

حسن تصدیق و بیعت

کنز علاج بالقبول

مصنفہ

محمد رفیق حسازی

کتاب خانہ ہنار و زندگی
لاہور ٹیکسٹ بک (مغربی پاکستان)

قیمت مجلد - 11/4/- Rs.



طلب ۶۹

بفرض ہفتہ

کتاب علاج ربا تصویب



مصنفہ

محمد رفیق حسازی


تحت خانہ ہنمائے زندگی

نوبہ نمیک سنگھ (مغربی پاکستان)

تعداد 2000 قیمت -/-/- Rs. 10



کنز العلاج



ڈاکٹر محمد رفیق حجازی میونسپل کمیشنر



جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

۷۸۶
۲-۷

زمانہ حاضرہ کا بے نظیر طبی شاہکار

کنز العلاج

(طبع سوم) بالتصویر

مصنف

ممتاز الاطباء حکیم ڈاکٹر محمد رفیق حبازی میونسپل کمشنر
ایچ اے ایچ پی پنجاب یونیورسٹی، آر پی ایچ

مالک و مدیر ماسنامہ رہنمائے زندگی مصنف قانون علاج مخصوص ادویہ جدید نکلشن کراچی
وغیرہ

پبلشرز

مینجر کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ

(مغربی پاکستان)

دس روپے



قیمت فی جلد

60664

۱۹۴۸ء

طبع اول

۱۹۵۲ء

طبع دوم

۱۹۵۶ء

طبع سوم



تعداد اشاعت ————— ایک ہزار

مطبوعہ

ڈی بی بزنس پریس لائٹ پورہ

دس روپے صرف

قیمت فی جلد

پیش لفظ

(طبع سوم)

الحمد للہ رب العالمین ، والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمدؐ و علی آلہ و اصحابہ
 و علی دلدہم ، الشیخ عبدالقادر جیلانی و بارک وسلم ،
 اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس انسانی سمدر دی اور فنی خدمت
 کے پاک جذبہ کے تحت یہ کتاب تحریر کی گئی تھی ، اس کے پورا سوسے کا ثبوت
 اس کتاب کے پیدے دو ایڈیشنوں کی مقبولیت سے ظاہر ہے ، اہل فن اور قارئین
 حضرات نے اس کتاب کو موجودہ دور کی بہترین اور مقبول ترین طبی تصنیف
 قرار دیا ہے ، اب اس کا تیسرا ایڈیشن بہار گنا اضافہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے
 اس کے متعلق مختصر عرض ہے ، کہ اس ایڈیشن میں تمام وہ طبی معلومات
 جن کا ہر ایک میڈیکل پریکٹیشنر عامل طب کو جاننا اور عمل میں لانا ضروری ہوتا ہے
 تحریر کر دی گئی ہیں ، سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسمانی بیماریوں کے طبی ڈاکٹری
 نام ، تعریف ، ماسیت ، اسباب ، علامات ، تشخیص ، رموز و نکات ، اسرار ،
 ذریعہ ہدایات ، مجرب الحرب یونانی ، ڈاکٹری ، ہومیو پتھی نشانی علاج پیش کیا گیا
 ہے ، اور خصوصیت سے ہر ایک مرض کی تشخیص اور علاج کو اپنے عملی تجربہ کے
 پیش نظر نہایت وضاحت سے لکھا گیا ہے ، اور جا بجا تشخیصی تضاد بھی دی گئی ہیں ،
 ابتداء سے طب سے لے کر آج تک علم طب نے جتنے منازل ترقی طے
 کئے ہیں ، اور جو جدید اکتشافات ہوئے ہیں ، دیکھ کر یونانی ، ایو پتھی ہومیو پتھی
 طریقہ علاج نے ازالہ امراض کے لئے جو نسخے تجویز کئے ہیں ، اور اپنے
 تجربہ میں بھی بار بار دفعہ آچکے ہیں ، ان کو تحریر کیا گیا ہے ، اور جہاں تک میرے
 دماغ اور تجربہ نے رسائی کی ہے ، کوئی نسخہ لغو اور غیر مستند نہیں ، بلکہ نام نسخے
 معمول و مجرب ہیں ،

اور خصوصیت سے جدید ادویات سلفا ڈرگس، اینٹی سی لین، اسٹریپٹوماٹی سین
 آرپوماٹی سین، کلورو مائی سٹین، دیکلینز، ہارمونز اور دیگر معینہ و مخرب قدیم
 جدید نسخہ جات، ہیپیٹٹ ادویات اور ہر ایک مرض کے مخرب اور شافی انجکشنوں
 کو بھی وضاحت سے تحریر کیا گیا ہے، ہومیو پیتھی اور بائیو کیمک علاج بھی درج ہے،
 آخر میں سرکاری ہسپتالوں کا فارما کو سیال بھی دیا گیا ہے۔

حقیقتاً یہ کتاب میری طبی زندگی کے عمل کا معجزیہ روح ہے، اور ہر ایک بات
 کو اپنے علم اور تجربہ کی روش سے ہدایت دیانت اور ایمانداری سے لکھا ہے،
 انشاء اللہ آپ اسے پڑھ کر اور اسے معمول بنانے کے بعد ہماری محنت
 صداقت اور انادیت کی داد دیں گے، اور دل و جان سے خوش ہوں گے،
 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید واثق ہے، کہ میری یہ کتاب
 عالمین طب کے لئے رہنما ثابت ہوگی۔

اس کتاب کو میں نے انتہائی کوشش، محنت اور حزم و احتیاط سے تحریر کیا ہے
 اور بحث کا پردہ چاک کر دیا ہے، لیکن پھر بھی انسان حنظل اور نسیان کا مرکب ہے،
 اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی یا سقم نظر آئے، تو مجھے ضرور مطلع فرمائیں، تاکہ آئندہ
 ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے، اور یہ حقیر تحفہ تمام اہل فن و علم حضرات کی خدمت
 میں پیش کرتا ہوں، "گر قبول افتد زہے عز و شرف"

غرض نقشبیت کرنا یاد ماند
 کہ ہستی رائے بیم بقائے
 مگر صاحب دلے روزے برحمت
 کند در حال این مسکین دعائے

خادم قوم و ملت محمد رفیق حجازی رفیق منزل ٹوبہ ٹیک سنگھ، یکم دسمبر ۱۹۵۶ء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا
محمد النبي الامي وعلى آله واصحابه وادليائهم وعلى وليد
الشيخ سيد عبد القادر جيلاني وعلى ارواح سلطان الفقهاء عليهم جميعين

باب اول

سر و اعصاب کی بیماریاں

درد سر HEADACHE ہیڈیک

وجوہات و تشخيص :- درد سر بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف
عام طور پر دوسری بیماریوں کے ساتھ ایک علامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے
اور فی الحقیقت قدرت کی طرف سے مرض کی موجودگی کے خطرے کا اعلان ہے
اس کی بہت زیادہ ہونے والی قسموں کو درج کیا جاتا ہے۔

درد سر مشترکی :- یہ درد سر دوسرے اعضا کی بیماریوں کے ہمراہ ہی ہو سکتا
ہے، لیکن عام طور پر معدہ اور انتڑیوں کی خرابی سے
ہوتا ہے۔ اس میں تبصن خاص خود پر ضرور ہوتا ہے، سر کے پچھلے حصے میں درد
سر کا جو جھل یعنی بھاری ہونا، سر جکڑانا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اس کی

علامتیں ہیں۔
 درد سر تیزی سے یہ نزلہ و زکام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں نزلہ و زکام کی تمام علامات موجود ہوتی ہیں۔

خاص کر جب غلغلیہ کاڑھا ہو کر دماغ میں رک جائے تو سر میں ہر وقت درد موجود رہتا ہے۔ اور درد خاص کر سر کے لگے حصے میں اور کنپٹیوں میں ہوتا ہے۔

درد سر بوجہ اعصابی و دماغی کمزوری : یہ درد دماغ اور پھیپھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پر زیادہ دماغی محنت کرنے والوں اور کمزور جسمانی عادیوں کو ہوتا ہے۔ اس میں درد ہر وقت لازم اور مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ دماغ معمولی محنت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نیند بھی کم آتی ہے۔

درد سر ساذج : یہ بغیر کسی مآخذ اور مرض کے سادہ درد سر ہوتا ہے جو عام طور پر سورج کی گرمی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور گرمی کا اثر دور ہونے کے ساتھ ہی رفع ہو جاتا ہے۔

اور کبھی یہ سردی لگ جانے سے بھی ہوتا ہے۔ سردی کا اثر دور ہونے ہی خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات شور و غل، زیادہ جاگیز، سفر اور تھکاوٹ، آگ کے پاس بیٹھنے سے بھی درد ہونے لگتا ہے۔ اسے اتفاقی درد سر بھی کہہ سکتے ہیں۔
درد سر مادی : یہ درد مادہ صفرا، غلغلیہ، سودا اور خون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

درد سرد موی : یہ سب سے زیادہ عام ہونے والا درد سر ہے۔ اس میں سر بھاری، بوجھل، چہرہ سرخ اور بھر پورا ہوا، آنکھیں سرخ، چنگاریاں یا

کھیاں سی اڑتی نظر آنا، کپٹھی کی ستر یا نیں خون کے جوش سے تڑپتی ہیں۔
اور درد خاص کر پیشانی اور گردی میں ہوتا ہے۔

درد سر صفر اوتی ہر یہ اکثر جگر کی خرابی، گرم غذاؤں اور دواؤں کے زیادہ
استعمال سے ہوتا ہے۔ اس میں درد شدت سے ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ
کڑوا، صفرادی تے اور جی مٹاتا ہے۔

اس کی خاص علامت یہ ہے، کہ سبب مادہ صفرافے اور دستوں
کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے، تو وہ سر کو فوراً تسکین ہو جاتی ہے۔

درد سر بلغمی یہ عام طور پر نزلہ، زکام ہونے کے بعد میں ہوتا ہے، سر میں بوجھ
کمی، نیند کی زیادتی، سٹخ اور نختوں میں تڑپتی ہوئی ہے جو اس
کلیئر، قارورہ سفید اور غلیظ آتا ہے اور سر میں درد شدید ہوتا ہے۔

درد سر سوداوی ہر سر میں بوجھ کے ساتھ درد، میمنہ نہ آنا، پریشان
خیالات، چہرے کی رنگت نیلگوں، بدن کا خشک ہونا، اس کی خاص علامتیں
ہیں، آتشک اور سوزاک کے دوسرے اور تیسرے درجے میں جب ان موذی
بیماریوں کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی شدید درد سر
پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے۔

درد سر دودھی ہر یہ درد دماغ اور ناک کے پچھلے حصے میں غلیظ مواد کے
جمع ہونے اور مادہ متعفن ہو کر دماغ میں کپڑے پر جانے کی وجہ سے ہوتا
ہے، اس کی وجہ سے سو بگھنے کی قوت بھی زایل ہو جاتی ہے، ناک کے
پچھلے حصے میں شدید خارش اور بے چین ہوتی ہے، ناک سے بدبو آتی
ہے، کبھی پیش کا مرض بھی ہو جاتا ہے، تالو میں سوراخ ہو جاتا ہے۔

یہ عارضہ عام طور پر آتشک کے مریضوں کو زیادہ لاحق

ہوتا ہے۔

درد سر سلسلی، یہ درد ادماغ میں رسولی پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، شروع میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، رسولی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ درد شروع ہو جاتا ہے، درد عام طور پر صبح کے وقت شروع ہوتا ہے، جھکنے اور لگائے سے شدید ہو جاتا ہے۔ درد کے ہمراہ چکر بھی آتے ہیں، اور رسولی کے مقام پر ہر وقت درد ہوتا ہے۔ دبانے سے بھی درد ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ مبنائی اور قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، شدید حالتوں میں غنودگی اور مرگی کی طرح درد سے پڑنے لگ جاتے ہیں، اس کی مکمل تشخیص اکسیرے سے ہو سکتی ہے۔

اس کا کوئی کامیاب علاج نہیں ہے، اندرونی رسولی کے لئے اپریشن بھی ناکام رہا ہے، ہمارے دوست ملک علم الدین صاحب بی، ایس بی کے لڑکے کو یہ مرض ہو گیا تھا، کافی علاج کے بعد پاکستان کے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹروں کے مشورہ سے مرین کومنڈن لے گئے، وہاں ڈاکٹروں نے اپریشن کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب اپریشن نہ کر سکے، اور اس مرض کو لا علاج قرار دے دیا، اپریشن کے تین ہفتہ بعد لڑکا فوت ہو گیا۔ مندرجہ بالا تمام علامات اس میں موجود تھیں، جسے کہ آخر میں مبنائی بھی بالکل زائل ہو گئی تھی۔

درد سر مزمن، یہ پرانا درد سر ہے، عام طور پر نقص تغذیہ، غذا کی کمی، یا کسی مہی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس میں زبان، چہرے اور آنکھوں کی رنگت سیاہی آیل ہو جاتی ہے، نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، ہر وقت معمولی درد رہتا ہے۔

درد سر حمیاتی، یہ اکثر شدید بخاروں کے ہمراہ ہوتا ہے، بخار رفع ہونے کے بعد دوسرے رفع ہو جاتا ہے، عام طور پر طیر یا تپ مخرقہ، چھپک، گردن تڑ بخار میں بہت شدید درد سر ہوتا ہے۔

درد سر ضروری: یہ درد سر دماغ پر چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی
 چوٹ لگتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی دماغ میں جریان خون ہونے کے
 بعد خون منجمد ہو کر جمع رہتا ہے۔ اس روز یا کچھ عرصہ بعد درد ہونا شروع
 ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مرگی کی طرح دور سے بھی پڑنے لگ جاتے ہیں ایسی
 حالت میں بعض سست، بے ہوشی اور سانس بھی رکھنے لگتا ہے۔ میرے بڑے
 محمد علی صاحب رحمہ اللہ عمرہ کو یہ مرض لاحق ہو گیا تھا۔ جو علاج کرنے سے شفا یاب ہو گیا
 تھا۔ اس مرض کا مجرب علاج تجربات درد سر میں ملاحظہ فرمائیں۔

ان اقسام کے علاوہ ہستریا، باؤگولہ، جمع، لہذاصل، خون، حین، نقص
 بصارت، کالاموتیا، اعصابی امراض، رنجا و خون، ہائی بلڈ پریشر، اشتراک الدم،
 خون کی زیادتی، ورم گردہ حاد و مزمن، کثرت جماع، کمی خون، دماغ پر چوٹ
 لگنے، دماغ میں ورم ہو جانے، منہ، راست، آنکھ، ناک، کان کی بیماریاں
 ذیابیطس ہونے کی وجہ اور ذہنی اسباب سے بھی درد سر پیدا ہو سکتا ہے۔
 درد سر پیدا کرنے والے ان اسباب کی تمام علامات مریض میں موجود ہوتی ہیں
 مکمل تشخیص کے لئے تصویر نمبر ۱ ملاحظہ فرمادیں۔

تشخیص درد سر کے علاج میں سب سے پہلے تشخیص کرنی نہایت ضروری
 ہے۔ تاکہ درد سر کا اصلی سبب معلوم ہونے کے بعد مکمل شافی
 علاج کیا جاسکے۔ درد سر کی تشخیص کے لئے درد کا صحیح مقام، درد کی کمیتی کا
 وقت، درد کی مدت یعنی کتنے عرصے سے ہے، مریض کی عام صحت اور دوسری
 بیماریاں جو مریض کو لاحق ہوں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
 کیونکہ اصل سبب کو معلوم کرنے اور اس کو رفع کرنے میں
 ہی اس کے صحیح اور شافی علاج کا راز پوشیدہ ہے۔

علاج : درجب اچھی طرح درد سر کا صحیح اور اصلی سبب معلوم ہو جائے ، تو سب سے پہلے اگر مریض درد کی شدت سے بے چین ہو ، تو مسکن دافع درد ادویات استعمال کرنی چاہئیں ، جن سے درد میں سکون حاصل ہو ، اس کے بعد اصل سبب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ،

درد سر کے علاج میں معصرہ اور انٹریوں کی معفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے ، قبض کو ضرور رفع کرنا چاہئے ، تاکہ مریض کی اجابت نرم ہوتی رہے ،

نسخہ ۱۰ اسپرین ۵ گرین ، فزیشن ۳ گرین ، کیفین ۲ گرین
ایسی ایک خوراک گرم دودھ یا چائے کے ساتھ استعمال کرائیں بحسب ضرورت چار یا چھ گھنٹے بعد دوسری خوراک بھی دے سکتے ہیں ،
یہ ہر قسم کے درد سر ، درد شقیقہ ، عصابہ ، نزلہ ذکام ، بخار کو فوری اور عارضی طور پر رفع کرنے میں بے حد مفید و مجرب ہے ،

ایلو پیٹھک ڈاکٹری میں یہ نسخہ "ای ای اسی" بوڈر کے نام سے مشہور ہے ، نیز عارضی طور پر درد سر کو رفع کرنے کے لئے کسی پیڈیٹ ادویات بھی استعمال ہوتی ہیں جو کم دیش اپنی دائرہ درد مسکن ادویات کا مرکب ہوتی ہیں ، مثلاً آسپرو ، سارپڈان ، کوڈو پامیرین ، سیبا لچین ، نوڈ لچین ، سونلچین ، دیجا نین ، ویرامون ایسے الی ڈین ، جنسپرین ، ایپیلی ڈین کیفین اسپرین وغیرہ ، عام دوا فروشوں سے مل سکتی ہیں ،

ان کے اجزائے مؤثرہ میں اسپرین ، کیفین ، کوڈین ، امیڈوپامیرین جو ہر افیون اور دوسری مسکن دافع درد ادویات شامل ہوتی ہیں ،
ان تمام ادویات کی مقدار خوراک اتنا ۲ ٹکیہ ہے ، گرم پانی ، دودھ یا چائے

کے ساتھ استعمال کرائی چاہئیں ،

ہر قسم کے جسمانی درد، درد سر، شقیقہ، عصابہ، درد کان، درد آنکھ، درد
دانت، درد سینہ، درد کمر، درد گردہ اور دیگر تمام جسمانی دروزوں کو عارضی طور پر
روکنے کے لئے بے حد مفید و مجرب ادویات ہیں، نیز درد روکنے کے علاوہ
خواب آور یعنی نیند بھی لاتی ہیں۔

نوٹ، سر کی بیماریوں کے علاج میں زیادہ ٹھنڈی، محذر مسکن کریموالی
بہ مسکن ادویات جو مثلاً ایفون، کوڈین وغیرہ سے بنائی گئی ہوں، عام حالات
میں استعمال نہیں کرنی چاہئیں، البتہ اگر شدت درد وغیرہ کی بنا پر سخت
ضرورت تھی جائے، تو استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں۔
بیرونی طور پر مندرجہ ذیل پیسٹ ادویات پیشانی پر لگانے سے بھی درد
میں افادہ ہو جاتا ہے۔

۱۔ امرت دھارا۔ پین بام فاسفورس بام، یہ سب ادویات ست پودینہ
ست اجوائن، مشک کا فود، کلورل ہائیڈریٹ کی مرکب ہوتی ہیں۔
ترکیب استعمال: ہر قدر بے دوائی لے کر پیشانی پر مل دیں، درد سر کو
فوری، عارضی ناسیدہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ اگر پیسٹ کی خواہی اور قبض وغیرہ سے درد سر ہو، تو دافع قبض ادویات
استعمال کرنی ضروری ہیں۔

۳۔ اظرفیل زمانی صاب زانی کی مشہور دوا ہے، بقدر ۹ ماشہ گرم و دودھ یا
پانی سے کھدیں، قبض رفع ہو کر درد سر کو آرام ہو جائے گا۔

قبض دور کرنے کے لئے بے شمار پیسٹ ادویات دوا فروشوں سے
مل سکتی ہیں، مثلاً بروک لیکس، کیسٹو فین، دچی میل پز، بیو پز، پل کالو سنٹھ
حب منقہ، لیگز پو پز وغیرہ۔ یہ دافع قبض ادویات مثلاً مقبیر، حنظل،
نیز فستقینیم، سقمونیا وغیرہ سے مرکب ہوتی ہیں، ان کی مقدار خوراک تا ۲ ٹکیہ

ہوتی ہے۔ جو گرم دودھ یا چائے یا نیم گرم پانی سے استعمال کی جاتی ہیں۔
 علاوہ ازیں فروٹ سالٹ، سٹڈ ٹیڈر، اسپم سالٹ، فروٹ سیلان
 وغیرہ بھی بقدر ضرورت ایک دو چمچ پانی میں ملا کر قبض رفع کرنے کے لئے استعمال
 کئے جاسکتے ہیں۔

نسخہ: ہر بلبلہ کا پانی ۲ تولہ، سنار کی مصفیٰ اتولہ، گل سرخ اتولہ، بنفشہ
 ۹ ماشہ، مغز بادام ۲ تولہ، کھانڈ ۳ تولہ، ہر ایک دوائی کا علوہ علوہ سفوف
 کر کے ملا لیں۔

مقلد اذخوراک: ۶ ماشہ تا اتولہ گرم دودھ کے ساتھ سو بوتل
 کھلائیں۔ یہ نسخہ درد سر بوجہ قبض، پیٹ کی خرابی اور دائمی قبض کے لئے
 بے خطا ہے۔ ہر قسم کے عادی درد سر میں خواہ درد سر کسی شلٹ کی وجہ سے ہو
 یا شویہ کرنا بے حد مفید ہے۔

۳۔ اگر نزلہ، زکام کی وجہ سے درد سر ہو، تو حسب علامات نزلہ و زکام
 کا علاج کرنا چاہئے۔

نسخہ: اسپرین ۵ گرین، ڈورس پوڈرہ گرین،
 ایسی ایک خوراک کھلائیں، اس سے نزلہ و زکام کی ترقی رک کر درد سر رفع ہو جاتا
 ہے، لیکن اس سے قبض ہو جاتی ہے، اس کی تین خوراکیں ہر چھ گھنٹہ بعد کھلا کر ٹکیں
 مسہل یا اور کوئی قبض کشا دوائی کا استعمال ضروری ہے۔
 اگر دائمی نزلہ، زکام کی وجہ سے درد سر رہتا ہو، تو مندرجہ ذیل نسخہ کا استعمال
 مفید رہتا ہے۔

نسخہ: مغز بادام شیریں ۱۰ دانہ، خشک شش سفید ۳ ماشہ، پوست خشک شش
 ۱۰ ماشہ، شیرہ کاہو معشر ۳ ماشہ، مغز تخم زبوز ۳ ماشہ، مغز تخم کر دے شیریں ۳ ماشہ
 مصری ۳ تولہ، دودھ گائے ۱۰ تولہ، روغن گاؤ ۵ تولہ۔

روحن گاد کے علاوہ تمام دواؤں کو باریک کوٹ کر دودھ میں سردائی کی مانند
 گرہ کر صاف کریں پھر پانچ تولہ گھی کو کسی قلعی دار برتن میں ڈال کر گرم کریں، جب
 گرم ہو جائے، تو سردائی کو اس میں ڈال دیں، اور دھیمی آہنج پر پکائیں، جب ذرا
 گاڑھا ہو جائے، تو پیچھے اتار لیں، نیم گرم ہونے پر کھا لیں۔
 ایسی ایک خوراک صبح، ایک شام، یہ نسخہ درد سر، نزلہ زکام، دالمی،
 کھانسی خشک، بے خوابی، ضعف دماغ کا حکمی علاج ہے۔
 نوٹ: اگر درد سر نہ ہو، اور صرف تعویث دماغ کے لئے استعمال کرنا ہو
 تو شیرہ تخم کا ہو شامل نہ کریں۔

نسخہ نسوار: ۱۰ مرچ سیاہ ۶ ماشہ، برگ نیم خشک ۲ تولہ، سوڈا
 بائیکارب ۱ تولہ، پوٹاشیم پرمنگنیٹ ۳ ماشہ

تمام دواؤں کو باریک میں لیں، اور نسوار کے طور پر استعمال کریں، جھینک
 لانے کے لئے بہترین نسوار ہے، نیز نزلہ زکام کی وجہ سے ناک کا بند ہونا،
 دماغ کا بھاری ہونا، سرد درد وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے۔

اگر درد سر وجع المفاصل گھٹیا کی وجہ سے ہو، تو پہلے یہ نسخہ استعمال کریں،

سیلانکسکسچر: گنیشا سلفاس ۲ ڈرام، ایکوا منتھاپ ۱۔ اونس
 ایسی دو خوراک گھنٹہ گھنٹہ بعد پلائیں، جب کھل کر دست آجائیں، تو یہ نسخہ
 استعمال کریں۔

لکسچر گھٹیا: سوڈا سیلی سلاس ۱۰ گرین، سوڈا بائیکارب ۱۰ گرین، سپرٹ
 کلوروفارم ۱۰ انس، ایکوا منتھاپ ایک اونس،

اسی ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ دیں

تزیاق گھٹیا: ایٹوفان رساختہ شیر لک، مقدار خوراک انا ۲ ٹکیہ ہر چار گھنٹہ بعد
 پانی کیسا کھنڈ کھلائیں، وجع المفاصل اور اس کے عوارضات کے لئے مفید ہے۔

معجون سورنجاں مقدار خوراک ۲ ماشہ دن میں تین خوراک کھلا نا بھی مفید

مفید ہے۔

اگر سر درد ضعف دماغ کی وجہ سے ہو تو مسکنات استعمال کرنے کے ساتھ تقویت دماغ کی کوشش کرنی چاہیے۔

نوٹ: درودِ سرزلی اور درودِ سرِ ضعف دماغی قریباً مساوی درجہ میں رکھتے ہیں، کیونکہ جب بار بار نزلہ زکام کا حملہ ہوتا ہے، تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور نزلہ بھی جھمی ہوتا ہے، جبکہ دماغ پہلے ہی سے کمزور ہو۔

اس لئے ضعف دماغ کا علاج کرنا نہایت ضروری ہے۔

نسخہ: ہر خمیرہ گاؤ زبان عبری ۳ ماشہ، اسپرین ۵ گریں، یہ ایک خوراک ہے عرق گاؤ زبان، اقلہ کے ساتھ دیں، ایسی تین خوراک دن میں استعمال کریں، درودِ سرِ ضعف دماغی و نزلہ کا تجربہ علاج ہے، دو ہفتہ کے استعمال سے حمد علامات بالکل رفع ہو جاتی ہیں، دوسرے درودِ پہلی، دوسری خوراک سے رک جاتا ہے۔

اکسیرِ ضعف دماغ: دٹامن بی ۱۲ جس کا تجارتی نام "سیٹامین" ہے، بمقدار ایک ہزار مائیکرو گرام عضلاتی انجکشن کریں، دماغی کمزوری، اور جسمانی کمزوری کے لئے بے حد مجرب ہے، ہفتہ بعد دوسرا انجکشن کریں،

طرِ لعل کشنیر: پوست عید زرد، پیلہ سیاہ، ۳ ملہ مقشر کشنیر خشک ہر ایک پانچ پانچ تولہ، تمام دواؤں کو کوٹ چھان کر حسب دستور طرِ لعل تیار کریں، مقدار خوراک: ۶ ماشہ دو دفعہ یا عرق گاؤ زبان سے صبح و شام کھلائیں،

یہ نسخہ دماغ کو قوت دیتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، دائمی نزلہ و زکام، آنکھوں سے پانی جاری رہنا، پیچیدہ معده، آشوبِ چشم اور دماغی کمزوری کے لئے بے حد مفید ہے۔

درد سر عصبی اور ضعف دماغی کے مریض کو کثرت جماع، حلق و دماغی محنت
 سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ورنہ مریض جلد ہی اعصابی کمزوری یعنی نیورسٹھینیا
 (NEURASTHENIA) میں مبتلا ہو جائے گا، جو بہت ہی مشکل العلاج
 مرض ہے، اور جنون، مایخولیا اور پاگل پن کا پیش خیمہ ہے۔
 درد سر ضعف دماغی کے مریض کو غذا زود ہضم اور لطیف دینی چاہئے،
 دماغ کو طاقت دینے والے معینہ و محرب نسخے ضعف دماغ کے علاج میں
 ملاحظہ فرمائیں۔

۵۔ اگر درد سر صغرا کی وجہ سے ہو، تو صغرا کو خارج کرنے کی کوشش

کریں نسخہ ہر کیلو مل ۲ گرین، سوڈا بائیکارب ۵ گرین، رات کو سوتے وقت
 پانی کے ساتھ کھلا دیں، صبح کے وقت ۴ ڈرام گلیشیا سلفاس پانچ توڑ پانی میں
 حل کر کے پلا دیں، اس سے کھل کر دو تین صغرا دی دست آجائیں گے،
 نیز بیوٹل بھی اس مطلب کے لئے معینہ ہے۔ رات کو دو گولی کھلا دیں
 صبح دو تین دست آجائیں گے۔

مشریت اٹی یا مشریت آلو بخارا یا مشریت بیوں پلانا بھی صغرا کی تیزی کو
 رفع کرتا ہے۔

صنداں اتلہ، کا فوراما شہ، عرق کلاب مرگھسی کر پیشانی پر صناد کرنا بھی
 معینہ ہے۔

سر پر سرد پانی دھارنا، دودھ اور دی کی لسی بھی صغرا دی درد سر میں
 معینہ ہے۔

نسخہ چین باؤم ہر کا فور ۲ تولہ، ست پودینہ اتلہ، ست اجوائن لا ماشہ،
 ریزلین ۲ تولہ، روغن زردہ ۵ تولہ،

تمام دواؤں کو کسی چھوٹے سے برتن میں ڈال کر نرم آگ پر رکھ کر گرم کریں،
جب تمام دواؤں میں مل ہو جائیں، تو کسی کھلے منہ والی سٹیشی میں ڈال لیں،
سردرد کے لئے ماسھے اور کنپٹیوں پر لگا کر آہستہ آہستہ مل دیں،
اور بھی جس جگہ درد ہو، وہاں ملنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

درد سر، شقیقہ، عصابہ، جسم کے بیرونی دردوں، زہریلے جانوروں کے
کائے اور آگ سے جلنے ہوئے مقام پر لگانے سے آرام ہو جاتا ہے، یہ ایک
قسم کا پین بام یعنی درد روکنے والا نسخہ ہے۔

۶۔ اگر درد سر مادہ سوداوی کی وجہ سے ہو، تو "معجون بخاج" کا استعمال سید
فائدہ کرتا ہے، لیکن پہلے سودا کا نفع کر کے تنقیہ کرنا ضروری ہے۔
اگر درد سرد موی یعنی خون کی زیادتی سے ہو، تو کیلول ۴ گرین، سوڈا بایکائیڈ
۱۰ گرین رات کو کھلا دیں، اور صبح ۴ ڈرام گینشیا حل کر کے پلا دیں، دو چار دست
ہو کر طبیعت صاف ہو جائے گی۔

شدت درد میں اسے پانی، اسی پوڈر بمقدار، اگر پین کھلائیں، یا
پوٹاشیم برومائیڈ، ۲ گرین، پانی ۵ تولہ میں حل کر کے پلائیں، درد کو
مشکین دینے کے لئے بے حد مفید ہے۔

صندل، کافور ماسھے پر لپیٹ کریں،
نسخہ ۱: یہ نسخہ درد سرد موی کے لئے بے حد مفید ہے۔
عاب پیہرانہ ۳ ماشہ، شیرہ تخم کاہو ۵ ماشہ، شربت بنفشہ ۳ تولہ،
عرق گاو زبان ۱۲ تولہ،

تمام دواؤں کو ملا کر پلائیں، دن میں دو بار،
ہر قسم کے گرم درد، درد کے لئے نہایت مفید و مجرب ہے، معمول
مطلب ہے۔

شریت عناب، بنلو فر اور شربت آلو بخارا کا استعمال درد سرد موی سکے لئے
 مفید ہے، کیونکہ یہ شربت خون کی حرارت کو بجھانے والے ہیں،
 روٹ، درد سرد موی کے مریض کو گرم غذاؤں، گوشت، گرم مصالح
 وغیرہ سے پرہیز کرانا چاہئے، اور قبض کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔
 بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی صورت میں رگ فیفاں کی قصد کھولنی بھی مفید ہے
 ۷۔ اگر درد سرد بلغم کی وجہ سے ہو، تو بلغم کا تنقیہ کریں، کیونکہ یہ باہموم نزلی
 طوبوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور یہی درد مزمن صورت
 اختیار کر لیتا ہے،
 بلغم کے تنقیہ کے لئے حب ایارج جو یونانی کا مشہور نسخہ ہے، بہت مفید و
 ثابت ہوتا ہے،

حب ایارج: ۹ ماشہ، ایارج فقیر ۹ ماشہ، کاناوانہ ۴ ماشہ
 غارلیون ۴ ماشہ، انیسوں ۴ ماشہ، نسیم حنظل ۲ ماشہ، نیک سامعہ ۲ ماشہ
 نام دواؤں کو کوٹ چھان کر عرق سولف کے ہمراہ بخود می گوبیاں بنیاد کریں
 خوراک ۴ تا ۸ گولی عرق گاؤ زبان یا عرق سولف کے ساتھ راست کو
 استعمال کریں، اعصاب کے ریشہ کو یعنی فضلات سے پاک کرتا ہے، درد سرد سے
 اور اسے کو مفید ہے، مرگی اور آنکھوں کی بیماریوں کو مفید ہے، دماغ
 کا تنقیہ کرتی ہے،

شدت درد میں مسکن ادویات مثلاً اسے پی، بی، پروڈر یا کوئی سپینٹ
 دوا استعمال کریں

نسخہ پلاسٹ: ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ، ۹ ماشہ
 کھلے منہ والی شیشی میں ڈال کر ادھر مضبوط کا رک لگا دیں، بوقت استعمال
 شیشی کو ہلا کر کارک کھول کر مریض کو سونگھائیں، بلغمی سردی کے لئے مفید ہے۔

نسخہ لشوار ہر کا پھل ازلہ پوٹاسیم پروٹینیٹ امانتہ ہر دو کو بار یک
پیس کر سفوف تیار کریں۔ بقدر ایک دو چادریں مرلین کو لشوار دیں۔ چھینکیں
آکر دماغ ہلکا ہو جائے گا۔ اور رکا ہوا مواد خارج ہو کر دفع ہو جائے گا۔
بلغمی درد سر کا خاص علاج ہے۔

ڈاکٹری نسخہ پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۵ گریں۔ سپرٹ کلوروفارم ۱۰ منم
سیرپ آرلشیائی اڈرام۔ ایچوا ایک ادنس

اسی ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ دیں۔ اس کے استعمال سے
بند رطوبتیں دوبارہ جاری ہو کر بلغمی مواد خارج ہو جاتا ہے جس سے دوسر
کو آرام ہو جاتا ہے۔

مسٹول ایک پیٹنٹ دوا ہے۔ اس کے دو تین قطرے ہر دو ناک کے
نخنوں میں ٹپکانے سے بھی ناک کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور درد سر میں
کافی کمی ہو جاتی ہے۔

اگر درد آتشک کی وجہ سے ہو جو عام طور پر آتشک کے دوسرے یا
تیسرے درجہ میں جب مرض کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور عموماً ناک کو
شدید درد ہوتا ہے۔ اکثر بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس درد کی صحیح تشخیص عام طور
پر آتشکی علامات سے کی جاتی ہے۔ اگر علامات نمایاں نہ ہوں۔ تو خون کا
امتحان کو اسے سے صحیح تشخیص ہو جاتی ہے۔

نسخہ پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۵ گریں۔ عرق مشہ ایک ادنس۔
دن میں اسی تین خوراک دیں۔

درد سر اور دیگر آتشکی عوارضات کے لئے نہایت مفید و مجرب نسخہ ہے
آتشک کی شرح تشخیص کے بعد کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورہ سے این۔ اے۔ بی کے
انجیکشن کا ایک کو دس لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

اگر درد سردماغ میں کیرٹے پڑ جانے کی وجہ سے ہو، تو یہ نسخہ ایسے مریض کے لئے اکسیر ہے۔
 نسخہ: ہر پورا نے جوئے کا تلے کر جلا کر رکھ لیں، مریض کو سنوار دیں،
 دن میں دو تین مرتبہ اس کے استعمال سے دماغ کے کیرٹے خارج ہو کر درد سرد
 زائل ہو جاتا ہے۔

عجیب نسخہ: ہر کلوروفارم خالص ۲ ڈرام، روغن تارپین ۲ ڈرام
 ایک شیشی میں ملا لیں، مریض کو سونگھائیں، اس سے بھی ناک اور
 دماغ کے کیرٹے خارج ہو جاتے ہیں، درد سردوی کے لئے عجیب نسخہ ہے
 اگر درد سر صبح کے وقت ہو، اور یہ اکثر خون کی قوت انجماد کی کمی سے ہوتا
 ہے، اس کے لئے یہ بہترین دوائی ہے۔

نسخہ: ہر کیسیم کلورائیڈ ۱۰ گریں، ایکوا ایک ادنس
 ایسی تین خوراک دن میں تین مرتبہ دیں، درد سر کو بے حد فائدہ کرتی ہے۔
 اگر درد سر کی خون کی وجہ سے ہو، جو درد سر کا ایک عام سبب ہے، تو مسکن
 بدافع درد ادویات کے استعمال کے ساتھ مولد خون مثلاً مرکبات فولاد، اور
 ایکٹریکٹ اور مقویات استعمال کرنی چاہئیں۔

نسخہ: ہر دٹامن بی ۱۲، ۲۵۰، مائیکرڈ گرام روزانہ ایک عضلاتی انجکشن کریں۔
 بہت جلد کی خون رفع ہو کر درد سردور ہو جاتا ہے، تجربہ کیا ہے۔
 بعض ادویات خشکی کی وجہ سے بھی درد سردور ہو جاتا ہے، اس کے لئے
 یہ نسخہ مجرب ہے۔

نسخہ: ہر دودھ آدھ سیر، روغن زرد اڑھائی تولہ، چینی پانچ تولہ، باقم ملا کر
 گرم کر کے غیم گرم پلانا خشکی کی وجہ سے درد سر کو فوری فائدہ بخشتا ہے، ہر سرد
 بادام روغن باقمی کن مالش بھی درد سر کو نافع ہے۔

حریرہ معز بادام خشکی کی وجہ سے ہونے والے درد سر کے لئے مجربات میں سے ہے۔

اگر درد سر سردی کی وجہ سے ہو، تو یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔
نسخہ: ۱/ اسطونودس ۲ ماشہ، سولف ۴ ماشہ، ملمعی ۳ ماشہ، پانی ایک پاد میں اوریہ ڈال کر آگ پر جوش دیں، بنگرم استعمال کرائیں، دن میں ایسی تین خوراک پانا بے حد مفید ہے۔

صرف پائے پانا بھی سردی کے سر درد کے لئے مفید ہے۔
نیز دارچینی یا سنڈھ کو پانی میں گھس کر کنپیٹیوں اور پیشانی پر طلا کرنا سردی کے درد سر کو رفع کرتا ہے۔

بعض ادنیٰات نظر کی کمزوری کی وجہ سے درد سر شروع ہو جاتا ہے، جو عام طور پر پیشانی پر ہوتا ہے، اور کبھی مادوف آنکھ کے اوپر ہوتا ہے، بینائی کا کام کرنے، زیادہ دیر تک پڑھنے، باریک، نظری کا کام کرنے اور سینما دیکھنے سے درد سر شروع ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں آنکھوں کا امتحان کرنا تشخیص کے لئے نہایت ضروری ہوتا ہے۔

اگر ضعف عبارت ہو، تو صبح منبر کی عینک لگوانے سے ہی درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی دوسری آنکھ کی مرض ہو، مثلاً کالاموٹیا، آنکھ کا زخم وغیرہ تو اس کا علاج کرنا چاہئے۔

کبھی دانت کی جڑوں میں پیپ کی وجہ سے درد سر شروع ہو جاتا ہے جو عام طور پر چہرے اور کنپیٹی پر ہوتا ہے، دانت نکال دینے سے ہی درد کو آرام ہو جاتا ہے۔

اگر کان کی خرابی سے درد ہو، تو ایر سکوپ سے کان میں دیکھنے سے اندہ کے پردہ کا دم یا زخم نظر آ جاتا ہے،

مسکناات استعمال کرنے کے بعد مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرنے سے ایک دو دن میں درد سر رفع ہو جاتا ہے۔

● پینی سی لین ۵ لاکھ پونٹ ڈسٹیلڈ واٹر ۵ سی سی

ہیم ملا کر عضلاتی انجکشن کریں۔ ایک دو انجکشن لگانے سے کان کا درد رفع ہو جائے گا۔

سلفا ڈیگس بھی اس مطلب کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔ اگر بخار کی وجہ سے درد سر ہو تو بخار کی حالت میں مسکناات سے درد کو روکا جاسکتا ہے۔ لیکن اصل بخار کا علاج کرنا ضروری ہے۔

اگر دوسرا شتاب گردہ کی وجہ سے ہو جس میں مندرجہ ذیل علامات مثلاً پیشاب کی قلت اور سیاہی مائل خون کے سرخ ذرات کا ہونا، پیرے اور تمام جسم پر درم بخار وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کا علاج گردہ کی بیماریوں میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس مرض کا مریض ہر وقت دوسری مبتلا رہتا ہے اور کبھی کبھی جاری ہو جاتی ہے، انی بلڈ پریشر کا علاج کرنا چاہئے۔

درد سر کے علاج کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ جتنے درد سر کے مریض ایک معالج کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً نوے فی صدی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

رسولی اور دماغی پھوڑے کی وجہ سے درد سر ہو، تو تندرست ہونا مشکل ہے۔ اور ایسے مریض شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔

دوسرا ایک ایسی مرض ہے کہ شاید ہی دینا میں کوئی ایسا آدمی ہو جسے درد سر نہ ہوا ہو۔ اس لئے معالج کو دوسرے علاج کے لئے

ادویات کا اہتمام ضروری ہے۔

مجربات درد سر

سفوف مسکن : در سوڈا سیلی سلاس ۲ تولہ، فنا شین ۱ تولہ، سورنجاں مہنچ و ماشہ
ست لوبان و ماشہ، مٹھا تیلیہ سفوف ۳ ماشہ،

تمام دواؤں کو باریک پیس کر سفوف بنیا کر لیں۔

مقدار خوراک ۲ رتی تا ۴ رتی، پانی چائے یا گرم دودھ کے ساتھ دیں۔
فوائدا : اسے حد مسکن و دفع درد ہے، درد شقیقہ، عصابہ، وجع المفاصل
نزلہ، ذکام، نقرس، بخار، درد اعصاب و عضلات کے لئے بہت مفید ہے۔
کرسٹمہ مسیحاٹی : لائیکوار ایموینا فورٹ ۱ تولہ، ست پودینہ ۱ رتی،

دروں کو شیشی میں باہم ملا کر مضبوط کارک والی شیشی میں
ڈال لیں، کالک کھول کر مرعین کو سونگھائیں۔

درد سر ہر قسم، نزلہ، ذکام، ناک کا بند ہونا کے لئے فوری اثر شہدہ ہے
لیکن عارضی ہے، اصل سبب مرض کو رفع کرنا ضروری ہے۔

اکسیر درد سر : برگیشیا فاس ۱۲ x، کالی فاس ۱۲ x، فیرم فاس ۱۲ x
برایک تین تین گرین۔

نیم گرم پانی کے ساتھ ایسی ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔
سر درد، درد شقیقہ، عصابہ اور دیگر اعصابی دردی، درد شکم، درد دل
کے لئے بے حد مفید و تجرب ہے۔

دوا سے دوسرے ضربی : اسٹوڈوس ۳ تولہ، بنات سفید ڈیڑھ تولہ،
دروں کو کوٹ چھان کر سفوف بنا دیں۔

اسٹوڈوس ۵ تولہ، کو ایک سیر پانی میں رات کو بگور کھیں، صبح جو شش دیں۔

اور مل چھان کر سٹھہر خالص نصف سیر ملا کر قوام بنایا کریں۔
 منوف خانہ ساز ۱۰ ماشہ کھاکو اور پر سے شربت خانہ ساز ۱۰ تولہ عرق
 بادیان ۵ تولہ میں ملا کر پی لیں
 ایسی تین خوراک روزانہ استعمال کریں۔

درد سر ضربی یعنی چوٹ لگنے سے پیدا ہونے والے درد سر کے لئے بھید
 مفید و مجرب ہے۔
 اکسیر درد سر ضربی: اگر سر میں چوٹ آئے کی وجہ سے درد سر ہو تو
 کوئی اور علامت پیدا ہو گئی ہو، تو مویو پیچک دوا ۱۰ آرٹیکا سے ۲۰ کی
 ایک خوراک ہر شب سے دن کھلیں، پہلی خوراک سے فائدہ ہو گا، نہایت مجرب
 ہے۔

سر میں چوٹ لگنے سے درد اور دیگر عوارضات سر درد کے لئے
 اکسیری اور فوری اثرات کی حامل ہے۔
 میچون درد سر اور انیسوں: گل سرخ، گل بنفشہ ہر ایک ۳۰ تولہ عود سندی
 ۲۰ تولہ صبر زرد، غاریقین کباب ہر ایک ۲ تولہ، مرکی، زعفران، حلیتیت خالص ہر ایک
 ۱۰ تولہ، جو دوا میں گوند کی منہم سے ہیں، جیسے مرکی اور حلیتیت، ان کو سرکہ میں حل کریں
 اور باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر سب کو شہد خالص کھٹ گھٹے، ۱۰ ماشہ میں ملا کر
 محض لہ کھیں

مغذ خوراک ۱۰ ماشہ سے، اس کی قوت ۲ سال تک رہتی ہے، مرکی اور علاج
 کرتی ہے، خواہ کھائیں یا ملا کریں یا بخور استعمال کریں، اسرار بخنیہ میں سے ہے۔
 درد سر سرد کے اقسام کو نافع ہے، منشی دماغ اور معوی و اس سے،
 نشاط لاتی ہے، اور معدہ کی اصلاح کرتی ہے، اگر گلاب خالص کے ساتھ
 استعمال کی جائے، تو گرم امراض میں بھی مفید ہے۔

درد سر کا ہومیوپیتھک علاج

اکوٹائٹ ۳۰x : شروع شروع کے ہر ایک قسم کے درد سر میں نہایت فائدہ کرتی ہے۔

سخت سردی، ماسے میں گرانی، چکر آنا، صفراوی تے، بے چینی، گھبراہٹ وغیرہ علامات میں بے حد مفید ہے۔

آرمینٹیک ۶x : پیاس کی شدت، بے چینی، کمزوری، تے آنا، پیشانی پر بوجھ اور سکون کی حالت میں سردی ہونا کے لئے مفید ہے۔

ایسڈ فاس ۳x : دماغی کمزوری کی وجہ سے سردی ہونے کے لئے نہایت ادائی ہے۔

سپیلڈوٹا ۶x : چہرہ سرخ، آنکھیں درد کر رہی، روشنی، شور و غل، حرکت میں تکلیف زیادہ ہو، سر کے دامن جانب درد اور پاگلوں کی سی حالت ہو، اور ہر قسم کے سردی کے لئے بہت مفید ہے۔

ایپیکاک ۶x : اگر درد سر کے ساتھ تے اور مستی ہو، اور بہت تکلیف ہو، تو یہ ادائی بہت مفید ہے۔

برائی او مینا ۶x : یہ دماغی جھلی میں سوزش ہو جانے کے لئے سردی میں بہت مفید ہے۔ جبکہ قبض، خشک اور سوکھا ہوا پاخانہ آوے، اور حرکت کرنے میں زیادتی ہو، اور صبح اٹھتے ہی سردی ہو۔

کینٹھ ۱۳x : مزدوروں اور دھوپ میں کام کرنے والوں کے درد سر میں بہت

ایڈامیکا ۶x : بد چینی، قبض، چوٹی میں بوجھ، سورج کی روشنی کے ساتھ

ساتھ درد بڑھتا جائے، اور شام کو کم ہو جائے، نیز درد شقیقہ کے لئے بھی بہت مفید ہے۔

سپالٹی جیلیا ۶۰ یہ درد قریباً ہر قسم کے سرد درد میں نہایت مفید ہے۔

سلفر ۳۰۰ یہ درد سر کی بہت سی قسموں میں مفید ہے، درد شقیقہ کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔

سیسیا ۶۰ نہایت سخت سرد درد، ایسا معلوم ہو کہ سر چٹ جائے گا، اور مر یعنی پتھنیں مارے، تپتی رہتی کا احساس، چہرہ زرد وغیرہ علامات کے درمیان میں بے حد مفید ہے۔

پلساٹیلہ، گنیشیا، ایوینیم کارب، چائنا، کلکیریا کارب، جیسی میم، کالیا، لیکس فاسفورس وغیرہ ادویات درد سر کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

گنیشیا فاس نہایت شدید درد سر جو دبا نے اور گرتی سے کم ہو، سردی لگنے سے بڑھے اس کے لئے نہایت مجرب ہے۔

کالی فاس دماغی کام کی زیادتی، اعصابی کمزوری اور بے خوابی کی وجہ سے سرد درد کے لئے نہایت مفید ہے۔

نیرٹرم سلف ہضمی مزاج والے مرلینوں کے سرد درد کے لئے بہترین دوا ہے۔

نیرٹرم فاس مددہ میں نیزا بیت کی وجہ سے درد سر ہو، صبح کے وقت درد کی زیادتی، منہ سے کھٹی ہوا آئے، تو مفید ہے۔

کلکیریا فاس دماغی کمزوری اور اعصابی درد میں نہایت بہترین دوا ہے۔

نیرٹرم میوہ پانچا فیض اور سر میں شدید درد کے لئے نہایت مفید ہے۔

نیرٹرم فاس سردی میں اجتماع خون، چہرہ اور آنکھوں میں تھما ہٹ اور سرخی حرکت اور جھکنے میں زیادتی، دبا نے سے کمی وغیرہ کی سرد و میں نہایت بہترین دوا ہے۔

درد شقیفہ MIGRAINE مائیگرین

دھڑکنا اور تشنہ پیس بہ یہ ایک قسم کا ذہنی سر درد ہوتا ہے۔ کھڑا رہ کر سر پر دھکبی مارنے سے سر میں ہوتا ہے کسی کے شروع ہونے سے دروہاں سے سر سے ہاتھ دیر دیر تک چمچ جاتا ہے۔ درد شروع ہونے سے دس منٹ سے کچھ ایک بعد دھکبی دروہاں ہاتھوں کی نگہبوں میں سونپناں کی چھتے کھنکھناتے ہیں۔ درنگ میں غصہ ہو جاتا ہے۔ دھکبی بروہاں ہاتھوں سے من کے بعد درد بڑھتا ہے۔ شدید ہو جاتا ہے۔ درنگ آتا ہے۔ کچھ گھنٹوں تک رہتا ہے۔ بعض آدمیوں کو اس درد کا آسنے دن درد ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کچھ کچھ ہوا میں آتا ہے۔ سر۔ ٹھونڈاں میں خد میں حد پر درد بعض میں شروع ہوتا ہے۔

اس کا درد درنگ گھنٹہ سے جو میں گھنٹہ تک رہتا ہے۔ درد کثرت سے پڑھتا ہو جاتا ہے۔ اس درد میں جھٹکا ہونے سے کثرت ہوتا ہے۔ یعنی درجہ میں آسانی ہونے سے یہ درد مدت مرد کو کیسے ہوتا ہے۔ درد کثرت ہوا میں ہوتا ہے۔

زرد کاک کے گڑا ہونے۔ مرد بخار سندید صیت عروانی جگر۔ مرد درد ہوا میں ہوا۔ یعنی ہوا میں درد کی زیادتی نافہ کشتی کثرت کثرت ہوا میں ہوا۔ ہوا میں ہوا۔ کثرت صیت دھیرہ سب سے ہوتا ہے۔

علاج ہر میں سب مرض کو صوم کر کے۔ یہ کرنے کا کشتی کرنی چاہئے۔ کر کے صحت کے دروہاں میں

اول دورہ مرض کی حالت کا علاج اور
دوم دورہ سے پہلے کی حالت کا علاج
جب دورہ ہونے لگے، تو مریض کو آرام سے اندھیرے کمرے میں لٹائیں،
اور یہ نسخہ استعمال کریں،

نسخہ ہر اسپرین ۵ گرین، کوئین سفاس ۳ گرین، ڈورس پوڈر ۳ گرین
ایسی ایک ایک پڑیہ ایک ایک گھنٹہ بعد، تین چار پڑیہ تک گرم و دھوا چائے
سے کھلائیں،

برقتم کے درد شقیقہ و عصاب کے لئے مفید ہے۔
● ٹیکچر حبسی میم ۱۰ بوند، لائیوڈ سٹرکینیا ۳ بوند، لائیوڈ ٹریپنی ٹرین ۱۰ بوند
یعنی زدن ۵ گرین، لائیوڈ اکلورونام ایک اونس
ایسی ایک خوراک دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔ وقفہ کی حالت میں بے حد
مفید ہے۔

اکسیر شقیقہ: اسطو خوردن ۳ ماشہ، رتقم دھنیا ۳ ماشہ، رتقم سیاہ ۷ ماشہ
تمام دواؤں کو پانی میں گھوٹ کر صاف کر کے بغیر نمک یا
مصری کے سورج نکلنے یا دورہ کے وقت سے پہلے ایک خوراک استعمال کرائیں،
یہ نسخہ درد شقیقہ و عصاب کے لئے تریاق الازہ ہے، چند دن کے استعمال
سے اس مرض سے نجات مل جاتی ہے۔

طلابہ شقیقہ: ہر جا گھوٹ ایک عدد پانی میں گھس کر جانب دراد کی مخالف
کنٹی پر دھیرے کے برابر طلا کریں، اس سے سوکشن ہو کر آبلہ پیدا ہو جائے گا۔
آبلہ جمید کر پانی نکال دیں، کھن لگاتے رہیں، زخم تندرست ہو جائے گا،
یہ طلا شقیقہ کے دورے کو روکنے اور درد کو شکمین دینے کے
لئے نہایت مجرب ہے۔

اس مرض کے علاج میں قبض کا خاص خیال رکھنا چاہئے، اگر قبض ہو تو رات کو بیوی پل ۵ گرین کھلا کر صبح کو ۳۴ ڈرام گنیشیا سلفاس ایک چھٹانک پانی میں حل کر کے پلاویں۔ قبض رفع ہو جائے گی۔

یا اطرینل زمانی بقد ۶ ماشہ گرم دودھ سے کھلائیں۔
درد شقیقہ کے علاج میں انجکشن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اگر بہت شدید درد بخار اور آنکھ کے ڈیوں پر دباؤ ہو، جیسے کہ باہر آ رہے ہیں تو اس وقت معمولی مسکنات سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایسی حالت میں مارینن سلفاس ۳۴ گرین، ڈیوین ۱۲ گرین کا ٹیکہ بہت جلد جملہ علامات دور کو رفع کر دیتا ہے۔

اکسیر درد شقیقہ: روٹامن بی ۱۲ جس کا تجارتی نام سیٹامین Sytamin ہے، مقدار ۲۵۰ ملیکروگرام ہر روز عضلاتی انجکشن کریں۔

درد شقیقہ و عصاب کے لئے بے حد مفید و تجرب ہے۔

درد شقیقہ کا ٹیکہ: گائی نرجن GYNERGIN (سندھ) اس کا اصلی نام ارگوٹائین ٹارٹریٹ ہے، درد شقیقہ کے علاج میں بالخصوص مفید و تجرب ہے۔

اس کے ۱/۲ ملی میٹر اور ایک ملی میٹر کے ایمپسبول ہوتے ہیں۔
شقیقہ کے حملہ کی پہلی علامت ظاہر ہوتے ہی ۱/۲ ملی میٹر گائی نرجن کا زیر جلد یا اندون جلد ٹیکہ کر دینا چاہئے، اگر ضرورت پڑے تو دوسرا انجکشن کریں، در نہ ایک ہی انجکشن سے درد شقیقہ، فتور بصارت کو دور کر دیتا ہے، اس سے ۹۰ فی صدی مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہر قسم کے درد شقیقہ مثلاً نقص بصارت، ایام ماہواری، سوجن مزاج خون

بمراض احشاء، یعنی لہن کے لئے بے حد مفید ہے۔

نزلہ و زکام سے ہونے والے درد کو کوئی اثر نہیں کرتا۔

میلر گال (ساختہ سندھ)

مقدار خوراک ایک ٹیکہ تا دو ٹیکہ دن میں تین خوراک۔

درد شقیقہ کے لئے بے نظیر پیٹنٹ دوا ہے، اس کے انجکشن بھی ہوتے ہیں، اس کا عضلی یا جلدی ٹیکہ ایک ایمپول کا کیا جاتا ہے، انگریزی پلیسٹر، ایمپلا سٹر کنٹریکٹس یہ ایک انگریزی پلیسٹر ہے، جو تیلنی کھی کا تیار کیا جاتا ہے، انگریزی دوائی فردشوں سے مل جاتا ہے،

گول کاغذی کاٹ کر اس کے اوپر پلیسٹر لگا کر کنپیٹوں پر لگا دیں، چار ہر کے بعد چھالا پیدا ہو جائے گا، اگر جلدی چھالا اٹھانا مطلوب ہو، تو روئی گرم سے ٹکڑ کر لیں، چھالے کو چھید کر پانی خارج کر دیں، درد شقیقہ کا فوری علاج ہے، اوپر گھی وغیرہ لگاتے رہیں، نوٹ، ایک اور انگریزی دوا ایپی سپاسٹکس بھی آبلہ پیدا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے،

اکسیر شقیقہ، کریمے کا پانی درد کی مخالف جانب ناک میں ٹپکانا فوری اثر دکھاتا ہے، معادہ درد بند ہو جاتا ہے،

ہدایات،

شقیقہ کے مریض کے لئے ہر قسم کی ثقیل، نفساخ، گرم اور محرک غذا یہ مشراب، کباب، شوربا، مٹھائی سے پرہیز لازمی ہے، غذا زود معتم استعمال کوئی چاہئے،

(نوٹ،

کبھی دماغ کے پانچویں پھٹے کے مادوں ہو جانے کی وجہ سے، کبھی ایک ایرو اور کبھی نصف چہرہ میں شدید نوبتی درد کا دورہ ہوتا ہے، اس سے درد عصاب کہتے ہیں،

مندرجہ بالا نسخہ جات ان کے لئے بھی معینہ ہیں،

درد عصابہ TICDOLARUX ٹک ڈولرکس

تشخیص : یہ مرض گرم خصلوں کے بخارات کا چڑھنا، زلہ و زکام کا بگڑنا، بطن فلیٹ کا جمع ہونا، سمیت طیر یا آتشک، گنٹھیا، بد معنی کی خون، خرابی دانت اس کے اسباب ہیں۔

یہ درد عموماً چہرے کے ایک طرف اور ابرو کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ درد اچانک آتا اور بڑا شدید ہوتا ہے۔ چند سکینڈ سے چند منٹ تک رہتا ہے اور بار بار دورہ ہوتا ہے۔ درد آفتاب کے بلند ہونے پر چڑھتا جاتا ہے، اس کے زوال سے لے کر غروب ہونے تک بند ہو جاتا ہے، اس درد کو عصبی شاخ کا درد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس پیٹھ کی تینوں شاخوں میں ہوتا ہے۔ اگر درد پہلی شاخ کے مادف ہونے سے ہو، تو پستانی اور سر کے سامنے ہوتا ہے، اگر دوسری شاخ میں خرابی ہو، تو اوپر کے جھڑے اور رخسار کے اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، اگر تیسری شاخ میں درد ہو، تو پچھلے جھڑے اور رخسار کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے۔

علاج : اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شدت درد کو روکنے کے لئے مسکنات کا استعمال کرنا چاہیے۔

اگر قبض کی شکایت ہو، تو قبض رفع کریں۔

مندرجہ ذیل نسخہ درد عصابہ کے لئے مستقل ہے۔

نسخہ : پوٹاسیم بردمانیڈ ۵ گرام، شیجر بیڈ ڈونا ۵ مہم، ایکوا کلوروفارم ایک ادش، دن میں صرف دو خوراک، دوسری خوراک پر درد بالکل بند ہو جائے گا، متعین و مجرب ہے۔

نزیاقی محصا بہ ہر پوست ہلیدہ کا پی اتورہ اسطو خود س بڑا تورہ ، بادیان
۶ ماشہ کتیز خلک و ماشہ ۷ مرچ سیاہ ۹ ماشہ ، دانہ الاچی کلاں ۶ ماشہ
پوٹاسیم برومائیڈ ۶ ماشہ ، الیپیرین ۳ ماشہ

سب دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنالیں ، پس تیار ہے ،
مفتد از خوراک ۳ ماشہ یا فی نیم گرم کے ساتھ صبح درد ہونے سے پہلے اور رات
کو سوتے وقت استعمال کریں ،

۶ نسخہ اعلیٰ درجہ منقہ ۷۵۰ گرام ، دافع درد اور قبض کشا ہے ،
نسوار عجیب : کا پھل اتورہ ، پوٹاسیم پرمنگنیٹ ۱ ماشہ ،
سفوف تیار کریں ، بوقت ضرورت ایک چادلی نسواریں ، زلہ و زکام کی
رکاوٹ سے پیدا ہونے والے درد عصابہ کو مفید ہے ،

اکسیر شقیقہ جو شقیقہ کے ضمن میں درج ہے ، درد عصابہ کے لئے بھی
مفید ہے ،

۱۰ نسخہ درد عصابہ ہر مارین سپر گرین کا جلدی ٹیکہ کریں ، اس سے
درد فوری رفع ہو جاتا ہے ، لیکن اس کے استعمال سے پہلے مریض کی حالت
کا اچھی طرح خیال کر لینا چاہئے ، صنف قلب کے مریض اور بچوں کو ہرگز نہ
لگانا چاہئے ،

جو سر متھنا ، کھول ہائیڈراس ، کیفز ، منقول ، عتایمبول ہوزن ملا لیں ،
سیال بن جائے گا ،

مقام درد پر لگائیں ، وقتی آرام کے لئے نظر دوائی ہے ،
غذا و پرمیٹیز ہر زود سفیم غذا مثلاً دال مونگ ، کچھڑی وغیرہ دیں ، تقبیل
نفاخ اور دیر سفیم غذا مثلاً آلو ، گوہی ، بنینگن ، تیل دالی اور ترشش اشیاء
محظوظ ، اچار سے پرہیز کریں ،

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پھٹوں کے درد خواہ جسم کے کسی حصہ میں ہوں، دٹامن بی اکی کی سے پیدا ہوتے ہیں،
لہذا یہ دٹامن جو مختلف تجارتی ناموں مثلاً بیرین وغیرہ سے ملتی ہے
اس کا خوردنی طور پر اور بذریعہ انجکشن استعمال کرنا بے حد مفید ثابت ہوا
ہے۔

دٹامن بی ا، ۲۵ ملی گرام ایک سی سی عضلاتی انجکشن کریں، روزانہ دو
نین انجکشن کرنے سے درد رفع ہو جائے گا،
اگر اعصابی کمزوری شدید ہو، تو اس کے ساتھ سیٹامین ۱۰۰ ملگرام
ملائیں، تو اور بھی زود اثر ہو جاتا ہے،
اگر یہ درد خرابی جگر اور تلی کی وجہ سے ہو، تو مندرجہ ذیل نسخہ بے حد
مفید و مجرب ہے،

نسخہ ۱: امونیم کلورائیڈ ۱۰، گرین، سوڈا سلفاس ۵، اگرین، ایکریٹک
ٹریکے سالی ۳۰، منیم، سیرپ اور نشیبائی ۵، منیم، ایکو اکلوروفارم، اونس
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ دیں، درد اعصاب و شقیقہ کے
لئے مفید ہے،

کابوس NIGHTMARE نائٹ میر

وجوہات: اصل سبب مرض کا بد معنی ہے، سلیوں کے درمیان
عضلات اور حجاب حاجز میں تشنج پیدا ہو کر دم گھٹنے لگتا ہے، غم، خوف
کثرت دماغی محنت، قبض دائمی، پیٹ کے کیرٹے بھی اس کے
اسباب ہیں،

شخصیں : مریض نیند کی حالت میں کوئی بیماری چیز سمیٹنے پر پڑی ہوئی محسوس کرتا ہے ، دم گھٹنا ، آواز کا نہ نکلنا ، حس و حرکت کا نہ ہونا ، تپش قلب اور حشمتناک خواہش میں نظر آنا وغیرہ اس کی خاص علامات میں فی الحقیقت یہ صرع یعنی مرگی کا پیشکش خیمہ ہے ۔

علاج : اصل سبب کو رفع کریں ، عام طور پر بد معنی کا علاج کرنے اور رفع قبض کے بعد مسکن ادویہ کا استعمال شفا بخشتا ہے ، ذیل کا اکثری نسخہ اس مرض کے لئے مفید ہے ۔

نسخہ : ہارٹیکٹ رٹیکے سائی لیکوئیڈ ۳۰ بوند ، ٹنگر جنشن کو ۳۰ بوند ، ایڈنا ٹریٹ ہائیڈرو کلورک ڈل ۱۰ بوند ، عرق پودینہ ایک اونس ، ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں ، بعد از غذا ۔

فوائد : خواب میں ڈرنا ، کابوس ، مایجولیا ، ردی گندے خیالات و مارغ کو چڑھنا ، مراقبہ سواد خوابی ، سقم ، دائمی قبض ، بد معنی ، ضعف جگر وغیرہ کے لئے مفید و مجرب ہے ۔

اول معمولی جلاب دے کر اس کو استعمال کرائیں ، یقیناً آہستہ آہستہ چھو جانا ہے بارہا کا آزمودہ ہے ۔

نسخہ : تربد سفید ۶ ماشہ ، شحم خنظل ۶ ماشہ ، صبر سفوطی ۶ ماشہ ، سقمونیا ۶ ماشہ ، پوست ہمد زرد ۶ ماشہ ، گل سرخ ۶ ماشہ ۔

سب کو گودہ کنوار گندل ۵ تولہ میں کھرل کر کے گولیاں برابر غواہ کے بنا دیں بوقت شب دو گولی ہر اذ عرق بادیاں پانچ تولہ کے کھلا میں بہت تجرب ہے ۔

در اسلو خوردن اولہ ، مصری اولہ ، مسوٹ پیا و گوبی ،

دوائے کابوس

مقدار ۶ ماشہ ہر دو شاہ روزہ پانی کے ساتھ کرے گی

مرض کابوس ، درد شقیقہ ، عصاب کے لئے مفید ہے ۔

نسخہ : محمود ہاشمیڈراس ، گرین پانی ایک اوش

بہارِ ایک خوراک رات کو سونے سے پہلے پلاویں خواب آدرا ہے۔

میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، لیکن وہ سب کچھ میرے لیے تھا۔

خبر: محمد علی جعفری

میں نے سب کے لئے سہید ہے، مگر عجبوں کے واسطے بالخصوص

یاد ہے، سوتے ہوئے دشتہ اک خواب دیکھے اور رونا چھٹنا شروع کر گئے

مخداویہ میرزا، قاضی، فیصل آباد، قاضی، کثرت حقہ نوشی، کثرت

خود بخود بخوبی چاہئے۔ چاہئے کہ وہ اپنے لئے غذا خود بخود

بسم تعالیٰ کریم

شعفا و ما

CEREBRAL ANEMIA

سیری برل (نیمیا)

اشخاص

و جہات و اسحق بن عیسیٰ و داؤد کے کل اربعہ حصوں میں خون کا

کہ مقدار میں پہنچتا ہے جس کی وجہ سے

ہے اور اپنے احوال کو اچھی طرح مرعہ بنائیں دے سکتا۔

صفحوں: داغ کی، ہم شور پر مندرجہ ذیل وجوہات ہوتی ہیں،

کم خون، ضعف قلب، کمی غذا، زیادہ دماغی محنت، کثرت جمار،

درین، احترام، جلال و امانت نفس، و ای نژاد زکام، دماغی ستر یا نو، میر،

سے پڑھا اور پھر دوسرا سہ ماہی سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔

سہریں اکثر ایک دردمنداں ہیں جو خصوصاً پچھلے حصہ میں ہوتا ہے۔

—تی کا بی مدہوشی : جمہوریہ داعی تحذرت سے قضاک جانا : معمولی مطالبہ

معمولاً شور و غل و چیخ و پکار کو برداشت نہ کرنا، ہتھوڑا سدا لکھنے پڑھنے، دھوپ میں چلنے پھرنے اور زور سے گفتگو کرنے سے دوسرے ہونے لگتا ہے، کالوں میں مختلف آوازیں آنا، اُسٹے بیٹھنے چکر آنا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا دائمی نزلہ زکام، چہرہ کی رنگت سفید، بے خوابی اور آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔

شدید حالات میں غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اور ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے، میں نے اکثر ایسے مریض دیکھے ہیں، جو اکثر مہی بیماریوں مثلاً بلیریا مزمن، تپ محرقہ، تپ دق، سنگرہنی، دائمی نزلہ زکام میں مبتلا ہوتے ہیں کثرت جوارح اور جلتی کے عادی اور عورتوں میں کثرت حیض و نفاس کا مریض سے ضعف دماغ عام طور پر پایا گیا ہے۔

در حقیقت میں یہ کوئی مستقل مرض نہیں، بلکہ بعض امراض کی علامت ہے۔ علاج: ہر مرض کے اصل اسباب کو معالج کر کے دور کرنا ہی اس مرض کا کامیاب علاج ہے۔ اگر مرض شدید ہو اور مریض کو غشی آتے ہوں، تو مریض کو آرام سے بستریہ کیے رہنے کو، درمیان کریں، اور ایک دو دن سوکھا پھر، جو دماغ کو محرک میں لاکر مریض کو ہوشیار میں لائیں، قبض کی شکایت ہو، تو حنظل کے ذریعہ قبض کو رفع کریں، اور مقوی ادویات استعمال کریں۔

عام حالات میں سبب کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔

ضعف دماغ کے علاج میں کامیابی کا مختصر ازالہ اسباب مرضی کا رفع کرنا اور دماغ کو تازگی اور تندرستی بخانا ہے۔

السیہ حافظہ: ہر معزادام، معزکدہ، سوافٹ خشخاش، سفید راجہ، ونگہ، الہام خورد، تولہ کرک، دہلی ۵۰، شہر مصری کوزہ، اذنا، کوٹ پچان کر سفوف بنادیں۔

خوراک اولہ ہمراہ شیر گاؤ دن میں دو بار،
 فوائد : وقت حافطہ کمزوری دماغ، دائمی نزلہ و زکام کے دور کرنے
 کے لئے اکسیر ہے۔
 سفوف مقوی دماغ : کشیز کنڈر، چاول سولف، مغز بادام، مصری
 کوزہ، سفوف برہمی بوٹی ہر ایک ۵ تولہ،
 الگ الگ کوٹ کر سفوف بنا دیں۔
 خوراک رات کو سوئے وقت ۲ تولہ ہمراہ شیر گاؤ استعمال کریں،
 دماغی کمزوری، شبانہ بھول جانا، کے لئے عمدہ نسخہ ہے۔
 صنعت دماغ میں دواؤں کی نسبت غذاؤں سے تقویت کرنا
 زیادہ مفید ہے۔
 دماغی کمزوری کو دور کرنے والا نادر و نایاب نسخہ
 قی سفوف برہن طمانک : اکسیر ٹیکٹ برہن، اولہ، رطب شیر کمود اولہ، ساج
 مستدی اولہ، ذراندہ حرج اولہ، کھٹ شیریں اولہ، درونج عطری اولہ
 ہلکی خورد اولہ،
 جملہ ادویہ کو بار یک کریں، ورق نقرہ ۴ ماشہ، ورق طلا امانہ، مسک
 برہن فیشل اڈرام، پل فاسفورس دو ڈرام، ریہ فاسفورس کا مرکب ہے بعض
 روایات نہیں ملتی، تو اس کی بجائے ایسڈ فاسفورک ڈائیلیوٹ مقدار خوراک
 کے لحاظ سے نسخہ میں شامل کی جاسکتی ہے، ایسڈ فاسفورک کی مقدار
 خوراک ۵ تا ۶ گم ہے، شامل کریں، اور ہموزن جملہ ادویہ شہد خالص ملا دیں
 خوراک ۴ تا ۶ ماشہ صبح و شام ہمراہ چائے یا دودھ
 یہ ایسا نسخہ ہے جو کمزوری دماغ کا سونی صدی علاج ہے، دماغی کام کرنے
 والوں کے لئے بہترین نسخہ ہے۔

علاوہ ازیں دہی نزلہ و زکام، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سر جھکنا، کمزوری قوت باہ، جریان، احتلام کے لئے بھی مفید ہے۔ اس کی ایک خوراک کھانے سے انسان گھنٹوں دماغی کام کر سکتا ہے، نادر روزگار ایجاد ہے۔ ترکیب ساخت اکسیٹرکیت برین،

بکرے کے سر کا مغز نکال لیں، بموزن کوڑھ معری یا کھانڈ ملا کر خوب گھوٹیں جتنے کہ ایک جان ہو جائیں، پھر پانی کی بھاپ پر خشک کر لیں، پس نیا۔ ہے شامل نسخہ کریں،

اکسیر مغزی دماغ، دماغن بی ۱۲، ۱۰۰۰ مائیکروگرام ہر چار دن بعد ایک عقلاتی انجکشن کریں،

دماغ کو طاقت دینے کے لئے اکسیری علاج ہے، عام مغزی جسم

بھی ہے، دو اے عجیب، خشخاش سفید ۳ ماشہ، مغز بادام ۲۰ عدد، چھار مغز

۳ ماشہ، دودھ گائے یا بکری ایک پاؤ، چینی سفید ۵۰ تولہ، جملہ چیزیں دودھ میں کھل کر لیں، چھان کر صاف کریں، آگ پر گرم کر کے صبح و شام استعمال کریں،

کمزوری دماغ، نزلہ زکام، کھانسی، سر درد، سر جھکنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ کے لئے مفید ہے، دماغی کام کرنے والوں کے لئے اول درجہ کی دوا ہے،

اکسیر دماغ، ہر شب ۲ ماشہ، مردارید خاص ۱ ماشہ، کرشنہ چاندی ۱ ماشہ، جملہ اسٹیا کو متواتر چھ گھنٹہ کھل کر لیں، خوراک ۲ رتی ہر روز مکھن یا ملائی وغیرہ،

کمزوری دماغ، قلب کا اکسیری علاج ہے، خفقان، دل دھڑکنا، کے لئے مجرب ہے

اگر کسی خون کی وجہ سے صغف دماغ ہو، تو فوراً کسیٹر مکیٹ بمع دامن کی
 کا استعمال ہے حد مفید ثابت ہوا ہے، یہ کسی کمپیور کو تیار شدہ مختلف
 ناموں سے مثلاً پلاگزن، گلیکس، کمپیو لائن رپارٹر، ملتا ہے۔
 مقدار استعمال ہر ایک سی سی عضلاتی ٹمیکہ کریں، مہفتہ میں دوبارہ
 اور خوردنی طور پر یہ نسخہ استعمال کریں۔

ترہ یاق بدنی ہر کشتہ مرجان ۶ ماشہ، درق طلا اماشہ، درق مساندی
 ۳ ماشہ، کشتہ فولاد ۶ ماشہ، کشتہ سیلاب ۶ ماشہ، کشتہ حببت ۳ ماشہ
 کشتہ قلعی ۶ ماشہ، کشتہ ابرک سیاہ ۷ ماشہ۔
 حجامہ اودیہ کو تقریباً ۳ گھنٹہ کھول کریں، تیار ہے۔
 مقدار خوراک ۲ چادل مکھن یا بالائی میں ملا کر کھلائیں۔

نور اسٹڈ ہر صغف اعصابی، رکیبہ دل، دماغ، جگر، اعصاب، عضلات
 اور عام جسمانی کمزوری خاص کر دماغی کمزوری کے لئے اکسیری دوا ہے، اس کے
 استعمال سے جسمانی کمزوری بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔
اکسیر دماغ مغز بادام ۵ دانہ رات کو پانی میں بھگو رکھیں، صبح چھلکا اتار
 کر کسی برتن میں کھول کریں، اس کے بعد اس میں مکھن ۵ تولہ
 پانی صغفہ ۵ تولہ، درق تقریباً ۵ عدد، ملا کر علی الصبح ناشتہ کریں، کبیا
 دماغ کمزور کیوں نہ ہو، اس چار پانچ ہفتہ کے استعمال سے دماغی
 کمزوری رفع ہو جاتا ہے۔

نسخہ درختہ پستہ اولہ، مغز جلفوزہ، اولہ، مغز فندق، اولہ، مغز بادام، اولہ
 تخم شلیم ۶ ماشہ، تخم ترب ۶ ماشہ، تخم ملیون ۶ ماشہ، جوز بویا ۳ ماشہ، خولہ بجاں
 ۶ ماشہ، دج ترکی، اولہ، دارچینی ۶ ماشہ، قر نفل ۶ ماشہ، فلفل سیاہ ۶ ماشہ
 دار نفل ۶ ماشہ، عاقر قرحا ۶ ماشہ

سب کو کوٹ چھان کر شہد و دھند ملا کر معجون بنائیں۔
 خوراک اتلہ ہمراہ شربت برگ ٹنبول ۲ تولہ کے پلانا مفید ہے۔
 دماغی تقویت اور نسیان کو رفع کرنے میں اکسیر بہت
 اکسیر دماغ بہ اجزاء ترکیبی۔ کلکیر یا فاس۔ گنیشیا فاس۔ فیرم فاس۔
 فیرم فاس۔ ہموزن

علامات :- حافظہ کمزور۔ بہت جلدی خشک جانا یا سر ہیر حیا و چڑھنے
 کے بعد سانس کا پھول جانا۔ عام کمزوری۔ کمی خون۔ میسار دہی بخار کے بعد کمزوری
 و نا طاقتی کے لئے بہترین دوا ہے۔
 اکسیر بدن :- اجزاء ترکیبی۔ کلکیر یا فاس۔ فیرم فاس۔ کالی فاس۔ گنیشیا فاس۔
 فیرم فاس۔ ہموزن

علامات :- عام کمزوری و نا طاقتی کا احساس۔ خون کی کمی اور نقا بہت
 قبض۔ درد سر۔ مریض ذکی الحس۔ حافظہ کمزور۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر
 کم خوابی۔ ڈرپوک اور تیز طبیعت۔
 خوراک دو ٹنگیاں سر تین گھنٹہ بعد۔

غذا :- زود ہضم۔ مقوی غذا میں مثلاً مونگ کی دال، شور بارہہ۔
 ترکاریاں، حیوانات کے مغز، دودھ، مکھن، ملائی، ازٹا، اسفنا، کھانا
 چائے، سبب، امرود، انگور، سرہ، آم، بیٹھا کھانا، پیر
 پیر، سیر، رقیق، بادی اور ترش چیزوں سے پرہیز رکھیں، کھانے
 جماع، دماغی محنت، گرم خشک غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے
 آلو، گوبھی، بیکن، لہسن، پیاز، چائے، مٹھا کو نوشی اور کثرت
 مطالعہ سے بچنا چاہئے۔

نزلہ وزکام

GORYZA-CATARRH

دکورا نیزا سینڈ کٹار

تعمیر لیبس ہر دماغ سے فضلات کے خارج ہونے کو نزلہ وزکام کہتے ہیں جب فضلات ناک کے راستے سے نہیں تو اسے زکام کہتے ہیں۔ اگر سینہ کی طرف گرے تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔

وجوہ است ہر موسمی تغیر و تبدل، دماغی کمزوری، کثرت جماع، گرم اور تر شرب، غذاؤں کا کثرت استعمال، زیادہ دھوپ میں چلنا پھرنا، سردی اور ٹھنڈی ہوا میں چلنا، سرد چیزیں مثلاً دہی، برف، کھنی، اور ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال کرنا نزلہ وزکام پیدا کرتا ہے۔

جدید تحقیقات میں نزلہ وزکام ناک کی میوکس ممبرین یعنی لعاب دار جھلی کا گرم درم ہے۔

تشخیص شروع مرض میں طبیعت سست اور کاہل ہو جاتی ہے۔ مائٹھے پر حکڑن، کنپٹیوں پر درد، ناک بند اور خشک، سر میں خفیف درد، بار بار چھینکے آنے لگتی ہیں، آخر میں ناک سے پتلی اور خواستہ اور طوبت بہنے لگتی ہے، اور رطوبت سفید اور غلیظ ہو جاتی ہے، اگر سردی کی وجہ سے ہو، تو رطوبت سفید اور غلیظ ہوتی ہے، اور سوزش کم ہوتی ہے، اگر گرمی کی وجہ سے ہو، تو رطوبت پتلی اور نکین نکلتی ہے، چہرہ آنکھیں سرخ، ناک اور حلق میں خراشش، پیاس بار بار لگتی ہے۔

علاج : اس مرض کے علاج میں مریض کی قبض کا رفع کرنا سردی اور
عشہ سے پانی سے محفوظ رکھنا ، تسکین دینے والی ادویات کا استعمال
کرنا اور مکمل آرام سے رہنا صحت یابی کا ضامن ہے ۔
ابتداء میں جب کہ رطوبت جاری ہو چکی ہو ۔ اس کو غلیظ کر کے
خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔

نسخہ : اے ، ڈی اسپرین ۵ گرین ، ڈورس پوڈر ۵ گرین ،
ایسی ایک خوراک مریض کو گرم پانی کے ساتھ کھلائیں ، دو دن تک مکمل
آرام کی ہدایت کریں ۔

اگر قبض ہو تو صبح کے وقت ۲ ڈرام گلیشیا ۲ چھٹانک پانی میں حل
کر کے مریض کو پلائیں ، تاکہ ایک دو دست آکر قبض رفع ہو جائے ،
نزلہ و زکام کا تکرر روکنے کے لئے معمول دجرب ہے ۔

کورائٹز مکسچر : لاسیکو ، ایپوینا ، ایسی ٹاس ۲ ڈرام ، سپرٹ ایٹھراٹراس
۲ مہم ، رائٹم اسپیکس ۱۰ مہم ، ٹیچر کیمفر کو ۱۲ ڈرام ، ایکو مفلر اڈنس ،
ایسی ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد پلائیں ۔

فوائید : نزہ و زکام کے لئے بہت مفید ہے ، اگر بخار ساتھ
ہو تو بھی دقت ہو جاتا ہے ۔
اکسیر نزلہ : قلعی شورہ ۹ ماشہ ، کافور ۴ ماشہ ، اینون ۳ ماشہ ،
میٹا تیلیہ مدبر ۱۲ ماشہ ۔

تھمرل کر کے مونگ کے برابر گویاں بنائیں ،
خوراک اگلی صبح و شام ہمراہ پانی

نزہ و زکام کا بہترین حریاق ہے ، بہت جلد دو تین خوراکوں سے
ہی حملہ کو روک دیتا ہے ۔

دوا سے نزلہ : ہر شعلچہ کو تین ایونے ۱/۲ ڈرام ، سیرپ کو ڈیٹا فاسفٹ
۱/۲ ڈرام ، ایکوا ایک اونس ،

یہ ایک خوراک ہے ، ایسی دو خوراک صبح و شام دیں
نزلہ و زکام کے لئے مفید ہے ،

نسخہ : اینٹی فیرین ۵ گریں ، صرف ہمارا چائے یا دودھ گرم ، تین تین
گھنٹے ، احتیاط کرنا کہ نزلہ و زکام کو فوراً دور کرتا ہے ،

نسخہ : اس کے لئے مجھے اچانک شدید نزلہ و زکام کا تدارک ہوا ، بلغم
منفرد : غلیظ ہو گیا ، اس کا معمولی علاج کرتا رہا ، لیکن آرام نہ ہوا ،
اور علامات تیز تر ہو گئیں ، ساتھ ہی کھانسی اور بخار شروع ہو گیا ، اور
کمزوری حد درجہ ہو گئی ، کئی قسم کے علاج یونانی اور ہومیو پیتھک کئے ،
لیکن آرام نہ ہوا ، آخر میں نے آسٹو مائی سین کا عضلاتی انجکشن تجویز
کیا ، دو تین انجکشن لگانے سے ہی تمام علامات رفع ہو گئیں ، اور پھر
حسب سابق صحت ہو گئی ،

اس لئے ہٹیلے قسم کے زکام میں سٹرپٹومائی سین اور پینی سی لین
کو یاد رکھیں ،

روغن دافع نزلہ : ہر زرد چوب ۴ تولہ ، بزرالنج ۴ تولہ ،

ایک سیر پانی میں ، بال لین ، جب نصف رہ جائے تو نیچے اتار کر
ایک سیر تیل کھنکھلا کر دوبارہ جو کشش دیں ، جب پانی جل کر صرف تیل
رہ جائے ، تو نیچے اتار لیں ،

اس میں ۴ تولہ ایون اور ۴ تولہ کافور ملا کر گرم کریں ، یہاں تک
کہ جل ہو جائے پس تیار ہے ، ماشہ تیل تالو پر لگا دیں ،

درد سر ، نزلہ ، زکام کے لئے بے حد مفید ہے ،

ناس نزلہ ہر آپہ صحرا جلا ہوا ، شیر مدار میں نر کر کے خشک کر کے پیس
کر محفوظ رکھیں ۔

بوقت ضرورت نسوار لیں ۔ سر کا بھاری ہونا کے لئے مفید ہے ۔
• یوکاٹس آئیل یا ایوینا کارب کا سونگھنا نزلہ و زکام کے لئے مفید ہے ۔
دلوٹ ، نزلہ و زکام کے لئے فاقہ کرنا نہایت نفع بخش ہے ۔
نر یا قی نزلہ ہر کچلہ مدبر اولہ ، دار چینی ۶ ماشہ ، عود صلیب ۶ ماشہ
لوگک ۶ ماشہ ۔

سب کو باریک پیس کر مفاہر ایک چاول کھن کے سلوٹھ کھائیں ۔
فسوائش نزلہ و زکام دائمی کے لئے عجیب اثر ہے ، عینہ
اور درد اعصاب کو بھی مفید ہے ۔

دوائے نزلہ دائمی ہر ہٹا سولف چینی سفید مسادی الون ، روغن
زرد گانڈ باعم ملائیں

... خوراک ۳ تولہ بوقت شام ہمراہ دودھ بچوں کو حسب عمر دیں ۔
انتباہ ہر نزلہ و زکام نبطا ہر معمولی مرض معلوم ہوتے ہیں ، لیکن
در حقیقت سل ، دق ، دمہ ، کھاشی ، ٹونہ ، لفٹ الدم ، چھپرہ ، بیاہیاں
یا بعض دیگر امراض اسی نامراد مرض سے پیدا ہوتی ہیں ، اس لئے ان کا
خاص خیال رکھنا چاہئے ۔

دوائے زکام : لوگک ۵ عدد ، مرچ سیاہ ۵ عدد ، انفسلہ راز
۳ عدد ، نیموں پیڑوں کو جو کوب کر کے ڈیڑھ پاؤ بختہ پانی میں جوش دیں
جب پانی نصف رہ جائے ، صاف کر کے ۲ تولہ چینی سفید ملا کر گرم گرم دن
میں دودھ پلائیں ۔

بد معنی سے پیدا ہونے والے نزلہ و زکام کی کامیاب دوا ہے ۔

ترياق نزلہ ہر ایک عدد چوزہ مرغ کا گوشت لے کر ایک سیر پانی میں
قدر سے نمک ڈال کر اس قدر پکائیں کہ پانی چومٹائی رہ جائے، چھان کر
گرم گرم پی کر جو اسے بچ کر سو رہیں۔

ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے نزلہ و زکام جڑے اکھڑ جاتا ہے خاص
کر جب کہ زکام کو ایک ہفتہ گزر گیا ہو۔

جوشنا ندی ہر گل بنفشہ ۶ ماشہ، برگ گاد زبان ۳ ماشہ، عناب ۵ دانہ
لسوڑیاں ۱۱ عدد، سونف ۳ ماشہ،

جود ادویہ کا سفوف تیار کریں۔

مستندار استعمال ہر ۶ ماشہ آدھ پاؤ پانی میں ڈال کر ۲ تولہ مہری

ملا کر آگ پر گرم کر کے نیم گرم پی لیں۔

اس کے تین چار مرتبہ کے استعمال سے نزلہ و زکام بالکل رفع

ہو جاتا ہے۔

اکسیر زکام ہر افیون ۶ ماشہ، آک کی جڑ کا پھلکا ۳۰ تولہ،

دو لون کا باریک سفوف کریں۔

بمقدار ۲ تا ۳ گرین گرم پانی سے دن میں تین بار دیں، زکام

کا ایک روزہ علاج ہے۔

اگر قہص کی شکایت ہو، تو رات کو قبض کشا دوائی کا استعمال کرنا

سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔

اکسیر نزلہ و امٹی، پیٹکڑی سفید انورہ کو چار ہر متواتر آگ کے

دودھ میں کھول کر کے خشک کریں، پھر دوسرے دن برگ دھتورہ کے پانی

میں کھول کر کے ٹکیہ بنا کر خشک کر کے کوزہ گلی میں خوب گل حکمت کر کے

جو اسے بچا کر دس سیراد پلوں کی آگ دیں، سفید کھیل نکلے گی۔

بار ایک سو فٹ کر لیں۔ خوراک اتنا ۲۰ روٹی یا ملائی یا حلویے میں دیں۔ دودھ گھٹنے تک پانی نہ پلائیں۔ دن میں ایک خوراک دیں۔ نئے دز کام کے لئے تین چار خوراک کافی ہیں۔ اور دائمی نزہہ کے لئے سات خوراک استعمال کرائیں۔
نئے دیرانے نزہہ کا حکمی علاج ہے۔

نسخہ :- گلی سفید ۶ ماشہ، تخم خلی ۶ ماشہ، سپستان ۱۱ دانہ، گاؤ زبان ۶ ماشہ، گل بلو فرہ ۵ ماشہ، اصل السوس ۳ ماشہ، بہیدانہ ۳ ماشہ
سب کو ایک پاؤ پانی میں ترکر کے صبح بنات سفید دودھ توڑ ڈال کر پلانا
نزہہ دز کام دودھ کو فائدہ کرتا ہے۔

تریاق نزہہ :- راسطو خدوس اتولہ، گل گاؤ زبان اتولہ، حب الاس اتولہ
کشیز اتولہ، تخم کاہو اتولہ، بزرابنج اتولہ، کوکنارہ ۲ اتولہ، تخم خشخاش ۲ اتولہ
گل سرخ اتولہ، کشیز خشک اتولہ، رب السوس اتولہ، لٹا سستہ ۱ اتولہ
صمغ عربی اتولہ، کثیرا اتولہ۔

ادل کشیز اور اس سے پہلی اور یہ کو پانی ایک سیر میں جوش دے کر
بنات سفید تخم سیر ملا کر قوام کریں، اوپر سے رب السوس، لٹا سستہ، صمغ
عربی، کثیرا، باریک پیس کر ملا دیں

خوراک ۶ ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان ۵ اتولہ کے کھلا دیں، یہ تریاق نزہہ
دز کام کے لئے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

نسخہ الرئیس :- نزہہ دز کام کا مریض دن میں ہرگز نہ سمئے، بھوک اور
پیاس جس قدر برداشت کر سکے، ترکرے، اور جتنا جاگ سکے، جاگے
یہ نزہہ اور دز کام کا بنیادی علاج ہے۔

جس شخص کو ہر موسم میں رخواہ گر مایہ یا سرمایہ دائمی طور پر نزہہ کی شکایت
رہتی ہو اس کے لئے حب قویا کا استعمال نافع ترین علاج ہے۔

مہیچہ کا بخور (دھوئی)، حالبس نزلہ ہے، اور زکام کا انتہائی علاج ہے،
 علامہ ابن سہیل صاحب مختارات اگر نزلہ سینہ پر گرتا ہو، تو اس کا علاج
 یہ ہے کہ فصد کھولیں اور مادہ الشیر میں گل بنفشہ اور اصل السوس منتشر
 پکا کر شکر طبرزد سے میٹھا کر کے پلائیں
 آپ آلو بخارا، عناب، شربت بنفشہ اور زنجبیل سے تلین طبیعت
 کریں، اور اگر نزلہ گرم ہو، تو لعوق خشخاش اور لعاب پیدانہ جلاب کے

نزلہ وز کام کا ہو میو پیشقی علاج

[illegible]

بزرگواران میں، نظیر امیر، ملکیر، سلف، کالی میور، ملکیر یا ناس، ملکیر یا ناس
 ملکیر یا ناس، کالی سلف، بھی نزلہ زکام کے لئے مفید اور بہاؤ ہے۔

اکسیر کھانسی زلہ و زکام :- اجزائے ترکیبی : فیرم فاس کالی میوہ ،
بھوذن

مرضہٹا محسوس ہو چھینکوں کی زیادتی ، کھانسی ، سانس لینے میں تکلیف ،
چھاتی میں درد ، ٹھنڈے پانی کی خواہش ، خوراک سرد گھنٹہ بعد دوٹکیاں ،

اکسیر افلوکسز :- نیرٹم سلف ۶۰ ، نیرٹم میوہ ۶۰ ، کالی میوہ ۶۰ ، فیرم فاس ۶۰
۶۰ ، مسازی الوزن ملائیں ، مقدار خوراک ۵ گریں گرم پانی سے دن میں چار مرتبہ
اگر بدن میں درد شدت کا ہو ، تو گینشا فاس ۶۰ ، ہمراہ دیں ، اگر کمزوری
اور نقابہٹ معلوم ہو ، تو کالی فاس بھی ملائیں ، افلوکسز زکام کا بہترین علاج ہے
اکسیر زکام :- نیرٹم میوہ ۶۰ ، نیرٹم سلف ۶۰ ، فیرم فاس ۶۰
مساوی الوزن ، مقدار خوراک ۵ گریں دن میں چار خوراک دیں ،

جب زکام کا ٹھہرا ہو جائے ، تو کالی میوہ بھی شامل کر لیں ، زکام کے لئے

مفید ہے

علاج زکام :- چھینکوں سے شروع ہو ، نیرٹم میوہ ۳۰ ، مجرب دوا ہے
۴ خوراک روزانہ لینے سے ایک دو دن میں آرام آجاتا ہے ، مکسیر یا فاس ۶۰
کی ہمارے خوراکیں تیسرے دن لینے سے باقی اثرات رفع ہو جاتے ہیں
موسم سرد یا سردی ہونے پر سرد ہو اسے زکام اور بخار ہو جائے ، رات
کو زیادتی ، سر سنگ اہم ، ۳ دن میں چار خوراک دیں ،

درایات :- زکام کے مریضوں کو ترش ، شیا ، برف ، ٹھنڈے
پانی کا استعمال ، دودھ ، دی ، دن کو سونا ، سردی و اکثر جماع ، کثرت
کھانا کھانا ، دھوپ میں چلنے ، پھرنے سے پرہیز کرنا چاہیے

غذا زود بختم ، دال مونگ ، پالک ، پتوں سے کا شورہ وغیرہ

دینا چاہئے

مرسام

CERIBRITIS سیری برائیس

تعریف : مرسام دماغ کے درم کو کہتے ہیں، خواہ درم خاص دماغ میں ہو یا دماغی جھلیوں میں، ڈاکٹری میں دماغ کے درم کو سیری برائیس اور دماغی جھلیوں کے درم کو من جاکٹیس کہتے ہیں، اور کبھی دماغ اور جھلی دونوں میں درم ہو سکتا ہے۔


وجوہات و تشخیص : خون کی آمد دماغ کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور اس کی واپسی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو دماغ اور اس کی جھلیوں میں خون جمع ہو کر درم پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ تیز بخار، طیریا، حرقة، تب دق، چھپک طاعون، ذات الحجب، ذات الریه وغیرہ امراض میں خون دماغ کی طرف زیادہ بہنے سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، کبھی تیز صوب میں چلنے، پھرنے، گرم چیزوں کے کھانے، شراب کے زیادہ پینے، سر پر چوٹ لگنے، گنٹھیا، نفرس اور آتشک سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی ناک یا کان کے اندر دانی درم کے بڑھنے سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے، بعض اوقات عورتوں کو بندش حیض کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔

اس مرض کی تشخیص میں دو چیزوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے، مشدداً جھک طیریا، تب حرقة، ذات الریه وغیرہ، یا تب دق وغیرہ میں مریض کے ہوش و حواس میں خلل آ جاتا ہے، مریض کی آنکھیں، منہ اور حیرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور یہودہ باتیں کرتا ہے، ٹھنکی باندھ کر دیکھتا ہے، اور دونوں کو پیستتا ہے، ہر اسے کسی چیز کو کپڑے اور بستر پر ادھر ادھر باغ مارنے لگتا ہے، کبھی جی متلانا، ایکایوں کا آنا اور بار بار تھوہ بھی



کنٹر العلاج

انجکشن لگانے کے مختلف طریقے
اور ان کے لئے بہترین مقامات کے نشانات



بھی ہونے لگتا ہے جب علامات بنایت شدید ہو جائیں مریض بالکل بے ہوش ہو، آنکھیں سرخ اور نیم کشادہ، ہاتھ پاؤں سرد اور سانس خراٹے سے آنے لگتا ہے، آخر مریض اسی بے ہوشی کی حالت میں مرجاتا ہے۔ جب مندرجہ بالا امراض کے علاوہ یہ مرض ہوتا ہے۔ تو یہ سرد اور سرد کے گھومنے کی شکایت ہوتی ہے، مریض کی طبیعت بے چین اور سست ہو جاتی ہے، بچوں میں تشنج ہو کر اور جوانوں میں سردی لگ کر بخار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سرسام کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں،

علاج: اس مرض کے علاج میں یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے، کہ اس مرض کے پیدا ہونے کا کیا سبب ہے، اصل سبب کے رفع کرنے سے ہی حاصل مرض کا کامیاب علاج کیا جاسکتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے، کہ آیا سرسام حقیقی ہے یا غیر حقیقی، کیونکہ سرسام حقیقی میں دماغ یا دماغی تھلیوں میں دم ہوتا ہے، اور غیر حقیقی میں دم نہیں ہوتا، صرف معدہ سے رومی بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر سرسامی حالت پیدا کر دیتے ہیں، جن کے اترنے سے مریض ہوش میں آجاتا ہے، کیونکہ دماغ میں خون کے اجتماع میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس مرض کے علاج میں یہی کوشش کرنی چاہیے، کہ خون کی آمد کو دماغ کی طرف سے کم کیا جائے، اور جوتا چکا ہے، اسے اعتدال پر لایا جائے، سرسام خواہ کسی قسم کا ہو۔ اس میں قبض کا رفع کرنا، پنڈلیوں کی ماسش کرنا، پاشوید کرنا یا پاؤں میں سینکیاں لگوانا بہترین تدبیریں ہیں، سرسام اگر مزنیہ کی وجہ سے ہو جو عام طور پر مزنیہ کا علاج نہ ہونے یا غلط علاج ہونے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مزنیہ میں بھی نیوکوکل رجائیم مزنیہ، سے پیچیدگیوں میں التهاب ہو جاتا ہے اور اسی التهاب کا اثر دماغ پر پہنچ جاتا ہے، اور دماغ میں رجائیم مزنیہ سے

سے رماغ یا دماغ کی جھلیوں میں درم پیدا ہو جاتا ہے۔
ایسے سرسام کے علاج کے لئے غویہ کا علاج ہی سرسام کا علاج
ہوتا ہے۔ جس کے لئے پانی سی لین اور سفاد ڈرگس کا استعمال شافی اثر
رکھتا ہے۔ جس کا کھل طریقہ استعمال غویہ کے علاج کے بیان میں ملاحظہ
فرمائیں۔

اگر سرسام کی حالت میر یا بخار میں تھلک ہو جائے، تو عام طور پر یہ
حوادث کے بڑھنے سے ہوتی ہے، اس کے علاج میں میر یا کا علاج کرنا
کوئین کا استعمال اور سر پر برف لگانا ہے حدیث بہ نسبت ہوتا ہے۔
جب درجہ حرارت ۱۰۵ یا اس سے زائد ہو، تو کوئین پانی یا سیڈرہ کلو را میڈ
اگرین کا استعمال بحکشن لگا دیں۔

تھن رفع کرنے کے لئے گلیسرین یا ٹینڈے پانی کا اینٹا کریں،
اکثر ایک بحکشن سے ہی درجہ حرارت نارمل ہو کر سرسامی عوارضات رفع
ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے علاج میں دو چار دن بھی لگ جاتے ہیں،
اگر تب حرقت رہا میٹاڈ پیورم کی وجہ سے سرسامی عوارضات پیدا
ہو جائیں، جس میں مریض آہستہ آہستہ بولتا ہے، ہاتھوں کو حرکت کرتا ہے
ناک، لبوں اور پسٹنر کو نوچتا ہے، اور بے ہوش ہو جاتا ہے، تو تب حرقت
کو ہی علاج کرنا چاہئے۔

کلورائی سٹین، سنٹر مائی سٹین، آپروائی سین وغیرہ ادویات
استعمال کریں، مفصل استعمال تب حرقت کے علاج میں ملاحظہ فرمائیں،

اگر تب وق دسل کی وجہ سے سرسامی علامات ظاہر ہوں، جسے سرسام
سی بھی کہتے ہیں اس میں شدید درد سر، گردن کا اکڑاؤ اور تیز روشنی کی برداشت
کم ہو جاتی ہے، تو اس کے علاج کے لئے تب وق کا علاج کرنا چاہئے،

جس کے لئے سٹر پٹو مائی سین۔ یہی فون اردو پکڑتے دن کے علاج کر
 برو نے کار لانا چاہتے۔ مفصل تب دیق کے علاوہ اس کا حلقہ فٹو
 اگر سرسام غیر حقیقی ہو جیسا کہ ہر ایک برمنی کی شدت میں مرمت
 بے ہودہ کبر اس، رہا غی خلل اور جو سرسام کے لوازمات سے ہیں اور کبر
 اسی مرض کا نڈا کہ اور علاج سے عام عوارض نہ ختم ہو جاسکتے ہیں
 انجکشن سرسام غیر حقیقی ہر ماہ جو سین ماسیڈ و پودا پٹو لے کر
 ٹشیکہ کریں۔ مریض کے سر پر پوت لگائیں۔

اس علاج سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے۔ رجسٹر سے اس کے لئے
 استغاث سے صحت ہو جاتی ہے

ہر سہ ہفتہ ایک پوٹا پکڑ و پودا پٹو
 ہر ایک مساوی اوزان ملا کر حسب ضرورت ان میں غلڑا

دیں

فٹو انڈ ہر درم سر ہر ہفتہ بیان سر سام اور موہا و باغ
 عضلات کی تیزی جس کو دور کرنے، پینڈ لاسنے، شکبہ دور
 مختلف اقسام، ام الصبیان، تشنج کز، جھٹکے، کالی کھانسی،
 جانا، دل دھڑکن، شہوت کا زیادہ ہونا، خواہ عورت ہو یا مرد کثرت
 درد رحم، بے خوابی، آلات محفوظہ زنا نہ دمر زنا کی سوچیں
 لئے مفید و مجرب ہے،

لوٹ، کمزوری و باغ، دل، عضب کی صورت، و باغ
 لئے استغاث جاتے نہیں

اکسیر سرسام : آٹا مرچک ایک پاؤ شیر گاویہ
 سرکہ ۲ تولہ

آٹے کو دودھ میں گوندھ دیں، گرم تھپے پر ایک طرف کی روٹی پکا دیں
 دوسری طرف ردغن گل اور سرکہ سے چھڑ کر مریض کے سر پر باندھیں، اول مریض
 کا سر منڈھ لینا چاہئے، اسی طرح تین گھنٹہ کریں، سرسام کی حکمتی دوا ہے،
 سرسام کی جلد بید دوا، پینلین ۵ لاکھ پونٹ کا استعمال یا نغالی انجکشن
 کریں۔ دن میں دوبار جب منشاء دماغ میں پیچیدہ کال جراثیم کی وجہ سے درم
 ہو کر سرسام کی حالت پیدا ہو جائے، تو اس کا استعمال اکسیری اثرات
 رکھتا ہے۔

آج کل نوالہ تاب خون کی وجہ سے دماغی خلل یعنی سرسام کے عوارضات
 پیدا ہو جاتے ہیں، پینلین کا استعمال ضروری سمجھایا ہے، تمام میڈیکل
 برکٹیشنروں کا معمول ہے۔
 پینلین کرشٹائن کی بجائے پروکین پینلین زیادہ مفید ثابت

ہوتی ہے۔
 دوا کے سرسام، رانی اتولہ، بابونہ اتولہ، سرکہ ۴ تولہ
 پس کر باہم ملا کر سر پر صناد کرنا بھی سرسام کے لئے مفید ہے۔
 اکسیر سرسام، پارہ مصفیٰ اتولہ، برگ تلسی ۲ تولہ
 دونوں کو اس قدر کھل کریں کہ پارسے کی چمک نابود ہو جائے،
 پس تیار ہے، تالو کے بال منڈوا کر اور اچھی طرح مالش کریں، اس کے استعمال
 سے ہڈیاں اودے ہوئی بہت جلد رفع ہو کر مریض کو ہوش آ جاتی ہے،
 سرسام کے لئے اکسیر پرتاثر ہے۔

لشجہ شترست، آلو بخارا ۲۵ دانہ، املی ۵ اتولہ، عناب ۳ تولہ،
 نیوفرہ تولہ، تخم کاسنی ۵ تولہ، گل بنفشہ ۲ تولہ، گل سرخ ۴ تولہ،
 رات کو تمام دواؤں کو ڈیڑھ سیر پانی میں جگر رکھیں صبح کیوقت

آگ پر جوش دے کر ایک سیر چینی سفید ملا کر مشربت تیار کریں۔
 مقدار خوراک ۳ تولہ ہر تین تین گھنٹہ بعد پانی ملا کر پلاستہ رہیں
 دھوی۔ صفراوی سرساک کے لئے بے حد مفید ہے۔

نسخہ: ہر گھل روغن ۳ تولہ۔ سرکہ اصلی ۳ تولہ۔ پیچہ مرغ ایک عدد۔
 پہلے انڈے کو پھینڈ کر دوزوں دواؤں کو ملا لیں۔ مرعین کے سرکہ کے بارے میں
 کر لیں کریں۔ اور ہر گھنٹہ بعد پلاستہ رہیں۔ ہر قسم کے سرساک کے لئے مفید ہے۔
 ضماد کا قوی اثر ہے۔ ۲۰ گرامہ سفید اولہ۔ سفید خشک اولہ۔
 عرق کلاب ۹ تولہ۔ سرکہ اصلی ۹ تولہ۔

صندل کشنیز اور کافور کے بارے میں کہ تمام دواؤں کو باہم ملا لیں۔ مرعین
 کے سرکہ کے بال ہنڈا کر اس میں کپڑا رکھ کر کے تالو پر رکھیں۔ اور جب خشک ہو
 جائے۔ بدلتے رہیں۔ سرساک صفراوی اور دھوی کے لئے کسیر ہے۔

نسخہ: ہر بوتل ۲۰ گرامہ۔ ۲۰ گرامہ۔ سرکہ فیروزی ۲۰ گرامہ۔ ۲۰ گرامہ۔
 ایجا ایک ادنیٰ۔ یہ پانچ برس کے بچہ کی آٹھ خوراک میں۔

بہتر ہر گھل روغن ۳ تولہ۔ سرکہ اصلی ۳ تولہ۔ پیچہ مرغ ایک عدد۔
 مرض نفوذت کے لئے چھلی کے تیل کے مرکبات سے کٹھن ایلیشن وغیرہ
 استعمال کرنے چاہئیں۔

سرساک کے مرعین کے علاج کے متعلق میرا تجربہ ہے۔ کہ پہلے سرساک کے
 اسباب کو لکھ کر مطالعہ کرنا چاہئے۔ جب سرساک کا منجم سبب معلوم
 ہو جائے۔ تو پھر علاج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔

نسخہ: ہر مرغ کا شکم چاک کر کے گرم گرم سر پہ باندھنا بھی مفید ہے
 اور پنڈلیوں پر بھری سینکلیاں لگانا۔ یا شویہ کرنا اور حقن کرنا بھی
 مفید ثابت ہوتا ہے۔

اس میں اس کی ایسی ادویات استعمال کرنی چاہئیں جن سے
سہل کے جراثیم ہلاک ہو کر ٹیڈی ریکل کی عقور تکمیل ہو جائیں۔
اس مطلب کے لئے قدیم ادویات میں سے پارہ اور پوٹاسیم

ایچوڈر، بیڈی،
سہید ادویات میں سے سٹرپٹومائی سین بہترین فائدہ مند

دوا ہے۔

سرسام کا ہومیوپیتھی علاج

اس مرض کے شروع میں بیل ڈونا سفید دوائی ہے جب جاگنے اور
خواب میں برابر سرسام جاری رہے۔ اگر مریض کپڑے پھاڑتا ہو، اور
گٹھ اٹھ کر باہر دوڑتا ہو، اور کبھی تھینے لگ جائے، اور کبھی رونے
لگ جائے، اور جو کچھ منہ میں آئے، کھتا رہے، اور کبھی چپ چاپ
بیٹھا رہے، تو ایسی حالت میں ہایکو سامس، ۳ سفید ہوگا۔
اگر آنکھ کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں، اور سینہ سے مریض تڑپتا ہو
اور وقت بوقت اس کو اس کرتا رہے، تو سٹرپیوٹیم ۶ تا ۳۰ بستر دوائی ہے۔
غیر مفاہیم اور پیسہ درجہ میں جبکہ بخار کے ساتھ بھن تڑپ ہو۔
کالی میوڈر، نیز بخار کے ساتھ ہریان ہو، بے چینی اور بے خوابی، مریض

خوف، زبردستی، کڑواہٹ،
زبردستی، کڑواہٹ،
کالی میوڈر، سر میں رچناغ خون کی وجہ سے سرسام ہو، دماغ میں

کافی دوا ہے۔

بے خوابی EN SOMNIA ان سومینیا

تعریف ہر اس مرض میں مریض کو نیند باطل نہیں آتی، اگر آتی ہے، تو بہت کم آتی ہے۔

وجوہات ہر اس کا سب سے بڑا سبب دماغ میں خون کی آمد کا کم ہو جانا ہے، جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو کر نیند آنی بند ہو جاتی ہے، یا انجم تیز بخار، شدت درد، بد معنی، قبض، خون کی کمی، رنج و غم، نفرد و تردد، دل و دماغ کی بیماریوں کا مضر، نفرس، گنٹھیا، لیجوینا، کثرت دماغی محنت، جلق اور جماع کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔

نیز شراب، متب کو نوشی، چائے، قہوہ، نسیم، جنگ، چرس، چاندرو، کرکین کے کثرت استعمال سے دماغ میں خشکی پیدا ہو کر نیند کم آتی ہے۔

تشخیص بے خوابی کے مریض کی دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے طبعیت ہنایت بے چین اور پریشان ہوتی ہے، ناک کے نچھنے

خشک ہوتے ہیں، پیاس زیادہ لگتی ہے، سر میں گرتی معلوم ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بعض اوقات غورگی سی آ کر نیند چاٹ ہو جاتی ہے

علامات اصل سبب کو معلوم کر کے مریض کو دیکرنا چاہئے، دماغ کو روغنیت سے تری پیدا کرنے کی کوشش کرن چاہئے، اگر نیند نہ آنے کا سبب خون کی کمی ہو، تو خون پیدا کرنے والی ادویات، استعمال کرنی چاہئیں۔

نسخہ روغن لبوب سبب ہر مغز منق، مغز پستہ مغز بادام شیریں، کنجد مقشر، مغز چغوزہ، مغز تخم کدو، مغز جوز داخروٹ،

براہدزن کوٹ کر اور گرم کر کے خوب اچھی طرح جوڑ دیں۔ یا کو لھوسے

تیل نکلو الیس،

فوائد ہر دماغی خشکی کو زائل کر کے بے خوابی کو دور کرنا ہے، سرسام سودا دی میں بھی نافع ہے،

نسخہ مکسیر خواب آور ہر پیم برد ماہیڈ ۵ اگرین، کلیرل ہائیڈروسیٹ، اگرین سپرٹ کلوروفارم، اگرین، ایکوا ایک ادنس،

ایسی ایک خوراک سوتے وقت دیں، نہایت عمدہ خواب آور ہے۔
نسخہ ہر فینوباربیٹون ۱۲ اگرین، ملک شوگر، اگرین،

ایسی ایک خوراک سوتے وقت دیں، خواب آور ہے۔

شیخ افراتیس: صاحب سبات کو ایسے امرد سنانے اور دکھانے چاہئیں، جو اس کو غم میں مبتلا کر دیں، کیونکہ اس قسم کی امراض میں جن میں قوت فکر ضعیف اور منجمد ہو جاتی ہے، غم نفس میں تحریک پیدا کرتا ہے، اور اسے اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے،

علامہ داؤد انطاکی: امرد جبہ ذیل نسخہ جات نیند لانے کے لئے ہمارے

محررات سے ہیں،
صفنہ: خوش رکا ہو، خشخاش اور زنج راہو، خراسانی، ان تینوں کے پھول پتی، بیج اور چھال میں سے جو چیز چاہیں، یا جو میسر آئے، ہر وزن ایک ایک حصہ ۱۵ زلہ کل حنا اس رمود، باقلا ہر ایک نصف جزو ۲۰ قود، صبر زرد اور زعفران خاص ہر ایک بقدر قلیل جتنی میسر آئے، تقریباً ۶ ماشہ۔

سب کو ایک سیر پانی میں اس قدر پکائیں، کہ دوا میں مضحل ہو جائیں، اس کے بعد صاف کر کے کسی مناسب تیل مثلاً روغن کدو یا روغن کاہو ۱۰ چھٹانک کے ساتھ اس قدر جلا لیں، کہ جل کر تیل باقی رہ جائے، صاف کر کے محفوظ رکھیں، اس کو خواہ کسی طرح استعمال کیا جائے، نیند لانے اور درد سر کو زائل کرنے کے لئے، سرار عجیب ہے۔

جس شخص کو اس کے استعمال سے بھی نیند نہ آئے، اس کے اچھا ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہئے۔
 غذا: زرد سفیم غذا ایسے مثلاً شوربا، بخنی، دودھ، ساگروانہ، بکسن، کدو، خرفہ وغیرہ استعمال کریں۔ تازہ پھلوں میں انگور، سیب، خربوزہ، آم کا استعمال بھی مفید ہے۔
 پر ممبر: گرم ترشش چیزیں، گرم مصالح، بٹنگن، سرکہ، اجپار، مچھلی، گدہ بھی، آلو، کثرت مطالعہ، دھوپ میں چلنا پھرنا زیادہ غور و فکر اور کثرت جماع سے پرہیز کرنا لازماً ہے۔

نسیان AMNESIA ایلم نسیا

تعریف: اس مرض میں مریض کو باتیں یاد نہیں رہتیں جو باتیں پہلے یاد ہوتی ہیں، ان کو بھی بھول جاتا ہے۔
 وجوہات: جب رطوبات کی زیادتی سے دماغ نرم پڑ جائے، یا ان کی کمی سے سخت ہو جائے، تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ عموماً عبات، کثرت جماع، شراب کا کثرت استعمال، غم و غصہ، رخ و فکر، سر پر چوٹ لگنا، دائمی نزلہ زکام، ضعف دماغ، نرم دماغ، دھوپ میں عرصہ تک رہنا یا آگ کے پاس دیر تک بیٹھے رہنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوسنے اور خاص کر دان کے وقت سونے سے خون میں بے رطوبتیں زیادہ شامل ہو جاتی ہیں جن کے باعث دماغ کے نرم ہونے سے یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی بدبودار مقامات میں رہنے سے خون میں زہریلی کیفیت پیدا ہو کر نسیان ہو جاتا ہے۔

تشخیص : ہر مریض کے نتھنے خشک . نیند کا نہ آنا ، قبض رہنا ، غورٹی محنت کرنے سے سر میں درد ہونا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا ہے . بعض مریضوں میں نیند کا زیادہ آنا ، ناک اور منہ سے رطوبت کا زیادہ نکلنا ، منہ کا مزا پھیکا اور چہرہ پر پھر پھر اسٹ کا ہونا پایا جاتا ہے .

علاج : ہر مریض کا اصل سبب معلوم کر کے اس کا علاج کریں ، قوت ہضم کی اصلاح کرنا ، خون پیدا کرنے والی اور دماغ کو طاقت دینے والی ادویات اور پیئر کو استعمال میں لانا چاہئے .

جو ہر یہ بھی کہ استعمال اس مرض کا شافی علاج ہے .

جو ہر یہ بھی : ہر یہ بھی کے تازہ پتے مع جوڑ حسب ضرورت لے کر ان کا پانی نکال لیں ، آگ پر اس قدر پکائیں کہ گاڑھا قوام بن کر خشک ہو جائے ، سفوف بنا کر محفوظ رکھیں .

مقدار خوراک : رتی ۲ چھٹانک مکھن کے ساتھ دیں ، ہر قسم کی دماغی کمزوری ، جریان ، احتلام اور نفل کی کمزوری کے لئے مفید ہے .

مندرجہ ذیل دوا بھی نسیان کے واسطے مجرب ہے .

صفنتہ : ہر کنڈر ۳۰ تولہ ، نفل سیاہ ، دبلہ ، ہار یک کوٹ چھان کر ۱۴ ماشہ روزانہ صبح ہنار منہ استعمال کریں .

علامہ طبری صاحب فرودس الحکمت : ہر مندرجہ ذیل دوا حفظ کو بڑھانے اور صحت و شباب کو باقی اور قائم رکھنے کے لئے نافع ہے .

صفنتہ : ہر بلاور ۱۰ تولہ ، ہر جلا زابا ۱۰ تولہ لے کر قوڑیں ، اور ٹکڑے کر لیں ، اس کے بعد گچھے ہوئے گھی سے خوب اچھی طرح دھوئیں ، اور سیاہ بیخ خشک کر لیں ، پھر حبہ الخضر ۱۰ تولہ ، سادج ہندی ، بلیدہ سیاہ ہر ایک ۱۰ تولہ ، قر نفل ہر ایک ۱۴ ماشہ ، ہر کوٹ چھان لیں ، اور شہد کف گرفتہ

اور روغن گاد ہموزن میں دوائیں اور بلا اور مذکور ملا کر اور اخروٹ کے برابر لٹو
سٹ لیں ، اور چالیس دن تک روزانہ ہمار منہ گائے کی دہی کے ساتھ کھائیں
لشعہ ہر دوا من لی ۱۲ دبی کمپنیکس اور مرکبات فولاد اور کچلہ بھی اس
مرض کے لئے مفید ہیں ۔

غذا و پرہیز ہر خون کی کمی کی صورت میں شوربا چپاتی پھوزہ مرغ اور
پرندوں کا گوشت رنیم پرشت انڈا دودھ ، مکھن ، ملائی ، سیب ، آم
خوبوزہ وغیرہ کا استعمال کرنا نہایت مفید ہے ۔

دماغی اور جسمانی محنت کثرت جماع ، گرم خشک ، غلیظ اور بادی
چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے ۔ رھو ہڈوں کے غلبہ کی صورت میں برف اور
سرد چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے ۔

نیمندگی زیادتی SAMNOLENIC سامنولینس

تعریف ہر اس مرض میں مریض طبعی نیمند سے زیادہ سوتا ہے ، اور ہر وقت
نیمند میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے ۔

وجہ ہاست ہر اس مرض میں دماغ میں رھو ہڈوں کی زیادتی ہوتی ہے ، یا دماغ
رگیں خون سے پر ہو کر دماغ پر دباؤ پڑا ہوتا ہے ، یا وہ ٹھنڈی چیزوں کا کثرت
استعمال بد ہضمی ، نزلہ ، زکام ، شراب ، انسجون وغیرہ کا استعمال بھی گری نیمند
لاتا ہے ، اور کبھی خون کی کمی سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے ، جسم سے
زیادہ خون نکل جانا ، دم کسی ، طویل فاذ کشتی ، دستوں کی کثرت ، کسی لمبی مرض میں
بستل ہو کر کمزور ہو جانا ، کثرت جماع ، کثرت دماغی محنت ، نیز تشنج ، مرگی ،
باؤ گرلہ خون کا زہر بلا ہونا اور سمیت بول زیادہ طبعی وغیرہ سے دماغ اور

اعصاب کے سست اور کمزور ہو جانے کی وجہ سے نیند کا غیر معمولی غلبہ ہو

جاتا ہے۔

تشخیص سرخ جھل پیرے پر بھر پیرا ہڈی، پیوٹے پھوٹے ہوئے،
سست رتوبند کا جاری ہونا، مریض گہری نیند میں سو یا رشتہ
ہے اگر جیہ یا جائے، تو مشکاک سے جاگتا ہے اور سوال کا جواب دے لے کر پھر
غور و فکر میں سو جاتا ہے۔

علاج یہ اصل سبب مرض کا معلوم کر کے اس کا علاج کریں، اگر
خون کی زیادتی ہو، تو کینا، دوسرا پیرا، کلوانا، فصد کھولنا، بہترین تدبیر ہے
قبض کو رفع کریں، روغن آمٹھ کی سر پہ مالش کرنا بھی مفید ہے،
دینے سے بھی نیند کی زیادتی کم ہو جاتی ہے، تاہم دلی اور دماغ سے ملزوم
ہونے سے یہ نہایت سو تو غور، تاہم سونا، چاندی، مردادیدہ،
عذیر، کستوری کے مرکبات کھانا مفید ہے۔

اگر شراب اور زین کی کمزورتاں سے ہو، دان کا چھوڑ دینا ہی

بہترین علاج ہے۔
علاج دوسرا پیرا، کینا، کلوانا، فصد کھولنا، بہترین تدبیر ہے، جو
زود ہضم ہوں، لیکن رطوبت کو پیدا نہ کریں، کمزوری شہم کی صورت میں زود ہضم
اور مقوی غذائیں شوربا، چینی، دودھ، گھی، کھن، ملائی بھی مفید ہے۔

دوا ال کمر CIDDINESS گیدنس

تشریف: یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں مریض کو کھڑا ہونے
یا معمولی حرکت کرنے سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔

یا چکر آنے لگتا ہے، جیسے ارد گرد کی تمام چیزیں گھوم رہی ہیں،
خون کی کمی اور اس کا زہریلا ہونا، کثرت جماع، کثرت
وجوہات حیض، چوٹ کی وجہ سے خون کا زیادہ نکل جانا، بدہضمی
قبض، منشیات کا استعمال، شراب، متھاکو، افیم، اور دماغی چوٹ کی وجہ سے
بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور فی الحقیقت یہ مرض دوران خون کی تبدیلیوں کے
باعث ہوتی ہے۔

علامات اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، سر چکرانا، اور جب یہ
کیفیت بڑھ جائے، تو سر گھومنے لگتا ہے، اور مریض کو سب چیزیں گھومتی ہوئی
نظر آتی ہیں، فی الحقیقت مرض ایک ہی ہے، لیکن علامات کی کمی بیشی کے
 لحاظ سے سرد اور دوار کہتے ہیں۔

علاج :- اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں، اگر
دماغی کمزوری ہو، تو دماغ کو طاقت دینے والی ادویات استعمال کریں، اگر
کمی خون ہو، تو خون پیدا کرنے والی ادویات دیں، عام صورتوں میں اطریفل
کشیر اور اطریفل اسٹو خودوس کا استعمال مفید ہے۔

اکسیر دوران سر، فینو باربیٹون پ گریں، ملک شوگر دگرین
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ دیں، دوران سر کے لئے
بے حد مفید ہے۔

نوٹ :- جن آدمیوں کو اکثر دماغی چکر آتے ہیں، اور ہر چیز گھومتی نظر آئے
اور ان کے لئے اٹھ کر چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جائے، تو یہ عام طور پر صرع
مرگی، کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

نسخہ :- کشیر خشک ۷ ماشہ، ہلیہ سیاہ ۳ ماشہ، ہلیہ زرد ۳ ماشہ،
۴۰ مقشر مسکوت ۴ ماشہ

اس کی دو خوراکیں کریں، ایک خوراک صبح اور ایک شام،
 نسخہ :- پوٹاس بائیکارب ایڈرام، شکر حشش کمپونڈ ۴ ڈرام، شکر کارڈیم
 ۴ ڈرام، ایچا منٹھا پ ۸ اونس

سب ادویات کو ملا کر رکھ لیں، پس تیار ہے، روزانہ تین بار ایک چمچ
 صبح، دوپہر، شام دیں،

اگر خون کی کمی ہو، تو فولاد اور پچلہ کے مرکبات دیں، اور لیورائٹر ٹیکٹ
 کے انجکشن کریں،

غذا اوپر تھیراز، شوربہ، مونگ کی دال اور چپاتی، ڈبل دلی، ساگودانہ
 کی کھیر، شلغم، یاگ اور توری وغیرہ دیں،

سگریٹ نوشی، چائے، شراب، رس، شکر قندی، پیاز، مچھلی،
 بیضہ مرغ وغیرہ اور کثرت مطالعہ سے پرہیز کریں،

عصبی کمزوری NEURASHENIA

(نیورس تھینیا)

تعریف :- اس مرض میں مریض کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جس
 کی وجہ سے کسی طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں،

وجوہات و تشخیص :- یہ مرض کثرت جماع، نشہ آور چیزوں کا
 استعمال، رنج و غم، تفکرات اور تیز بخاروں کی وجہ سے ہو جاتا ہے،

علامات :- معمولی کام سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اکثر بے خوابی پریشان
 خیالی، دسو سے اور دہم ہوتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، چہرہ بے رولتی،

مزاج چڑچڑا ہوا ہوتا ہے،

علاج: اس مرض کے علاج میں اصل سبب کا رفع کرنا ضروری ہے
 اعصاب کو پہلے سکون پہنچانا، بعد میں تقویت پہنچانا ہی اس کا اصل علاج
 ہے، ممکن ادویات میں سے پوٹاسیم برومائیڈ، فینوباربیٹون بہترین مسکن
 ادویات ہیں۔

اکسیر اعصاب: دٹامن بی اڈیرین، ۱۰۰ ملی گرام روزانہ عضلاتی
 انجکشن کریں، بہترین مقوی اعصاب ہے آج کل پھٹوں کو طاقت دینے
 کے لئے یہی دوا استعمال کی جاتی ہے نیز یہ دوا انجکشن کے علاوہ خوردنی
 طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔

● دٹامن بی ۱۲ (سیٹامین) ۱۰۰۰ ملے گرام ہر تیسرے دن عضلاتی
 ٹیکہ کریں، پھٹوں کو تقویت دینے کے لئے آج کل اس کا بہت استعمال
 ہو رہا ہے، جو کہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ مزید دٹامن کے علاوہ محلول
 دٹامن کی گولیاں بھی دستیاب ہوتی ہیں جو تقویت اعصاب کے لئے استعمال
 کی جاتی ہیں۔

نسخہ: ہر چار گھنٹے ۲۰ ملے ٹیکہ پکس دامیکا، ۲۰ ملے ٹیکہ ڈیپیرین ۲۰ ملے
 ایکو، اپنے سالی ایک اورس۔

ایسی ایک خوراک دن میں دو مرتبہ طعنا کھانے کے بعد دینی چاہئے
 تقویت اعصاب کے لئے کچھ بہترین دوا ہے،
 حسب کچیلہ، ۲ کچیلہ بدبر اتولہ، ۲ کچیلہ صدف مرداریدہ ۲ تولہ، کشتہ سونا
 ۲ رتی، کشتہ فولاد ۲ تولہ

گوند کیکر کے لعاب میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں،
 مقدار خوراک ایک گولی یا دو گولی دن میں تین مرتبہ کھانا کھانے
 کے بعد دیں۔

غذا و پرہیز :- مقوی اور لطیف ، زود ہضم غذا دینی چاہیے ، ترشش بادی ، بادی اور ثقیل چیزوں سے پرہیز کریں ، نیز کثرت مشاغل و کثرت جماع ، تفکرات اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز لازمی ہے ،
عصبی کمزوری کے علاج میں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ مریض کو اپنے معالج کے علاج پر پورا پورا اعتقاد اور اعتماد ہو ، اور مریض کو معمولی کام میں ہر وقت مشغور رہنا چاہیے ،

مندرجہ ذیل پیٹنٹ ادویات عصبی کمزوری کے لئے نہایت مفید ہیں
(۱) مینا ڈیکس (گلیکسو) بمقدار ایک چمچہ چائے پھر دن میں تین خوراکیں
(۲) فیلو سیرپ ، گلیسر د فاس ، فیشن کمپونڈ ، اسٹیز سیرپ ، ڈیشیز سیرپ آف ہیوگلو مین سیرپ ، بی جی فاس ، فاسفورین ،
ان تمام ادویات کی مقدار خوراک ان کے اوپر تحریر ہوتی ہے ، اس کے مطابق استعمال کریں ، اس مرض کا انجام عموماً بخیر ہوتا ہے ، لیکن آرام اکثر دیر سے ہوتا ہے ، اس لئے طبیب کو مریض کا مستقل طور پر علاج کرنا چاہیے ۔

کنولسشن CONVULSION کنولشن

تعریف :- اس مرض میں مسم کے کل یا بعض عضلات جلد جلد اور باری باری جھنجھکتے ہیں ، اور معمولی بیہوشی بھی ہو جاتی ہے ، بذات خود کوئی مرض نہیں ، دوسری مرض کی ایک علامت ہے ،
وجوہات :- دماغی چوٹ ، کمی خون ، دم دماغ ، دماغی رسولی ، سکرتہ رگی ، متذہر ، شراب ، کاذہر ، پیتھاب کاذہر ، پیتھاب کاذہر ، پیتھاب کاذہر ،

حلق، کثرت مباشرت، حیف، اور نفاس کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے
 عیوں کا دانت نکالنا، قبض، پیٹ کے کیرٹے، سردی لگنا اور ڈر سے بھی
 تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

تشخیص مریض وقتاً بے ہوش ہو جاتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں
 تشخیص اور جسم کے دوسرے عضلات جلد جلد اٹھکتے ہیں اور جسم

اگر سخت ہو جاتا ہے چہرہ کا رنگ پہلے سرخ اور پھر نیلا ہو جاتا ہے۔
 سانس مشکل سے آتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں۔

علاج :- اصل سبب مرض کو رفع کریں، عام طور پر اس مرض کے علاج

میں پہلے قبض کو رفع کرنا ضروری ہے جس کے لئے گرم پانی، صابن
 یا گلیسرین کا حقن کرنا ہے۔ یہ مفید ہے، اور مریض کو پشت کے بل جیت

لٹانا چاہئے، گریبان کے مٹن کھول دیں، سر پر برف لگائیں

تشنج رفع کرنے کے لئے دافع تشنج ادویات مثلاً پوٹاشیم برومائڈ

کلورل ہائیڈریٹ اور مارینین کہ اعمال بھی کیا جاسکتا ہے، خاص کر جب

دل کی حرکت کمزور نہ ہو، ایک جوان آدمی کے لئے پلہ گرین، دو سال کے

بچے کے لئے پلہ گرین استعمال کی جاسکتی ہے، بذریعہ جلدی انجکشن، اگر

انجکشن نہ کرنا ہو، تو لائیو مارینین یا ٹیڈرڈ کلورائیڈ ایک ڈرام، دو ان مریض

کے لئے کافی ہے، ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دے تینتے میں

ادو دو سال کے بچے کو دو قطرے فی خوراک دن میں دو بار،

سختہ ذرا، ایو صابن برومائڈ، اگرین کلورل ہائیڈریٹ، گرین، پیرپ
 اور شیاہی پلہ ڈرام، ایکواکبر آفٹ مالی ایک ادھن۔

اسی ایک خوراک دن میں تین بار دیں، تشنج رفع کرنے کے لئے

بے حد مفید ہے۔

میں نے تشیخ کے سینکڑوں مریض دیکھے ہیں جن میں عام طور پر نیچے
 حرکتیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور جن میں پیریا، دماغی چوٹ، مرگی،
 ٹے ٹے نس، ام الصبیان، میٹ کے کڑے، قبض اور خسرہ کے مریض پائے
 گئے ہیں۔ اس لئے اس مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد اس مرض کا
 صحیح علاج کرنے سے تشیخ رفع ہو جاتا ہے۔

اکثر اوقات بچوں کے تشیخ میں گلیسرین کا اینما یا معمولی قبض کشادہ دہی
 کا استعمال کسیری اثر دکھاتا ہے۔

اگر تشیخ مستقل ہو، تو مریض کو بخار پیدا کر دینا بھی مفید ہے۔ چنانچہ
 بخار پیدا کرنے کے لئے جو دوا میں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک
 یہ ہے کہ چند مہینے اور حلیت خالص ہودن لے کر باریک کر لیں، اور
 شہد خالص میں ملا کر بقدر جائز لگولی بنا کر کھلا دیں۔ یہ بخار پیدا کر کے
 تشیخ کو فوراً زایل کرتی ہے۔

تشیخ اگر سبب سے۔ اگر تشیخ خشکی کی وجہ سے ہو، تو اس کا علاج دشوار
 ہوتا ہے، کیونکہ یہ تشیخ رطوبت عزیزہ کے فتنہ ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے،
 اور رطوبت عزیزہ فتنہ ہو جانے کے بعد پھر بدن میں پیدا نہیں کی جاسکتی،
 مگر ہر صورت علاج کرنا چاہئے، تاکہ مرض ترقی نہ کرے، موافق ترین
 علاج اس کا یہ ہے کہ مرطب دہری پیدا کرنے والے، آئرن کریا جائے،
 اور مرطب دہنوں کی مالش کی جائے۔ اور بار بار یہ تدابیر عمل میں لائی جائیں
 لیکن یہ اس وقت کرنا چاہئے جب مریض کو ایسا لازم بخار نہ ہو جو کسی وقت نہ اترے،
 جب بخار نہ ہو، آئرن اور مالش کی وقت جوڑوں کو ترطیب پہنچانے کا خاص خیال رکھیں
 اگر آئرن ممکن نہ ہو، تو دودھ سے کریں، ورنہ پانی میں برگ پیدا سادہ، گلی سفید، گلی نیو فر،
 تراشہ کدو، تراشہ خیار جوش دے کر آب کدو آب گمری شامل کر کے آئرن کریں،

فالج PARALYSIS پیرے کس

تعریف : مریض کے تمام جسم یا آدھے جسم میں کامل بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حصہ کی طاقت نائل ہو جاتی ہے۔
وجوہات : الفالج کا اصلی سبب نظام عصبی کے حرکتی مرکز کا معطل اور بیکار ہو جانا ہے، عموماً یہ بیماری سکے کے سبب ہو جاتی ہے، اور کبھی نخاع کی خرابی، آتشک، باد و گودہ، ریشہ، مرگی، دماغی پھوڑا یا رسولی، شراب خوری، سردی لگنا، رنج و غم، دلی صدمات، کمر پر چوٹ لگنا، معدہ یا انٹڑیوں کی خرابی، بچوں میں دانت نکلنا، پیٹ کے کپڑے، محرقہ بخار، سیسہ یعنی سکے کی جسم میں سرایت، کثرت جماع، قیاسی منشیات کے استعمال اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی فالج ہو سکتا ہے۔ نیز کہ تبوں کو کثرت کتابت کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔

بلحاظ اسباب و علامات اس کی بہت اقسام ہیں۔

- ۱۔ فالج مقامی : اس میں کوئی ایک حصہ جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ فالج جسم استغلی : اس میں کمر کے نیچے کا و معرط شل ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ فالج نخاعی : اس میں مریض گفتگو اچھی طرح کر سکتا ہے۔
- ۴۔ فالج خناتی : یہ مرض ڈنٹیر یا رخناتی سے ہوتا ہے۔
- ۵۔ مونو پلجیا : اس میں صرف ایک بازو یا ٹانگہ کی حس و حرکت نائل ہو جاتی ہے۔
- ۶۔ فالج معرطہ : یہ فالج اکثر بڑھوں کو ہوتا ہے۔
- ۷۔ فالج آتشکی : یہ آتشک کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- ۸۔ فالج سری : یہ سیسہ یعنی سکے کے زہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

۹. فالج الصلبي :- یہ شراب کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔
۱۰. فالج کاتباں :- ہتھم کا فالج کاتبوں، محرروں، کپیاز بیروں اور بابودوں کو ہوتا ہے۔
۱۱. فالج بصری :- اس میں حقیقہ تشکیبہ نورانی پردہ مفلوج ہو کر بصارت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔
۱۲. فالج سماعی :- اس میں عصب سماعت مفلوج ہو کر قوت سماعت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔
۱۳. فالج شنائی :- اس میں قوت سماعت کا عصب مفلوج ہو جاتا ہے۔ قوت شنائی ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔
۱۴. فالج ذوقی :- اس میں عصب ذائقہ کے مفلوج، کھانسنے سے قوت ذائقہ ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔
۱۵. فالج فقری :- یہ فالج فقرس سے ہو جاتا ہے۔
۱۶. بچوں کا فالج :- یہ بچوں میں نخاعی امراض کے سبب ہوا کرتا ہے۔
۱۷. فی شیل پریلےسس (FACIAL PARALYSIS) لقوہ
اس مرض میں چہرہ کے ایک جانب کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں، اور چہرہ ایک طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مادون جانب کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔
۱۸. اس مرض میں مریض کے تمام جسم یا نصف جسم کی حرکت بالکل زائل ہو جاتی ہے، کبھی ایک بازو یا ٹانگ یا چہرہ کی ایک طرف اور کبھی دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں بے حس و حرکت ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض صبح کر سونا ہوگا اٹھتا ہے، تو ذرا ذرا سر درد کی شکایت ہوتا ہے، پھر ایک دو تے آکر فردا فالج ہو جاتا ہے، اور مریض کے ہر شے، دھواں میں فروزا آ جاتا ہے، با سہارے اٹھتا، بیٹھتا

چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ باؤں اسٹما خاص کر ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، گوشہ دہن ٹٹک جاتا ہے، اور بیمار ٹھیک طور پر بول بھی نہیں سکتا۔ عموماً اس مرض میں عمر رسیدہ یعنی اسٹخفاص مبتلا ہوتے ہیں۔

اگر بچے دھڑکا فاج ہو، تو پہلے مریض کی کمر میں درد ہوتا ہے پھر پاؤں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، بیمار رڈ کھڑا کر چلتا ہے، اور دونوں ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں، بچوں کو عام طور پر یہ مرض دفعتاً ہوتا ہے، بچہ رات کو سوتا ہے، اور صبح کو ایک یا دونوں ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خسرو پیچک، محرکہ اور پیر یا بخار کے اتر جانے کے بعد بھی یہ نقص واقع ہو جاتا ہے۔

اگر سکتہ کی وجہ سے فاج ہو، تو اس میں اکثر دائیں ہاتھ میں علامات دفعتاً یا آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں، اور زیادتی مرض میں دونوں ہاتھ ٹٹک جاتے ہیں۔

اس مرض کی تشخیصی علامت یہ ہے کہ مسوڑھوں کے کناروں پر ایک نیلی لکیر پڑ جاتی ہے۔

اگر چہرہ کی ایک جانب کا فاج ہو، تو باؤں جانب کا چہرہ تندرست جانب کی طرف کھینچ جاتا ہے، منہ کا ایک گوشہ نیچے کی طرف ٹٹک پڑتا ہے، منہ سے سال بہتی ہے، ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، اور مریض کے ہنسنے اور رونے میں منہ بالکل بیڑھا ہو جاتا ہے، اور نہ ٹٹک سکتا ہے، نہ ہی سیٹی بجا سکتا ہے، اور نہ ہی پھونک مار سکتا ہے، یہ کھکھ سے پانی بہنے لگتا ہے۔

اگر کتابت کی وجہ سے فاج ہو، تو ابتدا میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور بازو میں درد ہوتا ہے، اور کھینچنے وقت ہاتھ جلد خشک جاتا ہے، جب

مرض بڑھ جائے، تو قلم لہجہ میں پکڑے ہی انگریز ہسپتالی کی طرف مڑ جاتا ہے، اور کھٹنا محال ہو جاتا ہے۔

انسٹریٹوں پر فالج کا اثر ہو، تو پاخانہ خود بخود نکل جاتا ہے، اگر مہشائے پر ہو، تو پیشاب خود بخود خارج ہو جاتا ہے۔

چونکہ اس مرض میں دماغی مراکز اور نخاعی مراکز کے حرکتی اعصاب میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس لئے ان کی تقریق لازمی ہے۔

۱، دماغی مراکز کا مرض : فالج کا اثر حرکات پر ہوتا ہے، نہ محض عضلات پر ۲، بہت کم لاغزی عضلات میں واقع ہوتی ہے۔

۳، عضلات میں سختی بدستور رہتی ہے۔

۴، کسی قسم کی نشوونما کی تبدیلیاں جسم میں نہیں ہوتیں۔

۵، انعکاسی حرکات زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔

۶، نخاعی مراکز کا مرض : ۱، عضلات مجموعہ عضلات مفلوج ہوتے ہیں۔

۲، عضلات میں لاغزی زیادہ ہو جاتی ہے۔

۳، عضلات کمزور اور ڈھیٹے ہو جاتے ہیں۔

۴، جلد میں نشوونما کی کمی ہو جاتی ہے۔ زخم پیدا ہوتے نیز جلد ٹھنڈی اور

نیگلوں ہو جاتی ہے۔

۵، انعکاسی حرکات نہایت کم یا بالکل گم ہو جاتی ہیں۔

علاج :- جس وقت مرض کے آثار ظاہر ہوں، مریض کو بالکل آرام سے

بستر پر لٹا دیں، اور حرکت نہ کرنے دیں، سر کو قدرے اونچا رکھیں، اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں۔

سب سے پہلے قبض رفع کریں جس کے لئے سوپ وارڈ اور گرم پانی

کا حقن کرنا چاہئے، اور پھر قبض نہ ہونے دیں، اور چند دن بعد میں مسہل دیں۔

غذا میں پانی کی بجائے تین دن تک مارا غسل پلائیں، اور بطور دوا یہ نسخہ دیں،

پوٹاشیم آیوڈائیڈ ۵ گرین۔ پانی ایک ادنس، ایسی تین خوراک روزانہ پانچ دن تک پلائیں،

یاد رہے، مثنوی اور محرک ادویات مثلاً کھیل سنگھیا، فولاد، کوئین وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جب کہ دماغ اور حرام مغز میں خراش اور اجتماع خون ہو، تو کھیل کا استعمال ممنوع ہے،

جدید تحقیقات کی روش سے ڈامن بی ا کی کمی کو اس مرض کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور ڈامن بی ا اس مرض کے علاج میں مفید ثابت ہوتی ہے لیکن تا حال اس کا فوری شافی علاج معلوم نہیں ہوا، نیز اس مرض میں علی الگانا ادویوں کی بالشت کرنا بھی مفید ہے، اور مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کر لیں،

نسخہ :- ایکسٹریکٹ ارگٹ ۱۰ منم، ٹنگر ہیلڈونا ۵ منم، ٹنگر ہیلڈونا ۵ منم، پوٹاشیم آیوڈائیڈ ۵ گرین، ایکو اڈانس،

ایسی ایک خوراک دن میں دو بار دیں، پچھلے دھڑکے کے لئے بے حد مفید ہے،

اگر عیشہ مع فارچ ہو، تو یہ نسخہ بے حد فائدہ کرتا ہے
نسخہ :- رینگو آرسنک ۵ منم، ٹنگر ہیلڈونا ۵ منم، پوٹاشیم آیوڈائیڈ ۵ منم، ٹنگر ہیلڈونا ۵ منم، ایکو اڈانس،

ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار غذا کے بعد دیں، ریشہ مع فارچ کے لئے بے حد مجرب ہے،

اگر سبب یعنی سکہ کی وجہ سے فالج ہو تو رفع قبض اور مہل کے بعد
یہ نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ :- پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ۱۰، اگرین ۱۰، ایچوا ایک اونس، ایسی تین خوراک
روزانہ دیں، اور ایک مہینہ کے بعد گلیشیا سلفاس ۱۲ ڈرام، ایچوا ۱۰ اونس
۱۰ کر دیں، دو تین بار پلائیں، ایک دو جلاب آنے سے سبب کا تمام اثر
زائل ہو کر مرض رفع ہو جائے گا۔

اگر کتابت کی وجہ سے فالج ہو، تو کتابت ترک کرادیں، اور حرکت
کھینچا، فولاد، کوئین اور سنکھا استعمال کرائیں۔

دٹامن بی ۱، اور دٹامن ب ۱۲ کا استعمال بے حد مفید ثابت
ہوا ہے۔

اگر چہرے کے ایک طرف فالج ہو جسے لغو بھی کہتے ہیں، تو اصل
سبب کو معلوم کر کے رفع کریں، مادف جانب کے کان کے پیچھے کھنکھریس
کا پلاسٹر لگائیں، جب چھالا پیدا ہو جائے، تو اس سے پانی نکال کر
دیزین لگائیں، کھنکھری میں گرم پانی ڈال کر مادف کان میں بھاپ پہنچائیں
قبض رفع کریں۔

اگر کان میں زخم ہو، تو کان کا علاج کریں، اگر دانت خواب ہو، تو
اسے نکال دیں، مادف جانب یعنی منٹ ٹرین ٹائٹن کی ماسٹ کرنا بھی
مفید ہے۔

اس مرض کا جدید ترین علاج دٹامن بی، جس کا تجارتی نام بیرن ہے
ایک سی سی، ۱۰ ملی گرام روزانہ عضلاتی انجیکشن کریں، خود دینی طور پر بھی اس کی
طکیاں استعمال کی جاتی ہیں۔

:- من صورت میں بجلی لگانا بھی مفید ہے۔

ڈٹامن بی کمپلیکس کا ایک سی سی روزانہ عضلاتی انجکشن کرنا بھی مفید ہے
لیکن جب اس مرض کو چھ ماہ گزر جائیں، تو تقریباً یہ مرض لاعلاج ہو جاتا ہے
ہمارا ایک عزیز اس مرض میں مبتلا ہے، ہزاروں روپے خرچ کرنے
کے باوجود بھی وہ تندرست نہیں ہو سکا، حالانکہ ملک کے بڑے بڑے
ڈاکٹروں، حکیموں اور ہسپتالوں میں ہیمیزوں زیر علاج رہ چکا ہے۔
لغزہ کا مجرب علاج: لغزہ کے مجرب معالجات میں سے ایک علاج
یہ بھی ہے کہ ریٹھ و نذق کا عطوس استعمال کر دیا جائے، خصوصاً ریٹھ کا
بالائی پوست اس مقصد کے لئے بہت مفید ہے۔ اگر اس کو معوط کے طور
پر استعمال کیا جائے، تو تب بھی نفع بخشا ہے۔ نین دن تک استعمال کرنا
چاہئے، اس سے مریض کے نفعوں سے بہت سی یعنی رطوبات بہ کر نکلتی
ہیں، اور تیسرے دن مریض اچھا ہو جاتا ہے، مجرب علاج ہے۔
علاوہ لغزہ کے درد سر، شقیقہ، مرگی، جنون اور مایخولیا کے لئے بھی
مفید و مجرب ہے۔

لغزہ کے مریض کے لئے دو ٹی مضر ہے، اس لئے اس کو ہر وقت
تادیک مکان میں رہنے کی ہدایت کریں۔
نوٹ: فاج کے مریض کے لئے غذائی تدبیر بھی ضروری ہے، فاج کی
ابتداء میں دو تین دن صرف مارا، الشیر یا مارا، الحسل وغیرہ کی قسم کی لطیف اور
دو معتم غذا پر اکتفا کریں، بلکہ اگر مریض کی قوت برداشت کر سکے،
تو چودہ دن تک کوئی دوسری غذا نہ دیں، لیکن اگر مریض برداشت نہ کر سکے
تو بلکہ پرندوں مثلاً تیتز، بیٹر، کبوتر کا شور بادیں، نیز مریض کو بھوکا رکھنے
اور شک غذا میں کھلانے کے بعد دوپہر تک پیاسا رکھنے کی
کوشش کریں۔

نیز فالج کے مریضوں کے لئے تک چھکنی کا نفوخ بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

صاحب کنز الہکما نے لکھا ہے کہ بلاد و کھلائواں اور اس کے مرکت فالج، استرخا، اعصاب کے لئے عجیب چیز ہے۔

اسی طرح ہینگ رحلتیت، کو بھی فالج اور حذر کے لئے مفید پایا گیا ہے۔

اکسیر فالج: گندھک آملہ سار ۲ تولہ لے کر پانی ایک پاد میں خوب جوش دے کر پارچہ میں صاف کر دو۔ بعد ازاں اس کے وزن کے برابر ۲ تولہ سیلاب ملا کر کھول کر دو۔ جب کھول خوب ہو جائے، تو پڑتاں طبعی ۲ تولہ پچھناک مدبر اتولہ ملا کر سب کو عرق میوں کا غدی میں آٹھ پیر کھول کر کے گولیاں ماسش کے دانہ کے برابر بناؤ۔ بعد مہل کے صبح و شام ہمراہ پانی کے کھلاؤ اور منور یا مرغین یا آب نخود غذا اور انشاء اللہ دو مہینہ میں فالج و استرخا دور ہو جائے گا۔

یہ نسخہ نہایت اکسیر ہے اور معوی باہ بھی ہے، بلکہ صد ہا مرتبہ ضعف باہ میں اس کا استعمال نہایت قوی پایا گیا ہے۔

اکسیر فالج، رطلی یعنی رنگہ اتولہ، سیلاب اتولہ، حبست اتولہ پچھناک اتولہ، منفلی سیاہ اتولہ۔

اول حبست اور رنگہ کو ایک برتن میں ڈال کر آگ پر گرم کریں، جب حبست پانی کی طرح ہو جائے، تو پچھناک کو ڈال کر کھول کر دو، بعد میں منفلی سیاہ ملا کر تین روز تک خوب کھول کر دے رہو۔ اس کے بعد ایک شیشی میں ڈال کر محفوظ رکھو، بوقت ضرورت ایک چا دل شہد اتولہ میں رکھ کر دو۔

فالج کے لئے بے نظیر نسخہ ہے۔

حب سیماں دا فنج فالج : در سیماں اوتلہ رتقم دھنورہ اوتلہ ،
 دوڑوں کو آب ادرک ۵ تولہ میں خوب کھول کر پیں ، دو روز بعد گو سیماں
 بقدر مونگ کے بنا دیں ، صبح و شام ہمراہ حرفی بادیاں ۵ تولہ سکے دیں ،
 سات روز میں انشاء اللہ قدرت خدا نظر آجائے گی ،
 روغن فالج : چربی تھو چربی سانڈہ چربی شیر چربی گر سفند ،
 ہر ہونٹ خراطین خشک ہر ایک ایک تولہ ، موم سفید ۵ تولہ ، روغن کھنڈ ۲ تولہ
 سب کو ملا کر بدن پر مالش کرنا فالج اور لقوی کے لئے اکسیر ہے ،

فالج کا ہومیو پیتھی علاج

جیسی میم ۳۰ x : در دماغی حالت خراب ہو ، دل ، پیچھے پٹوں کا فعل کمزور ہو ،
 اعصاب منفلوج ہوں جس زائل ہو چکی ہو ، کمزوری سستی اور جسم کا سینے کے
 لئے مفید ہے ،

آرٹیکا ۳۰ x : در دماغ ایل جانے اور چوڑی کی وجہ سے فالج کے لئے اکسیر ہے
 کا ششک ۳۰ x : در نصف حصہ یا چہرہ کے فالج کے لئے مفید ہے جب
 ٹنڈک لگنے سے یہ تکلیف ہے ،

گنیٹشیا : در دماغی جذبات ، شب بیداری کے بعد فالج ہو ، ہسٹریا کے
 فالج کے لئے بھی اکسیر ہے ،

لیکس ۳۰ x : در بیمار کو چھوڑنے اور دبانے سے تکلیف ہو ، جسمی
 تکلیف ، بنڈ سے زیادہ ہو ، کے فالج کے لئے اکسیر ہے ،

اوپیم ۳۰ x : در ٹانگوں کا فالج ، عضوسن ہو جائیں ، پاخانہ ، پیشاب
 بند ، آنکھیں نیم دابوں ،
 تو مفید ہے ،

کاکولس ۱۳ :- ایک جانب کے فالج کے لئے مفید ہے، مکرر دوا، اعضا میں
کڑکڑاہٹ، شائے پلانے سے اکڑے ہوئے ہوں،
اکونائٹ ۳ :- لقوہ کا مرض دفعۃً حملہ کرے، یا سردی لگنے سے فالج کی
تکلیف ہو، تو مفید ہے،

کالی کالور ۶ :- جب لقوہ بائیں جانب ہو، اور ذکاوت بڑھ گئی ہو،
گریفائیٹس، جب منہ پر کڑی لگنے کا احساس پایا جائے، تو مفید ہے،
کالی فاس :- یہ ہر قسم کے فالج کے لئے اکسیر ہے،
گکینشیا فاس :- یہ رعشہ مع فالج ہر قسم کے لئے بے حد مجرب ہے،
کلکیریا فاس :- ٹھنڈک یا سن ہونے کا احساس، ٹانگوں میں رینگنے
والا فالج،

اکسیر لقوہ :- کالی فاس ۶ x ۶ (۲ گرین) گکینشیا فاس ۶ x ۶ (۲ گرین)
کلکیریا فاس ۶ x ۶ (۲ گرین) تمام دواؤں کو ملا کر ایسی ایک خوراک دن میں چھ
مرتبہ دیں، فالج کے لئے مفید ہے،

حذر ANAESTHESIA انس تخیر یا

تخیر لطف :- اس مرض میں مقام مادی کی حس بالکل زائل یا ناقص
ہو جاتی ہے،

علامت :- یہ بیماری عموماً حس لامسہ کی خوابی سے ظہور میں آتی ہے،
اور فی الحقیقت یہ بعض عصبی بیماریوں کی ایک علامت ہوتی ہے، اور کبھی
مخدرات کوئین وغیرہ کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی حس زائل
ہو جاتی ہے۔

لشخیص در ابتدا میں عضلاتی ریشوں میں گدگدی ہوتی ہے، اور اس مقام پر سردی یا گرمی کا احساس ہوتا ہے، حسیں افسوس ہو جاتی ہے اور کبھی جی بالکل زائل ہو جاتی ہے، اگر اس مقام کو کاٹ بھی دیا جائے، تو بالکل درد معلوم نہیں ہوتا۔

علاج :- مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اور مقام مائٹ میں جس پیدا کرنے کی تدابیر خواہ ادویات یا ماسٹش کے ذریعہ کرنا ہی کامیاب علاج ہے۔
دو اے ماسٹش :- یعنی منٹ ٹرپن ٹائن کی ماسٹش کریں۔

یعنی منٹ ایوینا بھی اس کے لئے بے حد مفید ہے۔
اور خوردنی طور پر معوی و محرک ادویات استعمال کریں، مثلاً مرکبات فولاد، کچھ مسکھیا مناسبت مقدار میں کھلائیں۔

نسخہ :- لائیکو آر سٹیک ۵ منم، ایکوا ایک ادنس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں دوبار بعد از غذا دیں، مذر کے لئے مفید ہے۔
نوٹ :- چونکہ یہ مرض کبھی ٹائچ کے پے اور کبھی ٹائچ کے عہد لاحق ہوتا ہے، اس لئے اس کے علاج میں ٹائچ کی تمام ادویات مفید ثابت ہوتی ہیں۔

عشر مائٹ کی ریاضت، ماسٹش اور ورزش کرنا اور اس کو ہلاتے جلاتے رہنا مذر کے لئے فائدہ مند علاج ہے۔
نسخہ :- فرنیون اتولہ، روغن کچھدہ، تولہ، ایلم ملائیں، مقام مائٹ پر ماسٹش کریں، عذر اور ٹائچ کے لئے نہایت مفید ہے۔

حب کچا :- کچھ عذر اتولہ، مرج سیاہ ۶ ماشہ، اورک کے پانی، کھرا کر کے پینے کے برابر گوبار نیار کر لیں۔

مقدار خوراک اتنا ۲ گولی دن میں دوبار بعد از غذا، فابج، لغتہ، رعشہ اور حذر کا کامیاب علاج ہے۔

حذر یا سن بھری ایک عصبی مرض ہے، اعصاب حسّیہ کے مبداء پر دباؤ پڑنے سے یہ اعصاب اپنا فعل صحیح طور پر سرانجام نہیں دے سکتے، اس لئے اس دباؤ کا رفع کرنا ہی اس کا کامیاب اور شافی علاج ہے، جو ادویات کے علاوہ آپریشن سے بھی رفع کیا جاسکتا ہے۔

کوریا

رَعَشَہ CHOREA

تعریف :- اس مرض میں جسم کا کوئی عضو لڑتا اور کاپٹتا ہے، اور عام طور پر گردن اور ہاتھوں میں ہوتا ہے۔

وجوہات :- عصبی کمزوری، کمی خون، سرداشپار کا کثرت، استعمال نکرد تردد، کرم شکم، کثرت مشراب خوری، کثرت جماع، ضعف دماغ و مخارج، سے پیدا ہوتا ہے، عام طور پر بچہ کی عمر میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے، لیکن عورتوں اور بچوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔

علاج :- شروع مرض میں ہاتھ پاؤں کا پیسنے لگتے ہیں، بے اختیار اڑے تا حدہ حرکات شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ حرکات عموماً سر اور ہاتھوں میں ہوتی ہیں، چپنا، پھرنا اور ہاتھ میں کسی چیز کا پکڑنا بھی دستور ہو جاتا ہے۔ اگر حرکات شدید ہوں، تو مریض کو حرکت کرنے سے منع کریں،

مرض رعشہ چونکہ اعصاب کی کمزوری کا اظہار ہے، اس لئے اس کے علاج میں تقویت اعصاب کا خاص خیال رکھیں۔

فستقہ ہر فیوڈ بار میٹون سوڈیم ۱۲ ٹگرین، کلورل ہائیڈریٹ، اگرین

سیرپ آرٹھیائی اڈرم، ایکوا ایک اڈنس، ایسی ایک ایک خوراک صبح و
شام دوبار پلائیں۔

مرض رعشہ کے شدید دورے کو روکنے کے لئے عجیب الاثر دوا
ہے، فوری اثر کرتی ہے۔

حب کچیلہ اس مرض کے علاج میں نہایت مفید ہیں، حذر کے بیان
میں نسخہ ملاحظہ فرمائیں۔

رعشہ کا ٹیکہ :- ہائیوسین ہائیڈروبرومائیڈ ۱۱۰ گرین کا جلدی انجکشن
روزانہ کریں۔ رعشہ کی شدید حالتوں میں بے حد مفید ہے۔

نسخہ :- اسٹوخودوس ۳ ماشہ کا سفوف بناد کریں، شربت کے ساتھ
کھلا نارعشہ کے لئے مفید ہے، خاص کر جب کہ ساتھ ہی درد سر بھی ہو۔

رعشہ کا ہومیوپیتھی علاج

گٹینشیا فاس ۶x :- اس مرض کی بہترین دوا ہے، شدید حالتوں میں
ہر آدھ گھنٹہ بعد دینا چاہئے، جب علامات میں کمی ہو جائے، تو پھر
دوائی دہرانے کا وقفہ بڑھاتے جائیں۔

اکسیر رعشہ :- گٹینشیا فاس ۶x ۲ گرین، کلکیریا فاس ۶x ۲ گرین،
نیٹرم فاس ۶x ۲ گرین، نیٹرم میورم ۶x ۲ گرین، سلیشیا ۶x
۲ گرین

ایسی ایک ایک خوراک دن میں چار یا چھ مرتبہ دیں، اور مرض کی کمی پٹنی
کے لحاظ سے دوائی دیں۔

مرض رعشہ کے لئے یہ نسخہ بے حد مفید ہے، ایک دو دن میں
کمل آرام آجاتا ہے۔

تمدد کزاز TETANUS طے نفس

تشریف: اس مرض میں جسم اکڑ کر تپڑ کی مانند سیدھا یا کمان کی مانند ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

وجوہ ہارت: اس مرض کا سبب ایک متعدی جراثیم "بیسی لیس آف ٹیٹے نفس" ہے جسے جراثیم کزاز بھی کہتے ہیں یہ حیوانات کی لید کے باعث گلی کوچوں اور کھیتوں، سڑکوں میں بہت پائے جاتے ہیں اور اس کی سرایت زخموں کے راستہ ہوتی ہے، خاص کر گھوڑوں کے پاؤں میں زخم ہونے سے بہت حد سرایت ہو جاتی ہے۔

تشخیص: چھوت گھسنے کے بعد سر چکرانا، جمائیاں آنا پھر بنار ہو کر بدن اٹھنا، اکڑ جانا ہے اور سخت درد کرنا ہے، گردن پیچھے کو مڑ جاتی ہے، دانت بالکل مل جاتے ہیں، پانی نہ گلنا اور بون بھی محال ہو جاتا ہے اس مرض کی علامات کچھ کے زہر سے ملتی جلتی ہیں، لیکن کچھ کے زہر میں تمام جسم اکڑا ہوتا ہے لیکن منہ کی دانت نہیں لگتی، منہ کھل سکتا ہے۔

علاج: اس مرض بنایت پر علاج ہے، اس پر اس علاج سے شفا کی امید ہو سکتی ہے، شدت مرض میں علاج محال ہے۔ جس وقت زخم ہو، اسی وقت بطور احتیاط مائع سیرم، اینٹی ٹیٹے نفس سیرم

پہلے ۳۰ سیرم یونٹ کا فوراً عضلاتی انجکشن کریں۔

بطور علاج مرض کی تشخیص ہونے کے بعد اینٹی ٹیٹے نفس سیرم

۲۰ لاکھ یونٹ کا دوبارہ انجکشن کر دینا چاہیے۔

ہر روز ایسا ایک انجکشن کرنا چاہیے، حتیٰ کہ تمام علامات

رفع ہو جائیں۔

۱۰ رفع تشنج کے لئے پوٹاشیم برومائیڈ ۲۰ گرین، ایکوا ایک اونس
ہر چھ گھنٹہ بعد ملائیں، تشنج زائل کرنے کے لئے کلورڈنام بھی سو لگھا یا
جاتا ہے۔

شدت تشنج میں ہائیڈروبرومائیڈ بیس گریں کا زیر چندی
انجکشن کرنا تشنج رفع کرنے میں مفید ہے۔

مرکبات افیون بھی رفع تشنج کے لئے مفید ہیں۔
چونکہ یہ مرض مشکل العلاج ہے، اس لئے عام میڈیکل پریکٹیشنروں
کو اگر ایسے مریض کے دیکھنے کا اتفاق ہو تو ہسپتال میں داخل ہو سنے کا
مشورہ دینا چاہئے۔

حسب کرا ازہرست لوبان ۳ ماشہ، کچلہ مقشتر ماشہ کرین ماشہ
مشک ماشہ، مال کنگنی اتولہ۔

سب کو شیرہ برگ بان پانچ عدد میں بکھول کر کے گولیاں برابر مونگ کے
بنا کر ہر ہفتہ کے گھس کر حلق میں ڈالنا مکرر کے لئے مفید ہے۔
دو اسے ٹمٹو، رگنیشیا فاس ۵۰، ۲۰ گرین، رفع تشنج کے لئے
مفید ہے۔

غذا سیال، دودھ، پھلوں کا رس، ٹمکوڑ وغیرہ دینا چاہئے۔

اختلاج

تعریف: اس مرض میں تمام جسم یا بعض اعضا خود بخود چڑکے لگنے
میں یہ بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ کسی اور مرض کی علامت ہوتی ہے
مثلاً اگر کسی شخص کا چہرہ ہمیشہ چڑکاتا رہے، تو لغوہ سونے کو علامت ہے۔

اگر پیٹ میں پھڑکن ہو، تو مرگی کا پیش خیمہ ہے، اگر تمام بدن کے عضلات
میں پھڑکن ہو، تو یہ سکتہ ہونے کی علامت ہے، اگر پہلو میں اختلاج ہو
تو دسم پہلو کی علامت ہے۔

نشم کے عضلات میں اختلاج کا ہونا مایخولیا کا پیش خیمہ سمجھا جاتا
ہے، اور پیٹ میں رنج کی علامت ہے،
وجوہات اور عام طور پر اختلاج رنج کے رک جانے اور بطنی مواد کے
جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج :- اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنا ہی اس کا کامیاب
علاج ہے، اور مقام ماذق کو سینک دینے سے بھی تکلیف رفع ہو
جاتی ہے،
دوائے اختلاج :- کبابہ ازلہ، کشیز ازلہ، سفوف نثار کریں،
روزانہ ۱۰ ماشہ صبح و شام کھلائیں، رفع اختلاج کے لئے یحید
مفید ہے۔

ہذیان DELIRIUM ڈی لیریم

تعریف :- اس مرض میں قوائے عقلیہ میں فتور آ جاتا ہے، یہ مرض
نسب، بلکہ بعض امراض کی علامت ہے،
وجوہات :- شدید بخار، خون کا زہریلا ہو جانا، دماغی ساخت میں
خرابی ہونا، اعصابی کمزوری، جنون، مایخولیا وغیرہ،
تشخیص :- ابتدا میں مریض کی گفتگو بے ربط ہوتی ہے، لیکن شدید حالت
میں بہت بولنے لگتا ہے، اور کئی قسم کی چیزیں جن کا

خارجی وجود نہیں ہوتا، اُن کو خیالی طہ پر دیکھ کر کہتا ہے کہ دھڑے دھڑے یہ ہے
 علاج : دراصل سبب معلوم کر کے رقع کرنے کی کوشش کریں، اگر
 شدت بخار ہو، تو سر پر یوف لگائیں، حتیٰ کہ میٹر تھرمار مل ہو جائے،
 اگر طیر یا بخار ہو، تو اس کو علاج کریں۔ اگر محرقہ یا فوسینہ ہو تو ان کا
 علاج کریں، شدید ہڈیاں میں پوٹاسیم پریدماٹید استعمال کریں
 ضعف قلب کی حالت میں مقویات اور محرکات مثلاً کونجین، سیرٹ
 ایونیا وغیرہ استعمال کریں، سر پر سرکہ، عرق گلاب، گل روغن کی پٹی لٹکوا کر
 رکھیں، اگر تسم ادم کی وجہ ہو۔ تو اس کا علاج کریں۔

ہڈیاں کی ہومیوپیتھنی ادویات

بیل ڈونا ۳ : ہمارے، دڑنے، کپڑے پھاڑنے، کبھی ہنسنے، کبھی
 چیخنے، اپنے آپ کو مارنے، نیند بیداری میں لکیاں دماغی حواس خراب
 ہونے کے لئے مفید ہے، چہرہ سرخ اور شدت بخار ہو۔
 ہائیڈرکس ۳۰ : دماغی خرابی، بڑ بڑاہٹ، خود بخود باتیں کرنا، سر میں
 انجناد خون ہو، چڑچڑاہٹ کے لئے مفید ہے۔
 سٹرامونیم ۳۰ : مجنونانہ حالت میں اُٹھ کر بھاگنا، چہرہ سرخ، گرم،
 ہنسنا، دماغ میں دوران خون کی تیزی کے لئے مفید ہے۔

لو لکنا SON STROKE سن سٹروک

تعریف : اس مرض میں شدت گرمی سے خون میں جوشش آجاتا ہے۔

محنت کمزوری ہو کر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت یہ مرض سکنتہ کی ہی ایک قسم ہے۔

وجوہات :- دھوپ میں باہر پھرنے، جسمانی اور دماغی محنت کرنے وغیرہ اس کا واحد سبب شدت حرارت ہے۔

تشخیص مریض شدت حرارت سے بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ وقت تنفس ہو کر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس کی علامات دل و دماغ اور درجہ حرارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لئے اس کی تین اقسام کی گئی ہیں۔ ہر ایک کا علاوہ علاوہ بیان لکھا جاتا ہے۔

۱۔ سکنتہ حراریہ قلبیہ

اس میں گرمی کا اثر مریض کے قلب پر پہنچتا ہے۔ اور دل کی حرکات پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر حملہ خفیف ہو۔ تو سر جھکانا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، نبض کا کمزور چلنا، درجہ حرارت کا کم ہو جانا، سینہ میں حکڑن تے، متلی کا آنا، سخت کمزوری، نفاہت کا ہونا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جانا اس کی علامات ہیں۔

اگر یہی حالت شدید اختیار کر جائے۔ تو مریض پر غشی طاری ہو جاتی اور حرکت قلب بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات سکنتہ اور قوما سے ملتی ہیں۔ اس لئے ان میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ قوما میں مریض کا چہرہ آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔

۲۔ سکنتہ حراریہ دماغیہ

اس میں تمام سابقہ علامات ہوتی ہیں۔ لیکن شدید ہوتی ہیں۔ اور یہ شدید علامات دفعۃً نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اس میں غشی کے علاوہ سانس میں بہت

زیادہ تنگی ہوتی ہے۔ دم گھٹتا ہے۔ اور بخار اس میں بھی نہیں ہوتا اس کی علامات بھی سکتہ اور توتا سے ملتی جلتی ہیں۔

۳۳۔ سکتہ حرّیہ محرقہ: اس میں نہایت شدید بخار ہوتا ہے درجہ حرارت ۱۰۸ سے ۱۱۰ تک پہنچ جاتا ہے۔ سخت بے چینی۔ بے قراری اور پیاس لگتی ہے۔ دل کی حرکات تیز ہو جاتی ہیں۔ نبض تیز اور پر ہوتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے۔ اور ہڈیاں بھی ہوتا ہے۔ غشی طاری ہونے کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی خوش قسمت مریض اس سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی بچ جائے تو اس میں بھی دماغی عوارضات باقی رہ جاتے ہیں۔

اس کی علامات پیریا بخار اور محرقہ بخار سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ پیریا بخار اور محرقہ میں درجہ حرارت اس قدر نہیں بڑھ سکتا۔ اور نہ ہی سانس کی تنگی ہوتی ہے۔

نوٹ: عموماً اس مرض میں دھوپ میں کاٹا کرنے والے کمزور۔ بوڑھے اور شرابی استرخا میں مبتلا ہوتے ہیں۔

علاج

۱۔ سکتہ حرّیہ قلبیہ: اس کا مکمل علاج مریض کو گرمی سے محفوظ رکھنا۔ اور گرمی کے اثرات کو رفع کرنا ہے۔ مریض کو فوڈ اسرڈ اور ہوادار جگہ پر لے جائیں۔ اور آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔ گرمی کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ ریڑھ اور گدی پر برف پھرائیں۔ سرد پانی برف ملا ہوا پلائیں۔ دل کو طاقت دینے کے لئے کوراسین بذریعہ انجکشن ۲ سی سی عضلاتی ٹیکہ کریں۔ یا خوردنی طور پر یاخچ یاخچ قطرے پانی میں ملا کر پلائیں۔ گلوکوز عرق کا دزبان میں ملا کر پلائیں۔ شربت صندل۔ فالسہ اور شربت انار وغیرہ پلائیں۔

چاروں معزز کا ہر خوفہ کا سنی زیادہ کی سردی تیار کر کے پلانا بھی
مفید ہے۔ یہ نسخہ بھی بے حد مفید ہے۔

نسخہ :- سپرٹ ایوینا ایرو میٹک ۔ سوئم ، سپرٹ ایٹر ۲۰ سوئم
سپرٹ آف لیونڈر ۔ سوئم ، ایکو اکلورونام ایکادس ،

ایسی ایک ایک خوراک ہر دو تین گھنٹہ بعد پلائیں جس کی علامات
رفع ہو جائیں ۔ یہ خود مقوی قلب ہے ۔

۲، سکڑے حریر و ماغیہ

چونکہ اس میں گرمی کا اثر دماغ پر ہوتا ہے ۔ دماغ سے گرمی کا
ازالہ کرنے کی کوشش کرتے چاہئے ۔

مریض کو سرد جگہ اور سایہ پر لا کر لیٹر پہ لٹائیں ۔ اور منہ پر سرد پانی
کے چھینٹے ماریں ۔ اور ایک درشتیں پانی کی مر پر دھاریں ۔

اگر کمزوری زیادہ ہو ۔ اور قبض مکر وہ چلے ۔ اور سرد سینہ آئے ۔
تو پانی کا استعمال نہیں کرتا چاہئے ۔ اور عرقیات مثلاً کورامین ایکسی کی
بذریعہ عضلاتی تحکیم استعمال کریں ۔

سرکتین بائسٹروکلورائیڈ کا جلدی ٹیکہ بھی کمزوری میں مفید ہے
اور مندرجہ بالا سکڑے قندیہ والا نسخہ استعمال کریں ۔

اگر قبض ہو ۔ تو گرم پانی کا حقنہ کریں ۔

مریض کو ہوش آسنے کے بعد کیفیشیا یا کوئی اور مسهل دیں ۔

۳، سکڑے حریر محرقہ

اس میں بخار بہت شدید ہو جاتا ہے ۔ اس لئے بخار کی شدت کو
کم کرنا ہی اس کا علاج ہے ۔

سر اور ریڑھ کی ہڈی پر برف پھیریں ۔ اور سرد پانی کا حقنہ کریں

اور برف یہاں تک پھیریں کہ درجہ حرارت ۱۰.۸ ڈگری کی بجائے ۱۰.۲ درجہ پر آجائے۔

کبھی اس مرض میں تشنج اور بے حسینی بھی شدید ہوتی ہے۔ پوٹاشیم برومائیڈ، اگرین، ایکوا ایک اونس پانی میں ملا کر دیں۔ تشنج اور تشنجینی رفع کرنے کیلئے مفید ہے۔ سرد پانی برف ملا ہوا، مشربت فاسلہ، گائے کی تسی پلانا بھی فائدہ مند ہے۔ کافوراماشہ، صندل سفید، ماشہ، عرق کلاب میں کھول کر کے سر پر لگانا بے حد فائدہ کرتا ہے۔ کمزوری رفع کرنے کے لئے تخمیرہ مرزادید، دوارالمسک، باردکھلائیں۔ اگر باوجود ٹھنڈا پانی ڈالنے اور برف لگانے سے بھی افاقہ نہ ہو تو کھوپڑی پر کنٹریٹس پلاسٹر لگا کر چھالا اٹھائیں۔ چھالے سے پانی خارج کر دیں۔ جن اشخاص کو سن سٹروک کی مرض ہو چکی ہو، ان کے لئے یہ احتیاط لازمی ہے کہ وہ گرمی میں چلنے، پھرنے اور کام کرنے سے پرہیز کریں۔ غذا زود ہضم، سیال اور ٹھنڈی دیں۔

سن سٹروک کا ہومیوپیتھک علاج

نیزم میورم ۱۲ :- سن سٹروک یعنی گرمی گھٹنے کے برے اثرات کے لئے بے نظیر دوا ہے۔ گرمی کا حملہ ہو جانے میں اس دوا سے بالکل آرام ہو جاتا ہے جب کہ کیا رگی، اعضا کی رطوبت خشک ہو جائے، اور تمام بدن میں خشکی کی علامات پیدا ہوں۔ کالی فاس :- گرمی کے برے اثرات زائل ہونے کے بعد دماغی خرابیوں کو درست کرنے کے لئے یہ مفید و تجرب دوا ہے۔

اکسییر سن سٹروک :- نیزم میورم ۶، رسگرین، کالی فاس ۶، رسگرین، ایسی ایک خوراک دن میں چھ مرتبہ دیں، گرمی گھٹنے کے تمام عوارضات اور ہذیان کیلئے مفید ہے۔ نیز بیلا ڈونا جیسی میم، گلکونائن، نکس دامیکا، کالی کارب بھی مفید ادویہ ہیں۔

ہیڈرو سیرس پانی بھر جانا HYDROCEPHALUS

ہیڈرو سیرس کیسے لگتا

تعریف : اس مرض میں دماغی پردوں کے اندر آب خون جمع ہو جاتا ہے۔ وجوہات : دماغ کی دیریدوں پر کسی دسولی وغیرہ کے دباؤ پرٹنے سے یا دماغ کے جوف کی سوزش ہونے یا دماغ کے سیلان خون سے یہ مرض ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے داخلی اسباب ہیں۔ عام طور پر جنین میں یا چار پانچ ماہ کے بچوں میں یہ مرض ہوتا ہے۔ شربابی، خنازیری، آتشکی و دین کی اولاد اس مرض میں اکثر مبتلا ہوتی ہے۔

نیز صدمہ دماغ، دانوٹوں کا نکلنا، ہیڈ کے کپڑے، جھک جھرہ وغیرہ کسی جلدی مرض کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی سوزش کا دماغ تک پھیل جانا وغیرہ اس کے خارجی اسباب ہیں۔

تشخیص : حالت جنین میں جب یہ مرض ہوتا ہے، تو وضع حمل میں ہنایت مشکل پیش آتی ہے، اگر پیدائش کے بعد ہو، تو مریض کا سر بڑا ہو جاتا ہے، اور بلا سہارے ٹھہر نہیں سکتا، سر کی ہڈیوں کے دراز کھل جاتے ہیں، تالو ابھر جاتا ہے، پیشانی چوڑی اور ٹھوڑی تنگ ہو جاتی ہے، سر درد، جھک آنا، بے خوابی، دماغی قوائے ناقص رہ جانا وغیرہ علامات ہیں، کبھی آنکھیں کھلی، پتلیاں بے حس، بھینگا پن، دست قے، تشیخ کی بھی شکایت ہوتی ہے، غلبہ مرض میں غنودگی برپا جاتی ہے اور آخر بے ہوشی یا تشیخ کی حالت میں مریض مر جاتا ہے۔

علاج : اکثر یہ مرض لاعلاج ہے، اگرچہ عمل جراحی سے سر سے پانی نکال لیا جاتا ہے، لیکن یہ عمل کرنا ہنایت خطرناک ہے۔

اور بعض کا بچنا نہایت مشکل ہے۔ اگر خارجی اسباب سے دماغ میں رگوت جمع ہو گئی ہو، تو پھر علاج معالجہ سے مرض میں تخفیف اور آرام ہو جاتا ہے۔ نسخہ: ریڈ آئوڈائیڈ آف مرکری ۵ گرین، ویزی لین ایک ادیس ملا کر مریم تیار کر کے اس کی سر پر مالش کریں۔ اور خوردنی طور پر مرکبات فولاد کا ڈیوڑا تیل وغیرہ دیں۔

اپنی لیبسی

EPILEPSY

مرکی

تعریف: اس مرض میں آلات حس و حرکت میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے اور عضلات میں تشنج ہو کر مریض زمین پر گر پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں کھینچے جاتے ہیں، اور منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اکثر یہ مرض معدہ سے آتی ہے و جو ہاتھ، اکثر یہ مرض موروثی ہوتی ہے، اور عام اسباب مرض یہ ہیں، کثرت جماع، جلق، دماغ پر چوٹ آنا، دماغی رسوبی، دماغ، کثرت محنت دماغی، شراب خدی، آتشک، نفرس، سمیت خون دہول، وجع المفاصل، رحم کی خرابیاں، فتور حصین، اغراض نفسانیہ، بچوں کا اچانک خوف کھا جانا، پیٹ کے کپڑے، دانت نکالنا، اور دانتوں کی خرابی سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔

تشخیص: ابتدا میں جسم کے کسی حصہ میں سرسراہٹ ہوتی ہے، سر درد، ہلکا ہونا اور ڈراؤنی تشکیلیں نظر آتی ہیں، پھر مریض ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں میں تشنج ہو کر تھیرا بیٹا ہو جاتا ہے، آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں، سانس مشکل سے آتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، پیشاب اور پاخانہ

بے اختیار نکل جاتا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کو جھٹکا لگتا ہے، مریض سرد آہ میں بھرتا ہے، غوطہ می دیر بعد مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ دودھ کی مدت تین مہینے سے لے کر آدھ گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔

بعض مریضوں کو سرد و دودھ پڑتا ہے، اور بعض کو دن میں کئی کئی بار، اور کبھی کئی ماہ اور سال گزر جاتے ہیں۔

مرگی کے دورے پانچ درجہ پر ہوتے ہیں،

۱۔ جسم کے کسی حصہ میں سرسراہٹ اور چیونٹیوں کا رینگنا، ڈراؤنی خشکیاں نظر آنا
۲۔ اس کے بعد جھجھ مارنا، ۳۔ تشنج ہو جانا، ۴۔ سارے جسم کا اکڑ جانا، اور
جھٹکے لگنا، ۵۔ بے ہوش ہو جانا، ۶۔ بے ہوشی عموماً نیند میں تبدیل ہو جاتی ہے
اس کے بعد مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔

مرگی اور ہسٹریا کے دورے کی علامات بالکل مشابہ ہوتی ہیں، اس لئے معالج کو ان کا فرق جاننا ضروری ہے۔

مرگی بالعموم مردوں کو ہوتی ہے اور ہسٹریا عورتوں کو۔

مرگی کے دورہ سے پہلے سرسراہٹ ہوتی ہے۔ دورہ کے دوران مکمل بے ہوشی ہوتی ہے۔ دورہ ہر جگہ پڑ سکتا ہے۔ دورہ کے وقت مریض زبان کاٹ لیتا ہے، اور غیر ارادی طور پر بول دہراؤ خارج ہو جاتا ہے۔ تشنج کی حرکات منظم ہوتی ہیں، لیکن ہسٹریا کے دورہ سے پہلے ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی۔

علاج :- اس مرض کا علاج تین حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ دورہ کی علامات شروع ہوتے وقت علامات رفع کرنے کا علاج کرنا، تاکہ دورہ رگ جائے۔

۲۔ دورہ مرض ہونے کے بعد دورہ رفع کرنے کا علاج۔

۳۔ مرض کا مکمل استیصال اور نشانی علاج۔

بطور حفظ مانتھم جس وقت دورہ کی علامات شروع ہوں، اور جس جگہ سرسراہٹ شروع ہو، اس جگہ کو مضبوط باندھ دیں، یا چٹکی بھریں، یا اس جگہ سردی یا گرمی پہنچائیں، یا بخلی لگائیں، اور اس جگہ پلاستر لگانا بھی مفید ہوتا ہے، اعضا کو زور سے کھینچنا، اچھلانا، حقنہ کرنا، تے کرانا، حلاب دینا وغیرہ علامات کو روکنے کے لئے بہترین تدابیر ہیں، ان تدابیر کا تعلق مریض یا مریض کے گھر والوں سے ہے، اور طبیب کے پاس پہنچنے تک یہ تمام مراحل گزر کر دورہ پڑ چکا ہوتا ہے، اگر ایسی صورت میں طبیب کے پاس مریض آئے، تو اس کو ان مندرجہ بالا تدابیر پر عمل کرنا چاہئے۔

علاج دورہ مرض : دورہ کی حالت میں مریض کو صاف کھلی اور ہوا دار نرم جگہ پر لٹائیں، سر کو ادبھار رکھیں اور زبان کو دیکھیں، کہ کہیں دانتوں کے نیچے آکر کٹ نہ جائے، دانتوں کے درمیان کپڑے کی گدھی یا بوتل کا کارک دے دیں، منہ پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں، سر پر برف لگائیں، ایمائیل نامٹریٹ سونگھائیں، اگر کامل بے ہوشی ہو جائے، تو ہوش میں لانے کی کوشش نہ کریں، ہوشی دیر بعد مریض خود بخود ہوش میں آجائے گا، دورہ دور ہوئے کے بعد اگر سرد رہے، تو کوئی مسکن دوا اسپرین وغیرہ دے دیں۔

مرض کا مکمل استیصال اور نشانی علاج

اصل مرض کے سبب کو معلوم کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے مریض کو قبض ہرگز نہ ہونے دیں، محرکات، شراب، چائے، قہوہ، متب کو اور جوش جذببات سے پرہیز کرائیں۔

اگر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ ہو، تو ان کو رفع کریں، معدہ، امعاء، جگر کے
اعمال کو درست کریں۔

سرگی کے علاج میں تمام ادویات سے بروما سید کا استعمال بے حد مفید
تجربہ ہو چکا ہے۔ روزانہ ۲ سے ۱۰ گرین تک بروما سید دی جا سکتی ہے، اور
دور سے رک جانے کے بعد بھی تقریباً دو سال تک یہ دوا جاری رکھنی چاہیے۔
چنانچہ دور سے رک جانے کے بعد ۵ گرین سے ۳۰ گرین کی مقدار میں
دن میں تین بار دینا شروع کریں۔ پھر حسب ضرورت اس کی مقدار کو گھٹایا
یا بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر ۳۰ گرین کی روزانہ تین خوراکیں دینے سے دورہ
نہ رکے، تو پھر اس دوا کا فائدہ کم ہوتا ہے، اور یہ اکثر دوا کے ناقص ہونے
کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس دوا کا بہترین وقت دورہ شروع ہونے کی ابتدا
ہے، مثلاً دورہ مرض سے تین چار گھنٹے پہلے ایک بڑی خوراک پلائیں۔
رات کو نیند میں دورہ پڑتا ہو، تو ۳۰ گرین کی ایک خوراک سوتے
وقت کھلائیں۔

اگر صبح کو بیدار ہوتے وقت دورہ پڑتا ہو، تو اس کو سوتے وقت
ایک خوراک اور ایک صبح بیدار ہوتے ہی پلائیں۔ دورہ رک جائے گا۔
بروما سید کا استعمال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک
کہ اس کا پورا پورا اثر نہ ہو جائے۔ اگر اس کے کچھ زہریلے اثرات ظاہر ہوں،
تو کچھ عرصہ کے لئے اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ دوران استعمال میں
کو غذا بے نمک دینی چاہیے۔

اس کے استعمال سے اگر دورہ مرض رک جائے، تو دورہ رکنے کے
بعد بھی دو سال تک متواتر اس دوا کی استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ
کم کرتے جانا چاہیے، اور کبھی کبھی ناخن کر لینا چاہیے۔

اکسیر صرع : پوٹاسیم برومائڈ ، سوڈیم برومائڈ ، ایونیم برومائڈ
سٹریکٹیم برومائڈ ، ٹیٹیم برومائڈ ، ہر ایک مساوی الوزن ہارکب
پیس کر سفوف تیار کریں۔

مقدار خوراک : اگرین سے ۳۰ گرین روزانہ تین خوراک دیں۔

اکسیر صرع جدید : پانڈن کیپ سٹول پے اگرین
ایک ایک کیپ سٹول دن میں تین بار غذا کے بعد دیں۔ مرگی کے دور
روکنے اور اس کے مکمل علاج کے لئے بہترین دوا ہے۔
دوا سے جدید : فنی ٹون ٹیبلٹ ۳۰ گرین۔ اسی ایک ٹیبلٹ دن میں
دو بار کھلائیں۔ مرگی کے لئے مفید ہے۔

کلیسچر : پوٹاسیم برومائڈ ۵۰ گرین ، سوڈا بائی باربوسٹ پے ۷۰ گرین
پھر ۵۰ ٹیکرا آرستین کیس ۳۰ ملیم۔ ایکو ایک ادتس۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار پلائیں

سفوف صرع : بیومینال پے اگرین۔ اڑدین جے اگرین۔ ملک منوگر
۵۰ گرین۔ ایسی ایک ایک پڑیہ دن میں تین بار دیں۔ ہر پانچ چھ دن کے
استعمال کے بعد دو دن کا وقفہ دے لیا کریں۔ صرع و مرگی کے لئے مفید ہے
اگر برومائڈ کے استعمال سے مرگی کو فائدہ نہ پہنچے تو بورکیس
کے استعمال سے مرگی کی علامات رفع ہو جاتی ہیں۔

مقدار خوراک : اگرین سے شروع کر کے بڑھا کر ۵۰ گرین تک

پہنچا دیں۔

اکسیر صرع : باجورہ ۵ ٹونڈے کر اول اس کو گدھے کے پیشاب
۲۰ ٹونڈے میں تر کر کے سایہ میں خشک کریں۔ اس کے بعد اس باجورہ کو ہاتھی
کے پیشاب میں اسی طرح تر کر کے سایہ میں خشک کریں۔

اسی طرح باجرہ کو انسان کے پیٹاب میں تر کر کے خشک کریں، پھر اس باجرہ کو شہد ۱۰ تولہ میں ملا کر سگ سیاہ کو پکڑ کر جبراً کھلا دیں، اور اس کو باندھ رکھیں، جب دوسرے روز یا خانہ نکالے، تو اس کو صاف کر کے اس میں سے باجرہ کے دانوں کو سالم نکلے اور۔

ان میں سے ایک دانہ وقت نوبت کے مریض صرع کو کھلا دیں، اور یہ ہولاس بھی جو کبھی جاتی ہے، ناک میں دیویں، انشاء اللہ تمام عمر کے واسطے اس موذی مرض سے نجات ہو جائے گی، مجرب ہے یہ نسخہ میرا تجربہ شدہ نہیں ہے، ہولاس پر سرگیں گرگ خشک ۱۰ تولہ، استخوان کا مسہ سرآمدی ۱۰ تولہ، متب کو سورتی ۱۰ تولہ، سرگیں نیل ۱۰ تولہ۔

سب کو خشک کر کے باریک پس کر رکھ چھوڑیں، وقت نوبت کے مریض کے ناک میں قدرے ۲ رتی کے ڈال دیں، بذریعہ نیلی، خداوند اپنا فضل کر دے گا، مجرب ہے۔

مرگی کی پیٹنٹ ادویات
ڈالی لنٹین و پارک ڈیوس،

مقدار خوراک ایک کیپ شول دن میں تین بار دیں، مرگی کیلئے مفید ہے
ٹالی ڈیوٹن

مقدار خوراک ایک کیپ شول دن میں دو بار، خفیف مرگی کے لئے
بہت مفید ہے۔

نوٹ، یہ زہریلی دوا ہے، احتیاط سے استعمال کریں۔

مالی سولین ریبلٹ،

مقدار خوراک تین ٹیکہ صبح و شام دیں، بچوں کو نصف ٹیکہ دن میں دو بار دیں، یہ ایک جدید دافع نفخ دوا ہے، شدید مرگی کے لئے بے حد مفید ہے۔

ڈائی فینیل ہائی ڈیٹو بین سوڈیم ۔

مقدار خوراک ایک کپیپ شول دن میں تین بار ، یہ شدید مرگی میں بہت موثر اور مفید ہے ، جب کہ شدید دورے پڑ رہے ہوں ،
مسل بوٹن ڈسینڈوز

شروع علاج میں نصف ٹمکیہ روزانہ ایک بار ہر ہفتہ ، اس کی مقدار خوراک بڑھاتے جائیں ، یہاں تک کہ ایک ٹمکیہ دن میں تین بار دی جاسکے ، یہ خطرناک دوا ہے ، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی استعمال کرنی چاہئے ،

سرپینا SERPINA

مقدار خوراک ۱/۲ تا ۱ ٹمکیہ دن میں تین بار دیں ، بے خوابی ، مرگی ، تشنچ کے لئے مفید ہے ،

سرپاسیل SERPASIL

یہ بھی مرگی کے لئے مفید ہے

علاوہ ازیں انگیز برومائیڈ ، دیلیرین ، ہٹری برومائیڈ ، کیسیم برومائیڈ سوئی رائل ، ایپی نال وغیرہ بھی اس مرض کے لئے مفید ہیں ،

کسیچر پوائے صرع ، پوٹاسیم برومائیڈ ۵ گریں ، سوڈیم برومائیڈ ۱۰ گریں ایونیٹم برومائیڈ ۵ گریں ، لائیوڈار آرٹھری کیس ۳۰ منیم ، کسیچر کلکس ، ۲۰ منیم ، ایچ اے اوٹس ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں ، دو خوراک صبح و شام کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ بعد اور تیسری خوراک رات کو سوتے وقت آدھے گلاس پانی میں ملا کر دیں ، مرگی کے لئے مفید و مجرب ہے ،

اکسیبر مرگی : سوڈیم لیو مینال ۱/۲ گریں ، ملک شوگر ۵ گریں صبح و شام پانی کے ساتھ ایک ایک خوراک دیں ، ہر پانچ دن کے بعد دو دن دوائی کا ناغہ کریں ، اور تقریباً دو ماہ استعمال کریں ، مرگی کیلئے بیضیر مجرب دوا ہے ، سرد دوا کو بھی مفید ہے ،

مرگی کے مریض کو پیر یا بخار کی صورت میں کوئین سلفینٹ نہیں دینی چاہئے
 فیروز بارمیٹون سوڈیم بھی اس مرض کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔
 آشک کی وجہ سے ہونے والی مرگی کے لئے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ
 بے نظیر دوا ہے۔

مرگی کا ہومیوپیتھی علاج

دورہ کے وقت ایمائیل نائٹر اس سونگھانے سے دورہ رفع ہو جاتا ہے۔
 ہر ایک قسم کی مرگی کے لئے بیلا ڈونا ۴ مفید ہے۔ بچوں میں
 خصوصیت سے یرالی مرگی کے لئے خاص کو جبکہ کسی حصہ سے پیپ
 یا رطوبت نکلتی ہو، تو سلیشیا ۳ دیں۔ جبکہ بیلا ڈونا کے استعمال سے نائدہ
 نہ ہو، تو سلفر ۳ کا استعمال بہت مفید ہے۔


جدید اور خفیف دورے کے (خصوصاً داینی طرف) اور دورے کے
 درمیان اگر پیشاب خود بخود خارج ہو جائے، تو کاسٹیک از حد مفید ہے۔ دورے
 کے پہلے چکر آئیں، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں، چہرہ نیلیوں ہوں، تو
 ایکس ٹامکس دیں۔

اگر مرگی جوٹ کی وجہ سے مرگی کی علامات پیدا ہو جائیں، روحانہ
 حالتوں میں آرینیکا ۳ دن میں تین خوراکیں ایک مہینہ تک کھلاتا اس مرض کا
 سٹانی علاج ہے۔ اگر مرض مزمن ہو، تو ادبچی طاقت میں ۶ ایکس استعمال
 کریں۔ معمولی و تجرب ہے۔

نیز کلکیریا کارب ۳۰، اگیشیا ۳۰، آر سینک الیم ۳۰،
 ٹمکس دامیکا ۳۰ بھی مرگی کے لئے مفید ادویہ ہیں۔

کمز العلاج

(۴) چہرے پر دردوں کے مقامات



(۱) سرحد قبضہ - بنجار کی حالت خراب ہے۔
کی مرمت دیا گیا اور بول کا زہر دیا۔

۵۱) هر دو جانب در دقیقه یاسرک بیماریان.

(۲) مددہ کی بیماریاں کثرت
شراب نوشی کی تکالیف -

(۲) تاک کی سیاریاں تاک کی جہت اور
پڑی کی حوضش۔

(۴) آئینہ کی چارپایاں - موتیا۔

آئینہ ورد - سوزش قرینہ

۱۔ مہلے کی سادہ ورد اور نرم سنبھہ کی تپا ق
رسولی۔ مہلے کی ند کا بڑھ جانا۔



(۱۱) اعصابی کمزوری اور درد۔

۱۴) نگہ کی بیماریاں۔ مسمایا
 (درویں اور دانتوں کی خرابیاں۔)

(م) رافت گاورو. (مصابی درو)

مکھنڈے جہڑے کی خلی ڈی
کی سوزش اور سولی -

(۴) دانت کا درد - اعصابی درد

ہماک کی جلی کی موزش

دعا خوان کی کسی مصیبتی ہوا یا نہ ہو

امصابی گزیری انتہائی رحم (ہشتمی)

برگ۔ رسولی۔ دماغ کا تیزم ہو جانے اور شرابیوں

• جو مانا جین کی خرابیاں اور مرض مایں۔

۱۰) من شاکہ برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
چوتھے مرتبہ اور گنٹھا۔

(۱) کالان میں غلہ بھانا۔ عیب یا خرابی کا پتہ چلا کر
کالان کا پتہ لگانا اور اسے دیکھنا۔

(۸) آنکھ کی غرابیاں۔ اعصاب کی کمی

در مانع مصلح مانع مایه پر.

دھرم

۱۹۱ مسیحیایان و مسیحی

(جو حقوق بحق رہنمائی زندگی منوط ہیں)

سکڑ APD PLEXY اپوپلیکسی

تعریف :- اس مرض میں دماغ کے اندر جریان خون ہو کر ہوش دھواں
محسوس ہو جاتے ہیں اور مریض مثل مردہ کے ہو جاتا ہے، لیکن حرکت
قلب اور سانس بدستور رہتا ہے۔

وجوہات :- اس مرض کا سب سے بڑا سبب دماغ کے اندر بعض
مستحبات میں کم و بیش خون یا آب خون کا جاری ہونا ہے جو موروئی
ہو پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن مضرہ ذیل اسباب سے بھی ہو سکتا ہے۔
خون کا زہریلا ہونا، خود کسی سبب سے ہو، دماغی جوش دماغ
میں بہتا رہ خون، جسم میں خون کی زیادتی، دماغی شریانوں کے پردوں
کا چربی وغیرہ میں تبدیلی ہو جانا، شراب اور اجنوں کا زہریلا ہونا،
عیش و عشرت اور ورزش کرنا، زور سے کھانا پکنا، شدید
کڑی یا سردی کا لگنا، زیادہ عضہ آنا، دل کا دھڑکنا، مہر تر چیزوں کا
زیادہ استعمال کرنا، تنگ گریبان وغیرہ کا دباؤ پڑنا،
نیز یہ جن چالیس سال اور اس کے بعد کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے۔

اس مرض کی چار اقسام ہیں۔

۱۔ سکڑ دموی (سنگولی نس اپوپلیکسی)

۲۔ سکڑ مصلی (میرس اپوپلیکسی)

۳۔ سکڑ اعصابی یا بخاری (زورس اپوپلیکسی)

۴۔ سکڑ حلقائی (کنجسٹو اپوپلیکسی)

سکڑ دموی :- یہ نام طور پر خون کی زیادتی سے ہوتا ہے۔

سکتے معنی ہر یہ معنی کی زیادتی سے ہوتا ہے۔
 سکتے اعصابی یا بخاری ہر یہ بخار کی زیادتی اور اعصابی دباؤ سے
 ہوتا ہے۔

سکتے احتقانی ہر یہ دماغی خون کی زیادتی اور اس کے دباؤ سے
 رک جائے سے جریان خون ہو کر ہوتا ہے۔
 تشخیص و علامات ہر مریض بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے، اور
 مثل مردہ کے ہوتا ہے۔

علائقہ وقت اور اثر آٹے سے آتا ہے، باغظ، پاؤں سرد، آنکھیں پھیرائی
 ہوئی ہوتی ہیں، دونوں نیلیاں بے حس کشادہ ہو جاتی ہیں، منہ کے
 حیرے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز منہ کے ذریعہ اندر نہیں جاتی، اور
 یہ حالت پانچ منٹ سے لے کر ۲۷ گھنٹے تک رہ سکتی ہے۔
 عام طور پر یہ مرض تین طرح ہوتا ہے۔

۱۔ مریض اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ چہرہ سرخ یا نند ہوتا
 ہے۔ سانس خواتے سے آتا ہے۔

۲۔ اچانک درد سر ہو کر آدھے جسم کا فالج ہو جاتا ہے، رنگ زرد، جی متلاتا
 ہوا نظر آتا ہے۔ سر جھک کر آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے
 دریا تک بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ باغظ، پاؤں سرد اور نبض کمزور
 ہو جاتی ہے۔

۳۔ اچانک آدھے جسم کا فالج ہو جاتا ہے، شروع مرض میں مریض کو
 ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔

مرض سکتے کے وقوع میں آنے سے پہلے مندرجہ ذیل علامات
 ہوتی ہیں۔ بار بار سرد درد سر، بے ہوشی، بے ہوشی میں فرق آ جاتا ہے۔

ایک چیز کی دودھ نظر آتی ہیں۔ قبض، خواب میں ڈرنا، اعصاب کی کمزوری
برائے وقت غلط، مہل الفاظ بولنا، کبھی کبھی ناک سے خون بھی جاری ہو جاتا
ہے، چہرہ کا ایک طرفہ فاج ہو کر چہرہ پیرھا ہو جاتا ہے، اور کبھی منہ کی
فاج ہوتا ہے۔

علامات فارقہ بر سکۃ کی مرض دیگر امراض کے تشابہ ہوتی ہے۔
اس لئے اس کی تشخیصی علامات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔

مثلاً مرگی پیشاب کا زہر بلا پن، غشی، مثراب، افیون، مرگی میں
مریض کے ہاتھ، پاؤں میں تشنج ہوتا ہے۔ سکۃ میں تشنج نہیں ہوتا، غشی
عموماً نازک مزاج عورتوں اور مردوں کو ہوتی ہے۔ جو چند منٹ میں رفع
ہو جاتی ہے۔ سکۃ کا مریض بالکل مردہ کی مانند پڑا رہتا ہے۔

پیشاب کا زہر بلا پن، پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ منہ سے پیشاب
نہیں آتی ہے۔ اور غشی میں تشنج بھی ہوتا ہے۔ سکۃ میں یہ علامت نہیں ہوتی
مثراب کے زہر میں مریض کے منہ سے مثراب کی بو آتی ہے۔ مریض کو
زور سے جگانے سے ہوش نہ آتا ہے۔ سکۃ میں نہیں۔

افیون کے زہر میں بے ہوشی میں سانس خراب ہے اور بے ہوشی
کی تلبیاں سگڑ جاتی ہیں، مریض کو ہلانے، چلانے، بلانے سے
ہوش نہ آ جاتی ہے۔ سکۃ میں ہلانے، چلانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا
مریض سکۃ کا یہ معلوم کرنا کہ آیا مردہ ہے یا زندہ،

مریض اگر زندہ ہو تو

رموز تشخیص

۱۔ مریض کے ناک کے قریب روئی کا ہکا سا ٹکڑا رکھتے ہیں۔ حرکت کرتا ہے۔
۲۔ آنکھوں میں چراغ کی روشنی اور دیکھنے والے کی صورت کا انکسار
نہیں آتا ہے۔

۱۳، پانی ۲ پیالہ بھرا ہوا سینہ پر رکھنے سے حرکت کرتا ہے۔
 ۱۴، سینہ پر آنے اسٹے شکوپ لگا کر بھی دل کی حرکت اور تنفس کو
 معلوم کیا جاسکتا ہے۔

اگر مریض مرجھتا ہو

۱۵، آنکھیں نرم اور اندر کو دھنسن جاتی ہیں۔

۱۶، آنکھوں کے آگے جہاں سامعہ اوم ہوتا ہے، اور عکس دکھائی نہیں دیتا۔
 ۱۷، مردہ کی تمام علامات پانی پانی میں۔

رگت کا علاج کرنا بنایت مشکل ہے، شاید زور دے کر اس
 سے جانبر ہوتے ہیں، ورنہ اکثر مرجھاتے ہیں۔

علاج

مریض کو ہوا دار جگہ آرام سے بٹائیں، سر کو اونچا رکھیں، گلے اور سینہ کی
 بندشیں ہموار ہیں، مریض کے پاس شور و غل نہ ہونے دیں، اور ٹھنڈے
 پانی میں کپڑا توڑ کر کے سر پر رکھیں، اور سر پر برف لگائیں، اور مریض کے
 پاؤں کو گرم پانی میں رکھیں۔

گرم پانی کا تھنہ کر جو، اگر دماغ کی طرف خون کا جوش زیادہ ہو
 تو کرشن آکیل، و تھنہ سے تھنہ سرین ملا کر مریض کی زبان پر مل دیں، اس
 سے دوجپ درست آجائیں گے، اور دماغ سے یہ جھڑا تر جائے گا۔

اگرچہ سات گھنٹے تک پیشاب نہ آئے، تو آنہ کیمتیر کے ذریعہ
 پیشاب خارج کریں، جب تک جوش نہ آئے، غذا و غیرہ نہ دیں۔

اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مریض ممکنہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، تو رطوبت
 کی نالی کے ذریعہ سر سے یہ مسدود پانی نہیں مثلاً دودھ یا پانی وغیرہ
 نکتہ بہ نکتہ نکال کر دینا اور پندہ یوں پر سینگیں لگھنوا، جس مہینہ میں
 مریض کے

سکتے یعنی میں تھے کرانا، معوط و بیاض سر پر نطیل اور عشاء کرنا اور محرک
و مقوی ادویات کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے،
سر کے بیان میں سوار کے سینے و جگر
سکتے کے مریض کو غذا استور یا چوزہ مرغا، پیسٹریا چاہئے۔

سکتے کا ہومیوپیتھی علاج

سکتے کے مریض کو اگر چکر آئیں، درد سر اور سر میں بھراؤ ہو، تو اس حالت
میں ٹکس دامیکا مفید ہوگا،
اگر مٹریاٹوں میں اکسامیٹ اور سربراہیٹ ہو، اور سن ہونے کا
احساس ہو، تو اکونائٹ ۳ مفید ہے،
اگر سر میں بھراؤ ہو، ٹیکن اور چہرے پر مٹماہیٹ ہو، تو بیلاڈونا ۳
دی، اور سر پر سینک کریں،
چہرہ پر سرخی اور سر میں عادی ورمی کیفیت کی علامات کے لئے
بیلاڈونا بہت مفید ہے،
جب غذا کی غلطیوں سے ہوا ہو، بخار اور ورمی کیفیت کی نمود
کم ہو، تو ٹکس دامیکا ۳ ہر پندرہ منٹ بعد دیں،
اگر مریض تیز اور بھری ہوئی ہو، تو اکونائٹ ۳ ہر ۱۵ منٹ کے
بعد دیتے رہیں،
اگر چہرہ کا رنگ ہینگنی ہو، غنودگی حد سے زیادہ ہو اور خراٹے
آئیں، تو اوپیم ۶ ہر ۱۵ منٹ بعد دیں، اگر ورمی کیفیت کا نام و نشان نہ ہو
تو آرنیکا ۳ دیں،
اگر اس کے بعد نالج ہو جائے، تو نالج کا علاج کریں،

اختناق الرحم HESTERIA ہسٹریا

ہر مرض اکثر عورتوں کو ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر رحم کی مشارکت سے ہوتا ہے، اسی لئے اس کا نام اختناق الرحم ہے۔
مفصل بیان عورتوں کی امراض میں ملاحظہ فرمائیں۔

عطاش CHOLERA رکالرا

یہ بچوں کا دم دماغی ہے۔ اس کا مفصل بیان بچوں کی بیماریوں کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔

مالم الصبیان INFANTILE CONVULSIONS

الفنٹائیل کن ولشنز

یہ بچوں کا مشہور مرض ہے۔
بچوں کی بیماریوں کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔

مالنجولیا MELAN CHOLIA (میلن کولیا)

تعلیل یہ ہے۔ اس مرض میں خیالات خامدہ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے، کثرت جماع، جلق، کثرت عسنت و مائے ریح و غم، ہانپہ کی خرابی، بواسیر کا خون بند ہو جانا، زیادہ جاگنا، عورتوں میں خون حلیق کی بند کشتی اور کبھی سرسبز یا متدید بخاروں کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔

تشخیص و علامات در مریض همیشه سست اور متفکر رہتا ہے۔ روانگی
قبض۔ نبوک کا نہ لگنا۔ ہا غنہ کی خرابی۔ معدہ

مگر یہ بوجھ اور درد کی شکایت کرنا۔ ریح پیدا ہو کر دماغ کو جڑھنا۔ اور
دل میں قسم قسم کے خیالات و افکار فاسدہ پیدا ہونے پتے میرا۔ لیجئے
مریض کی طبیعت بالکل وہمی اور دسوا سی ہو جاتی ہے۔

مریض اپنے آپ کو بہت کچھ کھنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی
بادشاہ اور کبھی پیغمبر سمجھتا ہے۔ کبھی خاموش اور کبھی دونا۔ بیٹنا شروع
کر دیتا ہے۔ مختلف آوازیں نکالتا ہے۔ اس مرض کی چار قسمیں ہیں۔

۱۔ مایخولیا دموی در یہ خون کے احتراق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مریض
خوش و خرم رہتا ہے۔

۲۔ مایخولیا صفراوی در یہ صفرا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مریض
ہمیشہ حیران و پریشان۔ بدخلق۔ بکواسی۔ غضبناک اور بدحواس ہوتا ہے
اور بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے۔

۳۔ مایخولیا بلغمی در یہ بلغم کے احتراق سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا
مریض کامل سست اور ایک سگہ خاموش بیٹھا رہنا پسند کرتا ہے۔ اور
گرم بالکل نہیں ہوتا۔

۴۔ مایخولیا سوداوی در یہ سودا کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ اور اس کا مریض
ہمیشہ خیالات فاسدہ اور افکار یہ میں مبتلا رہتا ہے۔ پریشان۔ خائف۔
متفکر اور بدحواس ہوتا ہے۔ بعض وقت ہنستا۔ روتا اور رگڑا کرتا ہے
سب اسے زیادہ غم ہونے والی ہی سمجھتا ہے۔

علاج در اصل سبب مریض کو رفع کریں۔ مریض کو کسی ایسے عمدہ
ہوادار اور پرفضا مقام پر رکھیں۔ ریح و غم اور فکر و تردد سے آزاد رکھیں۔

دماغ کو ترکھیں، مادہ محترقہ جس کی وجہ سے مایخولیا پیدا ہوا ہو، اس کا تعلق
 کریں، میرے پاس ایسے کئی مریض آئے ہیں، جن کا کافی علاج کیا گیا مگر
 علامات میں معمولی فرق ہوا، آخر کار ان کو دماغی ہسپتال میں داخل ہونے کا
 مشورہ دیا گیا، جس میں فوری مدت کے علاج سے وہ تندرست ہو گئے،
 کیونکہ یہ ایک عسر العلاج مرض ہے، اور علاج کرنے میں بھی کافی وقت
 و کار ہوتا ہے، ایک عام میڈیکل پرنکٹیشنر کے پاس اتنی دیر ایک مریض
 علاج نہیں کرا سکتا، کیونکہ ایسے مریض کے علاج کے لئے ماحول کا موافق
 ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ تمام باتیں ایک اعلیٰ وسیع دماغی ہسپتال میں ہی
 مہیا کی جاسکتی ہیں۔

نیز اس مرض میں مسدودہ ذیل کا استعمال بھی مفید ہے،

۱۰۔ دماغ کو نزاد ت پہنچانے کے لئے روغن کدو یا روغن لبوب سببہ کی سریر
 ماسش کریں۔

۱۱۔ اگر سودا کا غلبہ ہو، تو ماراجین کرانا مفید ہے۔

۱۲۔ اگر آتشک کی وجہ سے ہو، تو آتشک کا علاج کرنا چاہیے۔

اکسیر مایخولیا: رافیتوں (صرع لیسنہ) ۲ تولہ، بسفاج نستقی ۱ تولہ،

یوست حبیبہ کابی ۱ تولہ، گاد زبان ۱ تولہ، گل گاد زبان ۱ تولہ، گل سرخ ۱ تولہ، گل یلوفر

۱ تولہ، تخم کاسنی ۱ تولہ، تخم خیارین ۱ تولہ، آلو بخارا ۱ دانہ، قرصندی ۳ تولہ،

بنت مسیح ۱۰۰۰، عرق گاد زبان ایک سریر۔

سب کو عرق میں بیکر کر قوام کر کے شربت تیار کریں، بعد مہل یہ شربت

بمراہ ۵۰۰ گاد زبان ۵ تولہ کے چند روز استعمال کریں،

مایخولیا کے لئے بنایت اکسیر دوا ہے۔

غیرہ مرادید ۳۰ ماشہ بمراہ عرق گاد زبان ۵ تولہ کھلائیں، مایخولیا کے لئے عجب ہے۔

آج کل اس مرض کا علاج بجلی کے کرنٹ سے مریض کو صدمہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور مہینہ بعد زرد پیلے سے زیادہ صدمہ پہنچا دیا جاتا ہے۔
 مومٹا چرپاچ و فغہ صدمہ پہنچانے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے
 اس علاج کے علاوہ قبض نہ ہونے دیں ہاضمہ ٹھیک رکھیں
 جسمانی کمزوری رفع کرنے کے لئے مرکبات فولاد استعمال کرائیں مریض
 کو خوش و خرم رکھیں۔ روزانہ غسل کرائیں۔ سیر و تفریح کھیل تماشے دکھائیں
 غذا اور ہضم دیں۔ گرم خشک غذاؤں اور جماع سے قطعاً پرہیز کرائیں

INSANITY MAMA

جنون

(ان سنٹی مایا)

تعریف ہر اس مرض میں انسانی عقل میں خرابی ہو جاتی ہے۔ اور غیر
 پسندیدہ حرکات کرتا ہے۔

وجوہات :- کثرت جماع، جلق، کثرت شراب نوشی، فائبرکشی، خامی
 پریشانیوں، رنج اور روحانی پریشانیوں۔ اور اکثر یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے
 تشخیص و علامات :- ایسے مریض کا حافظہ کمزور، بے حسنی، بدحواسی
 چڑچڑاہٹ، بے خوابی اور سر میں بوجھ ہوسوس
 ہوتا ہے۔ پست ہمت اور پریشان خیال رہتا ہے۔

شدید حالات میں مریض کو زیادہ شور و غل، اچھٹا، کوٹونا، گالیوں
 دینا، دوسروں کو لفٹان پہنچانے کی رغبت ہوتی ہے۔

علاج :- اصل سبب کو دور کریں۔ قبض نہ ہونے دیں۔ نیند
 لانے کی کوشش کریں۔

اکسیر جنون :- چھوٹی چنڈن کا سفوف ۱۰ رتی، کیپ سٹول میں ڈال کر
عمرہ شربت بنوشر ۲ تولہ، پانی ایک چھٹا تک میں ملا کر ایسی ایک ایک
خوابک دن میں تین بار پلائیں، مہینہ عشرہ میں جنون کی علامات دور ہو
جائیں گی، بہترین دوا ہے۔

۱۔ اس مرض میں ماراچین کرانا بھی مفید ہے، شدید حالات میں ہائیو
سین ہائیڈروبرومائیڈ کا زبردست ٹیکہ کریں، عمدہ خواب آوے اور ذرا فتح جنون ہے
۲۔ ہر قسم کے جنون کے علاج میں مریض کو نیند لانے کی کوشش
کرنی چاہئے۔

۳۔ مریض کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہئے جس سے کہ
طبیعت میں جوش پیدا ہو۔

۴۔ نیند لانے کے لئے پوٹاسیم برومائیڈ ۲۰ گرین، ایک اونس
پانی میں ملا کر پلائیں۔

۵۔ نیمبوٹال ۲ پیٹ باربیٹال ۱ ۱/۲ اگرین کا ایک کیپ سٹول
پانی کے ساتھ کھلائیں۔

یہ مسکن اور خواب آور دوا ہے، ذہنی تناؤ، بے چینی
کم خوابی، ہڈیاں، پاگل پن، جنون میں بہت مفید و مجرب ہے
دماغ کو سکون بخشی ہے۔

نوٹ :- ہر مریض کے شفا یاب ہو جانے کے بعد کم از کم
۶ ماہ مریض کو آرام اور چین سے رکھنا چاہئے۔

ہر حال میں مریض کو خوش رکھنا، معتدل جگہ پر بٹھانا اور
غذا کے رکھنا بہت مفید ہے۔

گردن میں کلب پڑنا WRYNECK رانی نیک

تشریف :- اس میں گردن کے عضلات اکڑ جاتے ہیں،
وجوہات :- عام طور پر یہ تکلیف سرد گرم ہو جانے یا ایک طرف سونے
سے ہو جاتی ہے، کبھی گردن کے پھوٹ سے، خنازیر اور غزو کا وجہ المغا صلی
کن پڑے یا مہروں کی مرض سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے،
تشخیص علامات :- اس مرض میں گردن کے دونوں طرف یا ایک طرف
کے عضلات اکڑ جاتے ہیں، اگر گردن ادھر اُدھر
نہیں پھر سکتی، اگر پھرا جائے تو درد ہوتی ہے

علاج :- اصل سبب کو رفع کریں، اگر دیکھتے ہیں پڑ گیا ہو، تو مقام دُف
پر سینک کریں، اور اپنی منٹ ٹرین کا منہ کی دانتش کریں، راس کھٹکے کا ماشہ
بھی اس درد کے لئے مفید ہے۔

عام طور پر اس درد کے لئے رفع درد اور بات سننا اس میں شامین

کو ڈین وغیرہ اور ان کے مرکبات، پیرس سارٹان، کوڈینا پائکریں وغیرہ
میٹنٹ ادویات بھی مفید ہوتی ہیں،

اگر تین پڑوں کی وجہ سے جو توان کا علاج کرنا چاہئے۔ اگر اس
کے درد بوجہ سل فزری بہت زیادہ گرم ہو چکے ہوں، تو سٹریچنگ مائی سین
پی، اس، اسکو نیکس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

اگر گھٹیا کی وجہ ہو، تو سوڈا سیلی سلاس اور پٹان بہترین ادویہ ہیں
بعض پرانی صورتوں میں چلی بھی لگانی پڑتی ہے عام ریپکڑور آرمیوں کے
پیشوں میں بل پڑتے ہیں، اس لئے ایسے مریضوں کو طاقتور غنڈہ کس استعمال کرانی چاہیے

مراق

HYPOCHOLNDRIASIS

(ہائپو کائڈرائیس)

تعریف: اس مرض میں مریض کے دماغی حواس صحیح نہیں رہتے، ہر وقت سست، متفکر اور غویٰ کئے خیالات میں مبتلا رہتا ہے۔
وجوہات: دراصل یہ دماغی مایجولیا کی ایک قسم ہے، مایجولیا کے اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔

تشخیص و علامات: مایجولیا کے مریض کی تمام علامات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ مریض کا دل سست، متفکر، خود پسند اور ہر ایک بات کو بڑھا چڑھا کر سمجھنے سے بیان کرتا ہے، مرض کے زیادہ ہو جانے کی صورت میں نہایت پسند ہو جاتا ہے، اور اپنے خیالات میں گمن رہتا ہے۔
علاج: اصل سبب مرض کو معلوم کر کے، تھیک کریں۔ تھیک کرنا نیاں رکھیں، اگر خون کی زیادتی ہو، تو قصد بھی کر سکتے ہیں۔

کسبِ وزن: اگر ایک ٹریکٹ کے سالی ۳ منم، ٹینکچر جنشن ۳ منم، ایسڈ ہائیڈرو نائٹرک کلوڑک ڈال ۳ منم، ٹینکچر نکس دامیکا ۱۰ منم، ایکوا سفٹا ایپا اڈنس ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں بعد از غذا، یہ نسخہ معودہ اور جگر کی کمزوری اور مراق کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

حب مراق: ہر کچلہ مدبر الاولہ، رب انشیں رومی ۲ تولہ، شہد میں خوب بخودی تیار کریں۔

مقتدا: خوراک دو گولی کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلائیں۔ یہ دو مراق، بخیر اور ضعف، مضم مزمن کی وجہ سے غیر طبعی علامات و نم نکرا اور پریشان خیالات کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

اس مرض میں مارا لجن بھی بے حد مفید و مجرب ہے۔
 ماء اللجن بنانے کا طریقہ: سرخ یا کالے رنگ کی تندرست اور جوان
 بکری جس نے ابھی دو نیچے جننے ہوں اور بچہ پیدا ہوئے ابھی دو ماہ گزرے ہوں
 اس کو تقریباً ایک مہینہ دھینا، شامترہ، کاسنی، سولفت، خوند اور دوسری سرد سبزیاں
 کھلائی جائیں، اس بکری کا تازہ دودھ لے کر ایک قلعی دار برتن میں ڈالیں، نرم آج
 پر دو تین جوش دیں، اور پورے جوش کے وقت آب لیموں کا غذی ۲ تولہ دودھ
 میں ڈالیں، ابخر کی تازہ لکڑی یا چھب سے دودھ کو ملا تے رہیں، حتیٰ کہ دودھ
 پھٹ جائے، پھر چٹوٹے سے اتار لیں، تین تہ کی صافی سے اس کا پانی
 ٹیکا لیں، اس پانی کو سات تولہ سے شروع کر س، اور روزانہ ایک تولہ
 اضافہ کرتے جائیں، جب آدھ سیر تک پہنچ جائیں، پھر بدستور ایک تولہ
 روزانہ گھٹاتے جائیں، اور سات تولہ پر آ کر اس مقدار کو تین دن استعمال
 کر کے چھوڑ دیں، یاد رہے کہ مارا لجن کے دوران بھی بکری کو سرد سبزیاں
 کھلائیں، مراق، سودا، مالینولیا کے لئے قدیم مجرب علاج ہے۔

ہزال نخاع

TABES DORSALIS

بے تیز و آہ سیلس

تقریباً ہر اس مرض میں نخاع کے اندر شاد پیدا ہو کر پال رو کر طبع
 گنتی ہے۔

وجہ ہاست ہر اس مرض کا سبب زہر آتشک و کثرت جماع و عسار
 جسمانی کمزوری اور اعداء باطنیہ کی ہست ہے، اور کبھی یہ مرض سالانہ ہست
 بھی ہو جاتی ہے۔

تشخیص و علاج ہاست ہر اس چھب سے گھٹیں میں ہست گنتی ہے، چھب

ایک جانب پھر دوسری جانب بھی جھٹکنے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر میں درد ہوتی ہے، پیشاب کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، مریض لڑکھڑاکر پیتا ہے، رسید بھی لکیر پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے، آخر کار مرض بڑھ جانے کی صورت میں مریض کی حرکت بالکل بند ہو جاتی ہے، اور لیٹا رہتا ہے۔
 تشخیص کے لئے حرام معجزہ کی رطوبت کا کیمیائی امتحان کرانا ضروری ہے
علاج : ہر مقام درد پر گرم ٹکڑ کر میں، اگر پیشاب بند ہو، تو مدد است سے جاری کریں، اگر پھر بھی جاری نہ ہو، تو کیتھٹر کے ذریعے پیشاب خارج کریں۔

اگر آشک کی وجہ سے ہو، تو آشک کا علاج کریں،
حب عجیب : اگر گوشتیں ۲ گرین، ایکڑیکٹ بیلا ڈونا ۱/۲ گرین،
 ایکڑیکٹ جینشن ۱ گرین، یہ ایک گولی کا وزن ہے۔
 ایسی ایک ایک گولی صبح و شام دیں۔

اگر اعصابی کمزوری ہو، تو اعصاب کو تقویت دیں، اگر سل ظہری کی وجہ سے ہو، تو مرضی سل کا علاج کریں، اعصاب کی تقویت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔

جو ادویات فالج کے بیان میں درج ہیں، وہ اس میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں۔

ڈٹامن بی ۱، ڈٹامن بی ۱۲، کیسیم آسٹین، مرکبات فولاد، رومن مابی کے مرکبات، ڈٹامن ایس، ڈی اس مرض میں بے حد مفید ہیں۔
 یہ مرض بھی عسبر العجاج ہے، شاذ و نادر مریض اس سے تندرست ہوتے ہیں۔

SOFTENING OF THE
BRAIN

دماغ کا نرم پڑ جانا

(سافٹننگ آف دی برین)

تحریف در اس مرض میں دماغ نرم پڑ جاتا ہے۔
وجوہات: اگر یہ عام طور پر کثرت محنت دماغی یا دماغی سدد کی وجہ سے ہوتا ہے
عام طور پر بوڑھے اشخاص اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔

تشخیص و علامات: اس مرض میں ہرکشت وحواس میں خرابی واقع ہو جاتی ہے
مزاج چڑچڑاہو جاتا ہے، بھت پست ہو جاتی ہے۔
اور مریض تھوڑے سال بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی رو پڑتا ہے۔

میرے خیال میں بچوں کا زیادہ دونا دماغ کے نرم ہو جانے کی وجہ سے
ہی ہوتا ہے، چونکہ جس طرح انسان کے دماغ میں بھنگی اور سختی ہو جاتی ہے
دماغی کم ہو جاتا ہے: بچوں اور عورتوں میں یہ بات عام طور پر دیکھی گئی ہے۔
علاج: اس مرض کا علاج اصل سبب کو رفع کرنے میں مضمر ہے۔
لیکن دماغ کو تقویت دینے والی ادویات کا استعمال اس
مرض میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔

مریض کی صحت عامہ کا خیال رکھنا چاہیے کسی قسم کا رنج و فکر نہیں
کرنے دینا چاہیے، قبض رفع کریں، غذا خوب ذرا سفید اور مستوی دینی
جو نئے دماغی کمزوری کے بیان میں درج کئے گئے ہیں، یہ اس مرض
میں نہایت مفید ہیں۔

عام طور پر اس مرض میں کچید اور نونا رسکے مرکبات استعمال کئے جاتے
ہیں، اگر بے خوابی زیادہ ہو تو بردار یا جٹرا اور آس آس ادویات کا استعمال کریں۔

گرم خشک، باد انگیز اور ثقیل غذاؤں سے پرہیز لازمی ہے۔
 اسٹین سیرب، فیلو سیرب، مینڈلکس، فولاد اور کچلہ کے مرکبات
 اور دوا منتر اس مرض کے علاج میں استعمال کئے جاسکتے ہیں۔
 نشتر، برنجی، بیٹ، یونین، سائبراس، گرین، لاسکوار، سٹرکسین، ہائیڈرو
 کلورائیڈ، ۲۵ منیم، ٹیکسٹیکر، کارڈیم کو ۲۰ منیم، ایکرو منٹھاپ ایک ادس،
 ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو تین بار غذا کے بعد دیں۔
 کشتہ مرجان مشد ۴ رتی، خیرہ مردارید ۶ ماشہ، یام ملا کر ایسی تین
 خوراک روزانہ دودھ کے ساتھ دیں۔ بہترین چیز ہے
 بطور غذا جانوروں کے پیچھے، گوشت، شوربا، مٹی، مکھن، اندھے
 خوب کھلائیں۔

اکسیر دماغ

پلید زرد آمد، بھڑہ، برہی (سایہ میں خشک شدہ)، ہر ایک ایک سیر
 لے کر کسی مٹی کے برتن میں اچھی طرح بند کریں، اور گل حکمت کر کے
 اس قدر آگ دیں کہ خاکستر ہو جائے۔
 اب اس خاکستر کو ۲۵ سیر صاف پانی میں بگڑ دیں، اور دن میں
 دو تین بار ہلا دیا کریں، چوتھے دن اس کا زلال لے کر آہنی کڑا ہی میں
 ڈال کر اس قدر پکا لیں کہ سفید سانک باقی رہ جائے، اسے باریک
 کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں۔

مقدار خوراک، ۴ رتی یہ نمک صبح ہمار منہ ۲ تولہ مکھن تازہ میں ملا کر دیں،
 دماغ کے لئے خاص چیز ہے، اعضا کے ریسہ کو طاقت دیتا ہے، معدہ
 کو قوی اور خون کو صاف کرتا ہے، بواسیر کو نافع اور قبض کشا ہے، کسی
 طبیعت کے خلاف نہیں۔

محررات

اکسیر نسیان در آب افشردہ بر مٹندی تازہ نصف سیر روغن مالکنگنی
آدھ پاؤ روغن گاد ایک پاؤ روغن پستہ آدھ پاؤ
چاروں اجزاء کو ایک قلعی دار ریچی میں ڈال کر نرم آگ پر پکائیں
تاکہ بر مٹندی کا پانی خشک ہو جائے اب روغن کو محفوظ رکھیں
ترکیب استعمال و مقدار خوراک ۱ تولہ تا ۲ تولہ صبح و شام دودھ
میں ملا کر استعمال کریں یا روٹی پر لٹا کر کھائیں

فوائد: ہر دماغی طاقت اور قوت حافظہ کے لئے یہ دوا اکسیر الہ
ہے قبل از وقت بالوں کو مفید ہونے سے روکتی ہے نسیان کشانی
علاج ہے سرعت انزال جریان قوت باہ ضعف اعصاب
کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے

تبریق نزلہ ۱۰ تخم صندل ۳ تولہ ۱۰ روغن حنظل ۱۰ تولہ
گوند کیکر ۱ تولہ ۱۰ سونچ ۹ ماشہ

تمام دواؤں کو باریک پیس کر غازی گولیاں بنائیں مقدار خوراک ۱۰ گولیاں
بمراہ حریہ خشک ۱۰ پاؤ آدھ درہم میں پیار کر کے کھائیں ۱۰ دلی ۱۰ تولہ اور کمریزی و سار
کاشانی علاج ہے قریباً دو مہینہ استعمال کریں

اکسیر جنون و مایحولیا ۱۰ اسٹو خورس ۱۰ تربد مفید جوف ۱۰ سناج ۱۰ فیتون
۱۰ بیہ کاٹی ۱۰ بیہ سیاہ ۱۰ لاجور ۱۰ مفسول ہر ایک ایک تولہ ۱۰ مصری ۸ تولہ ۱۰ شہد ۱۰ تولہ
۱۰ دل شہد اور مصری کو عرق بید مشک میں قوام بنا کر تمام ادویات باریک سندھ
ملا کر معجون بنائیں ۱۰ لاجور مفسول ۱۰ ملا دیں ۱۰ ماشہ صبح و شام عرق گاد زبان سے
دیں تمام امراض سوداوی مایحولیا جنون پاگل پن کے لئے اکسیر ہے

باب دوم

آنکھوں کی بیماریاں

آنکھ دکھنا OPTHALMIA (افتحیلمیا)

تعریف :- اس مرض میں پوٹوں کے اندر کی جھلی اور کبھی ڈھیلے کے ادھر کی جھلی سرخ ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- زلزلہ و زکام کا ہونا، تیز دھوپ یا شدت گرما، سرد ہوا کا گانا، دھواں اور گرد و غبار کا آنکھوں میں پڑنا، شیرخوار بچوں میں دانتوں کا نکلنا، نیز خمرہ بخناق، بخاریر اور جھجک سے بھی آتش ہو جاتا ہے۔
آنکھ کے پردہ طعنے کے اندر سوزش اور سرخی
تشخیص و علامات :- ہو جاتی ہے، پوٹے سوج جاتے ہیں، آنکھ

بجاری ہو جاتی ہے، درلغش و دھوپ اور روشنی برداشت نہیں کر سکتا، اور اکبیں رطوبت غلیظہ سے جڑ جاتی ہیں، خارش، جلن، ررک اور درد ہر وقت رہتی ہے۔ آنکھوں سے تلی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے،

عام طور پر آتش چشم اور آنکھ کی دوسری بیماریوں مسدوجہ ذیل بیماریوں سے تشخیص کرنا ضروری ہے۔

ورم عنقیہ (آئی ریٹس) اس میں آنکھ گہری، سرخ اور قرنیہ کے گرد
گلابی حلقہ معلوم ہوتا ہے۔ آنکھ اور سر میں درد ہوتا ہے۔ اور پوٹوں
کے اندر کی جھلی سرخ نہیں ہوتی۔

ورم قرنیہ (کیرائٹس) اس میں قرنیہ کے ارد گرد گہری سرخی ہوتی ہے۔ آنسو
بہت نکلتے ہیں۔ اور مریض روشنی کی طرف بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ بصارت
نہم ہو جاتی ہے۔

ورم صلیبیہ (ایپی سکلیرائٹس) اس میں عام طور پر سرخی منجمد کے نیچے ہوتی
ہے۔ اور یہ سرخی دیر تک رہتی ہے۔ آنکھ میں معمولی درد ہوتا ہے۔

اصل سبب مرض کو رفع کریں، پانی سے آنکھوں کی صفائی کریں
علاج اگر کوئی بیرونی چیز آنکھ میں پڑی ہو، تو اسے نکال دیں، اگر
قبض ہو، تو قبض رفع کریں، کمیسٹر ایل اس کے لئے بہترین جلاب ہے
حسب عہدیں۔

آنسو بچھم کے علاج میں آنکھوں کی صفائی، قبض کا رفع کرنا اور
دافع درد ادویات استعمال کرنا کامل شفا یابی ہے۔

سب سے پہلے آنکھ کو جو دک روشن، اگرچہ فی اوش دالے سے
خوب دھوئیں، گرد و غبار، رطوبت غلیظہ، میلان اور بے وغیرہ سبب صاف
کر دیں۔ اور روشن نیم گرم سے گرم پانی گرتے جاتے، حسیب صاف ہو جائے
تو تر روئی کو پھوڑ کر آنکھ کو خشک کریں۔

رات کو موٹے دانت سادہ ویزلین یا پینسلین آئرنٹ منٹ یا سبازول
آئی آئرنٹ منٹ لگا دیں، تاکہ پلکیں آپس میں چپک نہ جائیں۔

اور مندرجہ ذیل نسخوں میں سے کوئی ایک پتار کر کے آنکھ
میں پٹکائیں۔

زنگ اپو تم لوٹن در زنگ سلفٹ ۲ گرین ، ایسڈ بورک ۱۰ گرین ، ٹنگیور
 اوپینلی اڈرم ، ایکوا ڈیسی لیکا ایک اونس ،
 اس دوا کے چند نظرات صبح و شام آٹھ میں ڈالیں ، حسب آٹھ میں
 درد زیادہ ہو ، تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے ۔

مفید لوٹن در زنگ سلفٹ ۲ گرین ، بورک ایسڈ ۲۰ گرین ، عرق گلاب
 ایک اونس ، روٹن پیار کر سیا ، اور صبح و شام دو دو قطرے آٹھ میں ڈالیں ،
 آٹھ دکننا ، مرغی اور غارشی چشم کے لئے مفید ہے ۔
 سوڈا لوٹن در سوڈا بایکارب ۱۰ گرین ، ایکوا کیفوری ایک اونس
 اس دوا کے چند نظرات دن میں چار بار آٹھ میں ڈالیں ، حسب آٹھ
 میں سوزش یا دہم کم ہو ، مرغی کھیلتا پرانا ہو ، تو اس دوا سے بہت فائدہ
 ہوتا ہے ۔

آٹھ بل آشوب چشم کا بہرہ ادویات سے علاج کیا جاتا ہے ۔
 پیشین لوٹن در پیشین ایک لاکھ پونٹ ڈسٹو وارڈا سی سی ، یا سی سی
 نیار سے سرور سے گتے زرا پر سے آٹھ میں ٹیکا لیں ، سوشن کو سرور سے
 آشوب چشم اگر دوں اور دم کے سے عید مفید و تجرب ہے ۔
 اکسیر لوٹن در بورک ایسڈ ۱۰ گرین ، زنگ سلفٹ ۲ گرین ، پرورکین ۱۰ گرین
 ایکوا ایک اونس ۔

پیشین لوٹن در پیشین چار دفعہ ٹیکا لیں ، یہ لوٹن آشوب چشم اور درد
 آٹھ بخیر کے لئے بہت مفید و تجرب ہے ، فوری شکین دیتا ہے ، اگر درد زیادہ ہو
 تو اسے ایک ٹیکہ یا دوں پر در حسب عمر ایک ہزار کھلائیں ، سارڈان ۱۰
 کوٹن یا پیشین بھی درد کے لئے مفید ہیں ۔

سارڈان یا زور ، سارڈا ڈیازین اور سلفا میڈریشین بھی آشوب چشم

کے لئے بھی کھلائی جاتی ہیں، اور اس مرض کے لئے معینہ نامہ ہوتی ہیں
 معتد اور خود ایک مرتبہ گھنٹہ بعد ایک ایک گھنٹہ تک سر دینے
 حرکت کو روکتی ہیں اور بائیں ہاتھ پر گھورائیٹ یا گرین، ایک اور ڈیڑھ یا دو دن
 اس دور کے چند نظریات صبح و شام آنکھ میں ڈالیں، یہ معینہ نامہ ہے۔
 گولڈن آئی ڈروپ، ایک اور ایسی دوا ہے، اگرچہ اس میں زنگ سفید یا گرین، بائیں
 بوراکس، اگرچہ اس میں زنگ سفید، ایک اور ایسی دوا ہے، اگرچہ اس میں زنگ سفید یا گرین، بائیں
 کر ڈروپ کرتی ہیں، اور اس میں چشم کے لئے معینہ نامہ ہے۔

حب مسرخ، ہر گیارہ ۲ تولہ، دیون ۶ ماشہ، زنجبیل، صندل، مریم
 ماشہ، سب کو کوٹ چھان کر آب کشیز یا جوش اندازہ ہست ثانی میں
 گوندھ کر پینے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ہر روز ۱۰ روپے آب دے، مذکورہ
 میں پسینہ گر دگر چشم مناد کریں، آشوب چشم کے لئے معینہ نامہ ہے۔

حب مسکین، ہر پیکڑی ۱ تولہ، دیون ۴ ماشہ، رسوت ۶ ماشہ، زعفران
 ۱۰ ماشہ، عسل ادویہ کھرا کر کے غولہ یا گولہ بنائیں، ایک گولی گھسیں، گرد و لؤل
 پپرٹوں پر لگانا۔

آشوب چشم، لکڑے، درد چشم، سرخی، سورج، غیر ذکر دیکھنے کے لئے
 معینہ نامہ ہے۔

حب مسکین، ہر پیکڑی ۱ تولہ، دیون ۴ ماشہ، رسوت ۶ ماشہ، زعفران
 ۱۰ ماشہ، عسل ادویہ کھرا کر کے غولہ یا گولہ بنائیں، ایک گولی گھسیں، گرد و لؤل
 پپرٹوں پر لگانا۔

رفع درد، آشوب چشم کے لئے معینہ نامہ ہے۔
 اکیزون، ہر پیکڑی ۱ تولہ، دیون ۴ ماشہ، رسوت ۶ ماشہ، زعفران
 ۱۰ ماشہ، عسل ادویہ کھرا کر کے غولہ یا گولہ بنائیں، ایک گولی گھسیں، گرد و لؤل

لو شش تیار کر کے ڈراپر سے ڈالیں۔ دھندہ غبار جالا، غار شش سرخی
 پانی بہنا، آٹکھ دکھنا کے لئے مفید و مجرب ہے۔
 سرخیم بریلیو آئرنٹ مینڈٹ آف مرکری، مگرین، سفید ویزلین ایک ادس
 مریم تیار کریں، دن میں دو بار آٹکھ میں لگائیں
 پھپھنی دار آٹکھ دکھنے کے لئے بے حد مفید ہے۔
 طبی لو شش: ہر قلمی سترہ ۴ تولہ، پشکر طمی خام اتولہ، پشکر طمی بریاں ۱۰ تولہ،
 کاوندھا لعل ۳ ماشہ، عرق گلاب ایک بوتل،
 تمام دواؤں کو باریک پس کر عرق گلاب کی بوتل میں ڈال لیں، پس تیار
 ہے۔ دن میں تین سیار دفعہ قطرہ قطرہ ڈالیں
 آٹکھ دکھنا، آٹکھ شوب چشم، غار شش، سرخی اور درد چشم کے لئے بے حد

مفید و خوب مشہور ہے۔
 طکورہ آٹکھ چشم، آٹکھ چشم کے لئے بہترین، سفید ویزلین میں سے یہ
 بھی ہے، کہ نیم گرم پانی میں استیج یا ایٹوف فقہ کر اس سے آنکھوں پر طکورہ
 کریں، بعض دفعہ اس عرق صرف دو تین دفعہ طکورہ کرنے سے مرض اچھا ہو جاتا
 ہے۔ البتہ اگر مرض شدید ہو، تو زیادہ مرتبہ سینٹ کی ضرورت پڑتی ہے
 بہر حال اس سے حذر یا بدبیرا کرہ ضرور ہو جاتا ہے، مرض کی قوت اس کے
 ضعف پر موقوف ہے۔

اگر بجائے نیم گرم پانی سادہ کے اکلیل اور تلبہ کے جو شانڈے

میں طکورہ کریں، تو زیادہ مفید ہے۔
 نسخہ درد چشم، از مسدودہ ذیل نسخہ آٹکھ چشم اور درد چشم کے لئے اطباء کا

معمول ہے، اور بے حد مفید ہے، کبھی خطا نہیں ہوا۔

زردی برینہ سرخ ایک عدد، روغن گل ۶ ماشہ، روغنوں کو اچھی طرح مخلوط

کریں ، اور زعفران خالص محسول ادا شد ملا کر حسب ضرورت لپیپ کریں ،
شدت مرض کی صورت میں تین چار گھنٹہ کے بعد دوسرا لپیپ کر دیں ، یہ کون
درد کے لئے عموماً دو مرتبہ سے زیادہ لپیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ،
آشوب چشم میں صبح و شام لپیپ لگائیں ،

ذرور چاکسو : چاکسو مدبر اولہ ، مصری اولہ ، نامیرا حسنی ۶ ماشہ
باریک سفوف بنا دیں ، اور آنکھوں پر بطور ذرور لگائیں

یہ نسخہ آشوب چشم کو بے نظیر فائدہ کرتا ہے ، بخامض کہ جب کہ آشوب چشم کو
چند دن گزر گئے ہوں ،

چاکسو مدبر کرنے کی ترکیب : چاکسو ۵ تولہ ، پوٹلی میں بانڈھ کر گندم
آدھ سیر کو دسیر پانی میں ڈال کر جوڑے پر رکھیں ، اور درمیان میں پانی
رکھ دیں ، جب گندم حل جاوے ، تو اتار کر چاکسو صاف کر لیں ، پس تیار
ہے ، بعض گدھے کی لیسہ میں جی مدبر کرتے ہیں ،

اکسیر سرخی چشم : برگ مہندی ۵ تولہ ، انار دانہ ۲۰ تولہ ، دونوں کو
نصف سیر پانی میں بھگو دیں ، اور ۱۲ گھنٹے کے بعد خوب مل کر مچھان لیں ،
کشتہ حبث ۲۰ تولہ ، مہندی کا پانی : ڈال کر کھول کر لیں ، حتیٰ کہ تمام پانی
خشک ہو جائے ، دوائے مبارک تیار سے ، سلائی سے آنکھوں میں ، لگائیں
سرخی چشم جو کسی دوائی سے سٹے کا نام نہ لیتی ہو ، اس کے چند
روزوں کے استعمال سے رفع ہو جاتی ہے ،

ویسی روشن : انار دانہ ۵ تولہ ، عرق کلاب ۲۰ تولہ ، رات کو دونوں دویہ
بھگو دیں ، صبح مل کر صاف کر کے مندرجہ ذیل ادویہ ملا لیں ،

رسونٹ ۲۰ تولہ ، پشکری سفید بریاں ۶ ماشہ ، انیسون خالص ۲ ماشہ
کا ذرا ماشہ ملا کر رکھ لیں ، پس تیار ہے ، بطور روشن آنکھ میں چسکائیں ،

اس کے استعمال سے آشوب چشم، سرخی، درد چشم وغیرہ کو فوراً

آرام ہو جاتا ہے۔ بے نظر نسخہ ہے۔

زنک اور نیم لوشن ہر دن تک سلفاس ۳ گریں، ایسڈ بورک ۱۰ گریں،
ٹنگسٹو اسیائی اڈرم، پر وکسین ہائیڈروکلورائیڈ ۲ گریں، عرق گلاب ایک اونس
ڈراپر سے چند قطرات صبح و شام یا بوقت ضرورت آنکھ میں ڈالیں،
جب آنکھ میں درد، سرخی اور سوزش ہو، ذیہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔

بعض اوقات دہائی طور پر آشوب چشم کی مرض ہو جاتی ہے، اور ایک ہی
بار بہت سے آدمیوں کو ہو جاتی ہے، اس کے علاج کے لئے آشوب چشم
کی تدابیر اختیار کریں۔

بعض اوقات سوزاک کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی اور درد ہو جاتا ہے
اس کے علاج کے لئے سلفا ڈرگس اور پینسلین کا استعمال شافی معالجہ ہے

بعض اوقات نوزائیدہ بچوں کو بھی آشوب چشم کی بیماری ہو جاتی ہے، اور
یہ چھوٹ کی مرض ہے، عام طور پر سوزاک کے مریض والدین کی اولاد کو یہ مرض
ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کے لئے پینسلین لوشن آنکھ میں ٹپکانا مفید ہے۔

اگر شہرہ یا جھپک کی وجہ سے یہ تکلیف ہو، تو قرشہ اور صلیبیہ مقام
انتقال پر چھوٹے چھوٹے اعبار یا پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں
بورک لوشن سے آنکھ کو دھوئیں، اور بعد میں کیلولر پمپر ڈالیں۔

اگر نزلہ کی وجہ سے آشوب چشم ہو، تو نزلہ کا علاج کریں، اور آشوب چشم
کی ادویات استعمال کریں۔

بہتر نسخہ درد آشوب چشم کے مریضوں کو گرم ترش غذا کھانے، دھوپ
میں چلنے، پھرنے سے پرہیز کرنا چاہئے، غذا زود ہضم، دودھ، چا دل،
وال مونگ، پاپکا، دیبا دیں۔

سفیدی چشم

OPACITY OF THE CORNEA

ایسٹری آف دی کارنیہ

تقریباً ۱۰ طبقہ قرنئیہ کے اندر زخم ہو جانے کے بعد داغ رہ جاتے ہیں
وجہ سے آنکھ میں سفید داغ رہ جاتا ہے۔

وجوہات :- نگرہوں، پٹ بال یا قرنئیہ طبقہ میں سوزش ہو کر زخم بن جانا
وغیرہ سے سفیدی (چھوٹا) بن جاتا ہے۔

تشخیص :- قرنئیہ میں زخم ہونے کے بعد آنکھ میں سفید نشان باقی رہ
تھیں جاتا ہے، جسے چٹا یا چھوٹا کہتے ہیں۔

علاج :- گوڈن آئرنٹ مینٹیلو اوکسائیڈ آف مرکری ۴ گرین
دیزلین مصففے ایک اونس۔

مرکری کو گلیسرین میں حل کریں، اور دیزلین ملا لیں، اس تیار ہے
سلائی سے صبح و شام لگائیں۔

سفیدی چشم :- آنکھوں کے بال گرنا، پھنسی نکلنا، پرانی سرخی چشم،
کو دور کرتا ہے۔ یہ آنکھ کے زخم کے لئے بھی مفید ہے۔

نسخہ سفیدی چشم :- شہد خالص ۲ تولہ کو ٹنگی آغ پر پکا لیں، اور جھاگ
اتارتے ہیں، سبب صاف ہو جائے، تو اس میں ۶ تولہ سفید سیاز کا پانی
ملا کر پکا لیں، اس کے بعد اتنا ہی مولی کا پانی شامل کر کے دیکھا لیں، اس
میں اسی قدر جو شانہ صغیر ڈال کر پکا کر اتار لیں، اور شیشہ کے برتن میں
محفوظ رکھیں، گرم مزاج مریضوں میں گلاب خالص، یا شیر زن کے ساتھ
اور سرد مزاج مریضوں میں تنها یہ آنکھ میں چٹکائیں۔

تقطع بیاض سفیدی کے لئے اور آئینہ پہنا کر ڈاکل کرتا ہے۔
 نیز ظلمت و تاریکی، قرعہ و زخم، سیل و جالاک کے لئے مضر ہے۔
 اکسیری سرمہ پر پٹکڑی بریاں ازلہ، سوئٹھ ازلہ، قلمی شورہ ازلہ،
 لیموں کا پانی حسب ضرورت۔

جملہ ادویہ کو کوٹ کر لیموں کے پانی میں کھل کر کے سرمہ بنا دیں اور
 سلائی سے صبح و شام آنکھ میں ڈالیں۔

ہر قسم کا چٹا بھولا چندون کے استعمال سے نیست و نابود ہو کر
 آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، طب یونانی کا معجز اثر نسخہ ہے۔

اکسیر دافع جالاک و بھولا ہر مرد و بدنا سفید ۳ ماشہ، خون چوزہ یا جوان مرغ
 میں چند روز حل کر کے آنکھ میں لگانا ہر قسم کے بھولے کو دور کرتا ہے
 • حبث الحدید ۳ ماشہ، جینی سفید ۳ ماشہ، کاجل سفید ۳ ماشہ
 مس سوختہ ۳ ماشہ، نوشتا در ۳ ماشہ، زخم سرس ایک ٹونہ

سب کو آب انار ترش ایک پاؤ میں ہفت روز کھل کر کے بطور
 سرمہ لگانا مضر ہے، ہر قسم کے جالاک و بھولا کو دور کرتا ہے، بہت مرتبہ
 تجربہ میں آچکا ہے۔

• کشتہ بیضہ مرغ ایک ماشہ، شہد ۶ ماشہ میں ملا کر سلائی
 لگانا سفیدی چشم کے لئے مفید ہے، عدد ہا مرتبہ کا تجربہ شدہ ہے،
 ہر قسم کے ابتدائی زخم میں اگر پیشین کی مریم استعمال کی جائے
 تو زخم جلد درست ہو کر نشان بھی اتر جاتا ہے۔

جو ہر بیاض پر پٹکڑی، قلمی شورہ، لوٹا جی، سہاگہ، نوشتا در، ہر
 مسادی اوزن لے کر سب کو جو کو ب کریں، اور ایک میٹ کے پیالے
 کوڑے میں ڈال کر دوسرا پیالہ اس کے اوپر ڈھانپ کر گل حکمت کر

کوٹوں کی نرم آنچ پر رکھ کر بکستوز جو ہر اڑائیں۔ اور صبح و شام سلائی سے
آنکھ میں لگائیں۔

جوش، پھولا، دھند، غبار کے لئے مجرب الجرب ہے۔
اگر سفیدی غلیظ اور قرینہ کے مرکز میں ہو، تو پھر یہ عمل جراحی سے
جی درست ہو سکتی ہے، جو ایک ماہر امراض چشم ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔

GRANULARIDS

گرے

اگرے نیو لریڈس

تعریف :- اس مرض میں اوپر کے پپوٹوں کے اندر گول، گول، چھوٹے
چھوٹے، سرخ رنگ کے دانے ہوتے ہیں۔
وچ بارت :- یہ مرض کثیف آب و ہوا، خواب غذا، دھواں، گرد و غبار
میلہ کچیلہ رہنا، آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جانا اور آئٹوب چشم کے بعد بھی
ہو جاتا ہے، یہ چھوٹ دار مرض ہے۔

تشخیص و علامات :- بالائی پپوٹوں اور کبھی دونوں پپوٹوں کی اندر دنی
سطح پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے
پیدا ہو جاتے ہیں۔ آنکھ میں غار کشی، رڑک اور ہر وقت پانی بھرا رہنا
روشنی کا برا لگنا، صبح کے وقت آنکھیں چپکی ہونا اس کی خاص علامات
ہیں۔ اکثر یہ مرض بچوں کو ہوتا ہے، اور کبھی بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے، یہ
مرض حسد اور کبھی مزمن ہوتا ہے۔

علاج :- آنکھوں کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنا چاہئے، صبح و شام
بورک لوشن سے ضرور دھونا چاہئے۔

اکسیر ککرہ اور نیدھتوٹھا امانشہ را فہون امانشہ

ککیرین ۲ تولہ میں حل کر کے رکھ لیں، بذریعہ سلالی صبح و شام

۳ کھکھوں میں لگائیں، ککروں اور روہوں کے لئے ہنایت مفید دوا ہے،

اگر آٹکھ میں چونہ رقلی یا اور کوئی خواستہ دار چیز پڑ جائے، تو

ککیراکیل کے چند قطرے آٹکھ میں ڈالنا بہت مفید ہے،

کاکہ ٹک، لوشن، سلوٹا ٹریٹ، اگرین، ایکوڈ سٹڈ ایک ادنس

نیلی شیشی میں لوشن بنادیں، پوٹوں کو اٹھا کر ان پر پھیر دے

کاکہ ٹک لوشن لگادیں

پھر سالٹ لوشن، اگرین، نمک ایک ادنس والے لوشن سے دھو

ڈالیں، پھر صاف دیزلین پتکوں کو لگادیں، اس طرح کرنے سے شدید

دوبوں کو آرام آجاتا ہے،

پھر صبح و شام بورک لوشن سے دھو کر پردہ مار گول لوشن پر دہارہا گرین

ایکو ایک ادنس والا لوشن صبح و شام ڈالیں،

اگر سوج زیادہ ہوگئی ہو، تو بورک لوشن سے دھو کر سلفوٹا سٹڈ پوٹوٹوٹ

پوٹوں پر لگادیں، بالکل آرام ہو جائے گا،

کارپا ٹکٹ، رکا پر نیدھتوٹھا، اگرین، دیزلین ایک ادنس، مریم

نارکریں، پرانے ککروں کے لئے بے حد مفید ہے،

اکسیر ٹکڑے، براڈ ختم، ٹریٹیکم، ایک سزار کی طاقت والا کی واحد خوراک

ککروں کو نیست و نابود کر دیتی ہے، بقدر ضرورت ہفتہ بعد دوسری خوراک

دے سکتے ہیں، خارجی طور پر ایک دودن بورک لوشن نیم گرم سے آنکھیں جھٹاکریں

اکسیر ککرہ، در سبازواں، ڈسٹنگ پوٹوٹوٹ، ایڈ بورک، اڈرام، شریہ

اگرین، ملا کر سرمہ بنادیں، سلالی یا چمکی سے استعمال کریں،

نئے دیرانے لگے، آشوب و خارش چشم کے لئے از حد مفید ہے
 سرمہ لوزہ، زعفران خالص، ۱۰ ماشہ، افیون خالص، ۱۰ ماشہ، سرمہ سیاه
 رنگار، لونگ، سمندر جھاگ، سبز کاج، میل سونا، میل چاندی ہر ایک
 ۳ ماشہ، جبت کا پھول ۹ تولہ۔

سب کو علیحدہ علیحدہ کھریں پس کر اور چھان کر باہم ملا لیں، اور
 صبح و شام آنکھوں میں لگائیں، پرانے لکڑوں کے لئے مفید ہے۔
 سنگ خداداد، زہدہ قوتھار، چکڑی، قلی سترہ ہر ایک ۷ تولہ،
 کافور ۳ تولہ، سب کو ملا کر گرم کر کے شبیافت بنائیں، بوقت ضرورت
 بالوں کو الٹ کر شبیافت لگادیں، اور بے کوکین پوشن ڈال لیں، بعد
 میں میوہ آکٹمنٹ لگادیں، اس سے پلکیں بھی نہیں چپکتیں، اور لکڑوں
 سرخی چشم وغیرہ کو آرام آجاتا ہے۔

اکسیر لکڑہ، زہدہ قوتھار، چکڑی، قلی سترہ ہر ایک ۷ تولہ،
 کھریں کر لیں، اور محفوظ رکھیں، بوقت ضرورت سلائی یا پھایہ سے پلک
 الٹ کر دوائی لگائیں، لکڑوں کے لئے بہترین دوا ہے۔

سرمہ معقوی نظر، زکشتہ جبت ۱۰ پار، سمندر جھاگ ۱۲ تولہ چینی پھل کردہ
 ۱۰ تولہ، جمبہ کے پھول ۲ تولہ، چھلکا، بیجہ ۱۰ عدد، نوشادر ۱ تولہ،

دلفندراز ۱ تولہ، جہاد ادویہ آب میوں میں ایک منہ کھریں کر لیں، پس تیار ہے،
 ترکیب استعمال: در جمع و شام سلائی سے استعمال کریں۔

فوائد: ابتدائی موتیا بند، لکڑے، آشوب چشم، پڑ بال، خارش، کمزوری
 نظر کو دور کرنے میں عجیب اثر ہے۔

یہ وہ سرمہ ہے جس کو ڈاکٹر فقرا اس آف موٹا نے موتیا بند کا
 مفید سرمہ مشہور کر رکھا تھا، اور اپنے مریضوں کو استعمال کرایا

کرتے تھے، یہ نسخہ بہت محنت سے پاٹھ آیا تھا، غسل کے
مقفل عندوق کو توڑ کر پلک کے سامنے رکھ دیا ہے، ضرورت
مند اصحاب بنا کر نامہ اٹھائیں اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں
اگر کوئی صاحب خوردہ تیار کر سکیں، تو ہمارے دواخانہ مجازی ٹوبہ پلک سنگھ
سے ایک روپیہ فی شیشی کے حساب سے منگا سکتے ہیں۔
البوسیدہ آبی ڈراپ، یہ سلفا سیٹا مائڈ کا لوشن ہے، جو آنکھوں
کی امراض کے لئے بے نظیر ہے، ڈراپ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دن میں
چار دفعہ قطرہ قطرہ آنکھ میں ٹپکائیں، دو تین دن کے استعمال سے گکروں
سے نجات مل جاتی ہے۔

گکروں کے علاج میں ہمارا روزمرہ کا معمول یہ ہے، کہ اول مریض کو لٹا کر
گکروں کو لٹا کر کاسٹک لوشن، اگر سن داے سے چھ کیا جاتا ہے، اگر گکروں
زیادہ ہوں، تو بعض اوقات خون بھی نکل آتا ہے، اس کے بعد ٹکین سلوشن
جو، اگرین فی ادنس کے حساب سے پہلے ہی تیار کر لیا ہوتا ہے، اسے
آنکھوں کو دھریا جاتا ہے، آنکھوں کو خشک کر کے پینسلین آئٹمنٹ ر جو
بنی بنائی یوٹ مل جاتی ہے، پلکوں پر لگادی جاتی ہے، یا پینسلین سلوشن
جو چپاس ہزار یونٹ، اسی سی سی میں تیار ہوتا ہے، دو دو گھنٹے بعد ڈالا
جاتا ہے، اگر درد زیادہ ہو، تو پر وکین لوشن، اگرین فی ادنس آنکھ
میں ڈالیں، دو تین دن کے اندر ہی اندر تمام سوزش، اورم اور گکروں کو بالکل
آرام ہو جاتا ہے۔

اگر آنکھ کو درم بہت زیادہ ہو گیا ہو، تو اول نیم گرم بورک لوشن سے
دھو کر پینسلین سو لوشن آنکھ میں گھنٹہ گھنٹہ بعد ڈالنے سے درم
بالکل اتر جاتا ہے۔

آنکھ دیکھنے کی گولیاں سبازول یا ایم بی ۶۰ ۷۰
 مقدار استعمال ایک سال کے بچے کو ایک ٹمکیہ دن میں تین حصے کر کے
 کھلا میں بکھرے۔ آشوب چشم، سرخی، درد وغیرہ کے لئے بچہ مفید و مجرب ہیں۔
 سبازول آنکھ ٹمٹ پر یہ مرہم یوب کے اندر ہوتی ہے، دن میں تین
 چار دفعہ آنکھوں کو صاف کر کے لگائیں، پانچ سات دن کے استعمال سے
 ہی نگردوں سے نجات مل جاتی ہے۔
 جدید دوا آر نی مین آف ٹھیک آنکھ ٹمٹ دساختہ بارز بلکم
 یہ بھی مرہم ہے، نگردوں اور آشوب چشم کے لئے بے حد موثر ہے۔
 کیر والہ جنٹل آنکھ ٹمٹ پر یہ مرہم سلائی کے ساتھ آنکھوں میں
 لگائی جاتی ہے۔ پرانے نگردوں کے لئے مفید ہے۔
 اگر مذکورہ بالا علاج سے پرانے نگردوں کو آرام نہ ہو، تو ان کا شافی
 علاج اپریشن ہی ہے، جو ایک ماہر امراض چشم ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔

مونیا بند CATARACT (کٹریٹ)

وجوہات ہر بڑھاپا، آنکھوں پر چوڑے لگنا، امراض گردہ، ذیابیطس
 کسی غیر چیز کا آنکھ میں چلے جانا اور کبھی یہ موردی بھی ہوتا ہے۔
 آنکھ کا بغور ملاحظہ کرنے سے پتلی کے پیچھے
 تشخیص و علایمات سفید خاکستری مائل یا نیلگوں، سفیدی مائل
 یا عنبریں رنگ کی کٹے دکھائی دیتی ہے، مریض کو ہر چیز دگنی معلوم ہوتی ہے
 ایک چیز کی دو دو نظر آتی ہیں، آنکھوں کے سامنے جالا سا معلوم
 ہوتا ہے۔

علاج :- اس مرض کا شافی علاج صرف اپریشن ہی ہے لیکن ادویات کے استعمال سے صرف بنیائی کے بند ہونے کی مدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اکسیر موٹیا بند :- سکس سنی ایریا میرٹھا جو میو پیٹک ورا ہے شروع موٹیا بند میں ایک ایک قطرہ صبح و شام آٹھ گھنٹے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اپریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ موٹیا بند کا اکسیری علاج ہے، نین ماہ کے استقامت سے مکمل صحت ہو جاتی ہے۔

اگر کسی ترقی یافتہ ہو تو سوائے اپریشن کے دوسرا کوئی علاج کا رگر نہیں ہو سکتا۔

اکسیرنگ کٹار ڈرائس :- ایڈ ایسی ٹک ڈائیبلوٹ ۲۰ منٹ، ایڈ پین ۲۰ منٹ، ٹیکسٹو ایڈ ۲۰ منٹ، زنگ سلفاس ۲۰ گریں، ایجا ایک اونس روشن بنائیں، دودھ قطرے صبح و شام آٹھ گھنٹوں میں ڈالیں۔
فوائڈ :- سرخی، خارش، چم، دھوا، ڈھلکا، تڑوا، انا، وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے۔

کٹرکٹ ٹم ٹمٹنٹ :- ڈائیوین ۲۰ گریں، بیو ادکسا کٹ آف مرکی ۲۰ گریں، گلیسرین اڈرام، ویزلین صفی ایک اونس، مرکی، ڈائیوین کو گلیسرین میں حل کر کے ویزلین میں کھول کر لیں پس تیار ہے محفوظ رکھیں، دن میں دوبارہ ملائی سے لگائیں۔

فوائڈ :- سفیدی چشم، ابتدائی موٹیا بند، تیلیوں کا پھیل جانا، کمزوری نظر وغیرہ کے لئے خاص ورا ہے، آئی سپیشل ڈاکٹروں کا معمول ہے سیرم روشن چمراخ، ۲۰ ساین ٹیکس ایک ٹکیہ، طوطیا سبز ۲۰ رتی، ویزلین ۲۰ ساین سے لطف وزن۔

ترکیب : در اول پے ادش پانی میں طوطیا کو حل کر کے اس میں صابن
ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیں ، اور آگ پر یہاں تک پکائیں کہ بالکل دی
کی مانند ہو جائے ، اب وزین ملا لیں ، پس تیار ہے ۔

ترکیب استعمال : بقدر خستہ نش ووالی ایک قطرہ پانی میں حل کر کے
سلالی سے دونوں آنکھوں میں ڈالیں ، در تین منٹ آنکھیں بند رکھیں ،
ہنایت پسیدار پانی خارج ہوگا ۔

فوائد : در دھند ، خارش ، لکڑے ، پکوں کا گرنا ، آنکھوں کا گند اپن
ابتدائی نزول الماء ، موئیا بند کے لئے ہنایت مفید و مجرب ہے ۔

بعض اوقات نزول الماء کی علامات سبز موئیا بند یعنی گلا کو ماسے
ملتی ہیں ، چنانچہ گلا کو ماسے کی علامات یہ ہیں ، پتلی کی رنگت کا سبز ہونا ، و صیلا
پتھر کی مانند ، آنکھ اور کنپٹی میں سخت درد ، پتلی سست اور بعید
نظری کی شکایت ہو جاتی ہے ۔

اس مرض کا بہترین اور شافی علاج عمل جراحی یعنی آپریشن ہی ہے ۔

زخم قریب

دلمرز آف دی کاربینہ

وجوہات : در آنکھ میں کسی غیر جنس کا پڑ جانا ، لکڑوں کا زبا وہ ہونا ،

آشوب چشم ، چوٹ لگنا وغیرہ اس کے اسباب ہیں ۔

تشخیص و علامات : آنکھ کے کسی حصہ میں دھیسے کے اوپر زخم کے
نشان موجود ہوتے ہیں ، آنکھوں سے پانی بہتا

ہے ، اور درد ہوتا ہے ۔ نظر دھندلی ہو جاتی ہے ۔

علاج : اصل اسباب کو رفع کریں، زخمی آنکھ کو کھلا نہ چھوڑیں
 بورک، اگرین فی ادنس، روشن یا کاربالک ۲ بوند ادنس کے روشن میں کپڑے
 کسی گدے کی جھگوڑی آنکھ پر پٹی باندھیں،
 ارڈر میں ۳۰ گرین فی ادنس، روشن آنکھ میں ڈیپیکا ہیں،
 مرہم برائے زخم، پینڈین آئی، آکٹمنٹ دن میں تین دفعہ آنکھ میں
 لگا کر اور پٹی باندھ دیں، قرنیہ کے زخم کے لئے بے نظردوا ہے، علاوہ
 اس گرزوں اور آشوب چشم میں بھی نافع دوا ہے،
 اکسیر زخم قرنیہ، ہر باخہ پر روغن نعشہ ڈال کر اس پر سیسہ لگا دیں،
 اور اس کا میل آنکھ میں لگائیں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ طبقہ قرنیہ
 کے زخم کو پڑھتا ہے،

دوا سے زخم قرنیہ، راقیمیا، نفزہ محرق، سوختہ، مغسول غاس محرق
 رس سوختہ، ہر ایک ۷ ماشہ، افاقیا، صمغ عربی ہر ایک ۱۰ ماشہ، سفیدہ
 کاشغری ۳۰ ماشہ، سب کو اچھی طرح باریک کر کے سفیدی سفیدہ مرع
 میں ملا کر سٹیا دے بنا کر رکھ لیں، اور بوقت ضرورت لڑکوں والی عورت
 کے درودھ یا سفیدی سفیدہ میں گھس کر آنکھ میں لگائیں،
 ہشتیاد آنکھ کے زخموں کا بہترین علاج ہے، اور بہت ہی

نافع ہے،
 گولڈن آکٹمنٹ، ۲ دن میں دوبارہ زخمی آنکھ میں لگائیں، زخمی آنکھ
 کے لئے مفید ہے،

اگر زخم پرانا ہو گیا ہو، تو کاسٹک روشن، اگرین دالے میں چھری لڑ
 کر کے احتیاط سے زخم کی جگہ لگائیں، اور اوپر سے کیپٹریل مہنے یا
 روغن کنجا کے ایک دو قطرے آنکھ میں ڈال دیں،

دشوٹ، زخمی آنکھ میں زنگ لوشن، کاسٹک لوشن، آئی ڈراپ ہرگز نہ ڈالیں، ورنہ غرائش زیادہ ہو کر زخم زیادہ ہو جائے گا۔
 اکسیر نشان قرنیہ پر پرانی بڑی عرق گلاب میں قدرے حل کر کے زخم کے نشانات پر لگائیں، آنکھ کے زخموں کے لئے مجرب، آزمودہ ہے۔
 اکسیر کی مرہم پر پائیدہ اجرائی، اکسیر فلیواید گرین، انڈین سلینیٹ، گرین، ایسڈ بورک، گرین، ریزین، ایک اولسن،
 سب کو بخوبی مخلوط کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں، بطریق معرفت آنکھ میں ٹپکائیں، آنکھ کے پردہ کی سوجن اور حلقہ عینیہ قرنیہ کے زخموں کے لئے عجیب، لاثر مرہم ہے، دو کو بھی رفع کرتی ہے۔
 پیچہ بیز، گرم، صاف، مرچ، تنک سے پیچہ ضروری ہے، غذا زرد، شہم دودھ، چاول وغیرہ دیں۔

FOREIGN BODY IN
THE EYE

آنکھ میں کچھ ٹپکایا

رفارن باؤمی ان وی آئی
 تعریف ہے، اس میں کوئی بیرونی چیز آنکھ میں بڑھ کر تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔
 وجوہات اور کوئی چیز، ریت، ٹکڑے، بارود کا ذرہ، آنکھ کے اندر پڑ کر دیکھنے کے اوپر جم جاتا ہے، اور کبھی پکڑوں کے ساتھ جھٹ جاتی ہے۔

تشخیص آنکھ میں سختی، رگ اور غرائش ہوتی ہے، مریض آنکھ نہیں کھول
 سکتا، اور آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے، شدت عانات میں

آنکھ میں سرخی اور درد بھی ہوتا ہے
علاج :- ہلک کو اٹا کر باریک سلائی کے ذریعہ آنکھ میں دھن
 مشدہ چیز کو نکال دیں۔ بعض اوقات اگر داخل شدہ چیز ذرا اوپر ہو
 تو ردی سے بھی نکالا جاسکتا ہے۔ اگر وہ ذرہ قرنیہ کے اندر جم گیا ہو
 تو پہلے آنکھ کو بے حس کرنا پڑتا ہے۔ اور اس مطلقہ کے لئے پردکین
 لوشن بہت مفید ہے۔

مریض کو میز پر بٹا کر آنکھ میں پردکین لوشن ڈالیں۔ اور جب آنکھ
 بے حس ہو جائے۔ تو ہلک کو اٹا کر غیر جنس کو نکالنے کی کوشش کریں۔
 اگر ہلک اٹھا کر نکالنے میں کامیابی نہ ہو، تو آئی سپیکولم سے آنکھ کو
 کھول کر باریک چھٹی سے نکال لیں۔

بعض اوقات غیر جنس قرنیہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کا نکالنا
 مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کسی آنکھوں کے ہسپتال میں کسی لائق آئی سرجن
 کے پاس جانے کا مشورہ دینا چاہئے۔

اگر آنکھ میں چوڑا پڑ گیا ہو، تو فوراً آنکھ کو سرد پانی سے دھوئیں۔
 اور کمپریسل کے دو چار قطرے آنکھ میں ڈالیں، چونے کے اثر کو زائل
 کرنے کے لئے تیلوں کا تیل رتیل شیریں بھی بہت اثر رکھتا ہے۔

اگر لوہے کا ذرہ اندر داخل ہو جائے، تو مقناطیس آنکھ کے
 قریب لے جائیں۔ ذرہ خود بخود مقناطیسی کشش سے باہر آجائے گا۔
 اگر آگ یا گرم پانی سے آنکھ جل جائے، تو میٹھا تیل اور چونے
 کا پانی ہموزن ملا کر مرہم تیار کر کے اس میں پیٹی تڑ کر کے آنکھ پر لگا دیں
 اور پیٹی خشک نہ ہونے دیں۔ انشاء اللہ تیل دفعہ پیٹی لگانے سے ٹھنڈ
 پڑ کر مریض کو تمام تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔

بعض اوقات کمپرسز کے دو چار قطرے آنکھ میں ڈالنے سے غیر جنس خود بخود نکل آتی ہے۔ اگر غیر جنس سے آنکھ میں زخم ہو گیا ہو تو ہومیو پیتھی دوا آرنیکا ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک ہر تیسرے دن کھلانی چاہیے۔ تاکہ مابعد کے اثرات زائل ہو جائیں۔ تازہ زخموں، چوٹ اور صدمات کے لئے آرنیکا کسیری دوا ہے۔

CONTUSION OF
THE EYE

آنکھ پر چوٹ لگنا

رکن ٹیوژن آف دی آئی

تعریف :- آنکھ پر کسی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ وجوہات :- بعض اوقات اتفاقی طور پر اور کبھی لڑائی، ٹھکڑے کی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے۔

تشخیص :- چوٹ لگنے سے آنکھ میں خون بھر جاتا ہے۔ اور کبھی آنکھ سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اور کبھی بینائی بالکل زایل ہو جاتی ہے۔ کبھی ابروں پھوٹے اور ڈھیلے پر زخم بھی ہو جاتا ہے۔ اور درد شدید ہو جاتا ہے۔

علاج :- اول یہ ملاحظہ کریں کہ چوٹ کس ذمیت کی لگی ہے۔ اس کے بعد پوٹے یا ابروں پر زخم ہو گیا ہو تو اسے سی دیں۔ اور بورک ٹوشن سے پٹی کر کے زخم کے اوپر رکھیں۔ اور مرین کو مکمل آرام کی ہدایت کریں۔ اگر درد شدید ہو تو دافع درد ادویات مثلاً اسپرین، کوڈین، امیڈو پائرن وغیرہ ادویات کھلائیں۔

دو اسے اکسیر : اگر آنکھ میں چوٹ لگ جائے تو یہ دوا اکسیر ہے
 تمام علامات کو رفع کر دیتی ہے
 آرینیکا ۳ x دن میں چار مرتبہ دیں ، اگر بعد میں خراش نہ ہو ، تو
 آرینیکا ۱ x دس قطرے ایک ادس پانی میں ملا کر قطرہ قطرہ آنکھ میں ٹپکائیں
 اگر جلد بھٹ گئی ہو تو میرے میس مدر ٹیکچرہ قطرے ایک ادس
 پانی میں ملا کر استعمال کریں
 اگر آنکھ میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے
 خواہ کتنی دیر کی چوٹ ہو ، آرینیکا بے حد مفید و مجرب دوا ہے ، اگر تازہ
 چوٹ ہو ، تو پھلی طاقت استعمال کریں ، اگر دیرینہ چوٹ ہو ، تو ادھی
 طاقت میں آرینیکا کا استعمال اکسیر ہے ،

رسانی

STYE

گوہا بخنی

تعریف : اگر آنکھ کے بالائی اور زیریں پوٹوں پر دانے
 نکل آتے ہیں ،

وجوہات : خون کی خرابی ، بد ہضمی ، خواب آب دہوا ، خواب غذا
 خن زیری مزاج کے بچوں اور بڑوں کو یہ مرض ہوتا ہے ، کبھی بینائی کا
 زیادہ کام کرنے سے بھی ہو جاتا ہے ،

تشخیص : پوٹوں کی جڑوں میں بے درم اور سوزش ہو کر سرخی ہو جاتی
 ہے ، اور پھر وہاں پھنسی نکل آتی ہے ، جس میں پیپ پڑ جاتی
 ہے ، جو دو تین دن تک خود بخود بھٹ جاتی ہے ، اور کبھی خود دبا کر پیپ
 نکالنی پڑتی ہے ، کبھی ایک اور کبھی بار بار نکلتی رہتی ہے ،

علاج :- شروع مرض میں بورک لوشن کی ٹکڑ کر دیں، اور جہاں گوہا بخنی نکل رہی ہو، اس مقام سے ایک دو بال اکھاڑ دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اگر پھپھی پک گئی ہو، تو پھپھی کو دبا کر یا معمولی چیرا زے کے پیپ کو نکال دیں، اور پمپلین آکٹیمٹ لگائیں۔
گوہا بخنی کے مقام پر کا سٹک لوشن ۲۰ گرین فی اونس والا لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

ط کبھی سندھو لگانے سے بھی آرام ہو جاتا ہے۔
چیکلہ :- ناگر موٹھا کی تازہ جڑ پانی میں گھس کر گوہا بخنی پر لگانے سے ذرا آہن، سوزش اور درد بند ہو جاتا ہے۔
پلسٹا :- گہا بخنی جب بار بار نکلے، تو اس کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے دن میں چار خوراک۔

ہیپر سلفر :- جب دانے بار بار نکلیں، بدن ذکی اس ہو اور پیپ پڑ چکی ہو، تو اس کے دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
مرکیوری ایس اور سٹانی سکیپر یا بھی اس مرض کے لئے مفید ہیں
فیرم فاس ۶x :- درد، سوزش اور گوہا بخنی کے لئے مفید ہے۔

با محنسی PLEPHARITIS پلی فرائیسٹ

تقریف :- اس مرض میں آنکھ کے پوٹوں کے کناروں میں درم ہو کر بال گر جاتے ہیں۔
وجوہات :- گرد و غبار، دھوئیں کی خراش، آنکھوں کا فلیٹھ رہنا

جو میں پڑ جانا، خسرہ، سرخ بخار، چھچک وغیرہ، نقص عبارت، آنسوؤں کی تسلی کی سوزش، قریب نظری یا بعد نظری وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔
تشخیص اس مرض میں پوٹوں کے کنارے متورم ہو جاتے ہیں، اور ان میں درد، سوزش اور جھین ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پلوں کی جڑوں میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو جاتی ہیں، جن کے پھوٹ جانے سے زخم بن جاتے ہیں، اور زخموں پر کھرنڈ بن جاتے ہیں، پیپ ٹکنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ تمام کناروں پر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے زخم سارے کناروں پر پھیل جاتا ہے، اور صبح بیدار ہونے پر پٹکیں بالکل چپک جاتی ہیں، پوٹوں کے کنارے سرخ، گول اور موٹے ہو کر باہر پٹ جاتے ہیں، آنکھوں میں سرخی، درد اور پانی بہتا رہتا ہے۔

علاج : رادل پوٹوں کو بورک لوشن یا سوڈیم لوشن نیم گرم سے آہستہ آہستہ مل کر دھوئیں، جس سے زخموں کے کھرنڈ صاف ہو جائیں، اور اگر بال کناروں میں پھنسنے ہوئے ہوں، تو ان کو کسی چمچی سے نکال دیں، اور صاف کر کے پینٹین آئنٹمنٹ لگا دیں۔

میرے زیر علاج اکثر اسی مختصر علاج کے ذریعے اس مرض کے مریض تندرست ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات پلوں کے کھرنڈوں کو صاف کر کے کاشک لوشن ۲ گرین فی ادنس ڈالنے سے بھی آرام آ جاتا ہے،
نسخہ : ہر پردہ گول ۳۰ گرین، ایکوا ایک ادنس، لوشن تیار کریں،
 تین چار دفعہ قطرہ قطرہ آنکھ میں ٹپکائیں،

نسخہ : رکتہ صدف مروارید باریک پس کر لگانا بھی اس مرض کے
 ہے مفید ہے۔

اکسیر سرورہ: سیاب اتولہ، سکہ اتولہ، سرمہ سیاہ، کشتہ جست،
 رسونت، نیلہ مرققہ، قلندر از ہر ایک ایک تولہ،
 ادل سیبہ کو پگھلا کر سیاب میں ملا کر گرہ تیار کریں، پھر اس میں تمام
 ادویات باری باری ملا کر کھل کرستے جائیں، جب تمام دواؤں کا سونف
 تیار ہو جائے، تو سبز سونف کا پانی ایک بوتل یا عرق سونف ایک بوتل میں
 کھل کر کے خشک کر دیں، خشک ہونے پر شیشی میں محفوظ رکھیں،
 سلائی سے صبح و شام سرمہ کی مانند لگائیں، یہ سرمہ پڑ بال، بامھنی
 اور پلکوں کی دوسری بیماریوں کے لئے مفید ہے۔

پڑ بال DISTICHIASIS (ڈسٹھی کالی سس)

تعریف: پلکوں کے بال اندر کی طرف مڑ کر آنکھ کے اندر خراش
 پیدا کرتے ہیں۔

وجوہات: پلکوں کے کناروں کی مزمن سوزش، ککڑے پڑنا، چوڑ
 لگنا، گرم پانی یا آگ سے جل جانا۔

تشخیص: پلکوں کے بالوں کو بغور دیکھنے سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ
 پلکوں کے بال اندر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے ہیں،
 اور ان کی رگڑ سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اور آنسو جاری ہوتے ہیں،
 کچھ دنوں کے بعد ڈھیلے پر زخم ہو جاتے ہیں، اور کبھی آنکھ میں سفیدی
 پڑ جاتی ہے۔

علاج: اس مرض کا دو طرح علاج ہو سکتا ہے۔

ایک عارضی اور دوسرا مستقل۔

بچوں کو موجدے سے اکھاڑ دینے سے عارضی فائدہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بال
دوبارہ نکل آتے ہیں۔ ایک ایک بال پکڑ کر اکھاڑنا چاہئے۔
اور اس مرض کا مستقل علاج اپریشن ہی ہے جو ایک تجربہ کار ماہر
سرجن ہی کر سکتا ہے۔

بھینکائین SCUINT (سکونٹ)

تعریف : اس مرض میں مریض آنکھ کو گھما کر اور اپنے کمر کے
دیکھتا ہے۔

وجوہات : بخار۔ کمزوری، معدہ اور انتڑیوں کی بیماریاں، دانست
لگانا، پیٹ کے کیرٹے، نظر کی کمزوری، گونا گونی اور بھینگے پن کی نقل آنا
وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علاج : اصل سبب مرض کو رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے بعض
ادویات معویات کے استعمال سے یہ مرض رفع ہو جاتی ہے۔ ورنہ اس
مرض کا شانی علاج اپریشن ہی ہے۔
کمزوری نظر کی وجہ ہو تو عینک لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

نظر کی خرابی ASTIGMATISM (الیں ٹیگماٹزم)

اس مرض میں کبھی ایک طرف اور کبھی دونوں طرف کی بینائی
وجوہات : نقص دافع ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا شانی علاج نظر
کا صحیح امتحان کرانے کے بعد صحیح لہر کی عینک لگوانا ہے۔

قریب نظری MYOPIA (مائی اوپیا)

بعید نظری HYPER METROPIA (مائی پر مٹروپیا)

تعریف : قریب نظری میں مریض کو نزدیک سے اچھا نظر آتا ہے، اور دُور سے صحیح نہیں دیکھ سکتا۔

بعید نظری میں دُور سے اچھا نظر آتا ہے، اور نزدیک سے صحیح دکھائی نہیں دیتا۔

وجوہات : در کبھی آنکھ میں پیرائی اور موروثی نقص ہوتا ہے، باریک بینی، خواب روشنی میں لکھنا پڑھنا، اور کبھی اعصابی کمزوری بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔

قریب نظری میں آنکھ کے موتی کی قوت بڑھ جاتی ہے، تشخيص جن لفظوں کو تند، ست آدمی بیس فٹ سے پڑھ سکتا ہے

قریب نظری کا مریض پانچ فٹ کے فاصلے پر پڑھ سکتا ہے

بعید نظری میں باریک بینی میں دقت، کیفیت اور دوسرے

ہوتا ہے، اور دھندلے معلوم ہوتے ہیں، اور دُور کی چیزیں آسانی

سے دیکھ سکتا ہے۔

علاج : اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کریں، اگر اعصابی کمزوری

ہو، تو تقویت اعصاب و دماغ کی کوشش کریں، ورنہ اس مرض کا شافی علاج

بینائی کا صحیح امتحان کرانے کے بعد صحیح نمبر کی عینک لگانا ہے۔

اندھاپن AMAUROSIS یا بیماری اور اس کا

تعریف :- اس مرض میں اچانک یا آہستہ آہستہ بینائی زایل ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- عصب بصارت کی خرابی یعنی سدہ پڑ جانا، شدید بخار، طیریا و حرقہ، شدید سقے کا آنا، آنکھوں میں پانی اتر آنا، سر پر چوٹ لگنا، دماغ اور نخاع میں درم ہونا، پھوٹا، رسولی، آتشک خناق، دماغی جریان خون، رطوبت کا جمع ہونا، شدید درد سر، اعصابی کمزوری، دوران سر، عورتوں میں بند کشتن حیض، شراب نوشی، تباہی کو علاج اور سپیہ کی زہر سے بھی اندھاپن ہو جاتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کریں، اگر عصب مجوف میں سدہ پڑ گیا ہو، تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں، جس کے لئے پوٹاسیم آیوڈائیڈ، سوڈیم آیوڈائیڈ، آیوڈیم آیوڈائیڈ وغیرہ کے مرکبات مفید ہیں۔

اگر موتیا کی وجہ ہو، تو اس کا آپریشن کرنا ہی صحیح علاج ہے۔ اگر اعصابی کمزوری ہو، تو مرکبات فولاد، کچلہ، کوپین وغیرہ مفید ہیں، اگر بند کشتن حیض کی خرابی ہو، تو اس کو رفع کریں۔

اس مرض سے بہت کم مریض شفا یاب ہوتے ہیں، اس لئے عام میڈیکل پریکٹیشنر کو ایسے مریضوں کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، کہ وہ کسی قابل آئی سرجن EYE SURGEON ماہر امراض چشم کو بھیج شخص کو اگر علاج کرائیں۔

ہمارے دوست ڈاکٹر عبد العزیز صاحب دین پوری کو یہ مرض میریا
بخار کے بعد ہوئی تھی، پاکستان کے تمام آئی سرجنوں کے علاج کے
باوجود بھی صحت یاب نہیں ہو سکے۔
اس لئے عام ٹریڈ ٹیکل پر کلیشٹر کو مریض کو صحیح مشورہ دینا
چاہئے۔

اندھرتا HEMERALOPIA

(ریمی رل اوپیا)

تعریف۔ اس مرض میں مریض کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔
وجوہات۔ ۱۔ عا جسمانی کمزوری، طیریا کا زہر، تشکاوت
آنکھوں پر شدت گرمی اور دھوپ کا اثر۔
تشخیص۔ مریض اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نظر
کچھ نہیں آتا۔

علاج۔ مریض کو طاقت دینے والی دوائیں اور غذائیں استعمال
کرائیں۔

لوٹن رٹونڈا:۔ کا شلک ۲ گرین، ایجو ایک ادس، لوٹن تیار کریں
ایک دو قطرے آنکھ میں ڈال کر آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، اور
دن بھر پٹی بندھی رہنے دیں، رات کو کھول دیں۔

ایک دو دنہ کے استعمال کرنے سے رات کو نظر آنے لگتا ہے،
وٹامن اے کے مرکبات کا استعمال بھی اس مرض کے لئے مجرب ہے۔

ایسٹن سپرپ یا مرکبات کچلہ، فولاد، کوئین وغیرہ بھی اس مرض
کے لئے مفید ہیں۔

شبیاف شیکوری :- بادیان، نمک لاسوری، ہر ایک دو دو تولہ

باریک سفوف تیار کریں،

سالم کلہی کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کر برتن میں ڈالیں، اور نیچے آگ جلا لیں، جب گرم ہو جائے، تو سفوف کو اوپر پھیر دیکئے جائیں، حتیٰ کہ کلہی کا تمام پانی علیحدہ ہو جائے،

پانی کو علیحدہ نکال لیں، اور اس میں مندرجہ ذیل ادویہ

نففل سفید، نففل سیاہ، دار نففل ہر ایک ایک تولہ باریک پیس کر کھل میں ڈال کر پانی ملا کر کھل کر لئے جائیں، حتیٰ کہ شبیاف بنائے گئے قابل ہو جائے، شبیاف تیار کر کے خشک کر لیں، بوقت ضرورت پانی میں لگس کر ہونکھوں میں لگا لیں،

شب کوری کے لئے مفید ہے، یہ نسخہ حکیم حافظ جلیل احمد صاحب پرنسپل حبیبہ کالج ناہور کی اختراع ہے۔

کسیب شیکوری :- نففل سفید، نففل سیاہ، دار نففل، رتنیوں ادویہ ہموزن لے کر بنابیت باریک سفوف تیار کریں، سرمہ کی طرح آنکھوں میں لگا لیں، شب کوری کے لئے مفید ہے،

دوائے شب کوری :- تکرے کی کلہی لے کر اس میں چند دار نففل چھرو دیں، اور آگ پر رکھ کر گرم کریں، اور جو رطوبت اُس سے ہے،

سلائی سے لگا کر آنکھوں میں لگا لیں،

اور یہی رطوبت شبیشی میں جمع رکھیں، اور سر روز سلائی سے

ہونکھوں میں لگایا کریں،

شب کوری کے لئے مجرب ہے،

شب کوری کے مریض کے لئے جانوروں کے جگر کا کھلانا بھی بچہ مفید ہے،

دھلکہ EPIPHORIA (اپنی فوریا)

تشخیص :- اس مرض میں آنکھ سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے ہیں۔ یہ مرض آنکھ کی خارش، ہاضمہ کی خرابی، آنکھ کی کمزوری آنکھوں کے گھرے یا گرد و غبار سے ہو جاتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ بڑک بوشن یا ایلم بوشن سے آنکھوں کو دھوئیں، مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرنا ثبات مفید ہے۔

نسخہ :- سنبل الطیب، انولہ، ایسڈ لیٹک + ماسٹہ، پیکرڈی، ماسٹہ، سرکہ کی مانند باریک پیس لیں، اور سلائی سے آنکھوں میں صبح و شام لگائیں۔

معوی دماغ دوائیں اور غذائیں استعمال کریں۔

نظر کی کمزوری ASTHENOPIA

(استھنی نوپیا)

تشخیص :- اس مرض میں نظر کمزور ہو جاتی ہے کثرت مطالعہ، دماغ اور پٹوں کی کمزوری، دائمی زلزلہ و زکام، بد معاشی، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، مشرقیہ عینک لگانا وغیرہ وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علاج: در اصل سبب مرض کو تلاش کریں، اور مکمل تشخیص ہونے کے بعد سبب مرض کو دفع کریں، دماغ کو طاقت پہنچانا، نظر کا صحیح امتحان کرائیں، اور نظر کو تیز کرنے والے نسخہ جات استعمال کریں۔
محررات امراض چشم میں ملاحظہ فرمائیں۔

ناخونہ PTERYGIUM (درتیم)

تشخیص و وجوہات: در اس مرض میں طبقہ ملتحمہ پر زائد گوشت پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی جڑ عموماً ناک کی طرف ہوتی ہے، یہ طبقہ قرنیہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جتنے کہ بڑھ کر طبقہ قرنیہ کو دھانپ لیتا ہے، یہ مرض عام طور پر خرابی حسدہ، گرد و غبار، آئینہ چشم اور قرنیہ کے زخم سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج: در ابتدا میں اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے، جب یہ مرض بہت بڑھ جائے، تو سوائے اپریشن کے اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔

اگر پیٹ کی خرابی سے ہو، تو اطرینل کشینز، اطرینل زمانی، اطرینل اسٹونو دوس بے حد فائدہ کرتی ہے۔

بعض ڈاکٹر ناخونہ پر کا پر سلینٹ لگاتے ہیں،

گولڈن آلی اسٹیمٹ ناخونہ کے لئے نہایت مفید ہے۔

روزکوری NEC TALOPIA (نکسالی اوپیا)

تشخیص وجوہات و تشخیص۔ اس مرض میں مریض کو رات کو نظر آتا ہے۔ اور دن میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ مرض کثرت مطالعہ، اشتیاع، لثقبہ، کثرت جماع، باریک خط پڑھنے اور آشوب چشم وغیرہ کے دیکھنے سے ہو جاتا ہے۔

علاج۔ دٹامن "ای" کا استعمال اس مرض کا شافی علاج ہے۔ ملٹی وٹامنز بھی مفید ہیں۔ فولاد کے مرکبات بھی اس مرض میں مفید ہیں۔ غذا مقوی دینی چاہئے۔

نسخہ۔ چٹکری سفید، نوشادر ہر دو تولہ تولہ، نہایت باریک سزمہ کی طرح پیس لیں، اور سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ روزکوری کے لئے نہایت مفید ہے۔

ناسور چشم

تشخیص وجوہات و تشخیص۔ اس مرض میں آنکھ کے کویہ میں ناسور اور درم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بے معمولی ہوتا ہے۔ جو علاج نہ کرنے کی صورت میں ناسور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور یہ آنسوؤں کی پھیلی کا پھوڑا ہوتا ہے۔

علاج۔ اکسیر ناسور چشم، کلکیر یا کرب... طاقت۔

ہر پندرہ دن کے بعد ایک خود اک دیں ، دو تین خوراکیوں کے استعمال سے ناسور ختم ہو جاتا ہے ۔

شیخ بوعلی سینا اپنے قانون علاج میں لکھتے ہیں کہ برگ سداب کو انار کے پانی میں پیس کر لگایا جائے ، اس کے لگانے سے سوزش پیدا ہوتی ہے ، لیکن سوزش کا خیال نہ کیا جائے ، اور اچھا ہو سنے تک مسلسل استعمال کیا جائے ، ناسور ختم کا عجیب علاج ہے ۔

اگر ناسور بڑی تک پہنچ چکا ہو ، تو یہ مندرجہ کر دیتا ہے ، ایک دو دفعہ لگانے کے بعد سوزش بھی پیدا نہیں کرتا ۔

خارش چشم

وجوہات و تشخیص : اس مرض میں آنکھ میں شدید خارش ہوتی ہے عام طور پر گندی اور غلیظ جگہ پر بیٹھنے اور آنکھوں کی صفائی نہ کرنے سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے ۔

علاج : آنکھوں کو خوب بورک لوشن یا ایلیم لوشن سے دھوئیں اور مندرجہ ذیل نسخہ کا استعمال کریں ۔

اکسیر خارش چشم : پتیل کا کھلا برتن لے کر اس میں قدرے پانی ڈال کر پچور کی ایک گانٹھ سے گھسنے

شروع کریں جب پانی خشک ہونے پر آئے ، تو قدرے اور ڈال دیں دو تین دن تک یہی عمل روزانہ تین چار گھنٹہ جاری رکھیں ، بعد ازاں خشک ہونے دیں ، احتیاط سے کھرج کر سفوف بنالیں ، اور اس کو شیشی میں محفوظ رکھیں ۔

سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، پلکوں اور آنکھوں کی خارش اور
 گروں کے لئے لاثانی دوا ہے،
 جست کا کشتہ بھی خارش چشم کے لئے مفید ہے،

مخربات امراض چشم

اکسیر گروے در قرفل ۲ تولہ، خوب باریک پیس لیں، پلک کو اٹھا کر
 دوہوں پر لگائیں، پلک اٹے رہنے دیں، اور سفوف اور پر لگا رہنے
 دیں،

اگرچہ اس کے استعمال سے سخت تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد
 گروں کی تکلیف باقی نہیں رہتی، مخرب ہے۔

سرمہ خاص، سرمہ سیاہ ایک پاؤ، قلی شوره ۲ تولہ، سمندر
 بھاگ اتولہ، فلفل سفید ۳ ماشہ، کاذر ۴ ماشہ، کشتہ جست ۵ ماشہ
 چٹکڑی اتولہ، زنگار ۴ ماشہ، سفیدہ ۸ ماشہ، ست لیموں ۲ تولہ
 نیل متوتھا ۱ ماشہ، سردیمینی ۲ تولہ، عرق سولف ایک پاؤ،
 عرق گلاب ۶ پاؤ،

سب کو باریک کر کے عقیات میں اچھی طرح کھول کر کے سرمہ بنائیں،
 ترکیب استعمال صبح و شام سلائی سے آنکھوں میں لگائیں،
 امراض چشم، خارش، ضعف بصارت، پانی بہنا، گروں کے
 لئے بے حد مفید ہے، بینائی کو تیز کرتا اور عینک کی عادت تک
 کو چھڑا دیتا ہے،

ضماد رسوت افیون والا اور رسوت زرد ۶ ماشہ، پھٹکڑی بریاں

۴ ماشہ، زعفران خالص ۲ ماشہ، افیون خالص ۱ ماشہ

عرق کھو کے پانی میں حل کر کے آنکھ کے اوپر لپیپ کر دیں، آشوب چشم، درد، رٹک اور سرخی چشم کو بہت جلد زائل کرتا ہے۔

زعفرانی سرمہ : زعفران، افیون ہر ایک ایک ماشہ، رنگار

سرمہ سیاہ، سمندر جھاگ، لونگ، سونا کھی، روپا کھی، سبز کا بیج ہر ایک ۳ ماشہ، کشتہ حببت ۵ تولہ،

سب دواؤں کو نہایت باریک سرمہ کی مانند کھری کر دیں، ایک

سلائی روزانہ لگائیں، اگر گھر سے زیادہ ہوں، تو پلوں کو اٹا کر یہ سرمہ

سلائی سے لگا کر گردن پر مل دیں،

دھند، غبار، جالا، سفیدی چشم، گروں کے لئے کاشک

سے بڑھ کر مفید ہے۔

ضماد اورام چشم : ہلیہ زرد، ہلیہ سیاہ، رسوت زرد، گل

ارمنی، عیندل سرخ، ہم وزن لے کر ہرے دھنیے کے پانی میں پیس کر

آنکھوں پر لپیپ کر دیں، آنکھوں کے زیادتی ورم کے لئے اکسیر ہے، اگر ورم

کی وجہ سے پوٹے الٹ گئے ہوں، تو ایک وزن میں درست ہو جاتے ہیں،

اکسیر سرخی و درد چشم : رسوت ۶ ماشہ، پھٹکڑی ۴ ماشہ،

دھنیا ۱ ماشہ، انار دانہ ۱ ماشہ، افیون ۱ ماشہ، پوست خشخاش ۱ ماشہ

پچر ۶ ماشہ، گندھی بلدی ۳ ماشہ، عرق گلاب ۲ تولہ،

تمام دواؤں کو کوٹ لیں، اور ایک صاف کپڑے میں تمام ادویہ

ڑال کر پوٹلی باندھ کر عرق گلاب میں بھگو دیں۔

ترکیب استعمال : صبح ، دوپہر اور رات کو سوتے وقت پوٹلی کو آنکھوں پر لگا لیں ، اور پلکوں کو الٹ کر یہی پانی ایک دو قطرہ آنکھوں میں ڈال دیں ، سرخی ، رٹک اور درد چشم کے لئے تجرب ہے ،

دوائے بھینگاپن : سرمہ سیاہ ، تولہ ، بندق ہندی ایک تولہ ، کھل کر کے سرمہ کی مانند کریں ، ستلائی سے آنکھوں میں لگا لیں ، بھینگاپن کے لئے مفید ہے ، علامہ سویدی رحمہ کا تجرب ہے ،

اکسیر موتیا : رگکیر یا فلوریکا ۶۰ (۵ گرین) روزانہ ۴ خوراک دیں ، یہ موتیا بند کی بہترین دوا ہے ، جبکہ پتلی میں درم اور آنکھوں سے پانی جاری ہو ، تو نہایت مفید ہے ،

اکسیر نزول الماء : کشتہ جست ۱۰ تولہ ، سرمہ سیاہ ۱۰ تولہ ، ایون اماشہ ، زنگار ۹ ماشہ ، سمندر جھاگ ۳ ماشہ ، سفیدہ کاشغری ۳ ماشہ ، تمام دواؤں کو علیحدہ علیحدہ پیس کر باہم ملا کر کھل میں ڈال کر عرق سولف اور عرق گلاب نصف نصف بوتل میں کھل کریں ،

یہ سرمہ موتیا بند ، نزول الماء کے لئے بے حد مفید ہے ، اسنادائی حالتوں میں اکسیر ہے ،

دیگر امراض چشم : کمزوری نظر ، جالا ، پھولا ، نازونہ وغیرہ امراض چشم میں بھی مفید ہے ، یہ نسخہ حکیم نور الدین قادریانی کا مجوزہ ہے ،

اکسیر دوقہ : دوقہ کو جڑ سے اڑا دینا ہے ، رسوت ۳ ماشہ ، طوطیا ۳ ماشہ ، شحم حنظل ۳ ماشہ ، لعاب اسبغول ایک تولہ میں ششیاف بنادیں ،

یشیر عورت میں گھسی کر آنکھ میں لگانا بہت تجرب ہے ،

اکسیر توشہ در شوره قلمی اولہ ، پشکڑی اولہ ، نوشتادر اولہ
نیلہ حقو کا اولہ ،

سب کو عرق لیوں تین روز میں کھول کر کے ایک کپیا گلی میں ملکیت
کر کے پانچ سیراپہ کی آگ دیں ، جب سوختہ ہو جائے ، تو باریک پس
کر شیشی میں حفاظت سے رکھیں ، اور سلائی سے آنکھ میں لگائیں ،
توشہ کے لئے بہت مجرب ہے ،

اکسیر بصارت افزا ز نورانی سرمہ در ضعف بصر کے
واسطے اکسیر کا حکم رکھتا ہے ،

مرداریدنا سفند ۳ ماشہ ، مشک اولہ ، طوطیا برماں ۳ ماشہ
کانور ۳ ماشہ ، سوہن کھی ، تیلنی کھی ہر ایک ۱ ماشہ ،

سب کو عرق بادیاں ۱۰ اولہ میں کھول کر کے بطور سرمہ بنا کر آنکھوں
میں لگانا نزول الماء تک کو فائدہ کرتا ہے ،

دولے کے اندھراتا در کاشک ۲ گرین ، اکھوا ادش ، ہیم ملاس ،
ایک در قطرے ڈال کر اوپر پی بانڈھ دیں ، رات کو کھول دیں ، رات کو
صاف نظر آنے لگتا ہے ، اندھراتا کے لئے نہایت مفید ہے ،

اکسیر نزول الماء در حلیت ۳ ماشہ لے کر کپڑے میں پونجی بانڈھ لیں
اور آب پتہ گاؤ ایک برتن میں ڈال کر گرم کریں ، اور اس میں حلیت کی پونجی
آہستہ آہستہ ملیں ، یہاں تک کہ تمام مہینگ اس میں حل ہو جائے ، اس کے بعد
اس میں روغن بلساں ۳ ماشہ ڈال کر رکھ دیں ، یہاں تک کہ گاڑھا ہو جائے
اس کے شیاف بنا کر رکھ لیں ، بوقت ضرورت گھس کر آنکھ میں لگائیں ،

ابتداء نزول الماء قاطع بیاض اور انتشار کو سودمند ہے ،

باب سوم

کان کی بیماریاں

کان درد EARACHEOTALGIA

(ایرک اوٹیلجیا)

تعریف: اس مرض میں کان کے اندر درد ہوتا ہے،
وجوہات اور سردی لگنا، عینسی کا ہونا، عینسی درد، خرابی دانت،
پانی پڑ جانا، و جمع المفاصل وغیرہ سے کان درد ہوتا ہے۔
درد کی تیسیں کان سے چہرے اور پیشانی تک ہوتی ہیں۔
تشخیص مریض بے عینسی کی حالت میں ہوتا ہے۔
علاج: اس سبب سے درد ہو، اس سبب کو معلوم کر کے
رفع کریں، عام طور پر یہ درد عینسی ہوتا ہے، اس لئے دافع درد
ادویات سے ناکارہ ہوتا ہے۔

اکسیر درد کان: ۱۰ ٹیکہ بیلا ڈونا + ۱۰ ڈرام، ٹیکہ اوپیم + ۱۰ ڈرام، گلیسرین
ایک اونس، جلا دویہ کو ملا کر نیم گرم کسے کان میں دو دو قطرے ڈالیں،
درد کان برقم کے لئے اول درجہ کی دوا ہے۔

اگر کان میں دھم آگیا ہو، تو اینٹی فلو جیسٹین یا السی کا پلستر بنا کر
باندھیں، اندرونی طور پر اکسیر بالا کے دو دو قطرے ڈالیں، آرام
ہوگا، کان کی مہل بھی دور ہو جائے گی۔

ایرلوشن ڈرائس، ایسڈ بورک، ۴ گرین، زنک سلفاس
۴ گرین، ایگری فلیوین اگریں، رکٹیفائیڈ سپرٹ ۴ ڈرام، ایکواڈسٹلٹ
۴ ڈرام، لوشن بنائیں، درد کان، کان کا بہنا، سوزش، پھوڑا
پھینسی اور دیگر امراض کان کے لئے مجرب ہے۔

اگر درد خرابی دانت کی وجہ سے ہو، تو خواب دانت کو
نکال دینا چاہئے۔

اگر مریض کو کمزوری ہو، تو دوا مقوی دیں، اور مقوی جسم
مركبات فولاد، کچلہ، ایسٹن سیرپ وغیرہ دیتے رہیں۔
اگر کان کے ارد گرد سوزش اور دھم ہو، تو خوردنی طور پر
سبازول کی ٹنکیاں ہر ۴ گھنٹہ بعد ایک ٹمبیہ دیں، شدید حالات
میں پنسلین ۵ لاکھ یونٹ کا انجکشن کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔
کان کو ٹنکور کرنا بھی دافع درد ہے۔

دوائے درد گوشہ ار بورک ایسڈ ۵ گرین، کاربالک ایسڈ
۷ بوند، پروکین ہائیڈروکلوراس، سپرٹ رکٹیفائیڈ ۲۰ بوند، مارفینا
ہائیڈروکلوراس ۳ گرین، کلیمیرن ایک اونس، تمام ادویہ کو باقم ملا لیں،
اول کان کو صاف کر کے مندرجہ بالا دوائی کے دو قطرے
نیم گرم کان میں ڈالیں، خواہ کیسا ہی سخت کان درد ہو، ۵ منٹ
کے اندر آرام آجاتا ہے۔

اکسیر درد : بعض اوقات مریض کو بیرونی ادویات کے استعمال سے قدرے فائدہ نہیں ہوتا ، اس وقت رفع درد کے لئے اندرونی طور پر اسپرود - سار پیڈان ، کوڈوپاٹرین ، سوئیچین بمقدار ایک یا ۲ ٹمکیہ دیں ، یا اسپرین یا ڈورس پوڈر ، اگر سین کی مقدار میں کھلانا فوری اثر کرتا ہے ، بعد ازاں اچھی طرح تختیوں کر کے اصل سبب کو رفع کریں ،
 روغن بابونہ : رگھل بابونہ ۵ تولہ ، تیل شیریں ۵۰ تولہ ، شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں ، جب پھول گل جائیں نکال کر دوبارہ یہی عمل کریں ، پھر صاف کر کے چار پانچ قطرے کان میں ڈالیں ، کان درد اور دوسرے درودوں کے لئے مفید ہے ،

اکسیر درد : ایون پے ماسنہ ، چند بیدستر پے ماسنہ ، روغن زیتون ۱۰ تولہ میں حل کر لیں ، اور نیم گرم کان میں ٹپکائیں ، درد کان کے لئے اکسیری دوا ہے ،

روغن ترب : رمولی کاپانی ۴ تولہ ، روغن شیریں ۱۰ تولہ میں ملا کر جوش دیں ، جب پانی جل کر روغن رہ جائے ، نیم گرم کان میں دو قطرے ڈالیں ، کان درد کو آرام ہوگا ،

اکسیر الاذن : کاربانک ایسڈ لیکوئیڈ ۶ بوند ، پرڈکین ہائڈروکلورائیڈ ۵ گرین ، گلیسرین ۲ ڈرام ، باہم ملا کر تین قطرے ماؤف کان میں ٹپکائیں ، فوراً درد کان رفع ہوگا ، بے نظیر دوا ہے ،

سفوف اکسیری : رپورک ایسڈ اڈرام ، آئیوڈر فارم اڈرام ، ملا کر ۳ - ۴ گرین کان میں چھونک دیں ، اور کان کے سوراخ میں ذرا سی دلائی رکھ دیں ،

رطوبت کو خشک کرنے اور زخم کو مندمل کرنے کے لئے مفید نسخہ ہے۔
 امراض کان کی لاثانی دوا درمکری کرم ہارین، بورک ایسڈ، اگرین
 سپرٹ رکٹیفائیڈ ۲ ڈرام، ڈسٹیلڈ واٹر ۴ ڈرام۔
 سب کو ایک شیشی میں ڈال کر حل کر دیں، بوقت ضرورت دو قطرے
 کان میں ڈالیں، جلد عوارضات کان مثلاً درد گوش، ریم گوش، زخم کان
 پھر اپن اور دیگر عوارضات گوش کے لئے بہترین چیز ہے۔
 بعض اوقات مکی خون کی وجہ سے کان بھنے لگتے ہیں، ایسی حالت میں
 مرکبات فولاد اور لیڈ ایکسٹریکٹ کا استعمال مفید ہے۔
 ہدایات در اول کان کا ایر سکوپ سے معائنہ کر لیں، اگر دھوئے
 کے قابل ہو، تو پانی نیم گرم کر کے ہوتا شیم پر منگنیٹ یا بورک ایسڈ حسب
 ضرورت ڈال کر پھکاری سے کان دھو کر دوائی ڈالیں،
 ۱۲، اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، تو نکال لیں،
 ۱۳، اگر میل بہت سخت ہو، تو پہلے گلیسرین وغیرہ ڈال کر
 نرم کر لیں،
 سفید پیاز کا عرق کان میں ٹپکانا درد کو ساکن کرتا ہے،
 بکری کی میٹگنیاں ذرا گرم کر کے کان پر باندھنا درد کو تسکین
 دیتی ہیں،
 کان میں ہمیشہ نیم گرم دوا ڈالنی چاہئے، کیونکہ ٹھنڈی دوائی سے
 عصب سمع کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے،
 کان کو میل سے ہمیشہ صاف رکھنا چاہئے۔

کان درد کا ہومیوپیتھک علاج

اگر کان میں درد اور درد ہو، تو پیلا ڈونا، ۳ ویں، اکونائٹ ۱۔
 بھی بہترین دوائی ہے، بعض حالتوں میں یہ دوائی کیومیلا ۳، پیسٹلا ۳۰
 سے بھی بہتر ہے، اگر افاقہ فارینی ہو، تو چند گھنٹوں کے بعد مرکب کی ایس
 ۳ ویں۔

اگر کان کی تکلیف دوبارہ ہو جائے، اور اس طرح آرام ہونے کے
 بعد بار بار تکلیف ہو، اور کان سے زرد رنگ کا مواد بھی بہتا رہے، تو
 پیسٹلا ۳ ویں، اگر یہ دوا مستقل طور پر فائدہ نہ کرے، اور سردی سے
 تکلیف زیادہ ہو جائے، تو ڈاکامارا ۳۰، اور سٹاکس ۳ ویں،

صبح و شام سلفر ۳ کی دوا رکھیں دنیا بھی بہت مفید ہیں، اگر
 کان میں احماسی درد ہو، تو پٹینیگو میجر مد ٹیکچر دیں، یہ دوائی بوسیدہ
 دانت کے خلا میں رکھنے سے بھی درد میں نمایاں افاقہ ہو جاتا ہے
 پٹینیگو میجر مد ٹیکچر کے پانچ دس قطرے لٹنے ہی پانی کے قطرہوں میں
 ملا کر رکھیں، اور گرم کر کے ایک گھنٹہ کے بعد ایک دو قطرے درد والے
 کان میں ڈالتے رہیں، بہت جلد افاقہ ہو جائے گا۔

مولین آئیل کے ایک یا دو قطرے ایک ایک گھنٹہ کے بعد کان
 میں ڈالتے رہیں، جب تک کہ تکلیف رفع نہ ہو جائے۔

کان درد، بہرا پن، کان بہنا کے لئے ہومیوپیتھک علاج کی

مسلمہ دوا ہے۔

کان بہنا OTORRHOEA (راولوریا)

تعریف: کان کی بیرونی نالی کی تھلی میں سوزش ہو کر کان سے پیپ بہنے لگتی ہے۔

وجوہات: بچوں میں دانت نکلنا، چوٹ لگنا، غیر حبش کا کان میں پڑنا، سردی، بد ہضمی، مرض خنازیر اور بعض جلدی امراض کے باعث یہ مرض ہوتا ہے۔

تشخیص: ابتداً کان کی نالی متورم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے، کان میں درد ہوتا ہے، برہہ درد کے نمینہ نہیں آتی، دو تین دن کے بعد رطوبت خارج ہونے لگتی ہے، پھر پیپ بن جاتی اور کان بہنے لگتا ہے۔

علاج: ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے چند قطرے کان میں ڈال دیں، ابل کر پیپ باہر آجائے گی، کان کو اچھی طرح صاف کر کے بورک الیڈ ڈال کر اوپر گلیسرین پیور کے چند قطرے ڈال دیں، اکثر اس طرح دوائی استعمال کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

بورک الیڈ: اگرین، ایکوا کے لوشن نیم گرم سے کان میں آہستہ آہستہ پھکاری کریں، اور پھر کان کو خشک کر کے بورک الیڈ اور آئیوڈو فارم سساری الون سفوف کان میں ڈالیں، اور کان کے اوپر روئی رکھ دیں۔

بورک لوشن کی بجائے مرکری لوشن سے بھی کان صاف کیا جاتا ہے۔

اولو رائن : کاربالک آئل ادس ، سبازول ڈسٹنگ پوڈر ڈرام
 باہم ملا کر حل کر لیں ، اول ہائڈروجن سے کان صاف کر کے چند قطرے
 دوائی مذکور کے ڈالیں ، اور اندرونی طور پر سلفوٹھائیمڈ زیا سبازول گولیوں
 بڑے آدمی کے لئے دن میں ۴ گولیاں دیں ،

کان بہنے کے لئے اکسیری بے نظیر علاج ہے۔

کاربالک آئل : کاربالک ایسڈ ۵ بوند ، روغن شیریں ۴۰ بوند
 دونوں کو ملا دیں ، بورک ایسڈ اور آئیو ڈو فام مسادی سفوف بنا
 کر کان میں پھونک دیں ، اور اوپر سے گلیسرین یا کاربالک آئل ڈال
 دیں ، کان بہنے کو آرام ہوگا۔

کان بہنے کی اکسیری دوا : پشکری باریک شدہ یا انزروت
 شہد خالص میں ملا دیں ، اول کان کو ہائڈروجن سے صاف کر لیں ، ملل
 کے صاف پارچہ سے فیتہ بنا کر لت پت کر کے کان میں رکھیں ، دن
 میں تین فیتہ رکھیں ، معمولی مرض دو تین دن میں ، پورا مرض کان بہنا
 سات دن میں مکمل طور پر زائل ہوگا۔

ترباق الاذن : رکھو فام پیور ۲ ڈرام ، روغن تارپین ۲ ڈرام ، دونوں
 کو ملا کر کان ، ناک یا کسی اور جگہ کپڑے پڑ گئے ہوں ، ۱۰ ، ۱۵ قطرے ماؤف
 جگہ میں ڈال دیں ، نصف گھنٹہ بعد کان صاف کر دیں ، تمام کپڑے مردہ ہو کر
 خارج ہو جائیں گے ، زخم بھرنے کے لئے بھی یہی دوائی استعمال کرتے رہیں
 جسم سے کپڑے مارنے کی اول درجہ کی دوا ہے۔

دیگر نیازوں کے سبز پتوں کا پانی کان میں ڈالنے سے تمام کپڑے مرجاتے ہیں ،
 اکسیری سیلان الاذن : ہر ٹال درقیہ نہایت باریک پیس کر ایک سیر چھتر

سرسوں کے نیل میں ملا کر اس قند پکائیں کہ تیل سے دھواں نکلنے لگے تب آگ پر سے اتار کر ٹھنڈا کر کے مختار کو بوتل میں محفوظ رکھیں۔

کان صاف کر کے چند قطرے روزانہ کان میں ڈالیں پڑنے سے پرانا کان بہنا کا چند دنوں کے استعمال سے مدد ہو جاتا ہے، بے نظیر دوا ہے۔
کان بہنے کی ٹکیاں سبازول یا ایم بی ۶۰، یہ بھی کان بہنے کے لئے اکسیر ہیں۔ مقدار خوراک جوان آدمی کے لئے دن میں ۶ گولی صبح و دوپہر، شام پانی کے ساتھ دیں۔

کان بہنے کا ٹیکہ، رینسین ۵ لاکھ یونٹ، ڈسٹلڈ واٹر ۲ سی سی، ایم ٹالین، دن میں تین بار عضلاتی انجکشن کریں، ایک ہی دن میں کان بہنے سے بند ہو جائے گا۔

بعض دفعہ ۵ لاکھ یونٹ کے دو انجکشن صبح و شام نصف نصف کرائے جاتے ہیں۔

دوڑٹ، بچوں کے کان اکثر پھپھی نکلنے کی وجہ سے بہتے ہیں، اس لئے بچوں کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

ٹیکہ نمبر ۱۲، ڈی ہائیڈرو سٹرپٹوماٹو سین پل گرام، ڈسٹلڈ واٹر اسی سی، صبح و شام نصف نصف انجکشن کریں، کان کی اندرونی پھپھی اور آئش

میڈیا کی اکسیری دوا ہے، ایک دن کے استعمال سے کان بہنا رک جاتا ہے، دوڑٹ، اگر کان کے ڈھول میں سوراخ ہو، تو کان میں پچکاری نہیں

کرتی چاہئے، کیونکہ اس طرح پانی اندر جا کر بہت سخت درم پیدا کر کے سخت تکلیف کا موجب ہوتا ہے، نیز مندرجہ بالا انجکشن کرنے سے پیپ کا اخراج بند ہو جاتا ہے، روت سماعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

کھرد مائی سٹین ٹاپیکل ریپارک ڈیوس، ایک ایک قطرہ ہر چار گھنٹہ
بعد کان میں ٹپکائیں۔

کان کی سوزش، درم، کان بہنا، اخراج مواد اور رطوبت کے
لئے بہترین دوا ہے۔

متواتر کان بہنے سے دماغ میں سوزش ہو کر کئی قسم کی پیچیدگیاں
پیدا ہو جاتی ہیں، اس لئے سیلان الاذن کا علاج جلد کرنا چاہئے۔

کان بہنے کا ہومیوپیتھک علاج

اول ہائیڈروجن کے چند قطرے ڈال کر کان کو اچھی طرح صاف کریں،
بعد میں مولین آیل کا استعمال کریں، کان کی خشکی، زخم، کان بہنا
خارش، کان بھنا، کان سے پیپ خارج ہونا اور بہرا پن کے لئے اکیسیر
ہے، دو تین قطرے دن میں تین بار ڈالتے رہیں۔

پلانٹیکو مد ٹنگر اڈرم، بورک ایسڈ ۱۲ ڈرم، گلیسرین ایک ادنس
میں ملا لیں، کان بہنے کے لئے لاجواب چیز ہے۔

پسٹلا ۳۰، کالی میور ۱۲ کا استعمال کان بہنے کے لئے مفید
ہے، خارجی استعمال کے لئے یہ نسخہ ہے۔

بورک ایسڈ، اگرین، ملک شوگر ۱۰، گرین، پلانٹیکو مد ٹنگر ۲۰ قطرے
گھل میں خوب گھوٹ کر خشک کریں، نلکی سے کان کے اندر چھونک دیں۔

ہیپر سلفر ۳۰ کان بہنے کے لئے جادو کا اثر رکھتی ہے، آرسینکیم آیوڈائیڈ
۳ سل دوق یا کمزوری بیماری سے ہو، تو فائدہ کرتا ہے، بیرونی منہ سے
یاخون اور گرج کی وجہ سے ہو، تو آرنیکا ۳۰ مفید ہے۔

WEX IN THE
EAR

کان میں میل پڑ جانا

(وکیس ان دی ایر)

تعریف اس مرض میں کان میں میل جمع ہو جاتا ہے،
وجوہات در گرد و غبار، مٹی اور کان میں بے فائدہ تیل وغیرہ
ڈالتے رہنا۔

تشخیص: مریض کو بہر اپن یعنی سنائی کم دینے لگتا ہے، ایر سکوپ
سے دیکھنے سے میل نظر آ جاتی ہے۔

علاج: کان میں تیل یا گلیسرین نیم گرم ڈالیں، جب میل نرم ہو
جائے، تو نیم گرم پانی سے کان میں پھکاری کریں، دو تین دفعہ پھکاری کرنے
سے میل خارج ہو جاتی ہے، اگر میل سخت ہو، اور خارج نہ ہو، تو روزانہ
گلیسرین نیم گرم کان میں ڈال کر پھکاری کریں، میل خارج ہو جائے گی،
اور کان صاف ہو جائے گا، اگر میل سخت نہ ہو، تو ہاڈروجن پراوکسائیڈ
ڈالنے سے ہی اہل کر میل نکل جاتی ہے۔

کئی آدمی بعض دفعہ کان بھاری ہونے سے کان میں دیاسلانی، سرخو
یا کسی اور باریک لکڑی سے کان کو صاف کرنے لگتے ہیں، جس سے کان
صاف ہونے لگی بجائے بعض دفعہ خراش ہو کر سخت تکلیف ہو جاتی ہے، اور
بعض اوقات بے احتیاطی سے کان کا پردہ بھی پھٹ جاتا ہے، اس لئے
کان صاف کرنے میں احتیاط ضروری ہے، نیز کان کو پھکاری سے صاف کرنے
میں سختی نہیں کرنی چاہئے، نہایت آہستگی سے پھکاری لگانی چاہئے۔

کان میں کچھ پڑ جانا

FOR EIGN BODY IN THE EAR

دفار ان پاؤی ان دی ایٹر

تشریف : اس مرض میں کان کے اندر کوئی غیر جنس داخل ہو جاتی ہے۔
اسباب : کان میں کپڑا، ٹکڑا، گندم، پھل، مٹر، کلی کا دانہ یا کوڑی
 رتی، کٹکڑ اور پینسل کا ٹکڑا جاتا ہے۔
علامات : کان میں غیر جنس کے داخل ہونے سے کان میں سرسراہٹ
 اور سنا بند ہو جاتا ہے۔

علاج : کان کو ایئر سکوپ سے فور کے ساتھ دیکھیں، اگر غیر جنس
 کان کے سوداخ کے قریب ہی دکھائی دیتی ہو، تو باریک فارسیس یعنی موچے
 یا صلائی وغیرہ سے احتیاط کے ساتھ نکال لیں۔ اگر غیر جنس سوداخ سے
 دور ہو، تو کان میں پانی کی چھکاری کرنے سے وہ چیز نکل جائے گی، اگر پھر بھی
 نہ نکلے، تو کان میں گلیسرین یا تیل ڈالیں، ایک دو دن کے بعد خود بخود نکل
 جائے گی۔ اگر نہ نکلے، تو چھکاری سے نکالیں۔ اگر کان میں پانی پڑ جائے
 تو خالی چھکاری سے کھینچ لیا جاتا ہے۔

کان سے پانی نکالنے کا آسان طریقہ : درج ذیل یا کانے کی نالی لے کر
 اس کے ایک سرے پر روئی لپیٹ لیں، اور دوسری کو تیل سرسوں میں تر کر کے
 دیا سلانی سے آگ لگا دیں، دوسرا سرا کان میں لگا کر مانتے سے پکڑ رکھیں،
 دسویں کے زور سے کان کے اندر کا پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، جب
 تمام پانی نکل جائے۔ تو نالی کو علحدہ کر دیں۔

دعہ ۲، جب کان میں پانی پڑ جائے، تو مریض کو ٹوڑی سی سنو اور دینی چاہئے، تاکہ چھینک آئے، اور جب چھینک آنے لگے، تو ناک اور منہ کو بند کرنے کی ہدایت کریں، اور سر کو پانی والے کان کی طرف جھکا دیں، اساکر نے سے اکثر پانی اور داخل شدہ چیز نکل جاتی ہے، اگر کان میں کوئی کیرا وغیرہ ہو، تو ہائیڈروجن ڈالنے سے فوراً مرجانا ہے، اور بعد میں پانی کی پچکاری کر کے نکال دیں۔

کان بجنا TINNITIS (سنائی ٹس)

تعریف: اس مرض میں دماغ کے اندر دماغی دوران خون کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔

وجوہات: ہر کسی خون اور خون کا پتلا ہونا، کہ نین کا زیادہ استعمال کرنا۔ بد ہضمی، نفخ شکم وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔
علامات: اس مرض میں کان میں پانی کے ٹھونسنے کی آواز اور ٹپ ٹپ ہوتی ہے۔

علاج: اس مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کریں۔
اکسیری دوا اور فینو باربیٹون سوڈیم اگرین، ایک شوگر، اگرین، ایسی ایک خوراک دن میں دو تین بار دیں، کان بجنے اور دوران سر کے لئے بے حد مفید ہے۔

دعہ ۲، پوٹاسیم بروائیڈ، اگرین، ایکوا ادلس، ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں، مفید ہے۔

اگر قوت ہضم کی خرابی سے ہو، تو ہاضمہ کی اصلاح کریں۔

سوڈا منٹ ۵ گریں کی وڈکیہ بعد غذا دن میں دو بار دیں،
یا نمک سلیمانی امانتہ صبح و شام غذا کے بعد دیں،
اگر کمزوری کے سبب ہو، تو ملی ڈٹا منتر، وٹامن بی ۱۲، ایسٹن سیرپ،
نروڈگر، سیٹا ٹون، وارڈ بریز کمپونڈ، وغیرہ استعمال کرنا مفید ہے،
اگر خشکی کی وجہ سے ہو، تو دماغ کو ترطیب اور تقویت دینے والی
ادویات استعمال کریں،

نسوہ، ہرکل روغن، روغن بادام، روغن خشخاش مسادی ملوڈن ملا کر سر پر
باش کر دیں، اور کان میں بھی ڈالیں،
اگر قبض ہو، تو قبض رفع کریں،
کثرت جماع، کثرت محنت، تنباکو، شراب، افیون سے پرہیز کریں،
نوٹ، ہر بوڑھوں میں یہ مرض لا علاج ہوتا ہے،

بہراپن DEAFNESS (ڈیفینس)،

تعریف بہراپن میں مریض کو یا تو بالکل یا کم سنائی دیتا ہے،
وجوہات بہراپن میں کبھی کان میں میل بھر جانے سے کان بند ہو جاتا ہے، اور
اوپر بولنے اور تیز بند آواز سے کان کے پردے کو صدمہ پہنچنا، خرابی خون
دماغی کمزوری، دم گھو، خناق، گلسوئے، وجع المفاصل، نفرس، چیچک
آتھک وغیرہ امراض سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے
تشخیص کانوں میں مختلف آوازیں آتی ہیں، قوت سماعت کم ہو جاتی ہے،
علاج بہراپن بالکل کبھی ختم ہی ہو جاتی ہے
اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں

عام طور پر کان میں میل بھر جانے سے یہ مرض ہوتا ہے۔ اس لئے
ایئر سکوپ سے دیکھ کر پیکاری کے ذریعے میل کو خارج کریں۔
اگر کان کا پردہ پھٹ چکا ہو، تو اکثر یہ لا علاج ہوتا ہے۔ یا
مصنوعی پردہ لگوا لیا جائے، تو قدرے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک سبب
کے مطابق علاج کریں۔

اگر دماغی کمزوری ہو، تو دماغ کو طاقت دینے والی ادویات اور
غذائیں استعمال کریں۔ حریرہ مغوی دماغ بہایت مفید ہے۔
اگر ادبغا بستے اور تیز سخت آواز کی وجہ سے بہرا پن ہو تو آرٹیکل
کی پر تھیرے دن ایک خوراک بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ اکثر دو تین خوراکیں
کافی ہوتی ہیں۔

دوا سے بہرا پن اور بادل دم روغن و تولد، روغن تارین تولد، باجم طائیں
نیم گرم قطرہ قطرہ کان میں ٹپکائیں۔ نقل سماعت بہرا پن کے لئے مفید
ہے۔ درد کان کو بھی فائدہ کرتا ہے۔

کان کا ورم

OTITIS MEDIA

(امالی لٹس میڈیا)

تعریف : اس مرض میں کان کے جوف اور پردہ میں ورم ہو
جاتا ہے۔

وجوہات : کان میں زور سے پیکاری کرنا، سردی لگنا، نفزس،
پٹھوں میں خراش ہونا، سرخ بخار، خناریر، گنٹھیا وغیرہ اس مرض کے
وجوہات ہیں۔

تشخیص: ہر شروع مرض میں کان کے اندر گرانی محسوس ہوتی ہے۔ پھر کان میں درد ہونے لگتا ہے۔ اور مختلف قسم کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ ذہن سماعت میں کمی آجاتی ہے۔ اور ساتھ ہی بخار ہو جاتا ہے۔ کان کی اندرونی نالی اور پردہ سرخ، متورم ہو جاتا ہے۔ اگر مرض زیادہ ہو جائے تو درد شدید ہوتا ہے۔ اور کبھی جوانوں کو ہڈیاں اور ہچوں کو تلخ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس مرض سے کئی مریضوں کو لغوہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سوزش دماغ کی طرف بڑھ جائے تو مریض کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج: اس مرض کے علاج میں دافع درم اور دافع درد ادویات کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔

شروع مرض میں پینسلین ۵ لاکھ یونٹ کا ایک انجکشن مرض کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حسب ضرورت چوبیس گھنٹے بعد دوسری بار بھی لگا سکتے ہیں۔

خوردنی طور پر سیبازول، سافا ڈایازین، سلفا مینزاتھین بھی اس مرض کے لئے اکسیری ادویات ہیں۔ مقدار خوراک ۲ ٹیکہ ہر چار گھنٹے بعد حتیٰ کہ مرض رفع ہو جائے۔ بچوں کو حسب عمر مقدار خوراک کم کر دیں۔

کان کو گرم پانی یا بورک رشن سے دھو کر خشک ہونے کے بعد کاربانک گلیسرین قطرہ قطرہ ڈالیں۔ بے حد مفید ہے۔

اگر درد شدید ہو تو اس میں پردکین یا ایڈرول کلورائیڈ لقند ضرورت ملا لیں۔ بیلادونا گلیسرین بھی کان میں ڈالنا مفید ہوتا ہے۔

کان پر ٹکڑ کرنا، انٹی ٹوکسین پلاسٹر لگانا بھی اس مرض میں مفید ہے۔ شروع مرض میں کان کے پیچھے جو ٹیکس لگوانا بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔

اگر کان کے پیچھے درم بڑھ جائے تو عمل جراحی کریں۔ اور پھر

دینے کے بعد آئیل کار باکک کی پٹی لگائیں، اور پینسلین کا انجکشن لگادیں،
 نہایت مفید ثابت ہوگا۔

بعض اوقات علاج نہ کرنے یا غلط علاج کرنے سے کان کا پردہ
 متوڑم ہو کر خراب ہو جاتا ہے، اور ہڈیاں بھی مردار پڑ جاتی ہیں، ایسی صورت
 میں کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے۔

لشعرہ: سفیدی بیضہ مرغ اور گلی روغن مسادی الوزن ملا لیں نیم گرم
 کان میں ٹپکائیں، درد اور دم کے لئے مفید ہے۔

بیلا ڈونا ۳ کان کے دم کے لئے بے حد مفید ہے، اگر پیپ
 پڑ چکی ہو، تو ہیر سلفر ۳۰ بہت فائدہ کرتی ہے۔
 کلکیر یا سلف بھی کان کے درد کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

کان کی پھنسیاں

ECZEMA OF
THE EAR

راگزیمیا آف دی ایئر

تعریف: اس مرض میں کان کے اندر اور ارد گرد پھنسیاں نکل
 آتی ہیں۔

وجوہات: کان کا اندرونی زخم ہونے کے باعث پیپ خارج ہو کر
 کان کے ارد گرد پیپ لگنے سے یہ مرض شروع ہوتا ہے۔

تشخیص و علامات: پھنسیوں پر درد اور جلن ہوتی ہے، اور
 ان سے درد رنگ کی ریم نکلتی ہے، جس سے جگہ

لگتی ہے، وہیں پھنسی پیدا کر دیتی ہے۔

علاج در کان کو کسی انٹی سپٹک دوائی سے باہر اور اندہ سے
خوب صاف کر کے مندرجہ ذیل نسخہ جات استعمال میں لائیں۔
نسخہ: بربرک ایسڈ اوڈرام، ایکری فلیوین ۵ گریں، سبازول ۵ گریں
سب اوویہ کو ملا کر ہارٹیک کر کے سفوف بنائیں۔

ترکیب استعمال: در زخم پر پہلے کاربالک لگا کر پھر مندرجہ بالا سفوف
اد پر چھڑکیں، تین چار دن میں مکمل آرام ہوگا۔
نوٹ: آئل کاربالک ۲۵ فی صدی کا تیار کیا گیا ہو۔

سبازول پمپ کے لئے نصف گولی صبح و شام پانی کے ساتھ کھلائی
ہنایت زود اثر ہے۔

نسخہ: در جل نیم بوٹی ۶ ماشہ کو ۵ تولہ تیل شیریں میں جلا کر ۶ ماشہ
موم خالص ملائیں۔ اب اسے ٹھنڈا ہونے پر محفوظ رکھیں، ہر قسم کے زخم
چھنی کے لئے نایاب مرہم ہے۔

مردار سنگ کا باریک سفوف پس کر زخم پر چھڑکیں۔
کان کی بیرونی چھنیوں کے لئے پینسلین آکسمٹ کا لگانا بھی بے حد فائدہ
کرتا ہے، ایک دو دفعہ لگانے سے ہی آرام آجاتا ہے۔

سبازول ڈسٹنگ پوڈ: چھنیوں پر لگانا ہنایت مفید ہے۔
آکیتول گلیسرین ۱۰ فی صدی نصف اونس گلیسرین میں تیار کریں، کان کی
چھنیوں پر لگادیں، اگر چھنیاں اندہ ہوں، تو جی نر کر کے کان کے سوراخ میں رکھیں

کان کے کیڑے

تعریف: اس مرض میں کان کے اندہ کیڑے پڑ جاتے ہیں۔

وجو ہاٹ : ارکان بہنا اور گندہ ہو جانا اور اس پر کبھی کا بیٹھ جانا۔
کیرٹے پیدا کرتا ہے۔

تشخیص و علامات : کان سے رطوبت بہتی ہے، کبھی درد بھی ہوتا ہے

علاج : ارکان کو بورک لوشن، یا کاربالک لوشن یا مرکری لوشن سے
پچکاری کر کے صاف کریں، اور بعد میں مسدوجہ ذیل نسخہ کان میں ڈالیں،
تریاق الاذن : کلوروفارم پیو ۲ ڈرام، روغن تارپین ۲ ڈرام
دونوں ملا کر کان میں ڈالیں، آدھ گھنٹہ بعد کان صاف کر دیں،
تمام کیرٹے مردہ ہو کر خارج ہو جائیں گے، کیرٹے مارنے کی ادل درجہ کی
دوائی ہے، زخم بھرنے کے لئے بھی یہی دوائی استعمال کرتے رہیں،
دیگیں بنانے کے سبز پتوں کا پانی بھی کان میں ڈالنے سے تمام
کیرٹے مرجھاتے ہیں،

نسخہ : ارکھنٹول ۱ ڈرام، ایسڈ بورک ۴ ڈرام، پیرامین مول ایلم
ایک انس، ان ادویہ کو باہم ملا کر مرہم تیار کریں، مقام مائوف پر لگائیں،
کان کی اندرونی اور بیرونی پھنسیوں کے لئے نہایت مجرب مرہم ہے،
سلو پیرین (ساختہ سیلک) : یہ ایک پیسٹ دوا ہے، جو کان کی
تمام سوزشی اور الہتابی بیماریوں مثلاً سوزش، ادرم، پیپ بہنا، پھنسیاں
نکلنا وغیرہ کے لئے مفید و مجرب ہے،

ترکیب استعمال : ڈراپر سے پانچ چھ قطرے ہر تیسرے گھنٹے
بعد کان میں ڈالیں، کان میں دوا ڈال کر پانچ دس منٹ تندرست کان
کے بل ٹپٹے رکھیں بے نظیر دوا ہے، نیز کان کی الہتابی بیماریوں میں
ہیٹی سلین کا بذریعہ انجکشن استعمال کرنا بے حد مفید و مجرب ہے،

کلورومائی سٹین ٹاپیکل (ساختہ پارک ڈیوس)

کان کی ان تمام بیماریوں کے لئے مفید و مجرب ہے، جن میں کانوں میں درم
رطوبت اور مواد خارج ہو، سوزش اور درد بھی ہو۔

ترکیب استعمال ایک ایک قطرہ ہر چار گھنٹہ بعد کان میں ٹپکائیں

بہرہ پن کا آلہ : جب کان کا اندرونی پردہ پھٹ جاتا ہے، تو
اس کی وجہ سے بہرہ ہو جانے کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ مصنوعی
آلات سے کام لیا جاسکتا ہے۔

آرٹیکل یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، جو آواز کی لہروں کو اکٹھا
کر کے کان میں منتقل کر دیتا ہے، اور کان کے ڈھول کا سوراخ بند
کرنے کے لئے مصنوعی کان کا ڈھول کان میں داخل کیا جاتا ہے،
جس سے آواز بخوبی سنائی دینے لگتی ہے، کاروباری آدمیوں کے
لئے یہ آلہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس سے کافی
مدد لی جاسکتی ہے۔

اگر مصنوعی کان کا ڈھول نہ ہو، تو ردی کا پھوپھ، گلیسرین یا پیرافین
میں تر کر کے کان میں داخل کرنے سے بھی کام چل جاتا ہے۔

روحغن : آلہ اولہ، برگ نیب ۱۰ عدد، مرچ سیاہ ۳ ماشہ،

طوطیا ماشہ، تیل سرسوں ایک ماؤر

تیل کو گرم کر کے آلہ کے سوا باقی سب دوائیں اس میں ڈال کر
جلا لیں، اور آلہ پیس کر ملا لیں، اس تیل کے چند قطرے کان میں
ٹپکانے سے کان کے زخم درست ہو جاتے ہیں، بے حد مفید
و مجرب ہے۔

باب چہارم ناک کی بیماریاں

نکسیر EPISTAXIS راپی سٹیکس

تعریف در اس مرض میں ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے،
وجوہات : ناک یا سر پر چوٹ آنا، دماغ میں خون کا جمع ہونا شدید
بخار کا ہونا، جگر میں اجتماع خون، دماغ کو گرمی پہنچنا، فشار خون، خرابی خون
تپ محرقہ، پلیریا، خسرہ اور حیض بند ہو جانا، بواسیر کا خون رک جانا،
بچوں میں پیٹ کے کپڑے پڑنا وغیرہ اس کے اسباب میں۔ اور کبھی کسی
مرض کے بھران سے بھی نکسیر پھوٹتی ہے، دموی مزاج آدمیوں کو گرمی
یا ہار کے موسم میں بھی نکسیر آتی ہے۔

تشخیص و علامات : نکسیر آنے سے پہلے پیشانی پر بوجھ ہوا کرتا
ہے، کبھی ایک ٹپٹنے اور کبھی ددلوں سے
خون جاری ہو جاتا ہے، کبھی قطرہ قطرہ اور کبھی دھار بندھ کر خون بہتا ہے،
کبھی قطرہ قطری دیر کے لئے بند بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی بہت
دیر تک جاری رہتا ہے۔

علاج : جب تکسیر شروع ہو جائے، پیتھانی، گردن اور پشت پر سرد پانی یا برف لگانی چاہئے، اگر شدید بخار، سخت درد سر اور دماغ میں اجتماع خون یا دماغی اشخاص میں تکسیر پھوٹے، تو جب تک مریض غصہ اور کمزوری محسوس نہ کرے، اس وقت تک تکسیر کو بند کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے، کیونکہ یہ ان بیماریوں کا قدرتی علاج ہے۔

اگر مریض کمزور، بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو، اور اس کو تکسیر جاری ہو جائے، تو اسے فوراً بند کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، مریض کے سر پر سرد پانی کی دھار ڈالیں، اور سر پر برف پھرائیں، اڈرینے لین ہائیڈروکلورائیڈ نزار میں ایک طاقت کا روشن لیکر اس میں ردی کا بھایہ تر کر کے مریض کے جس تختے سے خون جاری ہو، ٹھونس دیں۔

اگر یہ نہ ملے، تو ٹینکیر فیرائی پر کلورائیڈ ٹینکیر سٹیل کا بھایہ ناک میں داخل کریں۔

پھیٹکڑی : اراتی ایک چھٹانک پانی میں حل کر کے ناک میں پچکاری کرنے سے بھی تکسیر بند ہو جاتی ہے، لیکن اڈرینے لین سب سے بہتر اور قوی حالبس الدم ہے۔

● رسل دایٹرولیم نزار میں ایک حصہ کا محلول لے کر اس میں ردی تر کر کے ناک میں ٹھونس دیں، قوی حالبس الدم ہے۔

نوٹ، یہ دوا بولس ڈرگ کمپنی کی تیار کردہ ہے۔
● ہائیڈروجن پراکسائیڈ میں ردی کی پھیری تر کر کے ناک میں

لگانا بھی مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔

نکسیر کے علاج میں ہمارا معمول

سب سے پہلے نکسیر کے مریض کے جس نکتے سے خون جاری ہو اس میں ایڈریسے انسوشن کا بیجاہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈریسے لین پیس طاقت ایک سی سی کا جلدی انجکشن کر دیا جاتا ہے۔ اور خوردنی طور پر کیسیم کلکیٹ ۲۰ گرین فی خوراک دن میں چار خوراک کھانے کے لئے دی جاتی ہیں۔

ہر قسم کی نکسیر اور دیگر جریان خون بند کرنے کے لئے بہترین اور مجرب علاج ہے۔ اکثر اس علاج سے مریض تندرست ہو جاتے ہیں۔ اگر نکسیر زیادہ جاری ہو، تو ایڈریسے لین انجکشن کرنے کے نصف گھنٹہ بعد "ڈٹامن کے" جس کا تجارتی نام کیپی لین ہے، ۲ سی سی کا عضلاتی انجکشن کر دیا جاتا ہے۔ اور ڈٹامن کے کی ایک ٹمکیہ صبح، دوپہر اور شام کو کھلائی جاتی ہے۔ ایک دن کے علاج سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ یہ نکسیر بند کرنے کا فوری علاج ہے۔ جو کئی سال کا تجربہ شدہ ہے۔

بعض آدمیوں کو معمولی گرمی میں پھرنے سے نکسیر جاری ہو جاتی ہے ان کو چاہئے کہ کیسیم کلکیٹ ۵ اگرین دن میں تین بار استعمال کریں۔ گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈی ترکاریاں استعمال کریں۔ اس مرض سے نجات ہو جائے گی۔

دواء الدم :- کا فور خالص ۲ ماشہ۔ کنڈر۔ افسیون۔ مرکبی سوختہ۔ شاد بخ ہر ایک ۹ ماشہ۔ کا غذ سوختہ۔ پیکرڈی بریاں۔ مازد۔ گلنار۔ دم الاخوین ہر ایک ایک ٹولہ۔

جملہ ادویہ پیس کر گویاں چنے کے برابر بنائیں۔ بوقت ضرورت گھسی کر

ناک میں ڈالیں، نکسیر کو فوراً بند کرتی ہے۔

نفوذ نکسیر، رکھتے، پیشکڑی بریاں، کاغذ جلا ہوا، تینوں ہوزن،

بارک کر کے ذرا سی دوائی بطور نسوار چڑھا لیں، خون نکسیر بند ہو جائیگا
کہر باغی، بہ کہر با حسب ضرورت سفوف کریں، مقدار خوراک ایک ناشہ ہمراہ
مرد پانی یا مشربت انجبار دیں، ایک دو خوراکوں میں جاری خون خواہ کہیں سے
آتا ہو، نیز کثرت حیض، بواسیر، زخم کا خون یا نکسیر وغیرہ فوراً بند ہو جاتی
ہے، خون بند کرنے کے لئے طب یونانی کی مسئلہ دوا ہے۔

اگر نکسیر کسی طرح بھی بند نہ ہو، تو ناک کے پچھے سوراخوں میں پلگ
کرنا پڑتا ہے، جو ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، بعض دفعہ علی سے
خون نکلنے کے مقام 5 cm سے 8 cm کو جلا دیا جاتا ہے، پھر نکسیر
ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتی ہے۔

دماغ کے "بھی خون کی انجمادی طاقت بڑھانے کے لئے استعمال کیا
جاتا ہے، مقدار استعمال ایک سی سی بذریعہ جلدی ٹیکہ روزانہ، اور خوردنی
طور پر دن میں چار گولیاں دیں، جریان خون خواہ جسم کے کسی حصہ سے ہو،
وزی فائدہ کرتا ہے۔

دو اسے نکسیر، رکشتہ صدف مردارید ۴ رتی، مرتبہ پیٹیا ۲، تور

ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار کھلائیں، جن کو بار بار نکسیر کی
عادت ہو، ان کے لئے ایک نفعہ کا استعمال بے حد مفید ہے۔
نکسیر کا انجکشن، ۱۰ سی سی ۲۵ فی صدی کا دریدی انجکشن
کریں، روزانہ ایک بار، چلتے کہ مرض بالکل رفع ہو جائے،

یہ بھی نکسیر بند کرنے اور دیگر جریان خون کو روکنے کے لئے بہترین تجرب
انجکشن ہے، خون کی رقت کو دور کر کے انجمادی طاقت کو بڑھاتا ہے۔

نکسیر کے مریض کو دھوپ میں چلنے، لکھنے، پڑھنے، آگ کے پاس بیٹھنے، گرم ترشش اور تیل کی کشتیاں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
 سرد اور ٹھنڈی ترکاریاں، خشک جو، تازہ دودھ، ساگ و انہ اور زرد میضہ غذا دینی چاہئے۔

نکسیر کا چٹکلا: ہر گل ارمنی دیکر ۲ تولہ لے کر ہار یک میں کر پانی ۱۰ کر مائے پر لپیپ کرنے سے بعض ادوات ذرا نکسیر بند ہو جاتی ہے۔
 دیگر: زکافور، ماشہ، صندل، سفید ۶ ماشہ، پانی میں پیس کر پیشانی پر صفت دکر نا نکسیر کے لئے مفید ہے۔

بعض ادوات شاذ و نادر نکسیر کے ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کو نکسیر کی زیادتی کی وجہ سے ضعف قلب اور خشکی شروع ہو جاتی ہے، ان کے لئے کورامین ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔
 اور کیسیم گلوکونیٹ ۱۰ سی سی یا ۲۰ سی سی فی صدی کا دریدی انجکشن بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

کوگو لین دیسیا ۵ سی سی یا ۱۰ سی سی کا عضلاتی انجکشن کرنا بھی نکسیر کو فوراً روکتا ہے۔ اور اس کی پھریری تو کر کے نختے میں داخل کرنی چاہئے۔
 ہیمو پلاسٹین ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کرنا بھی نکسیر کو روکتا ہے۔
 یاد رہے کہ اس انجکشن کے لگانے سے پہلے مریض کو گھوڑے سے بنا ہوا سیرم استعمال نہ ہو چکا ہو، ورنہ اس سے سیرم سیکس یعنی سیرمی بیماری پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

اکثر ناک کے اندر دنی حصہ ہی نکسیر کے خون بہنے کا مقام ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آخری حصہ سے بھی خون نکلنے لگتا ہے۔
 اگر خون آخری حصہ سے نکلتا ہو، تو جو پھریری ناک میں داخل

کی جائے، اسے مضبوط دھاگے سے باندھ کر ناک کے آخری حصہ میں داخل کر دینا چاہئے،
 نوٹ: بڑھاپے میں خون کا آنا خطرناک ہوتا ہے۔

نکسیر کی ہومیوپیتھک ادویات

آرنیکا $\times 6$: جب ہواٹ یا صدمہ کی وجہ سے نکسیر جاری ہو، تو بے حد مفید ہے۔

سبلا ڈونا $\times 6$: جب دماغ میں اجتماع خون ہو، دھوپ یا گرمی لگ جائے تو نکسیر جاری ہو، اور چہرہ سرخ ہو، تو مفید ہے۔

ہیمے میلے $\times 30$: نکسیر پھوٹنے اور ہر قسم کے جریان خون کو روکنے کے لئے تجرب ہے، پھیپہ تر کے نکتوں میں داخل کریں۔

فیرمافاس $\times 6$: جب کہ خون سرخ اور چمک دار ہو، خاص کر عیب بچوں کو نکسیر آئے۔

کالی فاس $\times 6$: سیاہ خون آئے، کمزور، نازک بدن، اور بوڑھے اشخاص کی نکسیر کو مفید ہے۔

فاسفورس $\times 30$: یہ بے پتہ اور حسین آدمیوں کی نکسیر کے لئے مفید ہے اور ٹانگ بھی ہے۔

اکونائٹ $\times 30$: موٹے نازے آدمیوں کی نکسیر جب کہ بے چینی، بھرا ہوا بخار اور خون زیادہ نکلے۔

نکس دامیکا $\times 30$: جبکہ بواسیر کا خون رک جانے کی وجہ سے نکسیر جاری ہو اور علی الصبح نکسیر ہے۔

نیزاگرکس، چائنا، سیپیا، کاربودنج، ٹیڈم ہال وغیرہ بھی مفید ادویات ہیں

نزلہ، زکام CORYZA CATARRAH

رکونا نزا اسٹڈ کٹار

مرض نزلہ، زکام چونکہ دماغی فضلات ناک کے سینوس نمبرین سے نزاوش پاکر خارج ہوتے ہیں، اس لئے ان کو سرکی بیماریوں کے ماتحت لکھ دیا گیا ہے۔ مفصل بیان اور مکمل علاج صفحہ ۱۷۷ پر ملاحظہ فرمائیں۔

ناک کی بواسیر POLYPUS NASI

وجوہات و تشخیص: اس مرض میں ناک کے اندر سفید، زردی مائل پیلید یا سرخ دگر مستہ سخت ریشہ دار بواسیر کی مانند پیدا ہو جاتا ہے۔ مرض اکثر زکام کا شکار رہتا ہے۔ مادف جانب سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مریض گنگنا کر ناک میں باتیں کرتا ہے، اگر مستہ بڑھ جائے، تو نعتنا ابھر کر چہرہ بے ڈول ہو جاتا ہے۔

علاج: اس مرض کا علاج عمل جراحی سے ہی ہو سکتا ہے۔ مستہ کو نزل سکوپ سے دیکھ کر چمچی زنا سپس سے پکڑ کر باہر کھینچ لیں، اگر نرم اور پیلید مستہ ہو، تو آسانی سے کھینچا جاسکتا ہے، اگر سرخ رنگ اور سخت ریشہ دار ہو، تو زنا سپس یعنی چمچی سے کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ جو عمل جراحی سے ہی ایک ماہر تجربہ کار ڈاکٹر نکال سکتا ہے۔

VERMES NASI

ناک کے کیرے

(اور میز نیرائی)

تعریف: اس مرض میں ناک کے اندر کیرے پیدا ہو جاتے ہیں۔
 وجوہات: ہر یہ مرض گندے اور کثیف آدمی جن کو زکام مزمن مرض پیش
 ہو۔ ان کے ناک میں کھپاں داخل ہو کر کیرے دے جاتی ہیں۔
 تشخیص و علامات: شروع میں مریض کے ناک سے سخت بدبودار
 اور ٹون آمیز رطوبت خارج ہوتی ہے۔ پھر اس
 میں کیرے بھی خارج ہوتے ہیں۔ اور یہ کیرے ناک کے اوپر کے حصہ اور
 دوسری ساختوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ کبھی دماغ میں پہنچ جاتے ہیں۔
 اگر کیرے زیادہ دیر تک رہیں تو ناک بھی بیٹھ جاتی ہے۔ آتشکی مریضوں
 کے ناک میں بھی کیرے پڑ جاتے ہیں۔

ردمن تارپین ایک ادنیٰ گرم پانی ۲۰ اونس

علاج

دونوں کو ناک کے کیرے میں پھکاری کہیں۔ اس سے خود بخود کیرے
 خارج ہو سکتے ہیں۔ اور جو باقی رہ جائیں۔ یازل کو پانی یعنی آلہ ناک
 میں سے دیکھ کر پانی سے کیرے کو نکال دینا۔
 اگر ناک کے کیرے ختم نہ ہوں تو ان کے جوڑے میں سے پانی نکال کر پھکاری
 کی جائے۔ اور پانی شہید ہوتا ہے۔
 پھر اسے پانی کے ساتھ لے کر بخار دینا۔
 نسخہ: اس کی ضرورت نہیں۔

ناک کے کیرے نکالنے اور ناک کے لئے اسیریت

ناک کی بدبو OZOENA (اوزینا)

تعمیر لیسٹ۔ اس مرض میں ناک سے سخت بدبو آتی ہے۔
 لیسٹ یا سنٹ۔ اس مرض زکام کے پرانے ہو جانے، ناک پر چوڑے
 ناک جاسٹ۔ پیچیک خسرہ، آتشک، کسی سردی چیز کے ناک میں داخل
 رہنا، خنک زری مزاج اور زخم وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔
 قوت شامہ نیل ہو جاتی ہے، ناک بند رہتی ہے
 ناک سے بدبو دار رطوبت نکلتی رہتی ہے، کبھی
 کبھی رطوبت کے خشک پڑ جانے پر چھپرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں،
 بعض اوقات یہ چھپرے جم کر ناک سے سانس آنے کو بند کر دیتے
 ہیں، مرض کے سانس سے بدبو آتی ہے، اکثر ناک میں کیرٹے پڑ جاتے
 ہیں۔ اگر آتشک کی وجہ سے ہو، تو ناک کی بڑی گل جاتی ہے۔
 علاج۔ اس مرض میں ناک کی صفائی لازمی ہے، نیم گرم پانی میں معمولی
 نمک ملا کر دھونا نہایت نافع ہے، یا پوٹاشیم پرمنگنیٹ نیم گرم پانی
 یا ملا کر بدبو دار کی گھیڑ یا بنوری پیکاری سے ناک کو دھوئیں۔
 روک ایسٹ پانی میں ملا کر ناک کو دھونا نافع ہے۔
 اور یہ ہے کہ پیکاری کر سہ وقت مریض کو منہ کھلا رکھنے کی تاکید کریں،
 تاکہ جو پانی ناک کے ذریعہ حلق میں گرے، وہ باہر خارج ہو جائے،
 مستحضر! اگرین، پروکین، اڈس، دونوں ادویہ کو ملا کر ناک
 میں اندر اندر ڈرا پھر ڈالیں، اور اوپر سے مدلی ناک میں ٹھونس دیں۔

روحن کدوناک میں ٹپکانا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔
 دوا میں اسے کی دو ٹمکیہ دن میں تین بار دینے سے اس مرض
 میں کافی فائدہ پہنچتا ہے۔

دو اسٹے پیش : ہر امت دھارا ایک قطرہ ، روحن شیریں ہم قطرہ ،
 باہم ملا دیں ، قطرہ قطرہ صبح و شام ناک میں ڈالیں ، پیش ناک سے
 بدبو آنا ، نزہہ زکام ، درد کان ، درد سر کے لئے مفید و تجرب ہے۔
 نیرل آئی ڈراپ : ہر یعنی ڈھن ۴ گرین ، پردکین ۵ گرین ، منقزل
 ۴ گرین ، گلبیرن ایک ادس۔

شیشی میں ملائیں ، بذریعہ ڈراپ ناک میں ڈالیں ، غارالافٹ چھینکیں ،
 کے لئے مفید ہے۔

مسٹول : یوسکیمفر ، یوسکیش ، منقزل ، کلورو پورٹل ، لیکو میڈ پیرامین
 یہ ایک سیٹینٹ دوا ہے ، اور سرخ رنگ کا مرکب ہے ، دو دن قطرے
 ناک میں ڈالیں ، نزہہ زکام ، سوزش ناک ، ناک سے بدبو آنا ، ناک بند
 ہوجانا کا مجرب علاج ہے۔

FOR EIGN

BODY IN THE

NOSE

ناک میں کچھ پیش جانا

رفارن باڈی ان دی نوز

تعاریف : اس مرض میں ناک کے اندر غیر جنس داخل ہو جاتی ہے
 وحمہ ہاست ، رچنا ، سٹریکی کے واسطے ، کوڑی کنکر ، چھوٹے ٹن ناک
 میں چپس جاتے ہیں ، کبھی جو تک یا کیرٹس بھی ناک میں چلے جاتے ہیں۔

اسباب :- عام طور پر یہ مرض بچوں میں پائی جاتی ہے۔ مکی اور لکھنؤ کے ڈھیر پر کھیلتے ہوئے اتفاقاً ناک میں چسپن جاتے ہیں۔
تشخیص و علامات :- ناک سے سانس کا آنا بند ہو جاتا ہے۔
 مریض ناک سے سانس لینے کی کوشش

کرتا ہے لیکن نہ آنے پر سخت بے تاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرف کے

نہنے سے ناک سہنی ہے۔
علاج :- غیر چسپن کو کسی فارسیس یا موحنے سے کھینچ کر نکال لیں مگر وہ چیز چمٹی سے نہ نکل سکے۔ تو ایک خاص قسم کا آئدہ ہوتا ہے۔ اس کو ناک میں داخل کر کے غیر چسپن کو خارج کریں۔ یا مخالف جانب کے نختے کو دبا کر نیچے کو کمیں کہ زور سے ناک مسکے۔ دو تین بار ایسا کرنے سے داخل شدہ چیز نکل جاتی ہے۔

اگر کوئی جاندار چیر پڑ گئی ہو، تو کلوروفارم سونگھا دیں۔ وہ چیز فوراً ہلاک ہو جائے گی۔ یا تو خود بخود خارج ہو جائے گی۔ یا فارسیس سے نکال لیں۔

بچے کو پشت کے بل لٹا کر اور نیچے کا منہ بند کر کے اپنا منہ ماؤف نختے پر رکھ کر پھونک ماریں، اور اس کے بعد فوراً مخالف نختے میں زور سے پھونک ماریں، ایک دو دفعہ ایسا کرنے سے داخل شدہ چیز نکل جاتی ہے، بعض اوقات سوار دیسے سے تھپتھپوں کے آنے سے بھی غیر چسپن نکل جاتی ہے۔

PAROXYSMAL

RHINOORRHOEA

(پرکسمل رینورریا)

نوبتی سہلان الف

وجوہات تشخیص :- اس مرض میں ناک سے غیر طبعی طور پر طوبت بہتی رہتی ہے

اور چھینکیں کثرت سے آتی ہیں، بار بار اس مرض کا دورہ پڑتا ہے، کبھی مہینہ بعد اور کبھی دس پندرہ دن کے بعد دورہ شروع ہو جاتا ہے، سردی لگنا، ٹکانا، ٹکر، تڑدو، دھواں گرو دھبار، تیز خوشبو وغیرہ سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں، عروق دمو بہ کو کھولنے اور سکیر نے والے اعصاب میں اندرونی فتور واقع ہو جاتا ہے،

علاج: اس مرض کے علاج میں کامل سکون اور آرام کرنا چاہئے، دھواں گرو دھبار، خوشبو یا ت مخرش دماغی، اشیا اور سردی سے کامل پرہیز کرنا چاہئے،
لنسخہ: ہر ایلی ڈرین پ گریں، فینوبار بیٹون پ گریں، اسپیرین ۳ گریں،

ڈورس پوڈر ۳ گریں

ایسی ایک ایک خوراک صبح و شام گرم دودھ یا چائے سے کھلائیں، تقویت دماغ اور جسمانی کمزوری کو رفع کرنے کے لئے سیٹامین... انا لیکر دگر آم، سرچہ تھنے دن عضلاتی انجکشن کرنا چاہئے، اس مرض کا تجرب علاج ہے،

میری المیہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، مندرجہ بالا نسخہ استعمال کرنے سے علامات فوری طور پر رفع ہو جاتی ہیں، اور بہت عرصہ بعد دورہ پڑتا ہے، ورنہ اس علاج سے پہلے ہر دس بارہ دن بعد چھینکیں شروع ہو جاتی تھیں، بہترین علاج ہے،

اگر ناک کا درمیانی کرمی وار پردہ ٹیرھا ہو، اوزین میں خرابی ہو، تو عمل جراحی کرنا چاہئے،

انٹی ہسٹامین ادویات کا استعمال بھی نا بیدہ کرتا ہے،

مرض نزلہ و زکام میں استعمال ہونے والی ادویات بھی اس مرض کے لئے مفید ہیں،

باب پنجم

منہ زبان حلق دانتوں اور مسوڑھوں کی بیماریاں

APHTHAE
THARUSH

منہ کے چھالے

(ایفٹھی تھرش)

تعریف : اس مرض میں منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے چھالے پیدا

ہو جاتے ہیں۔ جو اکثر یہ مرض شیرخوار بچوں کو ہوتا ہے۔ خاص کر دانت نکلنے

کے زمانہ میں اور بچہ کو بازاری دودھ پلانے اور بدھنمی سے ہو جاتے ہیں۔

اس مرض میں چھوٹے چھوٹے چھالے منہ مسوڑھوں

زبان، ہونٹوں اور رخساروں کے اندر پیدا ہو جاتے

ہیں۔ اردان کا رنگ سفید اور خاکستری ہوتا ہے۔ منہ میں سوزش اور درد

ہوتا ہے۔ منہ سے رال بہتی ہے۔ اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اور کبھی ساقہ

بخار بھی ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے بے چینی اور پیاس لگتی ہے کھانے

کو دل نہیں چاہتا۔ اور جب یہ چھالے مزمن ہو کر معدہ، آنتوں اور پاخانہ کے

سوراخ تک پہنچ جاتے ہیں تو کبھی قے اور دست آنے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔

علاج : اس مرض کے علاج میں منہ کی صفائی بہ حد ضروری ہے۔ بورک لوشن یا ایلم لوشن یا کاندی لوشن سے کلیاں یا غرارے کرائیں۔ سہاگہ بریاں (بورکیس) منہ کے چھالوں کا خاص علاج ہے۔ اس مرض میں ہاضمہ کو درست رکھنا اور قبض کا رفع کرنا ضروری ہے۔ رفع قبض کے لئے گلبشتیا سلفاس مقدار ۴ ڈرام، ایچوا ایکہ دو اونس میں ملا کر پلائیں۔ بچے کو کسٹریٹیل حسب عمر دیں۔

بورک گلیسرین، بورکیس، ۳ گرین، گلیسرین ایک اونس، باقم الاولیہ پھریری سے منہ کے چھالوں پر لگادیں۔ ایک دو دن میں منہ کے چھالوں کو ہٹ جاتے ہیں، منہ کی سوزش کے لئے مفید ہے۔ اگر بڑے آدمی کے منہ کے اندر چھالے ہوں، تو دھبیا کے لئے مسٹی بھر تھوڑے تھوڑے کر کے چبا دیں، اور لعاب نیچے گرائے جائیں چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔

اگر چھالے منہ میں ایک یا دو ہوں، اور سفید رنگ کے ہوں۔ اور ان کا زخم اچھا نہ ہوتا ہو، تو اس پر سلوڑنا کسٹریٹ لگانا چاہئے، اور اوپر بورک گلیسرین لگادیں، ایک ہی دفعہ کے لگانے سے آرام ہوگا۔ دوائے قلاع، برکتہ، طباشیر، قلعی سٹومہ، کافور، الہی خور، سنگ جراح ہر ایک مساوی وزن، سفوف بنا دیں بچے کے منہ میں چھڑک لیں اور مال بنے دیں۔

منہ پکنا، چھالے نکلنا، زبان کا پھول جانا، امراض لب و لسان

وغیرہ کے لئے ازیس مفید ہے۔

طبی چٹکلا : زبانی کی جڑ سفوف بنا کر منہ میں ڈر کر دیں، منہ کے چھالوں کے لئے مفید ہے۔

اکسیری دوا ۱۔ کتھ سفید اتلہ ، گبر د اتلہ ، پھٹکڑی سفید ۶ ماشہ
کا فور ۳ ماشہ ، نیلہ عقوقھا ۲ رتی ،

جملہ دواؤں کو باریک پس کر رکھ لیں ، اور منہ میں دھوڑا دیں ،
منہ ، زبان ، ہونٹ پر چھالے خواہ کسی وجہ سے پڑے ہوں ، اس کو پانی
میں ملا کر غارے کرنے سے رفع ہو جاتے ہیں ،

اگر منہ کے اندر چھالوں کی سفید تہ جی ہوئی ہو ، تو ایسی حالت میں
دوائی پانی میں حل کر کے ، دئیے سے آہستہ آہستہ منہ کو صاف کریں نیم گرم
ساروہ پانی کے غارے کریں ، ہر قسم کے چھالے ، منہ پکنے کا مرض دور
ہو جائیں گے ، بہترین دوا ہے ، تجرب ہے ،

چٹنگمہ ، نیلہ عقوقھا بیاں بقدر ایک ماشہ ایک سپر پانی میں حل کر کے
اس سے غارے کرنے سے ہر قسم کے منہ کے چھالے رفع ہو جاتے ہیں
دوا سے آکلہ ، اکثر بچوں کے منہ کے اندر ایک چھالا سانکلتا ہے ، جو
مسوڑھوں اور رخساروں کو اندر کی طرف سے کھانا شروع کر دیتا ہے ، اور
باہر سو داخ ہو جاتا ہے ، اور بہت سخت بدبو آتی ہے ، زخم صاف کر کے
صرف روغن تارپین لگا دیں ، دن میں دو بار

خواہ کسی طرح کا زخم ہو ، چند دنوں میں آرام ہو گا ، اور اندر دلی طور پر
سلفو سٹا کیڈ حسب عمر دیں ، ہمراہ آب ،

بعض اوقات سنگرہنی کی وجہ سے منہ میں چھالے پیدا ہو جاتے ہیں
ان کے لئے سنگرہنی کا علاج کریں ،

کو میو پیمچی علاج

کالی میو ۶۸ ، اس مرض کی کامیاب دوا ہے ، چند دفعہ کے استعمال سے

منہ کے چھالے رفع ہو جاتے ہیں۔

لشخہ ہر کالی میور، فیرم فاس ہر ایک پانچ پانچ گرین، ایک اونس پانی میں ملا کر غارے کرائیں، منہ کے چھالوں کے لئے بہت فیر لشخہ ہے۔

کالی میور، گلیسرین میں ملا کر بھی منہ میں لگائی جاسکتی ہے۔

مرکیوری ایس ۳۰ منہ کے چھالوں کے لئے اکسیر ہے۔ دن میں دو تین دفعہ دینا فائدہ کرتا ہے۔

بیلٹا وٹوٹا ۳۰ منہ میں سفید چھالے، درم گلو متورم، حلق خشک اور سرخ ہو، تو مفید ہے۔

اکونائٹ، کالی بانی کروٹیکم بھی مفید ادویہ ہیں۔

منہ آنا STOMA TITIS (سٹوٹے ٹائٹیس)

تعریف ہر اس مرض میں منہ کی اندرونی جھلی سرخ ہو کر متورم ہو جاتی ہے۔

وجوہات ہر منہ، حلق، ناک کی سوزش، بد معنی، بچوں میں دانت نکالنا، سرخ بخار، خسرہ، بلیریا بخار اور مرض سبل کے آخری درجہ میں یہ مرض ہو جاتا ہے۔ کھاری، تیز اور چربی چیزوں کے استعمال سے منہ میں خارش ہونا، پارہ ہستگرت کا استعمال اور سگریٹ ملنا اور زیادہ مرج، گرم مصالح اور گرم گرم غذا کا کھانا، کسی خشک دانت سے مینہ میں زخم ہو جانا۔

تشخیص منہ کے اندر مسوڑھوں، رجناروں اور لبوں کی میو کس ممبرین کا بدار جھلی متورم اور سرخ ہو جاتی ہے۔

ھتوک کثرت سے آتی ہے اور منہ سے پانی بہتا ہے، سانس سے بدبو آتی ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، اور زبان بھی تدرے سرخ ہو جاتی ہے، اور کبھی رخسارے بھی سوخ جاتے ہیں، اور آخر میں منہ میں چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں۔

علاج: اس مرض میں جس سبب سے منہ میں خراش پیدا ہوئی ہو، اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔

دافع تعفن انٹی سپٹک ادویات سے غرارے پاکیاں کرائیں عام طور پر بورک لوشن، کانڈی لوشن، ایلم لوشن مفید ہوتا ہے۔
نسخہ: برٹینک ایسڈ ڈرام، گلیسرین ایک اونس، باہم ملا لیں، پھریری سے منہ میں لگائیں۔

نسخہ: برساگہ بویاں، ڈرام، شہد ۴ ڈرام، باہم ملا لیں، پھریری سے منہ میں لگانا اس مرض کے لئے مفید ہے۔

نیز منہ کے چھائے کے بیان کی ادویات اس مرض میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔

نسخہ: کاربالک ایسڈ لیکو بیڈ ۵ منم، پانی ۴ اونس میں ملا کر مریض کو کلیاں کرائیں، منہ کے زخموں کے لئے بے حد مفید ہے۔

دوا سے غرغره: پوٹاسیم کلورائیڈ ڈرام، ٹینکچر مرہ ایک ڈرام، گلیسرین ۴ ڈرام، عرق گلاب ۵ اونس، یہ ایک شیشی میں باہم ملا کر رکھ لیں، ترکیب استعمال: ہر ایک اونس دوائی مذکور لے کر دوا دس گرم

پانی میں ملا کر غرغرے پاکیاں کرائیں، منہ کے زخموں کو رفع کرنے میں عجیب اثر اور مجرب ہے۔

انکسیر قلاع العظم: برطاشیر، کتھ، مغز کنول گٹھ، دانہ الائچی خوردہ،

کتاب حبشی . زہر مہرہ . گہل ارمنی ہر ایک ایک ٹولہ ، کافور ۲ ماشہ
سب کو بار یک پیس کر منہ کے زخموں پر چھڑکیں ، منہ کے چھالوں
اور زخموں کے لئے اکسیر ہے ،

بعض مریضوں کے منہ میں خطرناک قسم کی سوزش ہو جاتی ہے ، جس سے
ایک رخسارے میں دم ہو جاتا ہے ، اور وہ زخم من کر گسٹ گرین کی صورت
اختیار کر لیتا ہے . اور وہ جگہ مردار ہونی شروع ہو جاتی ہے ، اور گہلی کر
جھڑنے لگتی ہے .

اس کے علاج میں زخم پر کاربائلک الیڈ خالص پھریری سے لگانا
چاہئے . تیزاب ستورہ بھی لگایا جاسکتا ہے .

دن میں تین چار دفعہ بورک نوشن یا ہائیڈروجن نوشن سے شروع کرے
کر لئے جائیں . اور بعد میں روغن تارپین کی پھریری لگائیں . یا آبل پوکلیش
لگانا بھی مفید ہوتا ہے .

اس مرض میں کمزوری بہت لاحق ہو جاتی ہے . اس لئے مریض کو
مقوی ادویات ایسٹن سیرپ ، فیواؤز سیرپ اور کوئین کچیلہ اور فولاد
کے مرکبات اس مرض میں مفید ہیں .

بعض مریضوں کے منہ میں سفید زخم پیدا ہو جاتے ہیں . اور ان کا
سبب ایک پھیپھو مذی ہوتی ہے . یہ زخم گوشہ دہن اور لبوں کے اندر
ہوتے ہیں .

اس زخم کو بھی غم گرم بورک نوشن سے صاف کرنا چاہئے . اور منہ
کے چھالے کی تمام ادویات اس کے علاج میں استعمالی کی جاسکتی ہیں . اور
مندرجہ ذیل نسخہ بے حد مفید ہے .

دو آنہ قلعہ زر قلی ستورہ . کھنڈ سفید . الابھی خورد گہل سرخ .

ہر ایک ۴ ماشہ ، کافور ۲ ماشہ ، نیلہ مختلقتا سنبر بریاں ۱۰ ماشہ ،
 تمام ادویات کو باریک پس کر منہ کے اندر چھڑکیں ، دن میں دو
 تین بار ۔ پھالوں کے لئے نہایت مجرب ہے ۔
 اگر پارے کی وجہ سے منہ میں چھالے ، سوج اور دم آگیا ہو ، تو
 پارے کا استعمال بند کر دیں ، اور سیڈائن کمپور کا جلاب دیں ،
 نسخہ : ہر گینشیا سلفاس ۴ ڈرام ، ایکوا ۲ ادنس ، دن میں دو تین
 مرتبہ ملائیں ، دو تین دست آجائیں گے ۔
 نسخہ غرغزہ : ہر پشکری بریاں ۶ ماشہ ، پانی ایک پاد میں ملا کر غرغزے
 کرائیں ، پارہ سے منہ آنے کو مفید ہے ۔
 نسخہ : ہر بیری کی جڑ کی چھال ، کیڑی کی جڑ کی چھال ، کینار کی جڑ کی چھال
 ہر ایک تولہ تولہ ، ایک سیر پانی میں جوش دیں ، ٹھنڈا کر کے دن میں تین
 چار مرتبہ غرغزے کرائیں ۔
 اگر اس میں اتلہ پشکری بریاں ملا لیں ، تو یہ نسخہ اور بھی مفید ہو جاتا
 ہے ، انڈے کی سفیدی اور دودھ باجم ملا کر دیں ۔
 نسخہ : ہر پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۵ گرام ، سوڈا سلفاس ۱ ڈرام
 سپرٹ ایوینا ایردم ۳۰ منم ۔ سپرٹ کلوروفارم ۱۰ منم ، ایکوا مختلاپ
 ایک ادنس ۔
 ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں ۔
 پارہ کی وجہ سے منہ کے تمام عوارضات منہ کے چھالے ، منہ آنا وغیرہ
 میں مفید ہے ۔
 ٹینک گلیسرین کا منہ میں لگانا بھی مفید ہے ۔

منہ سے بدبو آنا FETOR ORIS (فیٹر اورس)

تعریف : اس مرض میں منہ سے بدبو آتی ہے۔

وجوہات : اس مرض کا سب سے بڑا سبب ماسخوردہ یعنی پائیدار یا ہے
اور کبھی پیمپروڈ کے زخم سل کے آخری درجہ میں بھی بدبو آنے لگتی ہے
معدہ اور رحم میں متعفن خصلوں کا جمع ہونا، نرسن، پیاز، ہولی اور دیگر وغیرہ
کھانے سے بھی منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔

تشخیص : مریض کے منہ اور سانس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ پاس
بٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔

علاج : اس مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کریں۔

اگر ماسخوردہ کی وجہ ہو، تو ماسخوردہ کا علاج کریں۔ اس کے بیان میں ملاحظہ
فرمائیں، اگر سل کی وجہ ہو، تو سل کا علاج کرتنا چاہئے، اگر باطن کی
خرابی ہو، تو یہ نسخہ مفید ہے۔

نسخہ : روز شادہ، فلفلدرا، الچی سفید ہر ایک مساوی الوزن، باریک
سغوف تیار کریں، معتدلاً خوراک انارشہ غذا کے بعد دن میں دوبارہ۔

سرطان لب CANICER OF THE LIP (کنیسر آف دی لب)

تعریف : اس مرض عموماً پختہ لب پر ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے
لب سخت اور سیاہ ہو کر موٹا ہو جاتا ہے، اور اندکی طرف جڑیں ہو جاتی ہیں

اسباب اور یہ مرض ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو مٹی کے بنے ہوئے
چھوٹے مٹھنے پیتے ہیں۔ اس کے بار بار پینے سے لب پر خراش پیدا ہو کر
سرطان کی تشکک اختیار کر جاتا ہے۔
یہ مرض عموماً پیدائشی ہوتا ہے جو بڑے ہو کر بڑھنے لگ جاتا ہے
اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

تشخیص و علامات
ہونٹ بڑھ کر سخت ہو کر متورم ہو جاتا ہے،
جو بڑھتے بڑھتے ایک خبیث پھوڑا بن جاتا
ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو گردوں کے غدد پھول کر کانٹھیں
پیدا ہو جاتی ہیں اور بچے جبراً کو مرض میں مبتلا کر کے زہریلا اثر پیدا
کر دیتا ہے جو ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔
علاج: اس کا علاج عمل جراحی سے کیا جاوے، سیاہ لب کو
کاٹ کر نکال دیا جائے، تو اکثر آرام ہو جاتا ہے۔

ہونٹ کا پھٹنا CRACKED LIPS

(کرکڈ لپس)

تعریف: اس مرض میں ہونٹ متورم ہو کر ان سے خون نکلتا رہتا ہے
وجوہات: سردی لگنا، گرد و غبار، اوسے پڑنا، ٹھنڈی جگہ سے
بک بخت گرمی میں آنا۔

تشخیص و علامات
یہ مرض عموماً موسم سرما میں ہوا کرتا ہے جبکہ
سردی کی راتوں میں لگتا یا اوسے پڑتی ہے تو
یہ مرض عام دکھائی دیتا ہے، ہونٹوں سے خون نکلتا ہے۔ درد اور خراش
کی شدت، کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے۔

علاج ہر مقام مادف پر چربی یا دیرین لگانیں، سینڈک کی چربی متورم
لب کو فوراً آرام بخشتی ہے۔

سلورنا سٹریٹ کے ملکہ لوشن سے دھونا بھی نہایت مفید ہے۔
روغن گل میں سفید قوم ملا کر لگانا نافع ہے، اگر قبض ہو تو قبض رفع
کریں، اور مقام مرض پر پینسلین آئٹمنٹ لگانیں، دن میں دو تین بار لگانے سے
آرام ہو جاتا ہے، سبازول آئٹمنٹ لگانا بھی مفید ثابت ہوتا ہے،
اگر بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسیاں اور چھالے نکل آئیں، ہونٹ پھیٹ
گئے ہوں، تو روغن گادو گرم کر کے مقام مرض پر لگانا فائدہ کرتا ہے، سفیدی
بیشہ مرغ کو گل روغن میں ملا کر لگانا بھی نافع ہے، کھن میں قدرے کافور
ملا کر لگانے سے جلن، سوزش اور زخم کو آرام آ جاتا ہے۔

HERPES LABI
ALIS

ہونٹوں کے چھالے

(ہرپزیلیسی ایلیس)

تعریف ہر اس مرض میں ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے چھالے نکل آتے
ہیں۔

اسباب ہر یہ مرض پیچھے، جگر اور معدے کی خرابی سے پیدا
ہوتی ہے، شدید بخار، سردی لگنے اور خواش سے بھی ہو سکتی ہے۔

تشخیص و علامات اس مرض میں کبھی دونوں لب اور کبھی
کے لب پر چھالے نکلتے ہیں، جن پر

خارش ہوتی ہے، رات پہ دن میں سبید رہتا ہے، دھندلی دیتی ہے۔

جو جسد ہی پیپ کی صورت اختیار کر کے زخم بنا دیتی ہے، ہونٹ قدرے سوچ جاتے ہیں، جس سے مرین کو بولنا، کھانا، پینا و ستار ہو جاتا ہے۔
علاج: ۱۔ متورم لبوں پر زنگ آئرنمنٹ لگائیں، بارورک چھڑکیں
 اگر قبض ہو، تو رات کو ۵ گرین کیلومل کھلا کر صبح کو نمکین مشہل

دیں۔ متورم زخموں پر پینسلین آئرنمنٹ لگانا فوری اثر کرتا ہے۔
 سبازول کی وٹکیہ بار یک پیس کر، اگرین بورک ایسڈ ملائیں، زخموں
 پر اس کو چھڑکیں۔

ہنایت مجرب سفوف ہے۔
 سنگ جراحات کا سفوف چھڑکنا بھی فائدہ کرتا ہے۔
 اگر منہ اور ہونٹوں پر سٹریچر کوکل، سٹیفلو کوکل یا گونو کوکل جراثیم کی وجہ سے سوجن
 اور چھالے ہوں، تو یہ نسخہ جات ہنایت مفید و مجرب ہیں۔
 ۱۔ پینیسلین پر دیکھیں ۴ لاکھ یونٹ کا عضلاتی انجکشن کریں، دوسرا
 انجکشن ۴ گھنٹہ بعد کریں، ایک دوا انجکشنوں سے ہی تمام علامات رفع ہو جائیں گی
 ۲۔ سلفا ڈایازین پہلی خوراک ۴ ٹکیہ دیں، پھر سچو تھے گھنٹہ
 بعد دھکیہ دیں، منہ کی تمام عفونی امراض کے لئے مجرب ہے۔
 ۳۔ پینیسلین کی لوز بخرجو سے سننے والی ٹکیاں بھی اس مرض کے
 لئے مفید و مجرب ہیں، ہر دو گھنٹہ بعد ایک ٹکیہ منہ میں رکھ کر چوسائیں
 بے حد مفید ہیں۔

پلاؤ فارم (ساختہ میسکیر)
 یہ منہ میں رکھ کر چوسنے والی ٹکیاں ہیں، منہ کی سوزش سوجن
 درد وغیرہ کے لئے مفید ہیں۔

دانتوں کی بیماریاں

درد دانت ^ط (ٹوٹھیک) TOOTHACHE

وجہ بابت درد دانت کا خواب اور بوسیدہ ہونا، کیراگنہ، بد ہضمی، دانت کی جڑ میں درد ہونا، سرد، بیٹھی، کھٹی چیزوں کا زیادہ کھانا، مسواک وغیرہ نہ کرنا، پارہ کا استعمال کرنا اور حاملہ عورتوں کو حمل کے دوران میں طبی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

دانت میں سخت درد ہوتا ہے، مسوڑے سوج جاتے ہیں
تشخیص اور منہ پر سوج ہو جاتی ہے، کبھی رخسارے اور جبرٹے پر بھی دم آجاتا ہے، منہ پلارنے سے درد میں شدت ہوتی ہے۔

علاج زراکسیر مسکن، کلرل ہائیڈریٹ ۴ ماشہ، کافور ۴ ماشہ
کوکین یا پردکین ۴ رتی۔

سب دواؤں کو شستی میں ڈال کر گرم کریں، چل ہو جائیں گی، مقام درد پر پھریری سے لگائیں، درد دانت نیز دوسرے زہریے جانوروں کے کائے کے لٹھ کو ناکل کرتا ہے۔

درد بند: اگر داڑھ میں سودا خ ہو، تو اس میں قدرے افیون ڈال کر گرم سلاخ سے افیون کو پگھلا دیں، لیکن سودا خ کو پہلے صاف کر لیں۔ درد دانت فوراً بند ہو جاتا ہے، اور کافی عرصہ تک آرام رہتا ہے۔

لشعہ عجیب در بارہنگ حسب ضرورت اس کی چھ چھ مانتہ کی پوٹلیاں
بنادیں۔ ٹھوڑے سے پانی کو گرم کر کے ان پوٹلیوں کو پانی میں ڈال دیں
جب پوٹلی گرم ہو جائے تو درد والے دانت پر ٹکوا کر دیں۔
درد دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔

جسٹکس: کلوروفارم خالص یا سپرٹ کلوروفارم کا بھاریہ تر کر کے ماؤف
دانت پر لگائیں۔ فوراً درد بند ہو جائے گا۔

نیز کر بازوٹ: ابھتر روغن لونگ۔ روغن دارچینی کسی ایک دوائی
میں روئی تر کر کے دردناک دانت میں لگانا بے حد مفید ہے۔

دوائے درد دانت: ٹیکچر آئیوڈین، ٹیکچر اکونائٹ ہر ایک
مسادی وزن باہم ملا کر چھری سے دانت پر لگائیں، اگر مسوڑے
درد کرتے ہوں یا سوزش ہو تو بے حد مفید ہے۔

اگر گنٹھیا کے سبب دانت میں درد ہو تو گنٹھیا کا علاج کرنا
چاہیے جس کے لئے سوڈا سیلی سلاس، اگر بن دن میں تین خوراک
ریں۔

اگر باسے کے استعمال کی وجہ ہو تو پارہ کا استعمال بند کر دیں،
پوٹاسیم آئیوڈائیڈ ۳ گریں، ایچا ایک ادس، دن میں تین خوراک میں
لشعہ در کشتہ ۶ ماشہ، افیون ۲ ماشہ، گل روغن ۲ تولہ میں حل کر کے
دانتوں پر ملیں، دانتوں کے شدید درد کے لئے نہایت مفید ہے۔

دیگس اینک گرم کر کے وارم میں دبانے سے کیرٹے کی وجہ سے ہونے
والی درد وارم کو فوری تسکین ہوتی ہے۔

دیگس: معرقہ کا سفوف بنا کر دردناک دانت پر ملنے سے درد
کو فوراً آرام ہوتا ہے۔

موتی معجنہ : پشکڑی بریاں ۱۰ تولہ ، بازو ۲۰ تولہ ، سپاری ۲۰ تولہ ، کھنڈ
سفید ۲۰ تولہ ، مصطکی رومی ۲۰ تولہ ، خون سیاہ و شال ۲۰ تولہ ، کافور ۲۰ ماشہ
ست اجوائن ۱۰ ماشہ ، ست پودینہ ۱۰ ماشہ ۔

سب کو خوب باریک پس کر معجنہ بنادیں ، اور روزانہ استعمال کریں :
درد دانت ، مسوڑھے پھوٹ جانا ، کیرا لگنا ، پانی لگنا ، دانت کھٹے ہونا
وغیرہ عوارضات کے لئے جرب انجرب ہے ۔
دب گرا : داڑھ درد پر امرت دھارا لگانے سے فوراً آرام آ جاتا ہے ۔
سنخہ تجرب : ارکار باک ، ایڈا ڈرام ، سپرٹ رکٹیفائیڈ ، ڈرام ،
بانم ملا کر شیٹی میں ڈال لیں ، جھوٹا سا پچایہ دوائی میں ذکر کے
سوراج میں بھر دیں ، دانت کی شروع ہو سیدھی اور درد دانت کے لئے
بے نظیر نسخہ ہے ۔

سنون عجیب : پشکڑی ۸ تولہ ، سفید عرق ۳۰ ماشہ ، انیسون
۳۰ ماشہ ۔

ادل مٹی کا پیالہ لے کر آدمی پشکڑی نیچے پھر اس کے اوپر سفید عرق
اس کے اوپر انیسون پھر آدمی پشکڑی اوپر رکھ دیں ، نیچے آگ جلا دیں جب
پشکڑی کھیل ہو جائے ، تو اتار لیں ، اور پس کر محفوظ رکھیں ، صبح و شام
دانتوں پر ملیں ۔

درد دانت کیرا لگنا ، خون آنا وغیرہ امراض دنداں کے لئے مفید
و مجرب ہے ۔

اکسیر درد دانت : فلفل سیاہ ، طاقتور حار منقہ ، زنجبیل ہر ایک ۱۰ تولہ
گل ارغنی ۱۰ تولہ ، باریک پس کر دانتوں اور مسوڑھوں پر ملیں
درد دانت ، مسوڑھوں کی سوزش اور درد کے لئے مفید ہے ۔

دانتوں کی اہمیت :-

دانت جسم انسانی میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ غذا کا کھانا، چبانے، انہیں پر منحصر ہے۔ اور یہ سلا مضمون انہیں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور غذا کو اس قابل بنادیتے ہیں کہ معدہ یا سانی مضمون کر سکے۔ اور یہی غذا جزو بدن ہو کہ جسم کی پرورش کرتی ہے۔ دراصل تندرست زندگی ذات مضمون کے فعل پر ہے اور مضمون کا فعل دانتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو درست حالت میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ بیمار ہوں گے۔ تو ان کی بیماری کا اثر غذا میں مل کر تمام جسم کو بیمار کر دے گا۔ اس لئے شروع ہی سے ان کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اور بچوں کو بھی دانت صاف کرنے کی تہنیت کرنی چاہئے۔ کیونکہ جب کوئی اعضا ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اصلی طبیعی حالت پر آنا مشکل ہے۔

میں نے کئی بچے دیکھے ہیں کہ جن کے دودھ کے دانت گرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دانت اکھاڑنے ضروری ہیں۔ اور وہ دانت اوپر اسی طرح رہتے ہیں۔ اور نئے دانت پڑھنی شکل میں نکل آتے ہیں۔ دانتوں کی خوب صورتی زایل ہو جاتی ہے۔ اور منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ بچوں کے دانت اکھاڑنے کے زمانہ میں خیال رکھیں۔ اور جب دانت اچھی طرح پلنے لگیں۔ تو نکال دیں۔ تاکہ دانت سیدھے اور اچھی طرح نکل آئیں۔

بوزانہ دانتوں کو مسواک سے صاف کرنا چاہئے۔ کھانا کھانے کے بعد کلی کر کے دانتوں کو صاف کر دینا چاہئے۔ بہت سرد یا گرم کھانا، پینا اچھا نہیں۔ برف کے چبانے، شراب، پان اور تبا کو نوشی سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔

اکسیر درد وارٹھہ در پھشکڑی سفید بریاں ۲ تولہ ، مرچ سیاہ ۱۰ تولہ ،
 گیرد اتولہ ، نیلہ عتو تھا ۶ ماشہ ، کافور ۳ ماشہ ،
 تمام درادوں کو باریک پیس کر مسوڑھوں بنالیں ، بوقت ضرورت دانتوں
 اور مسوڑھوں پر ملیں ، وارٹھہ درد اور مسوڑھوں کی لاثانی دوا ہے ،
 امراض دندان کی اکسیر دوا در مرکی اتولہ ، دارحینی اتولہ ، قتر نفل
 اتولہ ، عطر قرھا اتولہ ، نیلہ عتو تھا سفید بریاں ، اتولہ ، افیون خالص اتولہ ، مازہ
 ۳ ماشہ ، پوست بول تازہ ۵ تولہ ، کافور اتولہ ، مائیں ۳ ماشہ ، پھشکڑی
 ۳ ماشہ ، الیڈ کاربالک لیکوئڈ ۱۲ تولہ ، سپرٹ رکٹیفڈ ۲ دس
 سب ادویہ کو پیس کر شیشی میں ڈال دیں ، تین دن کے بعد ٹھکر کریں
 بوقت ضرورت ردی کا پھایہ تر کر کے دانت اور مسوڑھوں پر لگا دیں ،
 امراض دانت اور مسوڑھوں کے لئے مجرب ہے ،

امرت دھارا

کافور ۲ تولہ ، ست اجوائن اتولہ ، ست پودینہ اتولہ ،
 ایک شیشی میں ملا لیں ، روغن ہو جائے گا ،
 مقام ناف پر ردی کا پھایہ تر کر کے لگائیں ، دانت کا درد فوراً
 دائل ہو جائے گا ،
 برائے مضبوطی دانت ،
 مسوڑھ کی پٹیاں ، باڑنگ ، کتاب حینی ، جھاڑ کی چھال ، ہر ایک اتولہ
 لے کر ایک چھٹانک پانی میں جوش دیں ، جب تیسرا حصہ باقی رہ جائے ، تو
 نیم گرم سے کھیاں کریں ،
 دانتوں کے درد کو دور کرتا اور دانتوں کو مضبوط کرتا

درد دانت کا ہو میو پیمنٹی علاج

مرکبوری ایس ۳۰ بہت ہی فائدہ کرتی ہے۔
 سفوفیت سے جب سانس اور غٹوک سے بدبو آئے، اگر اس سے
 فائدہ نہ ہو، تو پینٹیکو درٹیکر دیں۔
 اگر گرم چیز کھانے سے تکلیف ہو، تو کیو میلا ۳ دیں، اگر دانت
 نکالے جانے کے بعد درد ہو، تو آر ٹیکا ۳۰ دیں۔
 گنیشیا ٹاس ۶ x روزانہ چار خوراک درد دانت کے لئے مفید ہے۔

دانتوں پر میل جمع ہو جانا TAR TAR

ٹار ٹار

تعریف ہر اس مرض میں دانتوں پر میل جمع ہو جاتی ہے، اور دانت
 بد رنگ ہو جاتے ہیں۔
 وجوہات ہر دانتوں کا صاف نہ کرنا، معدہ کی خرابی اور دائمی قبض
 سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

تشخیص و علامات دانتوں کے اوپر اور جڑوں میں بھورے رنگ کی
 میل جمع ہو جاتی ہے، اور دانتوں کا رنگ خراب
 ہو جاتا ہے۔ خاص کر دانتوں کی اندرونی سطح پر میل جمع کر مواد کی شکل
 اختیار کر جاتا ہے، جو کئی امراض کا پیش خیمہ بنتا ہے۔
 سرد دانتوں کو نرم مسواک سے صاف کرنا چاہئے، کھانا
 علاج کھانے کے بعد خوراک کے تمام ذرات دانتوں کے خلاؤں
 سے نکال دینے چاہئیں، اگر میل زیادہ جمع گئی ہو، تو دانتوں کو کسی

دندان ساز سے صاف کر لینا چاہئے۔ تمام جسم کی صفائی کی طرح دانتوں کی صفائی نہایت ضروری اور اہم چیز ہے۔

GINGI
VITIS

مسورھوں کی سوجن

دبھی وائٹس

تعریف : اس مرض میں مسورھوں میں سوج ہو جاتی ہے۔ وجوہات ہر دانت کی خوابی، کمزوری، مادہ آتشک، ششادیر، سکر دی وغیرہ، پارہ کا کھانا، بچوں میں دانت نکالنا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

تشخیص : مسورھے متورم ہو جاتے ہیں، اور ان میں درد ہوتا ہے۔ کبھی اس وجہ سے تشیخ، پھیپھڑوں میں درم اور دماغ میں بھی درم ہو جاتا ہے۔

بچوں میں مسورھوں کی سوزش سے دست آنے لگتے ہیں۔

اصل سبب مرض کو معلوم کر کے علاج کریں، اگر

علاج : قبض ہو، توجہ فرم کریں۔

دوائے جھرت ہر لائیکوار آر سی سی کیس ۲ ڈرام، ٹیکو آف اپیکاک ۲ ڈرام، بذریعہ پھریری دن میں تین بار مسورھوں پر لگائیں مسورھوں کی سوجن کے لئے بے نظیر نسخہ ہے۔

بچوں میں جب دانت نکل رہے ہوں، تو متورم مسورھے پر

خشکاف دینا ہی بہتر ہے۔

بچوں کے دانت نکلنے کے زمانہ میں نمک اور شہد ملا کر مسوڑھوں پر لگانے سے بچہ دانت آسانی سے نکال لیتا ہے اور مسوڑھوں کی سوزش کم ہو جاتی ہے۔

اگر کوئی دانت خراب ہو جائے تو اسے نکلوا دیں، اگر آتشک یا خنازیر، سکر دی یا میاب کھانے کی وجہ سے ہو، تو ان امراض کا

علاج کریں، ٹینک ایسڈ ۵۰ گریں، عرق گلاب نسخہ ۱۰۰، ٹینکچر مرہم ڈرم، ٹینک ایسڈ ۵۰ گریں، عرق گلاب ۱۰۰، ادنیس، سب کو ملا لیں، اور پھر بری سے مسوڑھوں پر لگائیں، یونانی نسخہ ۱۰۰، دھینا، سپاری، سماق، صندل سرخ، گلنار، حب الہس، مسور، کو ہر ایک یا بچ یا بچ ماشہ۔

سب کو آدھ سیر پانی میں جو ش دیں، اور دن میں چار دفعہ کلیاں کرائیں۔

بہر اس مرض میں دھامن سی کا استعمال بے حد مفید ہے
تفصل مرض سکر دی کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔

ماسخورہ PYORRHOEA (پایوریا)

تعریف: اس مرض میں مسوڑھے متورم ہو جاتے ہیں اور ان سے پیپ آئے لگتی ہے۔

وجہ ہاست: منہ اور دانتوں کی صفائی نہ کرنا، دانتوں پر میل جم جانا، کھانا کھانے کے بعد غذا کے ذرات دانتوں کے خلا میں پھنس جانا،

اور متعفن ہو جانا۔ گنتھیا اور فقرس کے مریض اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

ابتداء میں اس مرض میں مسوڑھے پھول جاتے ہیں اور ان سے جریان خون ہوتا ہے، مسوڑھے گلنے شروع ہو جاتے ہیں، پیپ خارج ہونے لگتی ہے اور دانتوں کی جڑیں نیکی ہو جاتی ہیں، آخر گلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بوسیدہ ہو کر گرے لگتے ہیں، منہ اور سانس سے سحت بدبو آنے لگتی ہے۔

علاج: اس مرض کے علاج میں دو صورتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، بطور حفظ یا تقدم مرض اور بطور علاج مرض۔

بطور حفظ یا تقدم منہ اور دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کرنا چاہیے، اور نرم مسواک کبکیر یا نیم کی کرنی اس مرض سے محفوظ رکھتی ہے۔

اس مرض میں مبتلا ہونے والے مریض کو بالوں کا ٹوٹنا برش نہیں کرنا چاہیے۔

بطور علاج اس مرض میں منہ کی صفائی اور قابض اور کرم کش ادویہ کا استعمال کرنا شافی علاج ہے۔

منہ اور دانتوں کی صفائی کے لئے مسد رجبہ ذیل رافع تعفن ادویہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔

پائیدر و حین پر اکسائیڈ، اس کے غارے روزانہ کرنے چاہئیں، اور دوتین دفعہ غرغره کر کے پانی سے کلی کر لینی چاہیے، سوڈیم کلورائیڈ، ۴ گرین، ایجوام ادس ملا کر روزانہ غرغره سے

کر سنے سے بے حد نڈہ پہنچتا ہے۔
 یا بیورین ۲۰ گرانہ ۲ تولہ، ایسڈ کاربایک ۱ تولہ، ٹینکچر آئیوڈین ۹ ماشہ
 منتقول ۴ رتی، کر یا زوٹ ۴ قطرے، جملہ ادویہ ملا لیں،
 ترکیب استعمال: رات کو اول نمک پانی میں حل کر کے غار سے
 کریں، پھر یہ دوائی روتی سے لگا کر جانتوں پر لگا دیں، پانی وغیرہ سے
 کلی نہ کریں، صبح گرم پانی جس میں نمک ملا ہوں سے کلی کریں، ایک
 مہینہ متواتر کریں،

انشاء اللہ درد دانت، کیراگن، یا بیوریا دور ہو جائے گا،
 گم پینٹ: ایسڈ کاربایک ۵ منہ، ایسڈ نیک ۲۰ گریں، آئیوڈین
 رکٹیفڈ ۱ ڈرام، ٹینکچر اکونائٹ ۱۰ ڈرام، تھائیمل ۵ گریں، گلیسرین
 ۱۰ اونس، ملا لیں، دن میں ایک دفعہ لگائیں،

یا بیوریا اور مسوڑھوں کی سوجن کے لئے مفید ہے۔
 اکسیر یا بیوریا: ٹینکچر آئیوڈین ۱ ڈرام، ٹینکچر مرہ ۱ ڈرام، ٹینکچر اکونائٹ
 ۱ ڈرام، کافور ۱ ڈرام، ٹینکچر سٹیل ۱ ڈرام، روغن فونک ۱ ڈرام، آئیل
 یوکلپٹس ۱ ڈرام، کر یا زوٹ ۱ ڈرام، ایسڈ کاربایک ۱ ڈرام، کارد فارم
 ۱ ڈرام، منتقول ۱ ڈرام، گلیسرین ۲ ڈرام،

پہلے منتقول اور کافور کو ملا کر حل کر لیں، بعد ازاں جملہ ادویہ ملا لیں،
 اور پھر رومی سے مسوڑھوں پر لگائیں،

یہ دوائی ماسخودہ کے لئے اکسیر ہے، علاوہ ازیں درد دانت
 مسوڑھوں کا بھول جانا، خون اور پیپ کا بہانا وغیرہ کے لئے بے حد
 مفید و مجرب ہے،

دوائے یا بیوریا: مرود سنگ، ازروت، دانہ الہچی خود ہر ایک اتولہ

تمام دواؤں کو باریک سفوف کر کے رکھ لیں، اور بطور معین دانتوں پر
برش یا مسواک سے لٹا دیں، مٹوڑی و پیر بعد گرم پانی سے کلی کر دیں۔
ماسخورہ دیا یوریا، اور مسوڑھوں کی سو جن کے لئے سبب لسنوں
کا سرتاج ہے۔

حسب اس مرض کو کسی دوائی سے آرام نہ ہو، تو سوائے دانت
اکھاڑنے کے کوئی چارہ نہیں۔
مرض دیا یوریا کا جلد علاج کرنا چاہئے، ورنہ اس کا زہر معدہ میں
غذا کے ساتھ قل کر خون میں مل جاتی ہے جس سے بہت امراض
پیدا ہو جاتے ہیں۔
دیا یوریا کے مریض کو گوشت، مچھلی، انڈے، دہی اور لسی سے
پرہیز کرنا چاہئے۔

ماسخورہ کا مرکب پختی علاج

مرکبوری ایسی سالو اس کے لئے بہترین دوائی ہے۔
اس دوائی کے تحت میں منہ سے پانی نکلتا ہے، اگر خون کا
رنگ سرخ اور چمک دار ہو، تو فاسفورس ۳۰ بھی فائدہ کرتی ہے۔
اگر پیپ نکلتی ہو، تو ہیر سلفر ۳۰ اور سلینشیا ۳۰ مفید ہوگا۔
یاد رہے کہ مرکبوری ایس کے بعد سلینشیا ہرگز نہ دیں، ورنہ بجائے فائدہ
کے نقصان ہوگا۔

چٹکلیہ دیا یوریا، نیمہ متوقفا بریاں ۴ ماہ پانی میں حل کر کے غرار سے
قریبا ایک ماہ کریں، دیا یوریا کا بہترین علاج ہے۔

دانت نکالنا : بعض آدمی شدت درد کی وجہ سے مضبوط دانت نکالوانے کے خواہش مند ہوتے ہیں ، لیکن یہ سخت غلطی ہے کہ مضبوط دانت کو نکالنا نہیں چاہئے ، بلکہ علاج کرانا چاہئے ، کیونکہ مضبوط دانت نکالتے وقت اکثر اوقات ٹوٹ جاتا ہے ، بعض اوقات جھڑے کی بڑی ٹوٹ جاتی ہے ، منہ سوج جاتا ہے ، کبھی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے ، اس لئے جب تک تمام علاج بے سود نہ ہو جائیں ، دانت نہیں نکالنا چاہئے ، اگر درد زیادہ ہو اور کیرا لگ گیا ہو ، اور لا علاج ہو چکا ہو ، تو پھر دانت نکالنا ہی بہتر ہے ۔

دانت اکھاڑنے کا طریقہ : بعض اوقات دردناک دانت یا دواڑھ کانکان ناگزیر ہو جاتا ہے ، لیکن عام طور پر بعض مریض شدت درد کی وجہ سے مضبوط دانت نکالوانے کے خواہشمند ہوتے ہیں ، مضبوط دانت کو نکالنا سخت غلطی ہے ، بلکہ طبیب کو اس کا علاج کرنا چاہئے ، اور مریض کو سمجھانا چاہئے ، کہ یہ دانت علاج کرنے سے تندرست ہو جائے گا ، ورنہ مضبوط دانت نکالتے وقت اکثر اوقات ایک آدھ جڑ ٹوٹ کر جھڑے میں رہ جاتی ہے ، اور شاذ و نادر جھڑے کی بڑی لمبی ٹوٹ جاتی ہے ، عام صورتوں میں منہ پر سوجن آ جاتی ہے ، اور کبھی آنکھ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ، کبھی خرابی خون کی وجہ سے شدت جریان خون ہو کہ مریض کے لئے جریان خون ہی موت کا باعث بن جاتا ہے ،

جس دواڑھ یا دانت کو اکھاڑنا مطلوب ہو ، اس کے ارد گرد کوکین ، فودکین ، پلانڈکین یا پردکین ہائیڈروکلورائیڈ کسی ایک دوا کا ڈنٹیل سرخ سے ٹیکہ لگائیں ، ان کے تیار شدہ ایسپیول مل جاتے ہیں ، جن میں سب مقدار دوا ملی حل شدہ ہوتی ہے ، اور جریان خون کو کم کرنے کے لئے ان میں لائیگوارائیڈ رہنے لین شامل کیا ہوا ہوتا ہے ، جب اچھی طرح ٹیکہ

لگ چکے ، تو ایک دو منٹ بعد وارٹھ بالکل بے حس ہو جائے گی ، وارٹھ کے بے حس ہونے کے بعد نشتر جسے گم ٹسٹ GUM LENCIT کہتے ہیں ، اس کے ساتھ وارٹھ کے ارد گرد سے سوڑھے کاگوشت چھڑا دیں یہاں تک کہ زبور وارٹھ کی جڑوں تک پہنچ سکے ، پھر زبور وارٹھ کو ڈال کر مضبوط پکڑ کر وارٹھ کو پہلے اندر کی جانب پھر باہر کی طرف ہلاتیں جب وارٹھ اپنی جگہ سے ہل جائے ، تو پھر ٹوڑا سا زور لگا کر اوپر کو کھینچ لیں ، وارٹھ آسانی سے نکل آئے گی ، اگر وارٹھ کے اوپر زبور ڈال کر سیدھا کھینچنا شروع کر دیں گے ، تو وارٹھ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے ، اور مریض کو سخت تکلیف ہوگی ، یہ طریقہ وارٹھ نکالنے کا بالکل آسان اور سہل ہے ، تمام دانتوں اور وارٹھوں کو نکالنے کے لئے انگریزی دو اندرونیوں سے علیحدہ علیحدہ زبور مل سکتے ہیں ، جب وارٹھ نکل جائے ، تو پھر پوٹاسیم پرمنگنیٹ ۲ گریں ایک گلاس پانی میں حل کر کے غرارے کرائیں ، اور مقام ماؤت کو عداوت کر کے ٹنگھو فیروز پورائیڈ یا ٹنگھو بنزوسن کا پھایہ سوراخ میں لگا دیں بعد میں گھی میں نمک ڈال کر گرم کر کے روٹی کا پھایہ تر کر کے سوراخ میں رکھیں ، سرد پانی اور ثقیل نقصان دہ چیزوں سے پرہیز رکھیں ، اگر بعد میں درد شدت کی ہو ، تو کوڈوپاسرین ، سارائیڈان یا اسپرین ، اگر بن کی ایک خوراک گرم چائے یا دودھ سے دیں ، اگر منہ پر سوجن آجائے ، تو پشلیں ۵ لاکھ کاٹیکہ عضلاتی کریں ، سوزش دغیرہ رفع ہو جائے گی ، میرا یہ وارٹھ نکالنے کا اپنا عملی تجربہ ہے ، اور مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوئی ،

یاد رہے ، عام طور پر ۸ فیصدی ایسے وارٹھ نکالنے والے مریض ہوتے ہیں جن کی وارٹھیں مٹی میں جو نکالنی بہت سہل ہوتی ہیں ،

زبان کا سوج جانا

GLOSSITIS

(گلو سائی ٹس)

تعریف: وہ اس مرض میں زبان کو سوج پڑ جاتی ہے۔
وجوہات: درمعدہ اور انتڑیوں کی خرابی، کثرت تبا کو نوشی، مرض آتشک،
سباب اور اس کے مرکبات کا استعمال کرنا، سنگرہنی، چھک، خناذیر،
شدید بخار، کمی خون، تیز مصالحوں اور گرم اشیاء کا کھانا، زبان پر دھیر بیٹے
جانوروں کا کاٹنا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

تشخیص: زبان سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔
کبھی زبانی باہر نکل آتی ہے اور منہ سے رطوبت بہتی ہے،
کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے اور کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ
سے کمزوری ہو جاتی ہے۔

علاج: دراصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش
کریں۔ سب سے پہلے قبض رفع کریں۔ اور ایلیم لوشن سے غرغزے
یا کلیان کرائیں۔

کسٹرائیل ۵ تولہ ملائیں۔ تاکہ ایک دو دست آجائیں۔ یا صابن
کو پانی میں حل کر کے انہا کریں۔

اگر مرض شدید ہو، تو زبان پر جو مکس گوائیں، زبان کے درم کی
حالت میں پینلین ۵ لاکھ کا عضلاتی انجکشن کرنا نہایت مفید ثابت
ہوتا ہے۔

اگر آتشک کی وجہ ہو، تو پوٹاسیم آئیوڈائیڈ ۲ گرین، ایجو ۱ اونس
دن میں تین چار خوراک دیں۔

اگر شدید علامات ہوں، تو این، اسے، بی کے درپدی انجکشن کرنا مفید ہیں، لیکن ان کے استعمال سے پہلے خون کا امتحان کرنا ضروری ہے، اگر سبکی مٹی کی وجہ سے درم زبان ہو، تو ڈائسین بی ۱۲، لیور ایکٹریکٹ اور فولک ایسڈ کا استعمال کرنا کافی علاج ہے، اگر مٹی خون ہو، تو مرکبات فولاد دیں،

رے پیرلا RANULA

وجوہات و تشخیص: اس مرض میں زبان کا اگلا حصہ درجہ زبان کا لگام کتے میں، نیچے کے حصہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس سے مریض کے لئے گفتگو کرنا اور بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اور زبان بھی باہر نہیں نکال سکتا،

اکثر یہ مرض بچوں کو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے بول نہیں سکتے، اور عام طور پر یہ مرض زبان کے نیچے کی جھلی کے ملنے سے ہوتا ہے، کبھی رسولی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے،

جھلی تو سیدھی ہوتی ہے، اور رسولی اور کلٹی بعد میں منہ پکے سے ہو جاتی ہے،

علاج: اس مرض کا علاج عمل جراحی ہے، اگر جھلی نیچے کے گوشت سے ملی ہوئی ہو، تو مریض کو لٹا کر نیچے سے اس جھلی کو کاٹ دیں، جس سے زبان باہر نکلنے لگتی ہے، اور زخم بولنے لگ جاتا ہے،

اگر رسولی دہیرہ ہو، تو اس کا اپریشن کریں،

FISSURE OF THE
TONGUE

شکاف زبان

دشتر آف دی ٹنگ

تعریف اس مرض میں زیادہ خراش دار چیزیں کھانے سے زبان میں
شکاف پڑ جاتا ہے۔

وجوہات زیادہ ترش چیزوں کا استعمال، خرابی معدہ، تیز مصالحہ دار
اشیاء کا استعمال، پانی میں چونا کا زیادہ استعمال کرنا اس مرض کے
اسباب میں۔

تشخیص و علامات زبان کے جگہ جگہ سے پھٹ جانے پر کھانے
پینے اور بولنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے
اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض سرطان کی صورت اختیار
کر لیتی ہے۔

اس مرض میں اگر قبض ہو تو کیڑا سیل پلائیں، یا کوئی اور
علاج ملین مسهل دیں۔
زبان پر بوزک گلیسرین یا اکیری نیوین اینڈ گلیسرین لگائیں،
ناریل کا ٹکڑا چبانا بھی فائدہ کرتا ہے۔
زبان پر کمسن لگانا بھی نافع ہے۔

اگر کوئی دانت خراب ہو جائے، تو اسے نکلوا دینا چاہئے،
سلور نائٹریٹ کا ہلکا سویلوشن لگانے سے جلدی سرطان
ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔

CANCER OF THE
TONGUE

سرطان زبان

(کینسر آف دی ٹنگ)۔

تقریباً ہر ایک ہلاکت کن مرض ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے، تو مریض تین چار دن کے اندر مرجاتا ہے۔ یہ ایک خبیث قسم کا زخم ہے جو زبان پر ہو جاتا ہے۔

وجوہات ہر بوسیدہ دانت کے زخم، خراش کن اشیاء کا استعمال، زبان پر خراش پیدا ہو کر یہ مرض ہو جاتی ہے۔ معمولی زخم کو اگر علاج نہ کیا جائے، تو سرطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

تشخیص و علامات یہ مرض عموماً آنشک کے مریضوں کو ہوتی ہے، اس مرض کا زخم ایک ہوتا ہے جس کے کنارے متعادل، بھرے ہوئے اور باہر کی طرف بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے طبیعت نہ ہوتی ہے، زخم کی درمیانی سطح گہری ہوتی ہے۔ مریض کو کھانا پینا، بولنا دشوار ہو جاتا ہے، درد کی شدت سے مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

علاج ہر انٹی سیٹک ادویات سے غرارے کر لئے جائیں، طباء کا خیال ہے کہ اگر مریض کی زبان کاٹ کر نکال دی جائے، معمولی آرام ہو جانے کی توقع ہے۔ اکثر یہ مرض لا علاج ہی نقور کی جاتی ہے۔

ماکرو گلاسیا

MACRO GLOSSIA

(میکرو گلاسیا)

تشریح: در اس مرض میں زبان اپنی اصلی حالت سے بڑی

بڑھ جاتی ہے۔ یہ مرض عموماً پیدائشی ہوتی ہے کبھی کسی مرض کے
سبب سے زبان بڑھ جاتی ہے، کثرت دانوں کی زبان اکثر بڑی

ہوتی ہے۔
تشریح و علامات: در مریض کو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے اور
بول نہیں سکتا۔

علاج: اگر پیدائشی ہو تو اس کا آپریشن کیا جائے، اگر کسی
مرض کی وجہ سے ہو تو زبان پر نوشارد باریک پس کر ملیں،
نسخہ: در عقر قرحاء نوشارد و دانوں کو باریک سفوف بنا کر صبح و شام
لینا نہایت مفید ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس سے رطوبت خارج ہوتی ہے

TTYALISM

رٹا یا لزیم

تھوک کا زیادہ آنا

تشریح: در اس مرض میں مریض کے منہ سے تھوک کثرت آتی ہے
وہ بولتا ہے، حوزش زبان، پارہ کے مرکبات کا زیادہ استعمال معدنی
ادویات کا استعمال کرنا بھی تھوک لاتا ہے، خراش منہ اور مرض کن پیرٹا
میں بھی تھوک کثرت آتی ہے۔

کیبول کے کھانے کے بعد اگر کوئی نمکین مہل نہ دیا جائے، تو
ھتوک کثرت آتی ہے۔

تشخیص و علامات ھتوک کثرت سے پیدا ہونے پر مریض کو بولن
کھانا، پینا و شوار ہو جاتا ہے، اس مرض
میں مریض دبا ہوا ہوتا ہے، پارہ کے مرکبات استعمال کرنے پر مٹھ
سے تانے کا ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مہوڑھے پھول جاتے ہیں۔
علاج ہر پھیڑی اڈرام، آٹھ ادس پانی میں ملا کر غارے کر اسیں،
اگر پارہ کے مرکبات سے ھتوک زیادہ آئے، تو گنیشا سلفاس اڈرام
ایک ادس پانی میں ملا کر پلانا نہایت مفید ہے۔
اکسیر کثرت ھتوک : چکر پلا ڈوتا، منم، ایکہ ایک ادس،
ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں، اس کے پلانے سے
بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

لکنت STAMMERING (سپیئرنگ)

تعریف : اس مرض میں مریض ایک ٹک کر بولتا ہے۔
اسباب : سخت بخار، لغو، ناسخ، رعشہ کے باعث اکثر ہو جاتی
ہے، ایک دوسرے کی نقل کرنے سے بھی یہ مرض ہو جاتی ہے، کبھی زبان
کے نیچے رباط کے بڑھ جانے سے بھی یہ مرض ہوتی ہے، کچلہ کے مرکبات
استعمال کرنے سے اس مرض کا دورہ ہو سکتا ہے۔
علامات و تشخیص : یہ مرض اکثر پانچ سال کے بچوں کو ہوتا ہے۔

علاج : اگر زبان کے نیچے رباط بڑھ چکے ہوں، تو گول مسہ
 والی چمچی سے کاٹ دے جائیں۔
 عقرقرحہ اور رانی مٹا کر باؤبک کر کے زبان پر ملنا قدرے فائدہ
 کو کم کرتا ہے۔
 ڈائمن بی کسٹیکس : اسی سی کا انجکشن ہر تیسرے دن لگایا جائے
 بہت فائدہ پہنچتا ہے۔
 ڈائمن بی ۱۲ : اسی اس مرض میں قدرے فائدہ کرتا ہے۔

گلے پرٹنا TONSILLITIS (ٹانسلائٹس)

تعریف : اس مرض میں گلے کے غدود پھول جاتے ہیں، اور ان میں
 درد ہوتا ہے۔

وجوہات : زچہن اور آواز میں سردی لگنا، بارش سے بھگنے یا بدبودار
 ہوا کے سونگھنے سے یہ مرض ہوا کرتا ہے، وجع المفاصل، نفرس بھی اس
 کا سبب ہوتا ہے۔

جدید تحقیقات کے لحاظ سے یہ مرض جراثیم سے پیدا ہوتی ہے۔
 اور کبھی یہ مرض دبا کے طور پر بھی پھیل جاتی ہے۔

تشخیص : گلے کے غدود سوج کر درد کرتے ہیں، باہر کی طرف پھلے جڑے
 لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں۔
 کبھی کوآ بھی بڑھ جاتا ہے، نکلنے سے تکلیف ہوتی ہے، گٹریخار بھی ہوتا
 ہے، زبان گندی اور بدبودار سانس آتی ہے، کبھی پیام یا بخ دن میں درم

تخلیل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔
علاج اگر موسم گرم سے زبرد کا چوسنا اور گلے پر دانا اور دھنسن
 اور غدد کو کلم کرتا ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے۔ نو پٹس دھیر

کی ٹکڑ کرنی چاہئے۔
 اس میں گلیسرین، پیکر فرائی پر کلور، ڈرام، گلیسرین ایک ادنس، دونوں
 کو شیشی میں ڈال کر خوب ہلائیں، اور پھر پری سے گلے میں لگائیں۔
 معمولی گلے اور بچوں کی گھنٹی کے لئے ازبس مفید ہے۔
 رفع تبض کے لئے کیسٹرائیل پلائیں، یا رات کو ہ گزین کیلو مل کھلا کر صبح کو
 گلیشیا سلفاس ۴ ڈرام پلائیں، تاکہ دہن دست آجائیں۔
 گلیٹڈ ز پوڈر، اسٹائٹائل، سیلی سلک اسٹڈ، اسپرین،
 ادنس، کھلے منہ والی شیشی میں رکھیں۔

ترکیب استعمال پر روئی کی پھر پری بنا کر گلیسرین یا پانی میں ڈبو کر
 پھر پوڈر میں لت پت کر کے گلے کے اند لگائیں۔
 فائدہ برکھوٹ نزد کام کی وجہ سے حلق کا متورم ہونا، سردی کی
 وجہ سے گلا، میٹھ جانا، گلیٹڈز کا برٹھ جانا، کو آٹک جانا، آواز کا
 بند ہو جانا کے لئے ازبس مفید ہے۔

گلیٹڈ ز لوشن پر سلوڈنا ٹریٹ، ۳ گزین، ایکوا ایک ادنس،
 نیسے رنگ کی بوتل میں حل کر کے پھر پری بنا کر گلے میں لگادیں، اوپر
 سے چٹکڑی ایک چھ یا نمک ایک چھ گلاس پانی میں ملا کر غار سے کریں۔
 مینٹل لسٹ پینٹ پر پوٹیمیم آیوڈائیڈ، ۱۰ گزین، آیوڈم ۲ گزین
 منقول ۲ گزین، گلیسرین ایک ادنس۔

سب اجزاء کھول میں ریزو کر گلیسرین ملا دیں، اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔

روئی کی پھریری سے گلے میں لگائیں، سخت سے سخت گلے، سوزش اور روم کو دور کرنے کے لئے مجرب ہے۔
چیسپس کی گولیاں، یہ ایک پیٹنٹ دوا ہے جس کی دویاتین ٹکیاں منہ میں رکھ کر چوسنی جاتی ہیں۔

فائدہ: گلا بیٹھ جانا، گلے کی خارش، درد، سوجن، نزلہ کھانسی، انفلوئنزا، دمہ، تنگی سانس، انجماد سینہ وغیرہ میں مفید ہے۔

دیسکس: سوڈا سیلی سلاس، اگرین، دواؤں پانی میں حل کر کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے سے گلے کی امراض کو فائدہ ہوتا ہے۔
دیسکس: امتاس ۵، نزلہ یا سب ضرورت، آدھ سپرد دودھ ۵، تولہ مصری میں ابال کر نیم گرم دودھ صاف کر کے رات کو پی لیں، صبح ایک دوا جاتیں ہو کر گلے کی امراض، خنازیر وغیرہ دور ہوں گی۔

دیگس: مغز امتاس ۵، تولہ لے کر سیر پھر گرم پانی میں ملگو کر اور مل چھان کر غار سے کرائیں، گلے آزار، خناق وغیرہ کا حکمی علاج ہے، اطباء ملی کاموں سے اکسیر گلو: برطبا شیر نفزہ، الاچی خورد، مغز کنول ڈوڈھ، لنبال، سکنجہ سفید، گبرور، زبیرہ سفید، حملہ ادویہ مساوی وزن لے کر ہنایت باریک میں کر برابر وزن حملہ ادویہ مصری ملا لیں، بوقت ضرورت پچے کے گلے پر پختی سے لگائیں گلے کے تمام امراض کے لئے مفید و مجرب ہے۔

اکسیر گلو: سلفامیزا تھین، پہلی خوراک چار ٹکیاں، بعد ازاں دو ٹکیہ ہر چار گھنٹہ بعد دیں، اور پانی زیادہ معتداریں پلائیں، اگر گلا زیادہ متورم ہو، تو انٹی فلو جسٹین پلاسٹر گلے پر لگا کر گرم ٹکڑے کریں، گلے کے روم اور ٹائٹلٹس کے لئے بے نظیر علاج ہے۔

نوٹ: جب اس مرض کا بار بار حملہ ہو کر دو تین بار جاتیں پیاؤں میں

پیپ بڑھائے، تو اس کا اپریشن کرنا ہی بہترین علاج ہے۔
گلے کی گولیاں، سبازول ایم بی ۶۰ نے بھی اس مرض کے لئے
معین ہیں۔ خوراک ۲ گونی، دن میں چھ گولیاں تک دے سکتے ہیں، زیادہ
زیادہ مقدار میں ہلاکتیں۔

گلے کی دوا: ڈینک گلیسرین، ٹینک ایسڈ ۳۲ گریں، گلیسرین -
اوش، باہم ملائیں۔ برش یا زون کی پھیری سے گلے میں لگائیں۔
کے درم، درم لوزین وغیرہ کے لئے بے نظر دوا ہے۔
اگر مرض شدید ہو چکا ہو، تو گلے کا ٹیکہ لگائیں۔
گلے کا ٹیکہ: پینسلین ۵ لاکھ یونٹ صبح و شام عضلاتی انجکشن کر
بے حد معینہ و موثر ثابت ہوتا ہے، اگر پیپ بڑھ چکی ہو، تو پیپ
اخراج کی کوشش کرنی چاہئے۔

آدھ سیریاں کو نیم گرم کر کے ایک چمچ سرورڈ نی نمک ملا کر غریبے
کرنے سے منہ میں پسیدار بلغم اور درم گلو کو کافی ناکد ہوتا ہے۔
پینسلین لوز بخرنی ٹکیہ ۵۰ یونٹ منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ پوٹیں
دن میں چھ سات ٹکیہ کافی ہیں۔ کم شدید حالتوں میں اکثر اس دوا سے
گلے کی تمام خرابیوں کو دو تین روز میں مکمل آرام ہو جاتا ہے۔
اگر غدد میں پیپ بڑھ جائے، تو کسی ماہر غریبہ کا رٹاکٹر سے پتہ
دوانا چاہئے۔

غذا: منہ اور گلے کے مریضوں کو غذا لطیف اور زود ہضم
کھلانی چاہئے۔

پہلے ہیز: ہر قسم کے مخزنات، گردوغبار، دھوئیں، مٹا کوئلہ
اور ترخی سے بچنا بے حد ضروری ہے۔

کوارنا

ELONGATION OF THE
UVULA

(الانگیشن آف دی یوولا)

تھریلینف ہر اس مرض میں کوآ لٹک جاتا ہے۔
 وجوہات : حلق کی جھلی کمزور ہو کر لٹک جاتی ہے۔ حلق کی پرانی
 سوزش، گنٹھیا یا فخرس کے مادہ کا جسم میں سرایت کر جانا، عموماً
 اس کے ساتھ معمولی بخار بھی ہوتا ہے۔ بچوں میں سخت سردی یا گرمی
 سے کوآ لٹک جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر سردی کے موسم میں ہوتا ہے۔
 تشخیص : کوآ لٹک اور ڈھبلا ہو جانے کی وجہ سے حلق میں خواش
 پیدا کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے کھانسی بار بار اٹھتی ہے۔
 اور کبھی کھانسی کی زیادتی کی وجہ سے قے اور مثلی بھی ہوتی ہے۔ اور اکثر
 بیٹ جانے سے کوآ حلق میں گلنے کی وجہ سے کھانسی زیادہ ہوتی ہے
 اگر گرمی اور غلبہ خون سے ہو، تو پیاس کم ہوتی ہے۔ اگر سردی اور ملغم
 کی وجہ سے ہو، تو پیاس کم ہوتی ہے۔

علاج : ہیشکری ۲ ماشہ، پانی ۵ اونس میں حل کر کے
 غرغزے کرائیں۔

اکسیر لہیات : ہر سنوف ہیشکری ۲ ماشہ، شہد اتلہ، باہم ملا لیں،
 روئی کی پھیری دوائی میں لت پت کر کے کوسے پر لٹائیں، دن
 میں تین مرتبہ، استرخاء، الہیات کے لئے اکسیر ہے۔
 نوٹ : یہ دوائی کلیسیرین میں ملا کر
 بھی بنائی جاتی ہے۔

نسخہ در پوٹایم برومائیڈ ۳۰ گرین ، ایکوا ایک ادنس

ملا کر غرضے کرائیں ، اس مرض کو مفید ہے۔

نسخہ در ٹینک ایڈ ۱۰ گرین ، گلیسرین ۴ ڈرام ، یاہم ملا کر شیشی

میں ڈالیں ، پھر بری سے گلے میں لگائیں ،

گلے کے امراض کی ادویات بھی اس مرض میں مفید ہیں۔

اگر کسی طرح بھی آرام نہ ہو تو عمل جراحی کرنا ہی سودمند ہے ، اس کو
۱/۲ حصہ کاٹ ڈالیں۔

سورنا سٹریٹ ۲۰ گرین ، ایکوا ایک ادنس ملا کر آہستہ سے

کوٹے پر لگانا نافع ہے۔

کبھی کبھی ٹینکچر آیوڈین یا ٹینکچر سٹیل کی پھریری کوٹے پر لگانے

سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل دوا اس مرض کے لئے تمام حالات اور اوقات میں عمدہ ہے

صفعتہ در شب پانی تین حصہ ، زردود دو حصہ ، قسط ایک حصہ

سب کو باریک کرتے رکھیں ، اور پر کے ذریعہ یا مرفع اللہاء و کوٹے

کو اوپر اٹھانے کا آلہ سے لہاۃ پر یہ دوا لگائیں۔

نسخہ در عدس مسلم (مسود) ، پوست اخروٹ اور برگ ٹوت تازہ

بقدر مناسب پانی میں پکا کر غرضے کرائیں۔

درم لہات دلو زین کے لئے مجرب ہے۔

ضرورت کے وقت اس میں دوسری قابض دوائیں جیسے گلنار

اور مازوے سبز و غیرہ کا بھی اضافہ کر لیا جاتا ہے۔

درم لہات کے لئے ہنایت مفید ثابت ہوتی ہیں ، اور

جلد آرام ہو جاتا ہے۔

ACUTE PHARYNGITIS

درد گلو

(ایکیویٹ فرنجائیس)

تعریف: اس مرض میں گلے میں درد ہوتا ہے۔

اسباب: ہر کسی خناسن کن چیز کا حلق میں جے جا۔ اکثریت ذیاب کو فوشی حلق کو فوشی، خناسن، اگر دو غبار کا پڑنا، منشا و خن، زکام، خسرہ، جھک، خیرہ اس کے اسباب میں۔

تشخیص و علامات: حلق میں خراسن ہوتی ہے۔ بار بار کھانسی کا دورہ پڑتا ہے۔ بولنا کھانا دشوار ہو جاتا ہے۔

درد اور پیاس، آواز کا بھاری ہو جانا، حلق کی جھلی کا چھٹ جانا، منہ کا مزا خراب اور بدبودار سانس نکلتا ہے۔ معمولی نوزے سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کا جلدی علاج نہ کیا جائے، تو مرض کی شدت کے باعث دم گھٹ کر مرجانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔

علاج: سوڈا سیلی سندس، اگر مین، پانی یا دودھ کے ساتھ کھلائیں، یا سر کی طرف مسٹرڈ کا پیسٹر کرنا مفید ہے۔ اگر قبض ہو، تو ہر گرن کیوئل رات کو کھلا کر صبح کو نمکین مہل دیں۔ اگر نزلہ، زکام اور معمولی بخار بھی ہو، تو کوئین سیلی سلٹیٹ یا سیلی سلین ۲ گرن دن میں تین چار بار پانی کے ساتھ کھلائیں، یو کلتیس اینڈ کوئین نوز بخر چو سنا بھی فائدہ کرتا ہے۔

گلے میں گلیسرین ٹینک ایڈ لگایا جائے، برگ ٹوٹ سیاہ کے پتوں کا جو شائدہ بنا کر غرے کر لے جائیں،

گل سرخ اور امتاس دودھ میں جوش دے کر پلائے جائیں،

شریت توت، شریت عناب بلایا جائے، تو فائدہ کرتا ہے۔
 سٹرپٹوماٹی سین، پینی سلین کا عضلاتی انجکشن کرنا معجزہ نما اثر رکھتا ہے
 پردکین پینی سلین ۵ لاکھ یونٹ ہر چوبیس گھنٹے بعد عضلاتی
 انجکشن کریں۔ دو تین انجکشن کافی ہوتے ہیں۔

سٹرپٹوماٹی سین اگر ام ہر تیسرے دن عضلاتی انجکشن کریں، پتہ ق
 و سل کی وجہ سے درد گلو ہو، تو بے حد مفید ہے۔

مینڈلوز پینٹ پر آئیوڈین ۵ گرین، آئیل منٹھاپ ۵ منم
 پوٹاسیم آئیوڈائیڈ ۵۲ گرین، گلیسرین ایک ادس،
 پھریری سے گلے میں لگائیں، دن میں دو تین بار۔
 دم حلق اور درد گلو کے لئے مفید ہے۔

اگر درد شدید ہو، تو اسپرین ۵ گرین کی ٹکیہ کھلائیں،
 پینی سلین لوز بھر کا چوسنا بھی اس مرض کے لئے مفید ہے۔
 شدید حالات میں گلے پر پینٹس آف کیولین کا لگانا بھی
 مفید ثابت ہوتا ہے۔

پرانا درد گلو

تقریف پر اس مرض میں گلے میں مزمن درد ہوتا ہے۔
 اسباب پر شدید سوزش حلق کے سبب یہ مرض ہو جاتی ہے، کثرت
 تبا کو نوشی اور شراب خوری سے بھی یہ مرض ہو جاتی ہے، تقرس، سل
 اور آشک بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

تشخیص و علامات :- اس مرض کے مریضوں کو عموماً نزلہ ہو جاتا ہے
تشخیص مریض بلغم نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وقت محسوس
 ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے غوطہ سا جھپکا ہوا بلغم خارج ہوتا ہے۔ آواز بھاری
 ہو جاتی ہے۔ بلغم کے ساتھ گاہے گاہے خون بھی خارج ہو جاتا ہے۔
علاج :- جب حلق میں شدید سوزش ہو، اور بخار آنے پر مریض
 دن بدن کمزور ہوتا جائے، تو مریض کی بلغم کو ٹسٹ کرانا ضروری ہے، کیونکہ
 اس سے مرض سل کا شبہ ہو سکتا ہے۔

اس مرض میں ہوا خوری، معمولی دوزش، ترک حقہ نوشی، ترک میخوری
 ضروری ہے۔ قلعین اور گرم اشیاء سے پرہیز لازمی ہے۔
 سلوڈنا ٹریٹ۔ ۲۰ گرین فی آؤنس دالامیں ردی کی پھریری ترک کر کے
 حلق میں صبح کے وقت لگائیں۔

ڈنک کلہانڈ، اگرین فی آؤنس میں حل شدہ حلق میں لگانا بہت مفید ہے
 ایڈرینے لین ایک میں ایک سزار کی طاقت کا لگانا فدی اثر دکھاتا ہے۔

رفع قبض کے لئے کوئی ملین مسهل دیں، سل دوق کی وجہ ہو۔ توین کا علاج کریں
میتھورال METHURAL (مساختہ سیلگ) یہ دوا گلے کی تکالیف
 مثلاً گلے کا درد، گلے پڑنا، آواز بیٹھ جانا، نزلہ زکام، کھانسی کے ہمراہ جو تکالیف گلے
 کو لاحق ہوتی ہیں، ان کو رفع کرنے میں عجیب اثر ہے، نزلہ دہائی کے ایام
 میں بطور حفظ یا تقدم بھی استعمال کی جاتی ہے۔

ترکیب استعمال :- ایک ٹمکیہ ہر دو گھنٹہ بعد منہ میں رکھ
 کر چوسیں۔

غذا زود ہضم دیں، مخزش اشیاء سے پرہیز کریں۔

GRA NULAR
PHARYNGITIS

حلق کی پھنسیاں

(گرے نوبل فرنجائٹس)

تعریف :- اس مرض میں گلے میں پھنسیاں نکل آتی ہیں۔
اسباب :- یہ مرض ادنجا بولنے والوں کو ہوا کرتی ہے، دماغ
کو تھکے، ٹیکچر اس مرض میں گرفتار ہوتے ہیں، کثرت متبا کو نوشی
شراب خوری بھی اس کے اسباب ہیں۔

تشخیص و علامات :- اس مرض میں حلق کے اندر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں
نکل آتی ہیں، کھانسی اور کھوکھری ہر وقت

سناتی ہے۔ علاج نہ ہونے پر اگر مرض شدید صورت اختیار کر جائے،
تو پیپ خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے،
علاج :- مریض کو ہر قسم کے نشہ سے پرہیز کرنا چاہیے، بولنے
وقت بالکل آہستہ بولے، ہوا خوری اور قبض نہ ہونے دینا اس میں مفید ہے
اگر کسی طرح سے آرام نہ آئے، تو بیل کی تار سے پھنسیوں کو جلا دینا
چاہیے، یہ کام ماسٹر ڈاکٹر کے سوا نہیں کرنا چاہیے۔

نسخہ :- رگلے کی تمام خرابیوں کی شدت حالات میں مینی سی لین
کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

پینلین کے ٹوز بخرچو سے کئے دیں، یا عضلاتی انجکشن
حسب عمر کریں۔

غذا لطیف اور زود معضم دیں ہر قسم کی محرکات، گرد و غبار، متبا کو
ادد صومیں سے بدامیز کرنا ضروری ہے۔

آواز کا بیٹھ جانا AFONIA (رافونیا)

تعریف : اس مرض میں آواز بیٹھ جاتی ہے۔
وجوہات : درزہ شدید، جگرہ کی ساخت میں خرابی کا ہو جانا، سردی لگنا، جگرہ کا درم، زیادہ بولنا، چھینا، چلانا اور دق کے آخری درجہ میں بھی آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے، سرمہ اور سیندور کے کھانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

تشخیص و علامات : اس مرض میں آواز نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اگر کوشش کی جائے، تو بہت معمولی آواز

نکلتی ہے، اور مریض کا نا پھوکی کرتا ہے۔
علاج : دراصل مرض کے سبب کو معلوم کر کے رفع کریں،

اور کھانے سے آواز کھل جاتی ہے۔

سرسوں کے تیل والے دیے کا گل پان میں رکھ کر کھانا بنائیت

مفید ثابت ہوا ہے۔

اگر سیندور کھانے سے مرض شروع ہوئی ہو، تو جوہر متبا کو ۲ چاول پان میں رکھ کر چبانا مفید ثابت ہوا ہے۔

شربت لوت اور شربت ہفتہ پینے سے آواز کھل جاتی ہے۔
ہفتہ کو چائے کی طرح پکا کر پینا اور یہی ہفتہ گرم گرم

گلے پر باندھنا مفید ہے۔

گلے پر روغن بادام، روغن کدو، روغن زرد کی نیم گرم مالش کرنی چاہئے۔

مشکل سے نکلنا DYSPHAGIA

روٹس فیجیا،

تعریف: اس مرض میں مریض کی کھانے پینے کی قوت زائل یا ناقص ہو جاتی ہے۔

وجوہات: یہ مرض غذا نگلنے والے پھٹوں کے درم سے ہوتا ہے اکثر مرض لوزیتین، حلق، حنجرہ، مری کے درم سے ہوتا ہے، کبھی گلہڑ یا رسولی اور سپریا کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

تشخیص و علامات: کھانا، مینا و شوار ہو جاتا ہے، اور اگر اندر نگلنے کی کوشش کی جائے، تو کھایا پیاناک کے راستے خارج ہو جاتا ہے، حلق میں پھنس کر تکلیف دیتا ہے۔

علاج: اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کریں، اگر درم لوزیتین، حلق، مری، حنجرہ کی وجہ ہو، تو ان کا علاج کریں اگر اعصابی کمزوری ہو، یا استرخا کی وجہ ہو، تو اعصاب کی تقویت کی کوشش کریں۔

اگر سپریا کی وجہ ہو، تو سپریا کا علاج کریں۔

اگر قبض کی شکایت ہو، تو قبض رفع کریں۔

اگر مری کی تنگی کی وجہ ہو، تو ایک خاص آلہ سے مری کو

کشا وہ کریں۔

عام حالتوں میں برگ شہوت ۳ تولہ، مسور سالم ۲ تولہ، پوست خشتا ش

۴ عدد، ایک سپریا پی میں جوش دے کر غرغریے کرائیں۔

اس مرض کے لئے بہت مفید ہے۔

خناق DIPHThERIA (ڈیفٹیریا)

وجوہات ہر اس مرض کا باعث ایک خوردبینی کپڑا جس کو ڈیفٹیریا جیسی لس کہتے ہیں، ہوتا ہے۔

تشخیص و علامات تالو حلق اور حنجرے کے اندر ورم ہو کر ایک کاذب جھلی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کھانا پینا چلنے کے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ منہ سے رال ٹپکتی ہے اور ہلکا تیز بخار بھی ہو جاتا ہے۔

علاج ہر اس مرض کا ششانی علاج ڈیفٹیریا یا انٹی ٹاکسین ہے۔ اس کی مقدار خوراک معالج کی رائے پر منحصر ہے۔ شدت مرض میں ۵ ہزار سے ایک لاکھ یونٹ کا دریدی انجکشن کرنا چاہئے۔ عام حالت میں دس سے پندرہ ہزار یونٹ کا عضلاتی انجکشن کریں۔

اس مرض میں چونکہ عام کمزوری بہت جلد ہوتی ہے۔ اس لئے گلوکوز بکٹریٹ بلانا چاہئے۔ اگر ضرورت ہو تو بذریعہ دریدی انجکشن گلوکوز دے سکتے ہیں۔

اگر دل زیادہ کمزور ہو، تو کورائین ایک سی سی کا جلدی ٹیکہ کریں، مژدع مرض میں پینسلین ۵ لاکھ یونٹ کا ٹیکہ بھی بہت موثر ثابت ہوتا ہے۔

اگر خون کا جوش زیادہ ہو، اور ورم باہر کی طرف ہو، تو جو ٹکوں کا لگانا ہے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

اور ۵ تولہ امتاس کے غرغریے کرنا بالخاصہ مفید ہیں۔
 معزز امتاس ۴ تولہ پانی میں بھگو کر روغن بادام ۶ ماشہ، مصری ۳ تولہ ڈال کر
 پلائیں، اور معزز امتاس کو قدرے گرم پانی میں گھوٹ کر گلے پر باندھیں۔
 اکسیر خناق ۱۰ ریختے کا چھلکا، ۱۰ تولہ سفوف کر لیں، پانی میں حل کر کے
 مریض کو غرغریے کرائیں، پینے کے لئے شربت شہتوت پلائیں، مریض
 خناق کے لئے اکسیر ہے۔

نوٹ، جس وقت خناق پختہ ہو جائے، تو عمل جراحی سے ہی
 مواد خارج کرنا پڑتا ہے۔

دوائے خناق ۱۰ سلفا ڈایازین ۲ گیمہ سرچا رکھنے بعد کھلائیں۔ اور
 صبح و شام پیسلین ۵ لاکھ کا عضلاتی انجکشن کریں۔

خناق کے شروع میں اگر یہ علاج شروع کیا جائے، تو خناق سے
 نائدہ ہو جاتا ہے۔ گلے میں مینیڈلس پیسٹ لگائیں، خناق کے علاوہ
 درم حجرہ کا بھی تجربہ علاج ہے۔

ضماد خناق ۱۰ درجہ دار خطائی ۱ تولہ، معزز خیار شہر ۲ تولہ، آب بکو ۱۰ تولہ،
 میں خوب باریک پیس کر گلے پر ضماد کرنا ہر قسم کے خناق کو حکم اکسیر رکھتا ہے

خنازیر SCRAFULA (سکرافیولا)

وجوہات اس مرض کا سبب مادہ سہل ہے جو کسی نہ کسی طرح غدود
 جاذبہ میں سرایت کر جاتا ہے۔ منسلول، آشکی اور ششہابی دالہین کے
 بچے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوتا
 ہے۔

تشخیص :- اس مرض میں گردن کے غدد پھول کر مالا کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں درد نہیں ہوتا، اور گلیاں علحدہ علحدہ نظر آتی ہیں، لیکن بعد میں مل جاتی ہیں، اور زخم بن جاتے ہیں۔ ان میں مواد پیدا ہو کر پھٹنے لگتی ہیں، آخر ایک ہو جاتی ہیں، اگر پھیپھڑوں میں یہ مرض اثر کر جائے، تو ذوق ہو جاتی ہے، مریض کو بخار رہنے لگتا ہے۔

علاج :- اس مرض میں غذا صاف سمفوری اور مقوی ہونی چاہئے۔

اکسیر جتنا زیرہ :- یہ وہ نسخہ ہے جس کی صرف چھ سات خود اکیس کھانے سے ہنجر دوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، اور بہت سے مریض اس دوائے شفا یاب ہوئے ہیں، بہت مشکل سے یہ نسخہ ہاتھ آیا ہے، جو ہدیہ ناظرین ہے۔

شکر ف، سم الفار، رسکپور، دارچینا، چاروں اجزاء ہر ایک ۶ ماشہ، جنگلی چوہا دھوئے رنگ دالا، ایک عدد۔

ترکیب ساخت :- چوہے کا سر، ٹانگیں اور دم علحدہ کر کے پیٹ چاک کر کے صاف کریں، اور جلد ادویہ کو جو کوب کر کے چوہے کے پیٹ میں ڈال کر سی دیں، آدھ سیر گھی لے کر کڑا ہی میں ڈال لیں، چوتھے پر چڑھا کر نیچے آگ جلا لیں، جب چوہا جل کر سیاہ ہو جائے، نیچے اتار کر ٹھنڈا کر کے چوہے کے پیٹ سے ادویہ نکال لیں۔ ادویہ کو ڈیبا میں ڈال لیں، اس تیار ہے۔

خوراک :- اتنی ایک چھپو شوربا میں ملا کر دیں، اوپر سے باقی ماندہ گوشت کھلا دیں۔

گوششت آدھ پاؤ کو گھی ایک چھٹانک، مرج سرخ ۱۰ عدد مصباح
حسب مقدار ڈال کر تیار کر دیں۔

نوٹ، دوائی کھلانے کا موزوں موسم اسوج سے چھانگن چھینٹ
تک ہے، گرم موسم میں نہ دیں، اگر زیادہ تکلیف ہو، تو صرف ایک
خوراک دے سکتے ہیں، پیچروں کا مجرب علاج ہے، بنائیں اور نامہ
انھائیں۔

اس مرض میں پھل کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے، اوپر مریم المک
کا نسخہ باب الجراحت میں مذکور ہے۔

کچنار گول گول، پوست درخت کچنار ۴ سیر، برڑہ تولہ، پوست بھڑا
۸ تولہ، آملہ ۸ تولہ، سونچہ ۴ تولہ، فلفل سیاہ ۴ تولہ، فلفل دراز ۴ تولہ
پوست درخت برنا ۴ تولہ، لاجی خوروا تولہ، دارچینی، تولہ، تیز پاست ۱ تولہ
سب ادویہ کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر سفوف بنادیں، سفوف کے
برابر وزن مضمینی گول گول سے کر سب کو ملا کر اس قدر کوٹیں کہ گول بن جائے
کے قابل ہو جائے۔

مقدار خوراک اماشہ تا ۴ ماشہ مجراہ جوشاندہ کل منیڈ کو، پوست کچی
روزانہ دوبار استعمال کرائیں، خنازیر، چیدوں کی گھٹیاں، بگڑ گلی کندلی بہت
اقتام کے لئے مفید و مجرب ہے، آئور ویدک کا نیر مہر ف نسخہ ہے۔
سیرپ فیرانی ۴، یوڈا ۴، ڈرام ۴، کاڈیور آبل ۴، ڈرام ۴
ڈاکٹری علاج سیرپ آف کیمیم ٹیکٹون سینیٹ ۴، ڈرام ۴، لاکم رائی
۴ ادنس۔

مقدار خوراک ۱۲ ادنس دن میں تین خوراک، گھٹوں کی گھٹیاں خنازیر
کے لئے نہایت مفید و مجرب ہے۔

جس پر تحقیقات کی رو سے خنازیر کے مادہ کو سلی مادہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کے علاج میں سل ووق کی ادویات شافی اثرات رکھتی ہیں۔

سٹرپٹوما سیپہ اگر ام سر تیسرے دن عضلاتی انجکشن کرنا ہے جس مفید و مجرب ہے۔ گلیٹیاں بالکل تحلیل ہو جاتی ہیں، اور آسٹو ٹیکس کیاں کے ساتھ ڈومکس (روزانہ چھ عدد، دو صبح دو دوپہر اور دو شام کو کھلائیں) اس مرض کا کامیاب علاج ہے۔

نوٹ: گلیٹیوں کو عمل جراحی سے بھی خارج کیا جاتا ہے، یا بجلی لگا کر خشک کرتے ہیں۔

کن پیرے گلسوے MUMPS (مپیس)

وجوہات: یہ ایک متعدی مرض ہے جس کا سبب ایک خوردبینی کٹر ہے جو موسم خزاں اور بہار میں دہائی صورت میں پھیلتا ہے۔ اس سے بخار ہوتا ہے، ایک کان کے سامنے درد ہو کر کان تشخیص کے بعد منورم ہو جاتے ہیں، حساسے اور گردن سوج کر ایک ہو جاتی ہے۔ منہ کھرنے اور کھانے پینے میں دقت ہوتی ہے یا بخیر یا چھ روز علامات میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے۔

علاج: درمیں کو سردی سے بچائیں، منورم مقام پر بیلا ڈونا کا برتن لگا کر ٹوک لیں۔

نوٹ: یہ مرض شافی علاج پسینہ ہے، دو لاکھ یونٹ پنسیلین کا

صبح و شام عضلاتی ٹیکہ کریں، اور دم کی جگہ فلو حبشین پلاسٹر لگا میں اور

کسی چربے کو دیں۔

فیور کمپچر، لائیو ار ایوینا ایسی ٹاس ۳۰ منٹ، سپرٹ ایٹر
ٹاسٹر دس ۳۰ منٹ، پوٹاسیم سائٹریس ۱۰ گرین، ایکو ایکب ادنس
سیرپ ڈو اڈرام۔

ایسی ایکب ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

اگر درد شدید ہو، تو اسپرین یا سارپیڈان یا کوڈو پارین یا دیہا بن
حسب مربانی کے ساتھ کھلائیں۔

رنج درد کے لئے مفید ہے۔

لنچ غرغره، سوڈیم کلورائیڈ اڈرام، سوڈیم بائیکاربیٹ اڈرام
پانی ۱۶ ادنس، اس کے غرغزے کرائیں۔

کن پیرٹے یعنی گھسوتے کے مریض کے لئے بے حد مفید ہے۔

ہمارے زیر علاج اکثر مریض اس علاج سے بالکل شفا یاب

ہوتے ہیں۔

کئی مریضوں کے خبیثے متورم ہو جاتے ہیں، ان کے لئے پوست

غل باونہ کے جو تانڈہ سے ٹکڑ کر کے پیلا ڈونا گیسرین لگا کر گرم

گرم ٹکڑ کریں، دم اتر جائے گا۔

اگر دم شدید ہو، تو چند جو بکس لگوانا مفید ہیں۔

پینلین اگر نہ ملے، تو سلفا ڈایازین یا سلفا تھایازول کا استعمال بھی

بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔

اگر متورم غدو میں پیپ پڑ جائے، تو اسے شکاف دے کر خارج

کریں، ورنہ گنگرین ہونے کا خدشہ ہے۔

جب خیمے متورم ہو جائیں، تو بیلا ڈونا گلیسرین لگاتے رہنا چاہئے، اور پی یا
نگوٹ کے سہارے ان کو اوپر اٹھائے رکھنا چاہئے۔
شدت درد میں میند نہ آنے کی صورت میں مسکنات، معجون برشتہ، اسپرین
کو ڈونا کریں، ویکائین، سارڈان وغیرہ کا حسب ضرورت کھلانا مفید ہے۔

گلکسوزے کا مہموزہ طبی علاج

شدت درد مرض میں جبکہ بخار، پیاس، بے چینی، پریشانی اور درد ہو، تو
کوڈائٹ ۳۰ گھنٹہ گھنٹہ بعد دیں۔
جب بخار کم ہو جائے تو مرکزی سال ۶ گھنٹہ گھنٹہ بعد دیں،
اگر خیمے مائوف ہو جائیں، یعنی ان پر درم آجائے، تو پیسا ٹیلا ۳۰
برٹین گھنٹہ بعد استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔
اگر گلکسوزوں کے بعد دماغی حالت خراب ہو جائے، اور دیوانگی
کی علامات پیدا ہو جائیں، تو بیلا ڈونا ۳۰ ہر دو گھنٹہ بعد دینا مفید
ثابت ہوتا ہے۔

اس مرض میں بطور حفظ ماقدم پیرولیٹ ڈینم ۳۰ دن میں دو
خوراک دینا چاہئے۔

اکثر مریضوں میں مرکبوس سال ۳۰ اور بیلا ڈونا ۳۰ ہر دو
گھنٹہ بعد باری باری دینے سے مکمل آرام ہو جاتا ہے۔

مریض کو سردی سے بچانا چاہئے، مقام مائوف پر بیلا ڈونا
گلیسرین لگاتے رہنا چاہئے۔

بیلا ڈونا ۳۰ ہر دو گھنٹہ بعد ایک خوراک دیتے رہنا چاہئے۔

اس مرض کے لئے مفید ہے۔

باب ششم

پینے کی بیماریاں

کھانسی COUGH رکھ

تعریف : کھانسی پھیپھڑوں کی حرکت ہے جو پھیپھڑوں سے تکلیف دہ مادہ کو خارج کرتی ہے۔

وجوہات : سردی لگنا، زلہ، زکام کا بار بار ہونا اس مرض کا بہت بڑا سبب ہے۔ گرم، سرد، خشک، گرم، سرد، زکام، دہائی، تپ، حرقت، غوینا، پھیپھڑوں، امراض قلب، معدہ، جگر، دم گردہ، بعض دفعہ دہائی طور پر بھی یہ مرض پھیل جاتا ہے۔

تشخیص : پھیپھڑوں کی بڑی اور متوسط نالیوں کی اندرونی جھلی پر مندرجہ بالا اسباب سے جو اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں غیر طبعی حرکت ہوتی ہے، اس کا نام کھانسی ہے، اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے،

سر دی کی کھانسی :- جو عمر رسیدہ آدمیوں کو سردی کے موسم میں ہوتی ہے
 بلغمی کھانسی :- اس میں بلغم بکثرت خارج ہوتا ہے، کھانسی بار بار آتی
 ہے، تنگی تنفس بھی ہوتی ہے۔

خشک کھانسی :- اس میں بلغم بہت کم نکلتا ہے۔ امراض گردہ، جگر
 قلب اور نفرس کے مریضوں کو ہوتی ہے۔

مشدید کھانسی :- ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی میں ورم ظاہر ہو جاتا ہے
 بچوں، بوڑھوں اور کمزور اشخاص کو زیادہ ہوتی ہے۔

پرانی کھانسی :- ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی میں پرانا ورم ہوتا ہے
 جس میں جھلی موٹی، دانہ دار اور زخمی ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں
 بوڑھوں کو یہ مرض زیادہ ہوتی ہے۔

کالی کھانسی :- یہ مرض اکثر بچوں کو ہوتی ہے۔ اور دورہ کے ساتھ ہوتی
 ہے، کھانستے کھانستے تھکے بھی ہو جاتی ہے، چہرہ متورم اور بیلا ہو جاتا
 ہے، آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔

نزلیہ کی کھانسی :- یہ نزلیہ، زکام کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 سل کی کھانسی :- یہ کھانسی مرض سل کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 بخار کی کھانسی :- یہ بخار کی وجہ سے ہوتی ہے۔

علاج :- کھانسی ایک عام ہونے والی مرض ہے، اس لئے اس کے
 اصل اسباب کو معلوم کر کے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر
 کھانسی کا مادہ رقیق ہو، تو اسے غلیظ بنائیں، تاکہ قابل اخراج ہو جائے
 اور بہت غلیظ کو قدرے رقیق کر کے خارج کرنے کی کوشش کریں۔
 کف کش :- ایوینا کاتب، ۸ گرین، سپرٹ کلوروفارم، ۵ اٹم،
 کیکو کمیفور کو ۲ ڈرام، ایکوا ایک ادیس۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں، خشک کھانسی جو نزہ
 زکام یا کسی اور وجہ سے ہو، کے لئے بہت مفید ہے،
 کفصول :- پلو گسرہ نماز راست غٹھی، اٹولہ، نشاستہ، اٹولہ،
 گوڈ کیکر اٹولہ، افسیون ۹ ماشہ،

جملہ ادویہ کو بارہک کر کے پانی میں گوندھ لیں، بچوں کے لئے بقدر
 ماش اور بڑوں کے لئے بقدر بخود گولیاں بنائیں،

خوراک اگولی دن میں ۴ بار کھانسی پر قسم، نزہ، کالی کھانسی
 کے لئے کامیاب نسخہ ہے،

حب سیکراں :- زنجبیل، اجوائن خراسانی، تخم دھتورہ، ہموزن
 گولی بقدر بخود بنا دیں،

فواش :- خشک کھانسی، نزہ، زکام، درد سر کے لئے مجرب ہے،
 اس حالت میں جبکہ مواد رفیق ہو، حلق میں خراش اور کھانسی بار بار
 اٹھتی ہو،

جوشندانہ کھانسی :- دارحینی ۴ ماشہ، سہیدانہ ۴ ماشہ، غٹھی اٹولہ
 ۲ ماشہ، زودنا اٹولہ ۲ ماشہ، آبخیر ۱۰ عدد، خشتا ش ۳ ماشہ، مصری ۲ اٹولہ
 آدھ سیر پانی میں جوشندانہ بنا دیں، صاف کر کے بقدر ۵ اٹولہ
 استعمال کریں، دن میں تین بار، کھانسی پر قسم کو نافع ہے،

دسیگر :- شربت اعجاز تر و خشک کھانسی کے لئے ویسی طب کی
 بہترین دوا ہے،

طوطا خوراک ۳ ماشہ پانی میں ملا کر پیئیں، دن میں تین بار،
 میٹھی پڑیہ :- پیٹھکڑی بریاں اٹولہ، کھانڈ سفید اٹولہ،

دو لون کو بارہک پیئیں، مقدار خوراک ۱۰ ماشہ خشک کھانسی دوا کو

دودھ سے اور ترکھانی والے کو پانی سے دیں، دن میں تین خوراک،
پرائی کھانسی کے لئے بے بغیر نسخہ ہے،

دوا کے ٹاگ کسیر: بردانہ الاچی خورد، دانہ الاچی کلاں، طباشیر، دارچینی
ٹاگ کسیر ہر ایک ایک تولہ، فلفل سیاہ ۶ تولہ، صندل سفید ۱۲ تولہ،
چینی سفید ۲۴ تولہ، ورق طلا ۴ رتی، کستوری ۴ رتی،

ورق طلا کو چینی میں کھل کر دیں، جسے کہ چمک باقی نہ رہے
باقی ادویہ کے بعد دیکر سے ملا کر کھل کر دیں،

مقدار خوراک: اماشہ ہمراہ عرق کیوڑہ یا تازہ پانی سے دیں،
نئی پرائی، تر و خشک کھانسی کے لئے نہایت سریع الاثر تجربہ دوا ہے
نوٹ: یہ نسخہ ورق طلا اور کستوری کے بغیر بھی تیار ہو سکتا ہے۔

شدید کھانسی میں جب سوائی نابیوں میں بلغم بکثرت جمع ہو، تو محذر اور
قافیض دوا نہیں دینی چاہئے، بلکہ مخرج بلغم دوا میں دے کر بلغم کو
خارج کرنا چاہئے۔

مخرج بلغم: مکسیر پوٹاسیم آئیوڈائیڈ ۵ گرام، ایونیم کا رب
۲ گرام، ٹیکچر آف اسپیکس ۱۰ گرام، ٹیکچر سٹرامونیم ۱۰ گرام، ٹیکسیرین بہم
ایکوا ایک اونس،

اسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں: بہترین مخرج بلغم ہے
اکسیر کھانسی: زرگمھاں، سہاگہ، الاچی خورد، سندھ، افسیون
تولہ تولہ، جلد ادویہ کو ہر ایک پس کر گویاں بقدر رتی رتی تیار کریں،
مقدار خوراک: اگونی دن میں تین خوراک ہمراہ پانی نیم گرم دیں
کھانسی کے لئے اکسیری دوا ہے۔

کارڈ اسکی اتولہ رشتہ اتولہ میں ملا کر چٹانا کھانسی کیلئے مفید ہے۔

برائے کھانسی گرم در تخم خشخاش اور پوست خشخاش بقدر مناسب
پانی میں اچھی طرح جوش دے کر صاف کریں اور نبات سفید ملا کر
پکائیں یہاں تک کہ لعوق کا تمام تیار ہو جائے مریض کو چٹائیں
یہ چالینوس، رازی اور سولہ دوسرے حکیموں کا قول ہے کہ تخم گرم
کھانسی کے لئے مجرب ہے۔

اگر کھانسی سر سے پیچیدوں کی طرف دائمی طور پر رفیق اور گرم مواد
کے گرنے سے پیدا ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کو منہ میں
ایسی گولیاں رکھنے کی ہدایت کریں جو مادہ میں غلط اخلاط و وجہ پیدا
کرنے کے پیچیدوں کی طرف گرنے سے روک دیں مثلاً نشاستہ، مغز بادام
شیریں، کثیرا، آرد باقلا مقشر، تخم خشخاش، پوست خشخاش، صمغ
عربی، گل درمنی سے لعاب اسفول میں بنائی ہوئی گولیاں چوسیں۔
سنو بلا دی چورن، کوزہ مصری ۱۶ تولہ، طباشیر ۸ تولہ، دارچینی
۱ تولہ، علقہ راز ۴ تولہ، دانہ الائچی خود ۲ تولہ۔

تمام دواؤں کا سفوف تیار کر کے ملا لیں، تیار ہے۔
مقدار خوراک ۶ ماشہ دن میں تین بار دیں، ہمراہ شربت نعش یا پانی
برقہم کی کھانسی کے لئے اکسیر ہے، اور قوت ہاضمہ کو بھی تیز
کرتا ہے۔

پرائی کھانسی کے لئے، اگر کو رخام نصف سیرے کر چار سیر پانی میں رات
کو بھگو کر شبنم میں رکھ دیں، صبح اس قدر جوشش دیں کہ گور گور گل جائیں
اس کے بعد گور نکال کر پینک دیں، اور نئے گور رخام نصف سیر اس پانی
میں ڈال کر شبنم میں رکھیں، صبح جوشش دے کر مل چھان کر بقدر مناسب
یعنی سفید ملا کر تمام تیار کریں۔

مقدار استعمال ایک ایک تولہ دن میں چار مرتبہ دیں، پرانی کھانسی کے لئے بے نظیر نسخہ ہے۔

اکسیر کھانسی خشک در معزز بادام مقشرے عدد مصری ۲ تولہ، مکھن گاؤ ۲ تولہ، بوقت صبح گھوٹ کر چٹائیں، اور رات کو بالائی کھلائیں،

اگر مریض بار بار کھانستا ہو، اور باوجود کھا نسنے کتے اندر سے کچھ نہ نکلتا ہو، تو یہ نسخہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔

ورم حنجر، نمونہ، امراض قلب اور خرابی رحم کی وجہ سے ہونے والی کھانسی کا علاج ان امراض کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں،

کھانسی کا مکسچر (۱) در لاسکیوار ایونیٹا ساٹس اس ۲ ڈرام، سپرٹ ایتھر نائٹرو سالی ۲۰ منم، وائٹم اپیکاک ۷ منم، ٹیکچر کمیفیر کو ۲۵ منم، اکیوا ایک ادنس،

ایسی ایک ایک خوراک ہر جن چار گھنٹہ بعد دیں، شروع کھانسی میں مفید ہے مکسچر (۲) در ایونیٹیم کلورائیڈ ۷ گرین، پوٹاشیم آسٹوڈائیڈ ۴ گرین، پوٹاشیم بائیکا رب ۱۰ گرین، وائٹم اپیکاک ۵ منم، ایکٹریکٹ کسیر پائیزا ۲۰ منم، اکیوا ایک ادنس،

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں،

جب لغم نہ نکلتا ہو، اور خشک کھانسی اٹھتی ہو، جسے ٹھیکیدار کھانسی کہتے ہیں، کے لئے مفید و تجرب ہے،

حب سرفور، سفوف طبعی ۰۲ تولہ، کارطاسنگی اتولہ، نشاستہ اتولہ، شکر تیغال اتولہ، کھانڈ ۱۰ تولہ، ست پودینہ ۱۰ ماشہ،

سب کو ملا کر بڑی بڑی گولیاں یا ٹکیاں تیار کر لیں، منہ میں رکھ کر چوسیں، ہر قسم کی کھانسی کے لئے بے حد مفید و تجرب دوا ہے،

تو باقی کھانسی اور نوشادر، سوہاگہ، میبعہ سائکہ، ست طحی ہر ایک ایک تودہ، مرکبی، کتر اگوند، گوند کیکر ہر ایک چھ چھ ماشہ، افیون ۳ ماشہ، زعفران ۳ ماشہ، تمام ادویہ کو بار یک پس کر بقدر خود گولیاں بنیاد کریں، مقدار خوراک اگر لی دن میں تین خوراک شربت یا پانی سے دیں،

خشک، تر، نمی و پرانی کھانسی کے لئے اکسیری دوا ہے، دوا بے جھرت، بر پو ست کوکنار یعنی پو ست خشخاش کو بار یک پس کر کشیشی میں رکھ لیں، مقدار خوراک ایک ماشہ ہمراہ دودھ نیم گرم جس میں چینی ملائی گئی ہو، رات کو کھلائیں، مریض تمام رات آرام سے رہے گا، لیکن یاد رہے کہ دن کے وقت خواہ نمید بھی آئی ہو، تو بھی نہ سونے دیں،

دبائی کھانسی اور رات کو ہونے والی کھانسی کے لئے اکسیر ہے، کالی کھانسی کے نسخے بچوں کی امراض میں ملاحظہ فرمائیں، گریمالٹ سیرپ :- ساختہ فرانس، کیلیم اور ناسفورس کا شربت ہے مقدار خوراک دو ڈرام صبح، دو پہر، شام، وارڈ بریز کمپونڈ ریڈ لیبل :- یہ کاڈ لیور آیل، کریازوٹ اور ہائپو ناسفاس کا مرکب ہے،

مقدار خوراک ایک تا چار چمچ خود دن میں تین بار، وکمول کمپونڈ ساختہ شارب ڈم :- یہ مالٹ کاڈ لیور آیل لیورس ہائپو ناسفاس کریازوٹ اور گوانیکول کا خوشذائق مرکب ہے مقدار خوراک جوانوں کے لئے ۲ تا ۴ چمچ خود قبل از غذا دن میں تین بار دیں، یہ تینوں شربت پیچیدہ ہیں، کو تعویذ دینے اور کھانسی نمی پرانی کو رفع کرنے میں بے حد مفید و موثر ہیں،

ریسائل سیرپ ساختہ سیبا، در

مقدار خوراک اچھے خود دن میں تین بار دیں، کھانسی کے لئے

مفید ہے۔

کو ڈائل در

مقدار خوراک ۲ چمچ ہر چار گھنٹہ بعد دیں، کھانسی ہر قسم کے لئے

بے نظیر و ذاب ہے۔

دیگر ادویہ اپنی سندھین سیرپ (سندھوز) ، سفید پٹل (شارب

ڈوم) ، کو سوم (مرک) ، سیرولین (روچی) ، وغیرہ پیپٹ ادویہ بھی

کھانسی کے لئے مفید ہیں، ہرچہ ترکیب استعمال ہمراہ ہوتا ہے۔

نسخہ کھانسی :۔ آئش ڈھین پے کرتین ، سیرپ کوڈین فاسفٹ اڈرام
ایکوا ایک اونس،

ایسی ایک ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں تین مرتبہ دیں کھانسی

کے لئے بے حد مفید ہے۔

انجکشن کھانسی :۔ پردکین پینی سیلین ۴ لاکھ یونٹ ، عضلاتی انجکشن

روزانہ ایک بار ، پہلے ، دوسرے انجکشن کرنے سے ہوا کی تالیوں کی سوزش

اور درم کی وجہ سے ہونے والی کھانسی کے لئے بے حد مفید و مجرب و

ہے۔ عام طور پر چار پانچ انجکشن کرنے سے کھانسی رفع ہو جاتی ہے۔

کھانسی کا ہومیوپیتھی علاج

اکسیر کھانسی :۔ سگے میں خراش خشک ، ادھی آواز سے اور رات کو زور

بکڑے ، تو بیل ڈونا ۶ کا استعمال اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

اکو ٹائٹ ۳ بر خشک کھانسی اور ابتدائی حالت میں دیں۔

اگر بلغم نکلے، تو ہیر سلفر ۶ دیں، اگر کھانسی کے ساتھ معده میں
بوجھ اور سرد درد ہو، تو کمس دامیکا ۶ دیں،

اگر کھانسی کے ساتھ قے آئے تو اسپیکاک ۳، اگر کھانسی کے
ساتھ سینہ میں درد ہو، تو ایرایوینا ۳،

اگر کھانسی کے ساتھ گلے میں درد ہو، تو مرکبوس ۳۰، اگر کھانسی
کے ساتھ پیشاب نکل جائے تو کاسٹیکم ۳۰ مفید ہے،

کھانسی کی ابتدائی حالت میں جبکہ خشک کھانسی، سینے میں درد،
بلغم کے ساتھ خون کا اخراج ہو، تو فیرم فاس بے حد مفید ہے،

کالی میور، فیرم میور، فیرم سلف، گینشیا فاس، کالی فاس وغیرہ
ادویات بھی کھانسی کے لئے مفید ہیں،

اکسیر کھانسی :-

فیرم فاس، کالی میور، کالی فاس ہوزن

سرٹھنڈا محسوس ہو، چھینکوں کی زیادتی، کھانسی، سانس لینے میں تکلیف
چھاتی میں درد، ٹھنڈے پانی کی خواہش

خود اک سرد ٹھنڈ کے بعد ۲ ٹکیاں،

فیرم فاس بہ ہر قسم کی کھانسی کا پہلا درجہ، کھانسی خشک، پیچہ طے کی نلی میں
درد اور درد، بلغم کے ساتھ سرخ رنگ کے خون کا اخراج ہو،

کالی میور :- زبان پر سفید یا سفیدی مائل، سفید میل کی نہ، بلغم گاڑھا اور
لمبیدار،

کالی فاس :- بلغم گاڑھا، درد، ٹکین اور بدبودار ہو، اور سینے میں
درد ہو۔

دمہ رزق النفس

ASTHMA

دایستھا

تعریف :- اس مرض میں سانس مشکل سے آتا ہے۔
 وجوہات :- یہ مرض اکثر موردی ہوتا ہے۔ گردوغبار، سرد ہوا کا
 لگنا، نوثرین کا بڑھ جانا، حلق و حنجرہ کے امراض، نزلہ، زکام،
 کھانسی، معدہ کی خرابی، دل اور پیچڑوں کے امراض اس کے اسباب میں
 تشخيص و علامات :- پیچڑے کی بوائی نالیوں اور ڈایا فرائم کے
 عقدہ میں تشخ ہو کر تگی سانس کے دورے
 شروع ہو جاتے ہیں، دمہ کا دورہ اکثر اوقات کو ہوا کرتا ہے، بعض
 کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور سانس مشکل سے آتا ہے، یہ مرض
 مشکل العلاج ہے۔

علاج :- اس مرض کا اصول علاج یہ ہے کہ دورہ مرض
 کی تکلیف کو کم کریں، مدت دورہ کو گھٹائیں، اور وقفہ کی حالت میں
 اصل سبب مرض کو دفع کریں، خصوصیت سے مرض دمہ کے
 ہاتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی عموماً قوت مضمتیں نقص واقع
 ہوتا ہے، اور نزلہ کا خیال رکھیں، کیونکہ اس مرض کی اصل جڑ
 نزلہ ہے۔

اکسیر دمہ :- ایف ڈی این لائیڈ، ٹورائڈ ایک ڈرام، کشتہ پشکری
 شیر مدار دالا ۱ ڈرام
 باجم ملا کر کھولیں، اور سفوف بنا کر محفوظ رکھیں۔

دورہ کے وقت ۳ رتی دوائی ہمراہ آب تازہ . بعد از دورہ ا رتی
 دن میں تین بار . دتمہ کا دورہ توڑنے . روکنے اور اس کی بیخ کنی کرنے
 کے لئے بہترین مسلمہ دوائی ہے .
 دیگس افیڈرین کی گولیاں اکیلی بھی دتمہ کے لئے مفید ہیں .
 خوراک اگولی دن میں تین بار .

بخور دتمہ در شورہ قلمی . برگ خشک دھتورہ ہر ایک ۲ تولہ . ست لوبان
 ۳ ماشہ آب سولف دیسی ۵ تولہ .

جلد ادویہ کو کھل کر کے سفوف بنا دیں . بوقت ضرورت ڈھکنے
 کو ٹکوں پر ڈال کر ڈھواں لیں . یا جلد میں بھر کر حقہ پیس .
 محلول دتمہ در پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۲ ڈرام . پیپرٹ کلوروفارم
 ایک اونس . پیپرٹ ایوینا ایرومیشک ایک اونس . ٹینکچر لوبیلیا ایچھر
 ایک اونس . بوتلی میں ڈال کر حل کر لیں .

خوراک اڈرام دو اونس پانی میں ملا کر دن میں دوبار استعمال کریں .
 دتمہ کا کامیاب علاج ہے . دورہ کو فوراً دور کرتا ہے .

چٹکلمہ در دھتورے کے پتوں کا سکرپٹ بنا کر سینا بعض حالتوں میں
 جادو نما اثر کرتا ہے . دتمہ کے دورہ کو اتنی دقت زایل کرتا ہے .
 دو ۱ ٹے دتمہ در نیم الفار . بارہ ہر ایک تولہ تولہ . ورق نعترہ ۴ ماشہ
 سفیدی سفید مرع میں کھل کر کے مستدارکن روشنی گولیاں بنا دیں
 کوزہ گلی میں گل تخت کر کے دس سیرا دیوں کی آگ دیں . کشتہ ہوگا .
 پسینا کر محفوظ رکھیں .

خوراک ایک چاول ہمراہ پان . جلوہ یا کھن میں استعمال کریں .
 غذا خوب مرغن کھائیں . زیادہ سونا اور بغم پیدا کر نیوالی پیہروں سے

پر مبر لازمی ہے، دمہ کے لئے بے نظیر علاج ہے،

دمہ کا شکیکہ یہ اس مرض کا خصوصی شکیکہ ایڈرینلین ADRENALINE ہے، جو بحالت دورہ ۵ سے ۱۰ ہونڈ کی مقدار میں جلد میں کیا جاتا ہے، چند منٹ میں سانس درست ہو کر دورہ دور ہو جاتا ہے، حسب سانس نیچھ ہو جاتے، تو ایڈرین یا محلول دمہ استعمال کرائیں، دمہ سے نجات ہوگی، دمہ کا دورہ دور کرنے کے لئے اول درجہ کا انجکشن ہے، خوب تزیاتی دمہ ہر سم انفار، کھٹی بوٹی کے پانی میں بقدر دانہ یا جرہ گولیاں بنائیں، ایک گولی سرروز، ہمراہ دودھ گائے دیں، (نوٹ، پہلے کچھ کھا کر پھر گولی منہ میں ڈالنی چاہئے، نہایت شاذام، مجرب اور بے ضرر نسخہ ہے،

دمہ کا سنیا می تختہ ہر شیر مٹوسر ڈنڈا، جو کاک آٹا حسب ضرورت لیکر شیر مٹوسر میں گوندھ کر روٹی بنا کر گرم تھے پر پکائیں، روٹی کی دونوں طرف اچھی طرح پکائیں، پھر نیچے اتار کر آسن دسختہ سے خوب زور سے کھائیں، جتنے کہ تک جان ہو جائے، خشک کر کے سفوف بنائیں، مقدار خوراک ۶ ماشہ ہمراہ آب اس سے تھو واسپہال جاری ہوں گے، ملغمہ خارج ہو جائے گی، بعد میں مہذرجہ ذیل ادویہ کا حریرہ بنا کر استعمال کریں، دمہ کا کامیاب علاج ہے،

حریرہ ہر سیوس گندم ۳ تولہ، چہرہ مار مغز اتود، خشیاش ۳ ماشہ مغز بادام ۳ تولہ،

حریرہ بنا کر صبح و شام کھلائیں، انشاء اللہ دمہ یعنی کا نام دشنام

نہ رہے گا

دیگیا یہ حریرہ کا نسخہ نزہ، زکام، طبعی کھانسی، انفلوئنزا میں بھی مفید و مجرب ہے،

دمہ کے علاج میں ہمارا معمول

اول دورہ رفع کرنے کے لئے ایڈرینلین **ADRENALINE** ایک میں ایک ہزار کا ۱۲ قطرہ کا جلدی انجکشن کر دیا جاتا ہے جس سے فوری طور پر سانس کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ایک گھنٹہ بعد کیسیم گلوکونیٹ اسٹڈوز ۱۰ سی سی کا وریدی انجکشن کر دیا جاتا ہے جس سے جلد تکلیف وہ علامات بالکل رفع ہو جاتی ہیں، اور مریض کو تقویت پہنچ جاتی ہے پیسے کے لئے مجلول دمہ رفع اپنی ڈرین دو خوراک صبح و شام استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے، اس سے دمہ کی حملہ تکالیف رفع ہو جاتی ہیں، اگر مریض پوری احتیاط رکھے، تو پھر دمہ کا دورہ جلد نہیں ہوتا، اکسیر دمہ اور مریض دمہ کو جس وقت دمہ کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو مریض اس وقت کو اپنی زندگی کے آخری لمحات سمجھتا ہے، اور حیات موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، سانس کی تنگی اور رکاوٹ اس کو زندگی میں موت کا مزا چکھا رہی ہوتی ہے، اگر آپ ایسی حالت میں کوئی مریض دیکھیں، تو اس پر اس اکسیر کا استعمال کریں، دو چار منٹ کے بعد دمہ دورہ رفع ہو جائے گا، اور سانس درست ہو جائے گا، اگرچہ یہ دوا مریض دمہ کو مرض سے مستقل نجات نہیں دلا سکتی، لیکن دورے کی تمام تکالیف یکسر ختم کر دیتی ہے، وہ اکسیر یہ ہے۔

لائنگوار ایڈرینلین بیسٹ سویوشن معقدار ۱۲ قطرے جلدی انجکشن کریں، ایک انجکشن سے ہی دو منٹ میں سانس درست ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چند منٹ میں تمام تکالیف رفع ہو جاتی ہیں، بشرط ضرورت دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا معمول یہ ہے، کہ ایڈرینلین کا ٹیکہ کرنے کے بعد

سب سانس ٹھیک ہو جائے، تو کورامین ایک سی سی کا عضلاتی ٹیکہ کیا جاتا ہے، یا کینیم گلوکونیٹ (سندوز) ۱۰ سی سی بذریعہ دریدی ٹیکہ داخل کیا جاتا ہے، اس سے مریض کو از حد تشویش پہنچتی ہے، اور سانس مستقل طور پر درست ہو جاتا ہے، دوبارہ فوری طور پر دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا، اور ملغم کا اخراج بھی ہو جاتا ہے۔

(نوٹ) ایڈرینے لین، یعنی ڈرین کے ایک سی سی کے تیار شدہ ایسویز بھی ملتے ہیں، ایڈرینے لین تیار دینے سے بہتر ہیں، دمہ کی ایکسیری گولیاں، یہ وہ گولیاں ہیں جو دمہ کے مریضوں کی موٹائی، خنم خوار اور تھکی ہمدرد ہیں، دمہ کے مریضوں کو ہر وقت، اپنے پاس رکھنی چاہئیں، یہ گولیاں فوری طور پر دورہ کے وقت ڈاکٹر کا کام دیتی ہیں۔ اگرچہ مستقل طور پر مرض دمہ کو رفع نہیں کر سکتیں، لیکن عارضی طور پر دمہ کی جلد تکالیف کو بہت جلد رفع کر دیتی ہیں۔

ایسی ڈرین: مقدار خوراک اگر بن تا ۲۰ گریں پانی کے ساتھ استعمال کریں، دورہ کے وقت مقدار خوراک میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، علاوہ ازیں کھانسی ہر قسم، کالی کھانسی، اہل کیر یا دھپا کی، جہازی، تھوے وغیرہ میں بھی مستعمل ہیں۔

نوٹ: ایسی ڈرین کے تیار شدہ شربت مثلاً فلیوڈل، الفیڈرین، کت سیرپ، منڈیو، ٹکونروڈا وغیرہ بھی دستیاب ہوتے ہیں، جو مندرجہ بالا فوائد کے حامل ہیں۔

تذیقاتی دوا: اگر ایک سیاہ، تھلی سوزہ ۵ قطرہ، دہی، یا دوسری اور تھلی سوزہ ملا لیں، ایک تھلی باریک پترے بنا لیں، اس سے کھانسی، کالی کھانسی، اہل کیر یا دھپا کی، جہازی وغیرہ

ایک تہ قلمی شوزہ دی میں ملا یا ہوا رکھیں، اسی طرح کے بعد دیگرے
 رکھتے جائیں، بعدہ برتن کو قفل حکمت کر کے دس سیرادہوں کی آگ
 دیں، سرد ہونے پر نکال کر کشتہ شدہ ابرک کو باریک پس ہیں،
 مقدار خوراک ۲ تا ۴ رقی کھن یا بالائی میں پیٹ کر دیکھیں دن
 میں دو خوراک، صینق النفس دومہ، پرانی کھانسی اور پرانے بخار کے لئے
 اکسیری دوا ہے۔

سٹوف عجیب : نفقل دراز، نفقل گرد، سوخہ ہر ایک تولہ تولہ،
 عسارنگی ۶ ماشہ، سولف ۲ تولہ، سناکی ۴ ذرہ، نمک سانچر، نمک
 خوردنی، نمک سیاہ، نمک شیشہ، جو کھارو نوشادر ہر ایک ۶ ماشہ،
 جملہ ادویہ کو کوٹ پس کر باہم ملائیں۔

خوراک ۲ ماشہ بعد از غذا دو وقت ہمراہ پانی، ستنم کو تیز کرتا قبض
 کو دور کرنے میں بے مثل ہے، بلغم کی پیدائش کو روکتا ہے خصوصاً دمہ
 یعنی میں اکسیر ہے، گرمی والے مریضان دمہ کو شربت بننا۔ سے

کھلا میں مرض دمہ کی پیٹنٹ ادویات

فیلسول : یہ ایک پیٹنٹ دوا ہے، ایک خوراک ایک پڑیہ میں بند
 ہوتی ہے، پانی کے ساتھ کھائیں، ایک خوراک سے دورہ ٹک جاتا ہے
 دمہ قلبی اور دمہ جینی کے لئے اکسیر ہے۔

الفی زون : مقدار خوراک اٹکیہ دن میں دوبار، دمہ کے عوارضات
 کے لئے بے حد مفید ہے۔

زیغردل شیرپ : یہ انفیڈرین کا شربت ہے، مقدار خوراک ایک چیمہ
 خورد بغیر پانی ملائے ہوئے ہر چہار گھنٹہ بعد دیں۔

کھانسی، دمہ، کالی کھانسی وغیرہ کے لئے مجرب ہے۔
 فرنیوئل: یہ اس دوا میں انگریزین، مٹی ادبین اور بار بیٹون شامل ہے
 رات کے دورہ کو روکنے کے لئے ایک ٹمکیہ سوتے وقت کھلانا کافی ہے
 دمہ کے عوارضات کے لئے مفید ہے۔
 اسوپیرین: یہ دوا شدید یعنی دمہ اور خراب دمہ جس کا دورہ ختم نہ
 ہوتا ہو، کے لئے بطور ملحوظہ استعمال کی جاتی ہے۔
 ہدایات: ہر دمہ کے مریض کو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا
 نہیں چاہئے، بلکہ تین چار گھنٹے بعد سونا چاہئے۔
 ہر قسم کی ثقیل اور تلخ پیداکر نے والی غذاؤں سے پرہیز کرنا
 ضروری ہے، جس غذا کے کھانے سے دورہ ہو، اُسے ترک کر دینا
 چاہئے۔

مریض دمہ کو سرزدیوں میں کاڈیور، آئیل، مچلی کا تیل اور اس کے
 مرکبات سکالٹش ایلشن اور اینسٹن سیرپ وغیرہ استعمال کرانا بے حد
 مفید رہتا ہے۔

نوٹ: اس مرض کا نا حال مکمل شافی علاج معلوم نہیں ہو سکا،
 البتہ اس کی تکلیف وہ علامات کو رفع کرنے کی بے شمار ادویہ معلوم
 کر لی گئی ہیں۔

دمہ کا ہومیوپیتھک علاج

بلاٹاوری انٹیاس بلڈنگ پیر دمہ کی دوا ہے، دورہ روکنے کے
 لئے بہت مفید ہے، پندرہ بیس دن کے استعمال سے مکمل آرام ہو جاتا
 ہے۔ نوراک قطرے پانی صاف میں ڈال کر دیں، دن میں چار مرتبہ۔
 شدت مرض جوشٹ کے لحاظ سے کم و بیش کر سکتے ہیں۔

اکسیر دمہ در میرے ہاتھوں بیسی لینیم ۲۰۰ سنتہ میں ایک بار یا نو بر
کلینیم ۱۰۰۰ مہینہ میں ایک بار اس مرض کو جراثیم سے کھونے کے لئے بہت
مفید ثابت ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حسب علامات دوسری
دواؤں کا استعمال ہونا بھی ضروری ہے۔

دوائے دمہ در جہاں دمہ کی کسی قسم کی علامات نہ ہوں اور تکلیف
زیادہ ہو تو یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔

کالی فاس ۳ - گلیشیا فاس ۳ - ہر بندہ منٹ بعد ایک
خوراک دو۔ دمہ کے لئے بے حد مفید ہے۔ ڈاکٹر کاشانی

اکسیر دمہ در ایفیدرین پل گرین، نینو بار میٹون پل گرین، اینونا لین
۳ گرین، ایک شوگر ۵ گرین۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ دیں۔ دمہ کے درد کو کم
کرنے اور ختم کرنے کے لئے مفید ہے۔

مکسچر دمہ در ایپو مارفین ہائیڈرو کلورائیڈ ۲ گرین، پوٹاسیم آیوڈائیڈ
۵ ڈرام، سیرپ چیری ۴ اونس۔

ترکیب تیاری در پیسے ایپو مارفین کو مار مقطر ۳ ڈرام میں حل کر کے تمام
دواؤں میں ملائیں۔

مقدار خوراک اچھے چائے بھر بر تین گھنٹہ بعد دیں۔ دمہ کے مریضوں
کے لئے بھید مفید ہے۔ دورہ اور کھانسی کو رفع کرتا ہے۔

اکسیر دمہ در اسپیک ۴ - آرسنک ۴ - ہر دس منٹ بعد باری باری
دو دن دواؤں کی ایک خوراک دیں۔ چند خوراک دینے سے دورہ کی
شدت ختم ہو جائے گی۔

کمل افادہ کے لئے اپیکاک ۱۰۰ اور آر سنک ۱۰۰ کی ایک خوراک
ہر منفقہ بعد دینی چاہئے۔ دمر کو یخ دین سے اکھاڑنے کے لئے بھید
مفید و مجرب ہے۔

دمر کے علاج میں اپیکاک، آر سنک، سلفر، بلاٹا اور ای انٹیس
بھی مفید ہیں۔

نسخہ ہر سیاب، گندھک آم، سار ہر ایک ایک ٹوڈ، دو ٹوڈ کو یک جا
کھول کریں تاکہ بجلی خوب سیاہ بے چمک ہو جائے یہ بجلی خرمہرہ درد کے
نشگان میں پھردیں اور آٹے سے بند کر دیں

اب ان خرمہروں کو سہاگہ ۱۰ ٹوڈ نیچے اوپر دے کر دھان کی ۴ سیر بھوسی
میں ہوا سے محفوظ جگہ میں بستہ رکھتے کریں۔ اب اسے مع خرمہروں کے
باریک کر لیں۔ اور اس سیاہ کشتہ کو بچھا طلت رکھیں۔

ترکیب استعمال: در دورتی صبح و درتی شام ہمراہ شربت زرد
دمر کے لئے اکسیر بے نظیر ہے۔

دیگ، در مینگ بریاں، افیون بریاں ہر ایک ۱۰ ٹوڈ، سہاگہ
صبر زرد ہر ایک ۲ ٹوڈ

نام اجزاء نہایت باریک پیس کر آب برگ پہنچنے ۱۰ ٹوڈ میں کھول
کر کے بقدر بخور گولیاں بنالیں۔

ترکیب استعمال: در دو دو گولی مویرہ منفقے میں لپیٹ کر صبح و
شام بغیر دانٹوں سے چبائے اتار لیا کریں۔ دمر کے لئے یہ گولیاں
اکسیر اعظم ہیں۔ خوبی یہ ہے کہ نہایت سستا اور آسان نسخہ ہے
اور فوائد عظیم رکھتا ہے۔

PNEUMONIA (LOBAR) (لوبر پنونیہ)

ذات الریه

تعریف :- اس مرض میں پیپیرٹوں میں دم ہو جاتا ہے۔
وجوہات :- اس مرض کا باعث ایک خوردبینی جراثیم ہوتا ہے جسے
فرشکیلز نمونیا یا فرنیکل صاحب کا کرم نمونیا کہتے ہیں اور عام طور پر
نزلہ، زکام کی حالت میں یا بعد میں سردی لگنے سے ہوتا ہے اور کبھی شدید
کھانسی، تپ، حرقت، خسروہ، چیچک وغیرہ میں بھی ہو جاتا ہے۔

تشخیص و علامات
اس مرض میں پیپیرٹے کی ساخت میں دم
ہو جاتا ہے اور کبھی پیپیرٹے کا ایک حصہ یا
سالم پیپیرٹہ اور کبھی دونوں پیپیرٹے ملتے ہیں۔ اس مرض میں دم
کے ساتھ یکایک روزہ سے سخت بخار ہو جاتا ہے جس کی حرارت ۱۰۳ سے
۱۰۵ تک ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی پسلی اور نعل کے پاس دھیمہ دھیمہ درد
شروع ہو جاتا ہے۔ درد سانس لینے اور کھانسنے سے زیادہ ہوتا ہے
اور سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ شدید حالتوں میں تیس چالیس تک
فی منٹ سانس آتی ہے۔

جس طرف کے پیپیرٹے میں دم ہو، اس طرف کا رخسار سرخ ہوتا
ہے۔ شروع مرض میں کھانسی خشک آتی ہے۔ پھر بلغم آنا شروع ہو جاتا
ہے اور تیسرے چوتھے دن بلغم کے ساتھ خون کی آمیزش بھی آنے
لگتی ہے، خون میلے رنگ کا اور بلغم غلیظ ہوتا ہے۔
آلہ اسٹتھسکوپ کو سینہ پر لگا کر دیکھنے سے مادیوں پیپیرٹے

میں غنم کی کھر کھر اہٹ ، سانس کی آواز کم ، رکاوٹ اور تنگی بھی معلوم ہوتی ہے۔ سینہ کو ہاتھ سے ٹھونکنے سے پیچھڑے کی آواز کم یا غائب ہوتی ہے طبیعت میں بے چینی ، سر درد ، بے خوابی ، کھانسی ، سینے میں درد ہوتا ہے۔ مونہ کا بخار آٹھ نو دن تک چڑھا رہتا ہے۔

جدید تحقیقات کی رو سے اس کی کئی اور اقسام بھی دریافت ہو چکی ہیں۔

۱، ذات الریه فغسی :- یہ اسٹریٹو کاکل جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مونا زکام دہائی اور خسرو کے درمیان ہوتا ہے۔

۲، ذات الریه بنته عنبیه :- یہ سیٹفلو کاکل جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مریض بہت کمزور ہوتا ہے۔ کھانسی اور دم کشی عام ہوتی ہے۔

۳، ذات الریه فرید لینڈر :- یہ کلیب سیلا جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔

۴، ذات الریه جھٹی :- یہ دائر س مونہ سے ہے۔ یہ بھی دہائی زکام اور خسرو کے درمیان یا بعد ہوتا ہے۔

۵، ذات الریه ایلو فلپس زکام دہائی :- اس میں ہوائی نالیوں میں دم ہو جاتا ہے۔ زکام دہائی کے جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ قسم اکثر چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے۔

۶، ذات الریه سعالی :- اس کو براکو مونہ بھی کہتے ہیں۔

علاج :- جب کسی مریض میں مونہ کی علامات پائی جائیں ، تو مریض کو سردی سے محفوظ رکھیں۔ گرم اور ہلکا کپڑا پہنائیں ، خداداد جراثیم کی تشخیص کریں ، لیکن یہ خورد بینی امتحان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر خورد بینی سہولت میسر ہو ، تو فہما ، ورنہ ظاہر علامات کو اچھی طرح دیکھ کر اندازہ لگا لینا چاہئے۔

عام طہ پر نمونہ نیمو کو کل جراثیم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم

شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں۔

اکسیر نمونہ: پینلین ۵ لاکھ پونٹ، ڈسٹلڈ واٹر ۵ سی سی، ملا کر عضلاتی
ٹیکہ کریں۔ صبح و شام، سے انجکشن سے ہی مریض نمونہ کا درجہ حرارت
بخار، کھانسی اور درد میں کمی شروع ہو جائے گی۔ بارہ گھنٹے کے بعد یا
اس سے کچھ زیادہ وقت میں درجہ حرارت نارمل ہو کر بخار اور درد رفع ہو جائیگا
اگر دروز زیادہ ہو، تو ڈورس پوڈر، اگرین کی ایک خوراک چائے گرم
سے دیں، اگر دوبارہ ضرورت پڑے، تو دوسری خوراک دیں، ورنہ ایک
خوراک ہی کافی ہے۔

مقام درد پر یعنی منٹ ٹرین ٹائن کی ماسش کریں، یا پمپس آف کیولین یعنی
انٹی فلو جسٹین کا پلاسٹر لگائیں، اور اس کے اوپر ہاٹ واٹر بوتل سے ٹکور
کریں، اس سے درد موقوف ہو جائے گا۔

اگر ضعف طلب ہو، تو کورامین ایک سی سی کا جلدی ٹیکہ کریں، یا
دوا المسک ۳ ماشہ، عرق گاؤ زبان کے ساتھ کھلائیں۔

نمونہ کے علاج میں ہمارا روزمرہ کا یہ معمول ہے، جو سینکڑوں دفعہ کا
تجربہ شدہ ہے، دوا انجکشنوں سے ہی تمام علامات رفع ہو جاتی ہیں،
ایک دو دن میں مریض بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔

اگر سرسامی عوارضات بھی لاحق ہوں، تو پھر بھی پینلین اکسیر لائٹ

ثابت ہوتی ہے۔

پیسٹر نمونہ: پینلین کے بند ڈبے انگریزی دوا فردشوں سے مل
جائے ہیں۔

ترکیب استعمال: چائے ماؤف کے مطابق کپڑا لیں، پیسٹر کا ڈبہ

گرم کر کے کپڑے پر لگا دیں، سینے پر یا جس جگہ درد ہو، لگا دیں۔
 بیس گھنٹے لگا رہنے دیں، اور اوپر ٹکڑے کر دیں، نمونہ ذات الجنہ
 درد جگر، موج آجانا، کن پیرے، درم، رسو جن، دیگر سوزش امراض کے لئے
 بیرونی طور پر مستعمل ہے، جو نہایت مفید و مجرب ہے۔
 دوا کے نمونہ۔ سلفا پیراڈین ایم بی ۶۹۳ ساختہ میڈیکل کمپنی

SLFA PARADEN. M.B 693

نمونہ کی خاص دوا ہے، بڑے آدھی کے لئے دو گولی فی خوراک ۳ رتی
 ہمراہ سوڈا بائیکارب آب تازہ دن میں چار مرتبہ، بچوں کے لئے ۱/۲ گولی تا
 ایک گولی حسب عمر دیں، ضرورت کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔
 نمونہ، درد پسلی، سوزاک، پیشاب میں خون آنا، پیپ کا آنا، ڈیہ اطفال
 پیٹ کی متعدی بیماریاں، خون میں پیپ پیدا ہو کر جراثیم پیدا ہونا،
 سرسام، ٹائیفائیڈ فیور، چھوٹے بھینسی اور کھانسی وغیرہ کے لئے مفید ہے
 ضعف قلب کی صورت میں کورامین لیکوئیڈ ۴ قطرے یا گولیاں
 ایک گولی دن میں دو بار دیں، نوٹ، آجکل ایم بی ۶۹۳ متروک الاستعمال ہے
 یاد دہا، المسک حار ۳ ماشہ ہمراہ عرق گاوزبان یا خمیرہ گاوزبان غنبری
 دیں، ضعف قلب کے لئے مفید و مجرب ہے۔

سبازول گولیاں CEBAZUL ساختہ سباز

پہلی خوراک چار گولی دن میں ۲ گولیاں ہمراہ آب تازہ، جس وقت
 درجہ حرارت نارمل ہو جائے، ہر چھ گھنٹہ بعد دو گولیاں دیں۔
 نمونہ، پیپورسی، ڈیہ اطفال، پیچش، کھانسی سوزاک کے لئے مجرب
 دوا ہے۔

نوٹ، ایم بی ۶۹۳ یا سلفا ٹائیڈ کے دیگر مرکبات اور پینی سیلین

کے دوران استعمال میں سوڈا بائیکارب یا سوڈا سائٹراس استعمال کر سکتے ہیں لیکن میگنیشیا سلفاس سے ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

مرض نمونہ میں قبض کا خاص خیال رکھیں۔ قبض نہ ہونے دیں۔ اگر سخت قبض ہو تو دوائی کی نسبت حقنہ کرنا بہتر ہے۔

نمونہ کا کسچہ ہر پوٹاسیم سائٹراس ۵، اگرین، لائیوڈائیسیٹامس اورام، ٹنگر سینکا ۵، منٹ، ٹنگر سلا، منٹ، گینگشیا سلفاس اورام، ایکوا ایک اورنس، اسی ایک خوراک ہر چوتھے گھنٹے بعد دیں۔

نمونہ، درد پسلی، درد سینہ، درد جگر، بخار وغیرہ میں مفید ہے۔ نمونہ کی جدید دوا اور سلفا ڈایازین، مریض نمونہ کو پسلی خوراک ۲ ٹکیا اس کے بعد ہر چوتھے گھنٹے بعد ۲ ٹکیاں۔

جب بخار اتر جائے، تو صرف ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار کھدا کر بند کر دیں، نمونہ اور اس کے جلد عوارضات کا نشانی علاج ہے۔

اگر مریض یہ دوا براہ دہن نہ لے سکے، تو سلفا ڈایازین سوڈیم کا جدید انجکشن کریں۔ ہر آٹھ گھنٹے بعد دو تین انجکشنوں سے ہی درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے۔

نیز مندرجہ ذیل ادویہ بھی اس مرض میں بہ حد مفید ہیں۔

آکریو مائی سین، مقدار خوراک ۲۵ گرام ہر چھ گھنٹے بعد دیں۔
کلودو مائی سین، ۵ گرام ہر چھ گھنٹے بعد۔
ٹیرامائی سین، ۵ گرام ہر چھ گھنٹے بعد۔

اور ٹمونا ۸ سے ۱۲ گھنٹے تک نمونہ کی علامات رفع ہو کر مریض تندرست ہو جاتا ہے۔

لیکن پینی سیلین کی موجودگی میں کسی دوسری دوا سے مرض نمونہ کا

علاج نہیں کرنا چاہئے۔ اس کی غیر موجودگی میں دوسری ادویات استعمال کر لینی چاہئیں۔

بزرگ علم بہت گاڑھا ہو، تو یہ نسخہ دیں۔

پوناسیم آکسائیڈ ۳ گرام، ایکوا ایکٹ اوٹس، دن میں تین بار دیں، بلغم کو پتلا کرنے اور خارج کرنے کے لئے مفید ہے۔

درد کی شدت میں پیتھے ڈین ہائیڈروکلورائیڈ ۵ گرام دن میں ۲ خوراکوں میں، درد کے لئے مفید ہے، دیگر دافع درد ادویہ بھی مفید ہیں۔

اگر ہیموفیلز رز کام دہائی کی وجہ سے ہو رہا ہو، تو سٹرپٹوماٹا سین، اگر کم کا روز انجکشن کرنا بے حد فائدہ کرتا ہے، ایک دو دن میں فائدہ ہو جاتا ہے۔

آریو مائی سین بھی اس کے لئے مفید ہے۔

بزرگوں کو پناہ یعنی ذات اریہ شعلی کا علاج، بچوں کی پیادیل میں ملاحظہ فرمائیں، ایکسیرٹوٹیوہ، دوسری طب کا مایہ ناز نسخہ جو امراض سینہ کے لئے ایکسیرٹوٹیوہ بارہ سنگا ۵ توڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی کے چھوٹے سے بوتل میں

ڈال کر اس کے اوپر ایک پادشہد خالص ڈال کر منہ بند کر کے چالیس دن گندم میں دفن کریں، پھر نکال کر آگ کے دودھ سے بھر دیں، پھر گل حکمت کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں، پھر کید کے ڈنڈا کو چیر کر درمیان میں بارہ سنگا کے ٹکڑے رکھ کر گل حکمت کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں، پھر نکال کر کوزہ گلی میں ڈال کر شیر ڈنڈا، عوہر یا عوہر کا پانی نکال کر ڈالیں، کر ٹکڑے کر ہو جائیں، گل حکمت کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں، سفید شگفتہ برآمد ہو گا۔

خوراک ادنیٰ ہمراہ منقہ یا علو و گرم، دودھ یا چائے سے دیں، دن میں

تین خوراک ، دودھ ، کھانسی دے لے کہ ہمراہ شربت زردنا یا بخشنہ دیں۔

منویہ ، درد پسی ، درد سینہ کا ایک دودھ علاج ہے۔ ایم ، بی ۶۹۳ سے بھی زردنا اثر ہے۔ ایک خوراک کافی ہے۔ دودھ ، کھانسی ، وجع المفاصل ، گنٹیا ، بخار وغیرہ کے لئے مستعمل ہے۔

دلیپی پستیر : شکر ف رومی ۴ رتی ، معبر اماشہ ، زردی بیضہ مرغ ۱ عدد۔
پسی دواؤں کا سوزن بنا کر زردی میں ملا کر مقام زردی پر لپیپ کریں۔
اوپر گرم کھور کریں۔ دودھ نے انور بند ہو جائے گا۔

جوشنا زہ منویہ : در گل بخشنہ ۵ ماشہ ، عناب ۹ دانہ ، سپستان ۹ دانہ
زردنا ۳ ماشہ ، طحلی ۵ ماشہ ، بخر ۲ عدد ، منقہ ۵ دانہ ، ترنجبین ۲ تولہ ،
پانی پیر ملا کر جو کشش دے کر چھان لیں۔ اگر قبض ہو ، تو ۴ تولہ معطر
امتاس شامل کر لیں۔ مل چھان کر پلائیں۔ جمی ہوئی ملغم اور کھانسی کے لئے
بہت مفید و تجرب ہے۔

شربت زہ منویہ : بارہ نمٹکا ، بارہ منگہ ۵ تولہ لے کر کوٹوں میں رکھ کر جلا لیں۔
سر دھونے پر نکال لیں۔ آگ کے دودھ یا آگ کے پانی میں کھریں کریں۔
ٹمکیر بنا کر آگ کے پتوں کے ٹکڑے میں رکھ کر دس سیراپوں کی آگ دیں۔
کشتہ ہوگا ، پس کر محفوظ رکھیں۔

خوراک اور رتی تا ۳ رتی ہمراہ دودھ گرم یا چائے دن میں تین بار
منویہ ، درد پسی ، درد سینہ ، بخار ، کھانسی ، دودھ کے لئے تجرب ہے۔
تریاق منویہ : در فسطین ۲ تولہ ، سوڈا پسی سلاس ۲ تولہ ، شربت زہ منویہ
۱ تولہ ، ورق سونا ۵ عدد۔ سوزن بنا دیں۔

خوراک اماشہ ہمراہ چائے یا دودھ نیم گرم دن میں تین خوراک۔
سینہ کے دردوں ، جوڑوں کے درد ، سر درد وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

نوٹ، مریض کو دوران بخار غذا نرم و دودھ، ساگو دانہ، مونگ کی دال
چنے کا پانی دینا چاہئے، جب بخار اتر جائے، تو مقوی غذاؤں کا دینا
ضروری ہے۔

پیماس کے وقت سادہ پانی ہرگز نہ دیں، عرق گاہ زبان، عرق سولف
یا سادہ پانی گرم کر کے پلائے رہیں، غذا میں شوربہ مرخ، دال کا پانی یا انڈا
انڈا بڑا شہد میں ملا کر چٹا لیں، دوا کی دوا اور غذا بھی ہے،
دوا سے ٹونیر، رکشتہ بارہ سنگا شیر مدار دالا ۳ ماشہ، مٹھا تیلیہ، نوشادر
جو کھار، قلمی شورہ ہر ایک ۳ ماشہ، آگ کا دودھ ۵ تولہ،

سب ادویہ کو باریک پس کر لوہے کے برتن میں ڈال کر آگ کا دودھ
متاثر کریں، اور کونوں کی آنچ پر رکھ دیں، جب دودھ خشک ہو جائے، تو
اتار لیں اور باریک پس کر شیشی میں محفوظ رکھیں،

خوراک آرٹھریٹک یا پتاشہ میں رکھ کر چائے کے ساتھ دیں، ٹونیر
کے لئے بے مثل دوا ہے، جلد تکلیف وہ علامات کو جلد از جلد رفع کرتی ہے،
اکسیر ٹونیر، پنسلین کا ایک جدید ترین مرکب ایسٹوین AS TOPIN
بیمجڑوں کے امراض، ٹونیر، پیلو رسی اور شعبی بافتوں کی خرابیوں میں
خاص طور پر مفید ہے، ایک شیشی میں چار لاکھ یونٹ دوا ہوتی ہے، اس کا
ایک عضلاتی انجکشن ۲۲ گھنٹے بعد کرنا چاہئے،

جوشاندہ ٹونیر، نفعل دراز، پیلا مول، پیوہ، چترہ سرخ، سونٹھ ہر ایک ۵ ماشہ،
جو کوک کر کے نصف سیر خنہ پانی میں جوش دیں، جب پانی چوٹھا حصہ رہ جائے
تو اس کو چھان کر اس میں بعد ۲ تولہ مسری ملا کر دے نرم گرم مریض کو
پلا لیں، اسی طرح دن میں تین مرتبہ مریض کو نسخہ پلانے سے پہلے ہی روز
انفاق شروع ہو جاتا ہے،

ذات الریه کا ہومیوپیتھنکی علاج

بہت سے امراض میں ہومیوپیتھک کی بعض ادویات اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔
اکونائٹس ۶x، خونیر، درد پسی، درد سینہ کے لئے اول درجہ کی دوا ہے
وہ کہ سینہ میں خون کا اجتماع ہو رہا ہو، بخار تیز، نبض جبری ہوئی، سخت
مضبوط اور خشک تکلیف وہ کھانسی ہو، کچی بلغم اور درد بہت سخت ہو،
مریض بے چین ہو، خونی مرض کی ابتدا میں جب کہ مریض موتا تازہ ہو،
بہت مفید ہے۔ اس دوائی کا استعمال ہر مرض کے ابتدا میں ہوتا ہے۔

برا یو نیا ۶x (BRAYUONIA)

یہ دوا غزنیہ کے تمام درجوں میں کامیاب ہے۔ خصوصاً درجہ دوم، موسم میں بہت
مفید ہے۔ علاوہ ازیں دیگر امراض سینہ لغت الدم، سہل، دق، کھانسی،
ڈبہ اطفال، کثرت حیض وغیرہ میں بھی مستعمل ہے۔

علاوہ ازیں فرم فاس ۳x، کاربوجی ٹیس، جیلا ڈونیم، رسٹا کس،
سلفر، لائیو پوڈیم، مرکورس، انٹیم ٹارٹ، ٹارٹار ایٹیک، ہائیڈرو سائنکس
وغیرہ بھی حسب علامات مفید ادویہ ہیں۔

اکسیر غزنیہ ہر کھانسنے، سانس اندر لینے اور حرکت کرنے سے اگر سینہ میں
چھاڑنے اور سوزیاں پھینکنے کے مت درجوں، رات کو شدت اختیار کرے، پیاس
اور قہقہہ ہو، تو برائی ادینا ۶ کی چند خوراکیں پینلین کے ٹیکر سے بھی زیادہ مفید اثاثر
ثابت ہوتی ہیں۔

یاوداشتت ہر غزنیہ، درد پسی کے دور ہو جانے کے بعد پھل کے نل کے
مرکبات سکاش میٹن یا وارڈ بریز کمپنڈ یا کاڈلورائل بعد از غذا ایک چمچ ہمراہ دودھ
صبح و شام استعمال کرنے سے پیچھے پڑے طاقتور اور جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔

اکسیر مونیر: بر فیرم فاس ۶۰، کالی میور ۶۰، نیٹریم میور ۶۰، مسادہ کی لوزن
مقدار خود اک ۱۰ گوبین گرم پانی سے دن میں چار بار دیں، یا حسب علامت
وقفہ کر دیں۔ شروع مونیر میں اکسیر ہے۔

اگر مرض دوسرے یا تیسرے درجہ کو پہنچ جائے، تو کالی میور ۶۰،
کالی سلف ۶۰، نیٹریم سلف ۶۰ دیں
اگر پیپ کی علامات ظاہر ہوں، تو کلکیر یا سلف ۶۰ کو بھی ملا لیں۔
مونیر کا تجربہ علاج ہے۔

فاسفورس بھی مونیر کے دوسرے اور تیسرے درجہ میں اکسیر ہے۔

ذات الحجب (در دیلو) PLEURISY (پلوریسی)

تحریف اور اس مرض میں پیچھڑے کے غلاف میں التهاب یعنی درم ہو
جاتا ہے۔

وجوہات: یہ مرض سردی لگنا، زلہ، زکام، خسرہ، مونیر، سل، تپ، حرکہ
چوٹ لگنا وغیرہ سے ہوتا ہے۔

تشخیص: علامات یہ ہیں: پائیک پسی کے درد، لمبڑے کا بخار اور کھانسی
کے ساتھ شروع ہوتا ہے، درد بہت شدت
کے ساتھ جیسے کوئی برتھی چھو رہا ہے، اور یہ درد پستان کے نیچے ہوتا ہے
جس کی بھر بغل تک جاتی ہے۔

آلہ مسماع الصدر لگانے سے رگڑا، رگڑا گڑا ہٹ کی آواز سنائی
دیتی ہے، اور حرارت ۱۰۰ سے ۱۰۲ درجہ تک پہنچتی ہے۔

کبھی متورم پردوں کے درمیان رطوبت جمع ہونے لگتی ہے پانی پھٹ
ہونے کی صورت میں رگڑ اور گڑا برٹ کی آواز میں کمی واقع ہو جاتی ہے
اور کبھی پانی کے بعد پیپ پینا شروع ہو جاتی ہے، کبھی درم خشک بھی ہو
جاتا ہے۔ اور نمونا نمونہ کے پیلے یا بعد میں یہ مرض ہوتا ہے۔

علاج اصل سبب مرض کو مٹانے کے رفع کریں، اور رفع درد
کے لئے مسکنات استعمال کریں، رطوبت کی تراسش
کو روکیں، اگر پڑ چکی ہو، تو اسے خارج کرنے کی کوشش کریں۔

نمونہ کے علاج کی طرح پسیلین کا استعمال، پلٹس کا لگانا، سینک
وغیرہ کرنا شافی علاج ہے۔ پسیلین کی موجودگی میں نمونہ اور پورسی کا علاج
کسی اور دوائی سے کرنا مریض پر غلط کرنے کے مترادف ہے۔ اگر پسیلین
نہ ملے، تو دوسری ادویات کو استعمال میں لادیں، ورنہ پسیلین ان ہر دو
امراض کا شافی علاج ہے۔

نمونہ کے علاج میں پسیلین کو حلقہ استعمال نہ ملے فرما ہیں۔

سفوف بیشی یا اکوٹاشرٹ ۱۰۰۰ مٹھا تیلہ عمدہ لے کر اس کو ہارکیٹ مریمہ
کریں۔ پھر اس میں سے ایک کاشہ دوائے کر ۹ کاشہ کھانڈ ڈال اس قدر
کھول کریں کہ مثل غبار ہو جائیں، یہ خاص ہے۔

پھر اس میں سے ایک کاشہ لے کر ۵ کاشہ کھانڈ ملا کر مثل غبار
کریں، یہ عدد ۲ ہے۔

پھر اس میں سے ایک کاشہ دوائے کر ۹ کاشہ کھانڈ ملا کر مثل غبار
کھول کریں، یہ عدد ۳ ہے۔

نمبر ۲ اور نمبر ۳ قابل استعمال ہے۔ نمبر ۱ نہ کرے اس لئے نمبر ۲
استعمال نہ کریں۔

مقدار خوراک ارتقی دن میں تین بار، ذات الجنب، ذات الریه، درد سینہ
دوسرے وغیرہ کے لئے تیرہ سہد ہے، لیکن جب مرغن کی ابتدا ہو۔

علاوہ ازیں خشک کھانسی، زلہ، زکام، انفلوئنزا وغیرہ کے لئے بھی
مفید ہے، اس کی بجائے اکونائٹ ۲۰، ہومیو پیتھی میں استعمال کیا جاسکتا ہے
مکسچر درد پسلی: ۱۰ لٹیکور ایوٹنایسی ٹاس ۲ ڈرام، سپرٹ ایتھرنائٹ و سائی
۲۰ منٹ، پوٹاسیم سائٹریس ۱۰ گرامین، وائٹم ایسکاک، اسٹیمٹیکچر ایسکاک ۱۰ گرام
ایکوی اکمیفر ایک ادسن۔

ایسی ایک خوراک مرتین گھنٹہ بعد دیں، رفع درد کے لئے بہت مفید ہے
بخارات نے شے بعد ۱۰ گرامین آئیوڈائیڈ پوٹاسیم اس نسخہ میں زیادہ کریں۔
جذب رطوبت کے لئے مفید ہے۔

اکسیراد جیاع: پسلی کے ہر قسم کے درد، ذات الجنب، ذات الصدور، ذات الریه
وجع المفاصل وغیرہ امراض میں یہ نسخہ تیرہ سہد ہے۔

اس کا نسخہ بنام اکسیرٹونیہ: ذات الریه کے بیان میں درج ہے
مقدار استعمال ارتقی ہمراہ عرق سولف، منقہ، علوہ وغیرہ میں دیں،
کشتہ شکرکف - شکرکف اولہ، بنوٹے ایک سیر

اپنی بوتلے کو چھ پر رکھیں، اور ہر شکرکف رکھ کر آہستہ آہستہ بنوٹے
اور پوٹال دیں، پینچے تیز آگ جلا دیں، پینچے کو آگ بنوٹوں کو بھی لگ جاسے،
حبیب بنوٹے جل جائیں، سرد ہوئے پوٹشکرکف نکال کر پیس لیویں، ہم رنگ
اور پورے وزن کا اچھا کشتہ ہوگا۔

مقدار خوراک ۲ چاول تا ۴ چاول ہمراہ منقہ، علوہ وغیرہ۔
لائٹ، بنوٹوں کے اوپر ایک پاؤتیل ڈال دیں، درد پسلی، دیگر جسمانی درددن
کے لئے مفید ہے، وقت باہ کے لئے نہایت مفید و تجرب ہے۔

یعنی ٹمپن ٹانگن ہر قسم کے دردوں کے لئے مفید ہے۔ مقام ماؤف پر ماسٹ کریں۔

یعنی منٹ لے بی سی یعنی منٹ اکونائٹ۔ یعنی منٹ بیلا ڈونا۔
یعنی منٹ کلوروفارم مساوی وزن ہر ایک اونس، تین دیسی ۲ اونس۔
ملا کر جائے ماؤف پر ماسٹ کریں۔ درد کو نے الفور آرام ہوگا۔ تجربہ ہے۔
رفع درد کے لئے مسکنات مثلاً ڈورس پوڈر یا مارفین ۱/۲ گریں کی بیلدی
چھکاری کرنے سے بھی شدت درد رفع ہو جاتی ہے۔

جب پیچھے پڑے کے علاقہ میں بہت سا سیرم یعنی آب خون عواکش
پاکہ جمع ہو جائے۔ تو چھٹی یا ساتویں پسی کے درمیان پولی سوئی داخل کر کے
اس کو نکال دینا ضروری ہے۔ لیکن یہ عمل ایک ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔
تفصیل کے لئے ہماری کتاب انجکشن گائیڈ جدید ملاحظہ فرمادیں،
مشرع مرض میں یہ نسخہ استعمال کریں۔

گینتیا سلفاس ایک اونس، سیرپ سفٹاپ ۱۰ سی سی، ایکو ۱۰ اونس
بیم ملائیں۔ دو تین دفعہ پلائیں۔ اس سے آسمان آ کر افاقہ ہو جائے گا۔
سوڈا سیلی سلاس ۱۰ گریں، پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ۱۰ گریں،
کلچر پورسی سیرٹ کلوروفارم ۱۰ سی سی، ایکو ایک اونس۔

ایسی چار خوراک روزانہ دیں۔ مندرجہ بالا مصلاب دینے کے بعد یہ نسخہ
استعمال کریں۔ اس مرض کے لئے بے حد مفید ہے۔

نوٹ۔ ارپورسی کو فونینہ درد و عضلات مہینہ سے تشخیص کرنا ضروری ہے۔
فونینہ میں بخار، درد اور کھانسی کے ساتھ ٹمپن کی شدت ہوتی ہے۔
سینہ کے عضلات کے درد میں بخار بالکل نہیں ہوتا۔

اگر مادہ ہیل کی وجہ ہو تو رسل کا علاج کریں۔

تجربہ پلورسی اور ماسے دانداجہ نسبتہ ناجی مہراج الدین صاحب مدظلہ کو
 یہ ماسہ اپنی سسٹم میں پلورسی کا مرض ہوا تھا۔ تو پتیلیں اور پٹیس آف
 کیونٹین کے اس مقام سے ہی صحت پر تھی۔ عمل جراحی سے طبیعت کے
 شرارت کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔

اس علاج کے علاوہ اور کئی مریضوں کا علاج بھی اسی طرح کیا گیا۔
 جو نہایت کامیاب رہا۔

اگر اس مرض میں بخار دیر تک رہے اور بار بار لرزہ آئے، تو سمجھیں
 کہ پردوں میں پیپ پڑ گئی ہے۔

پلورسی کا ہومیوپیتھک علاج

مریض کے شروع میں کونا ٹرٹ سو دیں۔ اس میں مریض بہت بے چین ہوتا
 ہے۔ اور بخار بھی شدت کا ہوتا ہے۔ اگر پلورسی ہرچرگی طرح کا ہو رہا یا
 جائے، اور ہفتے چلنے سے تکلیف ہو اور دوا سے بہتر کے بل پیا ہوا ہو۔
 ماسہ پلور سے تکلیف ہو، تو بلیس حالت میں برانی اوینا سو دیں، چسپہ ہی
 خوناکوں سے ہماری رک جاتی ہے۔ یہ دوائی پسی کے دور اور ماسہ کے
 واسطے بہت مفید ہے۔ اگر پانی کا اخراج ہو چکا ہو، اور مریض جلد
 سے صحت ہوتا ہوا دکھائی نہ دے، ماسہ سے بہتر آئے، اور غم بھی
 بادوار مہراج ہو، تو ایسی حالت میں سلفر، سو مفید ہوگی۔ اگر پلور اچھلی
 میں یہی موجود ہو، اور مریض بہت کمزور ہو، پسی کے درد کو بھی افاقہ نہ ہو۔
 زائر سٹیم مفید ہوتا ہے۔ اگر پیپر ٹے میں پیپ نمودار ہو چکی ہو، اور
 مریض کی تپیدیں کبھی طبع کی طرف ذوق کی طرف ہوں، تو پیپر سلفر، سو مفید
 دوائی ہے۔

درد والی جگہ پر فلین کے کپڑے کو گرم پانی میں بھگو کر اور پھوڑ کر کہیں
 اس سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
 فیرم فاس، کالی سیور، ٹکسیر یا سلف، گنگر پانی میں نیم گرم مسیرہ سلینیا
 یا شیڈ کیماک ادویات بھی پورسی کے لئے مفید ہیں۔
 پلو رسی کا ایک روزہ علاج۔ پہلے اکوائٹ۔ پانی پور اور کس ہر آدھ گھنٹہ
 بعد ایک خوراک دیں۔ پھر برائیوینا کی چار خوراکیں ہر ایک گھنٹہ بعد ایک
 خوراک رات کو سوئے وقت۔ اور دوسرے دن علی الصبح ۴ کیویریں ۳۰ کی
 صرف دو خوراکیں۔

اس کورس کے بعد، یہ معلوم ہوگا کہ عمل جیسے بھی ہوا ہی نہ تھا۔
 مریض پورسی کو حثک اور خیرات کے غذا دینی چاہئے۔

سینہ کا عضلاتی درد PLEURODTNIA

ز پلو رڈیلیا

تشخیص۔ وجوہات۔ خفص اور اس میں سینہ کے عضلات میں درد شروع
 ہو جاتا ہے۔ جو اکثر عضلات یا دمیانی ہنسی کے درم کی وجہ سے ہوتا ہے۔
 اور اکثر گزردہ آشنی اس اور عورتوں کو ہوتا ہے۔

علاج۔ رفع درد کے لئے رفع درد ادویات اسے پانی کی پاؤں۔
 یا سارپڈاں یا کدو پارسین۔ استعمال کریں۔

اور منہام ماؤف پر یعنی منہ ٹپن کا من یا یمن منہ سے اسے پانی کی بخش
 کریں اور ہر گرم پور کریں

اکثر اوقات پانی میں ہلا کر کھانسی نکالنے سے بھی درد رفع

ہوجاتا ہے، اس مرض کا مدد جگر سے تشخص کرنا نہایت ضروری ہے،

ہومیوپیتھی علاج

اکونائٹ، برائیونیہ، فیرم فاس وغیرہ ادویات اس مرض کے لئے مفید

ہیں۔ اکسیردورہ، کالی فاس ۶x، فیرم فاس ۶x، گگنیشا فاس ۶x، مراکب
تین تین ٹخریں، ایسی ایک ایک خوراک حسب ضرورت گرم پانی کے ساتھ
دیں، ہر قسم کے دردوں، سردرد، درد عضلات، شکم، سینہ، درد دل
کے لئے مفید و مجرب ہے۔

نفث الدم (خون تھوکرنا) HAEMOPTYSIS

(ہیماپٹیسیس)

تقریباً ہر اس مرض میں تھوکی یا کھانسی کے ساتھ خون آتا ہے۔
وجوہات: اکثر اس مرض کا سبب سل روائی یعنی پھیپھڑوں کی سل ہوتا
ہے، کبھی پھیپھڑوں کی سوجن، ٹیوبیہ، پھیپھڑوں کا مردار پڑ جانا، علق، خنجرہ کی
ہوائی باریک نالی کی سٹراپین کا پھوٹ جانا اور دھوی مزاج ہونا، کبھی منہ
معدہ، مری کے زخم کی وجہ سے بھی خون آنے لگتا ہے۔
دماغی چوٹ، بواسیر یا خون حبش کا بند ہو جانا اور جگر کے سکڑ جانے
کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔

تشخیص و علامات: خون کی تھوکی آتی ہے، اور کبھی کھانسی میں کھسکار
خون کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے، اور بعض اوقات

خون کی گلیاں خارج ہوتی ہیں، اگر پیچھڑوں سے خون آ رہا ہو۔ تو اس کا رنگ شوخ سرخ، کف دار اور پیغم میں ملا ہوا کھانسی کے ساتھ آتا ہے اگر معدے سے آ رہا ہو، تو خون اکثر تھے متلی ہو کر غذا کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور زیادہ مقدار میں نکلتا ہے، معدہ کے مقام پر بہن ہوتی ہے۔

اگر دماغی چوٹ کی وجہ سے خون ہو، تو عام طور پر تھے کے ذریعہ نکلتا ہے، اور خون جما ہوا، سیاہ رنگ اور دھڑھکیوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے اگر منہ، حلق اور مسوڑھوں سے آ رہا ہو، تو معمولی متو کئے سے بھی خون آ جاتا ہے۔

اصل مرض کے اسباب کو معلوم کر کے خون بند کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے مریض کو بستر پر آرام سے لٹائیں، سر کو نیچا رکھیں۔

اکسیر نفث الدم پر کشتہ رنگ جراح، گل زمینی، شاد رخ معسول، گلیک انڈیکسیم کھٹھ بوزن، سفوف تیار کریں۔
خوراک اکثر ہمراہ آب تازہ برتن گھنٹہ بعد ایک خوراک، خون خفوکنا، کمبیر، جریبان الطمٹ، کثرت حیف یا جسم کے کسی حصہ سے خون آتا ہو، کے لئے معینہ و مجرب ہے۔

دوائے نفث الدم پر ٹیکچر اومیم ۱۰ بوند، ایڈ سلفورک ڈاکلیپرٹ ۱۰ بوند پانی ایک اونس، یہ ایک خوراک ہے، تین گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں، خون متو کئے کے لئے مجرب ہے،

ترقیاق الدم پر کشتہ معدف مرداریدی ۴ رتی، بالسنہ مکے تازہ یا خشک سہ ۳ قولہ، آدھ پاء پانی میں گھوٹ کر صبح و شام بلائیں،

پھیپھڑوں کے زخموں کی وجہ سے خون آرہا ہو، اس کو بند کرنے کے لئے
 تریاق الہی ہے، بارہا کی تجرب ہے، طب یونانی کی ماہر نازدوا ہے،
 ٹیکہ نفث الدم، مارین ہائیڈروکلورائیڈ، کم گریں کا جلدی ٹیکہ کریں
 اس سے خون بند ہو جائے گا، لیکن مریض کی قوت کو ملاحظہ کر کے مارین کا
 ٹیکہ کریں، کمزور اور ضعف قلب کے مریضوں کو مارین کا ٹیکہ نہیں کرنا چاہئے
 دیگما، کیسیم اسٹیلین، اسی می کی شیشی میں بند ملتا ہے،
 روزانہ ایک سی سی کا جلدی ٹیکہ کریں، اس سے بھی پھیپھڑوں کا جریان خون
 بند ہو جاتا ہے۔

دوائے نفث الدم: دھنیا، آملہ، برگ بانسہ، منقہ، شاہترہ، ہر ایک
 ہاشہ، جو کوب کر کے آب نارسیدہ می کے برتن میں قریب ڈیڑھ پارہ
 پختہ پانی ڈال کر رات کو بھگو ہیں، صبح علی چھان کر اس میں سے نصف
 دکان لے کر اس میں قدر سے مسری و شہد ملا کر استعمال کر انہیں صبح و شام،
 روزانہ اس کے چند روزہ استعمال سے مرض نفث الدم رفع ہو جاتی ہے،
 تریاق نفث الدم: ہشکڑی، سرمہ سیاہ، کچھ سفید، سنگ جراح،
 ہر ایک تین تین ہاشہ، کھر باٹمی، صدف مردارید، افاقیا ہر ایک دس دس
 ہاشہ، دم الہوین، گوند کثیر، گوند کبکیر ہر ایک سات سات ہاشہ،
 صفوف تیار کریں،

مقدار خوراک: روزانہ ہاشہ ہمراہ شربت انجبار، دن میں تین خوراک،
 نفث الدم و خون بھوکنا، کثرت حین و نفاس، بواسیری خون، نیز ہر قسم
 کا خون خواہ جسم کے کسی حصہ سے آرہا ہو، چند خوراکوں سے بالکل رک جاتا
 ہے۔

بہترین ماس دم، خون کو بند کرنے والی دوا ہے۔

نفث الدم کے علاج میں ہمارا معمول

اگر کھانسی کے ساتھ خون آئے، تو مجھے کہ پیچھے سے تب دق کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کے لئے سر شیشہ مائی سین اگر ام کا عضلاتی ٹیکہ کریں اور آدھ گھنٹہ بعد دامن کے کپنی لین اسی سی کا عضلاتی ٹیکہ کریں۔

اگر دامن کے ذمے، تو لوگو لین (ساختہ سیبا) ۵ سی سی عضلاتی انجکشن کرنے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ اور خوردنی طور پر کیلیم کثیفٹ ۱۵ گرین ہر تین گھنٹہ بعد کھلائیں، اور کیلیم آسٹین ۲ سی سی کا ہر تیسرے دن ایک عضلاتی انجکشن کریں۔

کبھی لائیو ایاڈرین لین کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، ہمارے زیر علاج کئی مریض اس درجہ بالا علاج سے شفا یاب ہوئے ہیں، کم از کم دو ہفتہ تک یہ علاج جاری رکھنا چاہئے۔

نفث الدم کا ہومیوپیتھک علاج

جب نفث کھانسی ہو، اور آخر میں خون نکلے، پیچھے سے خون آنے کے لئے ایکسفا، نڈیکا ۲ انسری دوا ہے۔ ایک ایک گھنٹہ کے بعد دواک دینی چاہئے۔

اگر رات کو خشک کھانسی ہو، اور شافول کے بیچ میں درد اور خون بھی آئے، تو فیرم ناس ۳۰ تا ۲۰۰ مفید ہے، گورے پتلے، نازک مزاج اور لمبے قد کے مریضوں کے پیچھے سے خون آنے کے لئے فاسٹوس ۳۰ تا ۲۰ بہتر دوا ہے۔ اگر سینے میں درد ہو، کھانسی ہو، خون آئے، تو کالی کارب ۳۰ از حد مفید ہے۔

چنانچہ کلیریا ناس بھی نفث الدم کو مفید ہے۔

سِل THYSUS (تھائیسس)

PULMONARY
TUBERCULO
SIS

پھیپھڑوں کی تپ دق

(ٹیوبرکیولوسس)

تعریف :- اس مرض میں پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔
وجوہات :- اس مرض کا سبب ایسی سیس ٹیوبرکیولوسس ایک جراثیم ہے۔
یہ جسم انسانی میں داخل ہو کر پھیپھڑوں کی ساخت میں جم کر ایک چھوٹی سی گانٹھ
دانہ یا پھنسی بنا دیتا ہے۔ اور اس قسم کی گانٹھ کو تدرن (ٹیوبرکل) کہتے ہیں
یہ ایک متعدی مرض ہے، سل کے مریضوں سے یہ مرض تندرست
اشخاص کو ہو جاتی ہے۔ اور یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے، نیز دلی نزہ، زکام
پلوری، ذات الحجب، رنج و غم، ناقص غذا، صاف ہوا کا میسر نہ آنا اور
بخار کی حالت میں جماع کرنا وغیرہ اس کے مؤید اسباب ہیں۔
اکثر ملغم، حقوک اور یاخانہ سے اس کے جراثیم پھیلتے ہیں۔
ٹیوبرکیولوسس ایک عام مرض ہے۔ لیکن جس اعضا میں اس کی مراست
زیادہ ہوتی ہے، اسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سل کی عام اشتہام
درج ذیل ہیں۔

(۱) پھیپھڑوں کی تپ دق یا سل ریلویری ٹیوبرکیولوسس

اس میں پھیپھڑے مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

(۲) انٹریوں کی تپ دق رانٹسٹائینل ٹیوبرکیولوسس

اس میں انتڑیاں مبتلائے مرض ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت حرارت اور دستوں کی شکایت ہوتی ہے۔

۳، عند کی تب دق رگلیںڈ پور پور برکیو کوسس

اس میں مرض عند یعنی گلیوں میں ہوتا ہے۔ اکثر گردن اور پیٹ کی غدو مبتلائے مرض ہوتی ہیں۔

۴، باریطون کی تب دق ریرو ٹونا ٹیش پور برکیو کوسس

اس میں پیٹ کا پردہ مابعد ریری ٹوٹیم، جراثیم دق سے متاثر ہوتا ہے۔ آبی رطوبات جمع ہو کر استثنائی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ یہ مرض گلے، جلد، ہڈی، خنجر، نلی، گردہ، بلبہ، مثانہ، جوڑ، حرم مغز، دماغ اور تمام جسم میں بھی ہو سکتا ہے۔


غرضیکہ تب دق کے جراثیم جب کسی ایک اعضا میں سرایت کر جاتے ہیں۔ تو تمام جسم تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اس بیان میں ہم صرف پھیپڑوں کی تب دق کی تشخیص اور علاج بیان کرتے ہیں۔ باقی ہر ایک کا بیان ان کے مقام پر درج ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

تب دق کی جدید ادویات کی دریافت سے پہلے ادویاتی علاج کرنے کے باوجود کسی خاص مقام کی بندی کی ٹھنڈی آب دہوا، درختوں کی خوشبو پہاڑی مقامات پر رہنے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اب ان جدید ادویات کی موجودگی میں کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں رہی، البتہ مریض کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معالج کی نگرانی میں رہے، جہاں اس کی دوا نہ دیکھ بھال ہو سکے، اور اس کے حسب حال علاج جاری رہ سکے۔

جدید علاج کو ماہرینِ دق دسل نے اس طرح مرتب کیا ہے،
مریض کھلی جگہ، کھلی ہوا اور روشنی میں مکمل آرام کرے، تمام دن بستر پر لیٹا رہے
حتیٰ کہ پیشاب، پاخانہ بھی بیڈ پین میں کرے، اور کسی قسم کی جسمانی یا دماغی
تکان پیدا نہ کرے،

تب دق کا جدید شافی علاج



۱، سٹرپٹامائی سین اگر کم عضلاتی انجکشن ہفتہ میں دوبار کریں۔
۲، اینڈونیکس یا ری می فون، ہائڈرازائڈ و ڈیگلیکونڈن میں تین بار دیں۔
۳، ڈامن بی ۱۲ - ۲۵۰ مائیکروگرام ہر تیسرے دن عضلاتی انجکشن کریں، آج
کل ۱۰۰۰ مائیکروگرام کے امپیزون ملتے ہیں ہفتہ میں ایک بار کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔
یہ زمانہ حاضرہ کا بہترین علاج ہے، اور آج کل ماہرین تب دق اپنی
ادویات سے علاج کرتے ہیں، بعض معالجات پی ایس ایس چارٹکیاں سرچا
گھنٹہ بعد دن رات میں ۵ مرتبہ کھلاتے ہیں، اور ہفتہ میں ۵ دن کھلانے کے بعد
۴ دن ناغہ کیا جاتا ہے، کا ڈیوراکل دن میں ۲ بار غذا کے بعد ۲ گچھ دیا جاتا ہے
پھیپھڑوں کی سل روٹی کا کامیاب علاج ہے اور تب دق کی دیگر اقسام میں مفید ہے،
اگر مکمل آرام اور مندرجہ بالا علاج سے صحت میں خوشگوار تبدیلی واقع نہ ہو،
اور پھیپھڑوں میں غبار پڑ چکا ہو، تو کو لپیس پھیپھڑوں کی استعمال ضروری ہے، اور یہ جلدی کرنا
چاہئے، ورنہ غار سے مرہن پھیل جائے گا، اور شفا ہونی مشکل ہو جائے گی،

لیکن آج کل ماہر معالج دق و سہل گردن میں دیا فرمائی پٹھے و فرنیٹک نزد
کو کاٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈایا فرام جو سینہ اور شکم کے درمیان آرٹھے
طور پر آلات تنفس کو آلات غذا سے جدا کرتا ہے۔ غار منی طور پر چھ ماہ تک مغفوج
ہو جاتا ہے، اس سے مائوف بھیڑے کی حرکت کم ہو جاتی ہے، جب بھیڑے
کے پٹھے یا اوپر کے حصہ میں چھوٹے چھوٹے غار موجود ہوں، تو یہ علاج
ہدایت کامیاب اور مجرب ہے۔

اس عمل کو فرنیٹک کرشس کہتے ہیں، اور یہ عمل ایک ماہر اور تجربہ کار
سرجن ہی کر سکتا ہے۔

بھیڑے مائوف ہونے کی صورت میں ان سے خون آنا ایک خاص علامت ہے
خون تھوکنے کو روکنے کے لئے اور بنالین ریچوڈرین، ایماکل ناکر اس کا استعمال
بالکل بیکار ہے، البتہ ڈھانٹنے کے، کیسوں اور ڈھانٹنے سے اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا
ہے، دیا فرمائی پٹھے کا اپریشن کرنے کے بعد مندرجہ بالا تینوں ادویات کا استعمال
مفید و مجرب ہے۔

اکسیر سل ووق: درمرداریدنا سفنہ، زہر زہرہ اصلی، سنگ بشتب، کمر باکے
شمعی کشتہ قلعی، کافور ایک ۲ ماشہ، گل ارمنی ۴ ماشہ، دم الاخویں ۴ ماشہ، صندل
سفید، تخم خرفہ، سرطان سوختہ، نشاستہ، کثیرا، طبشیر، تخم خشکاش، رب السوس
سریشم مای، موئے سر انسان سوختہ ہر ایک ۶ ماشہ، زعفران ۱ ماشہ۔
نام دواؤں کو باریک پس کر لعاب اسبغول میں تین تین ماشہ کے

قرص تیار کریں۔

مقدار خوراک ایک ایک قرص دن میں تین بار صبح، دوپہر، شام شربت اعجاز
کے ساتھ کھلائیں، مرض سل ووق کے لئے ہدایت کامیاب اور مجرب دوا کی بے نظیر دوا
ہے، پہلے اور دوسرے درجہ کے مریض اس سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

باب ہفتم دل کی بیماریاں

خفقان دل و دھڑکنا
PALPITATION
(پیشی ٹیشن)

تعریف در اس میں دل زور زور سے جلتا ہے۔
وجوہات در یہ مرض سوء مزاج حاد قلب، فکر و غم، کثرت جماع،
حلق، گرم، غذیہ کا زیادہ استعمال، مکی خون وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔
تشخیص و ایلاست در دل دھڑکتا ہے، دل کے ساتھ سینہ پر بھی دھڑکن
معلوم ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل
ڈوبا ہوا ہے۔ گھبراہٹ ہے چینی اور آخر کار غشی تک نو بہت پہنچتی ہے
علاج دل کی اندرونی دیر دلی طور پر تیز کر دیں، اور اسباب
کا ازالہ کریں۔

اکسیر القلوب: طباشیر، دانہ الچی خورد، زہر مہرہ خطائی، کبہ بار، نار جیل۔
برایک ایک ٹولہ کشتہ عقیق ۳ ماشہ، کشتہ مرجان ۳ ماشہ، صندل سفید
۱ ٹولہ، کشیز انور، ورق چاندی ۱ ماشہ، ورق سونا ۳ رتی، کشتہ سنگ پش ۳ ماشہ

جملہ ادویہ باریک سنوف بنا دیں۔ پھر ایک بوتل روح کیوڑہ ادہ ایک
بوتل روح بید مشک میں کھول کر کے خشک کریں۔ سنوف بن جائے گا۔
بس تیار ہے۔

مقدار خوراک امانتہ ہمراہ شربت انار دیں زبچون کو ۲ رتی ہمراہ شہر مالدور
اعلیٰ درجہ کی معزی دل و دماغ ہے۔ ضعف دل۔ خفقان۔ دھڑکا۔
کمزوری دماغ۔ ضعف جگر۔ سیانہ۔ سہال۔ مروڑ۔ پیچش۔ کثرت
پیاں وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے۔ دل کی گرم امراض کے لئے اکسیر
ہے۔ گویا کہ طب یونانی کا طبی امراض کے لئے ایک معجزہ ہے۔
ضماد قلب بہ صندل سفید اولہ۔ گل سرخ اولہ۔ کاندہ اکبر کشمیر اولہ
عرق گلاب میں جملہ ادویہ کھول کر کے مقام قلب پر منقاد کریں۔

جب مریض کی بخار کی تیزی۔ شدت گہری۔ خفقان القلب کی وجہ سے دل
کی حرکات بہت تیز ہو گئی ہوں۔ تو یہ منقاد بہت مفید ہے۔ کثرت پیاں کو
بھی دور کرتا ہے۔ جب مریض ہلکا پانی پانی پکا رہا ہو بہترین نسخہ ہے۔
خامخہ عجیب بہ صندل سفید ۶ ماشہ۔ کاندہ ۲ ماشہ۔ عرق گلاب ۲ ماشہ
عرق کیوڑہ ۲ ماشہ۔ عطر خس ایک ماشہ۔

ترکیب استعمال بہ کھلے منہ والی شیشی میں ڈال کر بلا کر سونگھادیں۔
بے ہوشی۔ غشی۔ خواہ کسی وجہ سے ہو۔ اس کے سونگھانے سے مریض
فوراً ہوش میں آ جاتا ہے۔

خمیرہ مرواریدی دل کو تقویت دینے کے لئے بہترین دوا ہے۔
مقدار خوراک امانتہ ہمراہ عرق یا شربت

دیگس بہ خمیرہ گاؤ زبان سنبری امانتہ ہمراہ عرق گاؤ زبان یا پانی
دیگس بہ دوا مسک حار یا بارد دل کو طاقت دینے والی بہترین ادویہ میں

۳ ماشہ عرق گلاب ، گا د زبان رکھو ڈھ ، بید مشک کے ساتھ استعمال
کرنا کمزوری قلب ، غشی وغیرہ کے لئے اعجازِ مسیحائی رکھتا ہے۔
تریاق القلب : ہر فیراٹ ایوینا ساٹھ اس گشتہ مونگا ، مسک آرٹی
فیشیل ہر ایک مساوی الوزن لے کر خوب کھرل کر کے معزف بنا دیں۔

مختار خوراک ۴ رتی ہمراہ آب یا دودھ دن میں دو بار۔
یہ دوا دل کی تمام امراض ضعف دل ، دھڑکا ، کمزوری ، غشی وغیرہ کے لئے
اکسیرالاثر ہے ، معزوی اعضائے ریبر ہے ، دل و دماغ کو قوت دے کر
باہر کو بھی طاقت دیتا ہے۔
دیسکس : کمزوری دل کے لئے عرق گا د زبان اکیلا یا چاروں عرق بھی
بہت مفید ہیں۔

قلب یا دل سے ایک ایسا عضو جسم انسانی میں ہے ، جس پر حیات انسانی
کا دار و مدار ہے۔
انجکشن قلب : کمفران آئیل یا دودھ ایتھر اسی سی کا عضلاتی ٹھیکہ
ہر روز یا ہفتہ میں دو بار کریں۔

سخت کمزوری جب کہ نبض بالکل کمزور ، غشی ، دل کی حرکت کمزور ہو جائے
تو ایسی حالت میں مفید ہے۔
علاوہ ازیں لائیکو ایر ایڈر سینے لین مقدار ۱۰ بوند جلدی ٹیکہ ،
گلرکوز سولہوشن ۱۰ سی سی کا دریدی عضلاتی ٹیکہ کرنا ہر قسم کی کمزوری قلب
نبض با قفل ہے قاعدہ ہو تو بہت مفید ہے۔

اگر کمی خون ہو ، تو اس کو زیادہ مقدار میں دریدی ٹیکہ کے ذریعہ داخل
کرنے سے تمام جسم کو قوت پہنچتی ہے ، فوری طور پر جسم کو طاقت دینے
والا واحد علاج ہے۔

جسد پیدائش : آج کل ضعف قلب اور خفقان کی حالت میں
کوراجین کا انجکشن اور خوردنی طور پر بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
یہ بے حد مقوی اور ٹانگ ہے۔

مقدار خوراک ایک سی سی جسبیدی ٹیکہ کریں اور خوردنی طور پر
اتنا ۱۰ قطرے پانی میں ملا کر دیں۔

جواہر مہرہ یا اکسیر اعظم : یہ دوا دل کی تمام بیماریوں اختلاج، دل دھڑکن
ضعف قلب، خفقان وغیرہ کے لئے آب حیات ہے، ایک ہی خوراک
سے دل کو طاقت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چند خوراکوں میں تمام
اعضائے رئیسہ طاقتور ہو جاتے ہیں، طب یونانی کا مایہ ناز اکسیری نسخہ ہے،
ذہر مہرہ خطائی، تولد، مردارید تا سفتہ، بسد، کمرہا شعی، یا قوت
سرخ، لاہورد مغسول، یا قوت کبود، یا قوت اصغر، سنگ لیشب سبز،
ذمرد اخضر، عقیق سرخ، ورق نقرہ، مصطکی ہر ایک سات سات ماشہ،
ورق طلا، جدوار خطائی، نازیل خطائی، کستوری، عنب الثعلب،
مومبائی خالص ہر ایک ساڑھے تین تین ماشہ

دو ہفتہ تک تمام دواؤں کو روح گلاب میں کھول کر لیں، پس
تیار ہے۔

مقدار خوراک ۲ چاؤل ۲ چاؤل ۲ چاؤل تمبرہ گاؤ زبان عنبری یا مناسیب
بدلتہ کے ساتھ دیں، مقوی اعضائے رئیسہ، منقش حرارت عزیز، بہترین
ٹانگ اور زود اثر ہے۔

نوٹ : کھول عمداً ابد نہ گھسنے والا ہونا چاہئے۔

اکسیر قلب : مردارید تا سفتہ ۲ ماشہ، ورق سونا اما شہ کشتہ سنگ لیشب
۹ ماشہ، کشتہ موزکا ۹ ماشہ، باجم ملا کر کھول کریں۔

مقدار خوراک ۱۲ رتی تا ایک رتی خمیرہ گاؤ زبان بقدر ۶ ماشہ میں ملا کر
کھلائیں، اوپر سے عرق گاؤ زبان آدھ پاؤ پکائیں، اختلاج قلب، ضعف
القلب، دھڑکن کے لئے بے نظیر دوا ہے۔
مغز ح قلب، گل سرخ، برادہ صندل سفید، گل گاؤ زبان ہر ایک ۲
تو ماشہ، پانی ایک پاؤ میں پکائیں، جب پانی نصف رہ جائے، تو ۳۲ تو لہ
مصری ملا کر چھان لیں۔

ختم بالنگو و ماشہ بھانگ کر اوپر سے مندرجہ بالا جو شانہ پلا دیں
دن میں ایک یا دو بار، دل دھڑکن، خفقان، اختلاج القلب میں بے حد مفید
و تجرب سے کم خرچ ہونے کے باوجود نہایت اکسیر چیز ہے۔

ANGAYNA PIKTORS

راجائنا پکٹورس

دردِ دل

تعریف: اس میں مریض کے دل پر سخت درد ہوتا ہے،
اسباب: دل پر چوٹ لگنا، اعصاب کا تشنج، جس کی وجہ سے شریانیں
میں گھٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے دل پر سخت درد ہوتا ہے

وجوہات تشخیص: دل میں تشنج ہو کر درد کے یکایک دورے شروع
ہو جاتے ہیں، دم کشتی پیدا ہوتی ہے، ٹھنڈے
پینے آتے ہیں، درد کا دورہ چند گھنٹے رہتا ہے، اکثر بے ہوشی ہو جاتی ہے،
علاج: ایم ایٹل ٹائپرٹ کے کیپ شول اگر مل جائیں، تو رد مال میں
ڈر کر سو بٹھائیں، فوراً آرام ہوگا۔

مقام قلب پر بیلا ڈوتا پلاسٹر لگانا مفید و مجرب ہے۔ اور قطر گلاب
کی ماسش کرنا بھی درد کو دور کرتی ہے۔
میراہینگ ادنیٰ منفعہ میں ڈال کر کھلانا درد دل کے لئے از حد

فائدہ مند ہے۔
تریاق درد دل: رکشتہ بارہ سنگا دھکیو اور در کھوار گندل والا سفید
رنگ ہو۔ مقدار خوراک ۲ رتی تا ۴ رتی منفعہ میں رکھ کر کھلائیں۔
ہر قسم کے درد دل کے لئے تریاق الاثربہ ہے۔

اکسیر و جع القلب: رشاخ مرجان اقلہ کو عرق بید مشک ۵ تولہ میں
کھول کر پیں خشک ہونے پر جڑ ملٹی ۴ تولہ کا باریک سٹون کر کے
ملا کر خوب کھول کریں۔

مقدار خوراک ۴ ماشہ ہمراہ عرق کیوڑہ یا عرق گاد زبان دیں
دن میں تین بار۔ و جع القلب (درد دل) اختلاج القلب، ضعف قلب
اور تقویت دماغ کے لئے بے حد مفید ہے۔

کسچر: پیرٹ ایتر نائٹر اس ۳ قطرے، پیرٹ ایوینا ایروم
۳ قطرے، پیرٹ کلوروفارم ۳۰ قطرے۔

کسچر کارڈیم ۳۰ قطرے، ایکو ایک اولس۔

درد دل کے لئے نہایت مجرب ہے۔
ضماد درد دل

ایون، زعفران، ہینگ ہوزن

عرق گلاب میں حل کر کے نیم گرم صناد کریں۔ درد دل کے لئے
مفید ہے۔

غشی

SYNCOPE

رُسکوبی

تعریف ہر اس مرض میں مریض بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے،
وجوہات اور اچانک غشی یا غم کی خبر سنتا، جریان خون کی زیادتی،
نازک مزاجی، عمل جراحی کے بعد انہماکی کمزوری، صدمہ، انجکشن متناک،
دھکے کا صدمہ وغیرہ اس کے اسباب میں۔

تشخیص و علامات
آنکھوں کے آنکے اندھیرا آتا، رنگ زرد ہو جانا،
ہاتھ پاؤں سرد، نبض اور سانس کمزور ہو کر عارضی
طور پر دل کا نفل بند ہو جاتا ہے، مریض پسینہ میں تر ہو کر بالکل
بے ہوش ہو جاتا ہے۔

علاج اصل سبب مرض کو رفع کریں، مریض کبھی ایک ٹیبلٹ
سانس لے کر خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے، فوراً مریض
کے منہ پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں۔

ایوینا کلوب سونگھائیں، یا سپرٹ ایوینا ایرو میٹک سونگھائیں،
اور مقدار ۶۰ بوند ایک ادس پانی میں ملا کر پلائیں، مریض کے جسم کو گرمی
پہنچائیں، ہاتھ پاؤں کے نلوں کی مالش کریں، مریض کے سر کو دوسرے
حصہ جسم کی نسبت پچا رکھیں، تاکہ خون آسانی سے دماغ کی طرف

جاسکے
اکسیر غشی اور جواہر مرہ ۴ چاؤل، عرق گودبان میں حل کر کے منہ میں
ڈالیں، غشی کو فوراً رفع کرتا ہے۔

ککیر برائے غشی اور سپرٹ ایوینا ایروم ۳۰ بوند، ککیر مسک ۲۰ بوند

سپرٹ ایٹر ۲۰ بوند ، ٹیکر لونڈر ۴۰ بوند عرق گلاب ایک ادس ،
 ایسی ایک خوناک پلائیں ، فوراً غشی کو دور کرتا ہے ۔
 ٹیکہ غشی : اگر کچھ دیر مریض غشی کو ہوش نہ آئے ، نبض کمزور اور
 تنفس سست ہو ، تو فوراً یہ ٹیکہ کر دینا چاہئے ۔
 لائیکوار ایڈرینے لین پیپ ۱۵ بوند جاری ٹیکہ کریں غشی اور
 اس کی علامات کو رفع کرنے میں اکسیر ہے ۔
 ٹیکہ ۲ : کورامین ایک سی سی ، عضلاتی ٹیکہ کریں ، یہ بھی ضعف قلب
 شاک ، صدمہ ، ضعف تنفس ، کمزوری نبض اور غشی کے لئے مفید ہے ۔
 ٹیکہ ۳ : سٹرکینین سلفاس : پیہ گرین کا زیر جلد ٹیکہ کرنا بھی انتہائی
 ضعف قلب اور غشی کو رفع کرتا ہے ۔

یہ مرض اکثر عورتوں میں نازک طبع کے باعث ہوتا ہے ۔ مرگ والے
 گھر میں جاسے یا اچانک غمی کی خبر سننے سے بھی ہو جاتا ہے ، جو خود بخود
 رفع ہو جاتا ہے ، بعض اوقات عورتیں ناک وغیرہ دباکس کا علاج کئی میں
 ایسی عورتیں جن کو یہ مرض ہو جاتا ہو ، ان کے لئے جو اہر مہرہ کا استعمال
 بے حد مفید و مجرب ہے ، دو مفتہ کے استعمال سے پھر یہ مرض نہیں ہوتا ۔
 بعض اوقات ذیابیطس کے مریض کو انسولین کے انجکشن سے بھی غشی
 ہو جاتی ہے ، ایسی حالت میں ایک ادس گلوکوز پانی میں حل کر کے پلانا بھی
 مفید ہے ، بعض اوقات گلوکوز کا دریدی انجکشن بھی کرنا پڑتا ہے ۔
 راونٹ ، قارورہ کے امٹان کے بغیر انسولین کا انجکشن نہیں لگانا چاہئے ۔
 ہدایات : مریض کو غشی پیدا کرنے والے اسباب سے پرہیز کرنا ضروری
 ہے ، جو مریض انجکشن سے گھبراتے ہوں ، انہیں زبردستی انجکشن نہ لگانا چاہئے
 ورنہ ان کو غشی کا دورہ ہٹ جائے گا ، ایسے آدمیوں کو خوردنی دوائی دینی چاہئے ۔

رفع ہو جاتی ہے، اور دہی ٹیس اس سے دوسرے درجہ پر ہے، جب تک تھکی تنفس اور کھانسی ہو، مریض آرام سے سونہ جائے، اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہئے، اور مریض کو کم از کم دو ہفتے بستر پر ٹائے رکھنا ضروری ہے،

دل کی سوجن MYOCARDITIS (مابوکارڈائیٹس)

تشخیص وجوہات و تشخص اس مرض میں دل متورم ہو جاتا ہے، دل کے مقام پر گرانی، درد اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے، دل کے نفل میں خلل واقع ہو جاتا ہے،

علاج اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کرنا چاہئے، قلب کے اوپر ہدف لگانا بھی مفید ہے، مریض کو بالکل ٹائے رکھیں اور اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیں،

صغف قلب کی صورت میں گورامین کا استعمال کریں، غذا لطیف اور زرد پیئم دیں،

دل کی اندرونی سوجن ENDOCARDITIS

تشخیص رائنڈ و کارڈائیٹس

وجوہات و تشخص اس مرض میں دل کے اندر کی طرف ایک جھلی لگی ہوتی ہے،

اس مہل میں دم ہو جاتا ہے، اور عام طور پر عفونتی بخار مثلاً حرہ، غوینا
سوزش گردہ، اور وجع المفاصل وغیرہ امراض کی وجہ سے یہ مرض
ہو جاتا ہے، بوجہ اٹھانے والے، زور کا کام کرنے والے یا
تھک رہا ایک مسئلہ کنوئیں یا کوئکہ کی کان میں کام کرنے والے
اشخاص اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں،

اس مرض میں دل دھڑکتا ہے، درد سر، تشنگ اور ہڈیاں بھی
ہوتا ہے، مقام قلب پر درد ہوتا ہے، سخت کھیرامیٹ رہے ہیں
ماریوسی اور وقت تنفس بھی ہوتی ہے، کبھی غشی طاری ہو جاتی ہے
مریض بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اس مرض کا انجام عموماً خواب
ہوتا ہے،

علاج اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کریں، مریض
کو بستر پر لٹائے رکھیں، اسٹین پیسٹن کی بالکل اجازت دیں،
اگر غوینہ کی وجہ ہو، تو پر دکن پنسلین ۴ لاکھ یونٹ کا
عضلاتی انجکشن صبح شام کریں،

اگر ہفن کمزور ہو، تو کورامین ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن
کریں، غوینہ کی وجہ سے دل کی اندرونی سوجن کا بہترین علاج ہے،
اگر وجع المفاصل کی وجہ سے مرض ہو، تو اس کا مناسب
علاج کریں،

اگر سوزش گردہ ہو، تو سوزش گردہ کا علاج کریں، مریض کو
غذا لطیف اور زود ہضم دیں،

اگر ٹائیفائڈ کی وجہ ہو، تو کلورامائی سیٹین کا استعمال کریں،

مفید ہے، طبیعت بحال ہونے پر مریض کو چھٹے پیر سے کی اجازت دینی چاہئے

PERE CARDI
TIS

دل کے غلاف کی سوجن

رپیری کارڈیائیٹس

وجوہات و تشخیص : اس مرض میں دل کے مقام پر درد ہوتا ہے، سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، شروع مرض میں لڑھ اور بخار کی شکایت بھی ہمراہ ہوتی ہے، اس مرض کا سبب زیادہ تر وجع المفاصل یا گنٹھیا ہوا کرتا ہے اور کبھی عفونی بخار اور سوزش گردہ سے بھی ہو جاتی ہے، علاج : اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں، اس مرض میں مکمل آرام سخت ضروری ہے، مریض کو ہر وقت بستر پر لٹائے رکھیں، اگر سانس لینے میں تکلیف ہو، تو گاؤٹکیہ لگا کر بٹھا لیں، اور مقام قلب پر انٹی فلوجسٹین کا پلاستر لگائیں، یا انسی کی گرم گرم پلٹس باندھیں، اگر مریض قوی ہو، تو مقام قلب پر چند جونکیس لگوائیں، اگر درد شدید ہو، تو مسکنات کا استعمال کریں، چونکہ اکثر شدید گنٹھیا کے دوران میں یہ مرض ہو جایا کرتی ہے اس لئے اصل مرض گنٹھیا کا علاج کریں، شدید گنٹھیا کا علاج : ارگاکا پائرن، یہ ایک مصنوعی مرکب ہے، جو سوزش، تورم اور دردوں کو کم کرنے کے لئے بہت مفید ثابت

بڑا ہے۔ خاص کر جوڑوں کی تکالیف میں بہت استعمال ہو رہا ہے شدید
گنٹھیاں، ریاحی دردوں، عضلات اور دیگر ساختوں کی ریاحی دردوں نیز
اعصابی دردوں کے لئے بہت مفید ہے۔

لقوہ، عرق النساء، ضربات، حادثات وغیرہ میں خاص طور
پر مفید ہے۔

دل اور گردوں کی پرانی بیماریوں میں اس کا استعمال مضر ثابت
ہو سکتا ہے۔

مفت دار خوراک : دسی سی میپسول کا گہرا عضلاتی انجکشن
آہستہ آہستہ لگانا چاہئے۔ بیمار کو لٹ کر ٹیکہ چوڑے پر لگائیں۔ ٹیکہ
روزانہ یا دوسرے تیسرے دن لگا سکتے ہیں۔
اگر مریض کو نفید نہ آتی ہو، تو پانچ یا دس گرین ڈوس پاؤڈر
کی خوراک دیں، غذا لطیف اور زود ہضم دیں۔
یہ خوردنی طور پر بھی استعمال کرا لی جاسکتی ہے۔

دل ڈوبنا STROKE S D A M S D I S E A S E

سٹوٹک ایڈمز ڈیزیز

تشخیص : اس مرض میں بغض ہنایت سست چلتی ہے
مریض کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل ڈوبا جا رہا ہے، خفیف غشی
ہوتی ہے، یہ شکایت اکثر بوڑھے آدمیوں کو ہوتی ہے۔

اس مرض کا سبب اکثر دماغی اور نخاعی شریانوں کا سخت صدمہ ہوتا ہے۔ کبھی آتشک بھی اس کا سبب ہوتی ہے۔
علاج : اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کریں۔ مریض کے سر کو پتھر رکھیں، مقویات اور محرکات کا استعمال کریں اگر آتشک کی وجہ سے مرض ہو تو آتشک کا علاج کریں۔

دل کی پھپرکن TACHYCARDIA (ریسکی کارڈیا)

تشخیص : اس مرض میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ اور دل پھر پھڑکنے لگتا ہے۔ نبض ایک منٹ میں ۵۰ یا ۸۰ مرتبہ کی بجائے ۱۵۰ یا ۲۰۰ بلکہ ۳۰۰ مرتبہ حرکت کرتی ہے۔ لیکن مریض کو قلب کی حرکت محسوس نہیں ہوتی، اور کبھی یہ مرض ذہنی طور پر ہی واقع ہوتی ہے۔

خون کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر عصبی کمزوری، شراب خوری، بد ہضمی، دل کا پھیل جانا، اختناق الرحم وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علاج : اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کرنا چاہئے۔ اور محرکات مثلاً چائے، قہوہ اور شراب وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اگر باضمہ کی خرابی ہو تو فعل ہضم کو درست کریں۔

اگر عصبی کمزوری کی وجہ ہو، تو ڈیٹا من بی ۱۲، ربرین، ڈیٹا من بی ۱۲ (سیٹامین) اور مرکبار کچلہ کا استعمال کریں۔

اگر کمی خون کی وجہ ہو، تو مرکبات فولاد، لہذا کیسٹرکلیٹ اور
وٹامن بی ۱۲ اور ہیموگلوبین کا استعمال کریں۔
اگر سن یا س کی وجہ ہو، تو ہارمون ٹن ٹی ر ساختہ جی ڈی پیکارک
کا استعمال کریں

گرم اور مقوی غذاؤں سے پرہیز لازمی ہے، مثلاً گوشت
انڈے، شراب وغیرہ۔

نسخہ: ہر سوڈیم برومائیڈ ۵ گرین، سوڈیم فینو باربیٹون ۱۲ گرین،
ایسی ایک خوراک دن میں دو تین بار استعمال کریں، دل کی پھرٹکن
کے واسطے بے حد مفید ہے۔

نسخہ: ہر فیری ایٹ ایونیا سائٹراس، اگرین، ٹنکچر کارڈیم کمپونڈ
سوئم، سپر آرٹھیائی اڈرام، ایگوا ایک ادس،
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں

اگر کمی خون کی وجہ سے ہو، تو یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔
نسخہ: اسپرٹ ایونیا ایرومیٹک، سوئم، ٹنکچر کارڈیم کمپونڈ، سوئم،
روال کمپونڈ، سوئم، سپرٹ کلوروفارم، سوئم، اسپرٹ ایٹیر کمپونڈ، سوئم،
ایگوا منتھاپ ایک ادس،

ایسی ایک خوراک دن میں تین بار دیں۔
اگر نفخ شکم یا باضمہ کی خرابی سے ہو، تو یہ نسخہ بہت مفید ہے۔
نسخہ: ہر خمیرہ گاد زبان سادہ یا خمیرہ ایرلیم ۶ مائش، بکری کا دودھ
ایک پائیس نصف چھٹانک شربت نیو فرملا کر پلائیں، دل کی پھرٹکن
خفقان قلب کے لئے نہایت مفید و تجرب ہے۔

امراض قلب کا ہومیو پیتھی علاج

دردِ دل اور دل کا ڈوبنا

اگر حلق میں متواتر جلن کا احساس پایا جائے، اور پیٹ میں ریح یعنی ہوا بھی پیدا ہو، تو کاربو دیج ۲۰ دیں۔

اگر معمولی سے آرام کے بعد بار بار یہ تکلیف ہو، تو کلکیریا کاردی ۳۰ اور سلفر ۳۰ ناندہ کرے گا، ہر ایک گھنٹہ کے بعد دوائی کھائیں، جب تک بالکل آرام نہ آجائے۔

اگر معمولی سی حرکت سے بھی دل یکایک ڈوبتا ہوا معلوم ہو، نبض باتا عہدہ نہ چلے، اور پسینہ آنے پر جسم تمام سرد ہو جائے، تو اس وقت ڈیجیٹیس ۲۰ ہی مفید دوائی ہے۔

دل کی دھڑکن

اگر ایسا معلوم ہو، کہ حرکت کرنے سے دل کی رفتار بند ہو جائے گی تو ڈیجیٹیس ۲۰ مفید ہوگا۔

اس میں نبض بہت سست اور غیر منتظم ہوتی ہے، یعنی چلتے چلتے دو چار ضربات کے وقفہ کی مقدار کے موافق گم ہو جاتی ہے، اور بیمار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن کے ساتھ تیز درد بھی پایا جائے، اور دھڑکن کے ساتھ جسم بھی رہے، تو سپاہیجیلیا ۳۰ مفید ہوگا۔

اس کے علاوہ نایا ۳۰، لیکسس ۳۰، پاساٹیل ۳۰ بھی مفید ادویہ ہیں۔

غشی

اگر جسمانی حرارت دفعہ کمزور ہو جائے، اور غشی آجائے، جلد سرد اور سردی معلوم ہو، اور آگ سے نفرت ہو، تو کمیض بہت مفید ہے، غشی کی حالت میں ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک خوراک کھلانے سے بہت جلد نادمہ دہی ہے۔

اگر غشی کی حالت سخت طاری ہو جائے، اور انتہائی درجہ کی کمزوری اور بدن لاغر ہو، غشی جب اخراج رطوبت کی وجہ سے ہو، اور سر پر سرد کچا پسینہ آئے، جسم سرد اور ٹیگڑوں ہو جائے، اور روحانی قوت جلد زائل ہونے والی ہو، انتہائی تعاقبت اور غشی ہو، تو دیرپم کی ہر پندرہ منٹ بعد خوراک دینا مفید ہے۔

اس کے علاوہ مارینا، کیو پرم، لیکسس، آرسنک بھی حسب علامات دی جاسکتی ہیں۔

مگنیشیا فاس، دروں میں دھڑکن کے ساتھ تیز گولی لگنے جیسا درد دروں میں دھڑکن کے ساتھ ہو، یا سینہ میں ایسا درد ہو، کہ سینہ دبایا جاتا ہو، ایسی حالت میں اس دوا کو گرم پانی میں دیا جاتا ہے۔

کالی فاس، دروں کی کمزوری، سستی، دھڑکن اور درد کے لئے اعلیٰ دوا ہے، دل کی کمزوری اور دھڑکن کے ساتھ نبض غیر منتظم یا سست ہو، دل پورے طور پر اپنا کام انجام نہ دے، دل کی کمزوری کی وجہ سے غشی ہو۔

کالی سلفٹ، کمزوری کے ساتھ نبض میں تیزی، کوٹھے کے اوپر درد ہو، بات کرنے کو جی نہ چاہے، حرارت کے باعث دھڑکن ہو۔

باب ہشتم معدہ اور انتڑیوں کی بیماریاں

GASTRALGIA

درد معدہ

(رگسٹریلجیا)

تعریف ہر اس مرض میں مقام معدہ پر شدید درد ہوتا ہے،
یہ درد عموماً بد معنی، قبض، خرابی معدہ و غذا کی وجہ
وجوہات و تشخیص سے ہوتا ہے، کبھی تھے بھی آجاتی ہے، اگر یہ درد
معدہ کے منہ پر ہوتا ہے، تو اس کو وجع الفواد یا کوڑھی کا درد کہتے ہیں، چونکہ
نم معدہ دل کے قریب ہوتا ہے، اس لئے اس سے بہت سخت تکلیف
ہوتی ہے، اور غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور مریض کی زندگی خطرے میں
پڑ جاتی ہے۔

علاج اکثر تیج خارج کرنے والی اور قبض کشا ادویہ سے درد معدہ
کو آرام آ جاتا ہے۔

دوا سے ہا غصہ ۲، نوشادر ۲، فلفل دراز ۲، تولہ، الایچی کلاں (دوا نہ)
تولہ، گیری اتولہ، لونگ اتولہ، ست لیوں لاماشہ، ست بہدینہ ۳، ماشہ،

سب چیزوں کو علاحدہ علاحدہ پیس کر سست پودینہ شامل کر لیں۔
 مقدار استعمال نصف ماشہ ہمراہ آب تازہ، اکثر امراض معدہ، درد پیٹ،
 کمی ہواک، کھٹی ڈکاریں آنا، قراقرز، نفخ شکم وغیرہ کو از حد نافع ہے۔
 روح شفا دو بوند کھانڈ میں ملا کر دینا درد شکم کو فوراً دور کرتا ہے۔
 نسخہ روح شفا یا امرت دھارا اور کافور ۶ ماشہ، منقول ۶ ماشہ
 نقایمبول ۶ ماشہ، کاربالک اسٹم ۳ ماشہ۔

سب کو ملا کر دھوپ میں رکھیں، یا ذرا گرم کر کے حل کر لیں، امرت دھارا
 کا نسخہ تیار ہے، اندرونی و بیرونی طور پر مستعمل ہے۔
 مقدار خداک ۲ قطرہ تا ۴ قطرہ ہمراہ کھانڈ یا بدرقہ مناسبہ، درد دامت
 درد سر اور جسم کے جس حصہ میں درد ہو، نیز زیریں جاندروں کے کاٹے پر
 پھیر کر لگائیں۔

کنکھیا اور بخڑوں کے دردوں کے لئے امرت دھارا ۱۵ تولہ شیریں تیل
 میں ملا کر مالش کریں۔

اگر کان میں درد ہو، تو یہی تیل نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں۔
 اندرونی طور پر بد صفی، دل کا متلانا، تھکے، اسہال، درد شکم، بیضہ کے
 لئے چند قطرے پیتا مشہ میں ڈال کر یا کھانڈ میں ملا کر دیں، قلب کی
 کمزوری میں دل کو تقویت پہنچانے کے لئے عجیب الائنز ہے۔ مندرجہ
 بالا امراض کے لئے واقعی پیغام شفا ہے، ہر طب میں اس کا ہونا
 لازمی ہے۔

شیخ الکشمیس، معدہ کے سرد اور ریخی درد اگر خفیف ہوں، تو ماجرہ کی
 پوٹی سے سینک کرانا اور مجھ ناری لگانا ان میں سکون پیدا کرتا ہے۔
 خصوصاً اگر مراقب شکم کے وسط میں ایک بڑا جھجھ اس طرح لگایا جائے۔

کہ چاروں طرف سے ناف کو گھیرے۔ اور ایک گھنٹہ کے لئے اسی طرح بغیر
پھینکوں کے چھوڑ دیا جائے۔ اور درمیان فوراً عجب تسکین پیدا کرتا ہے۔
مینگ خالص منقہ کے دانہ میں لپیٹ کر نیم گرم پانی سے کھانا درد
نظم کو فوراً دور کرتا ہے۔

زنجبیل کو خواہ تنہا استعمال کریں یا کھانے میں ملا کر کھائیں، ہضم پر
اعانت کرتی ہے۔

تریاق معددہ در نفل سیاہ اولہ، نوشادر اولہ، پرچی اولہ، تخم دھتورہ
۶ ماشہ۔ سب کو کٹ چھان کر سفوف بنا دیں۔

خودک پڑتی تا اوتی ہمراہ آب تازہ یا عرق سولفون میں چار بار
متلی، ۴، بد ہضمی، درد نظم، کھٹی ڈکاریں اور کمزوری معدہ کی جلدہ شکایات
رفع کرنے میں خصوصیت سے مفید ہے۔

بعض اوقات معدہ میں غذائے غیر ہضم تکلیف کا باعث ہوتی ہے
جس میں قے لانے کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ بہت مجرب ہے۔

بین پھیل سب ضرورت سفوف کر لیں، مریض کو اولہ نیم گرم پھینکا دیں۔

ادھر سے وہ گلاس گرم پانی کے پلا دیں، قے ہو کر فوراً درد کو افاقہ ہو گا۔

دیکھیں نمک خوردنی ۶ ماشہ نیم گرم پانی سے پھینکا دیں۔ ادھر سے وہ

گلاس پانی نیم گرم پلا دیں۔ قے ہو جائے گی اور درد دُکھ ہو جائے گا۔

حوار شش جالینوس کمزوری معدہ کے لئے بہترین دوا ہے۔

کارمی نمک کسیر ۱۰ سوڈا بائیکارب ۱۰ گرین، سپرٹ ایونیٹا ایرو مینگ ۱۵ منم

۱۰ کچھ خمر ۱۰ منم، سپرٹ کلرید فارم ۱۵ منم، عرق پودینہ

ایک ادنیٰ۔ اسی ایک خودک بعد از غذا صبح و شام دس

نیم معدہ، درد معدہ، ترش ڈکار، کلیجہ جلتا، بد ہضمی، کمی ہواک وغیرہ

کے لئے تجربہ شدہ دوا ہے۔

دوا سے درد خم معدہ بہ کیو مل چم گرین، سوڈا بائیکارب ۸ گرین، اسپرین ۴ گرین، ایسی ایک ایک خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

درد خم معدہ کے لئے بہترین دوا ہے۔

سوڈا امونٹ گولیاں جو ست پودینہ اور سوڈا بائیکارب ملا کر بنائی گئی ہوں، خرابی معدہ اور بد ہضمی کے لئے مفید ہیں۔

تریاق و جمع الغواد بہ شیر شتر سوا سیر نمک شیشہ ۴ تولہ زعفران ۲ ماشہ دودھ کو کڑا ہی میں ڈال کر آگ پر رکھیں، نمک شیشہ پین کماں میں

ڈال دیں، اور کف گیر سے ملائے رہیں، جب مثل کھویا کے لگاڑھا ہو جائے

تو زعفران اصلی دودھ میں کھل کر کیا ہوگا، اس میں ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد

اتار لیں، اور خیال رکھیں کہ جل نہ جائے، خشک ہونے پر پیکر محفوظ رکھیں،

مقدار خواگ ۱ ماشہ ہمراہ آب تانہ دن میں تین بار، اگر دل بہت

کمزور ہو، تو اس میں سونا اور چاندی کے دق ملا لیں۔

یہ دوائی درد خم معدہ کے لئے صحیح معنوں میں تریاق ہے۔ زیادہ

تعریف فضول سے تجربہ کریں۔

دوا سے امراض شکم بہ تنہا ۱ ماشہ، نمک سنگ ۲ ماشہ، بارٹنگ

۴ ماشہ، سوئمٹھ ۵ ماشہ، مرچ سیاہ ۴ ماشہ، لنگھاں ۷ ماشہ، کھٹو

۸ ماشہ، بلبلہ سبز ۹ ماشہ، چترہ ۱۰ ماشہ، دل اجواٹن ۱۱ ماشہ،

درج ۱۲ ماشہ۔

جملہ ادویہ کو پیس کر قند سیاہ کے قوام میں گولیاں بقدر کنا روشنی بنالیں۔

جملہ امراض شکم کے لئے ویدک کا مشہور و معروف نسخہ ہے۔

نسخہ درد شکم مزمن اور خشک، درج چلہ، برگ کیکہ سہرا یک ۵ تولہ، آلہ بخار ۴ دانہ

اہلی پاؤ پختہ، اناردانہ ۷ تولہ، سرکہ ایک پاؤ، پانی تین سیر۔
 سب دوائیں بھگور کھیں، روزانہ صبح ایک پاؤ پانی پلا دیا کریں۔
 پرانے درد شکم کے لئے لاثانی نغہ ہے، قبض ترقی، پیاس، درد شکم،
 یہ تان قطعاً دور ہو جاتا ہے، باضمہ کو تقویت دیتا ہے۔
 نسخہ اسہال گرمائی :- کشیر خشک ۵ ماشہ، اناردانہ ۵ ماشہ، زبرد سفید
 ۳ ماشہ، زردود ۳ ماشہ، گرد سماق ۳ ماشہ، الہی خودہ ۵ عدد، زرشک ماشہ
 پہلی پانچ دوائیں بریاں کر لیں، سب کو سردائی کی طرح پانی میں پیس
 کر چھان کر مشربت اناردانہ ۲ تولہ ملا کر استعمال کرائیں۔
 اسہال گرمائی اور پیاس وغیرہ کے لئے اکسیر ہے۔
 میکلین سٹاکس پوڈر، بسمتہ کارب ۲۰ گرین، سوڈا بایکارب ۳۰ گرین
 گلیسٹیم کارب ۶۰ گرین، کیلیم کارب ۶۰ گرین
 مقدار خوراک نصف سے سالم حجم پانی میں ملا کر بعد از غذا کھلا دیں،
 درد، ترمشی معدہ، بد معنی وغیرہ کے لئے اکسیر ہے۔
 لائیوڈار ڈیٹس ٹوس پر یہ ایک میٹڈ دوا ہے، جو اکثر امراض معدہ کے لئے
 مفید و تجرب ہے، پرچہ ترکیب استعمال ہمراہ ہوتا ہے۔
 نسخہ :- سوڈا بایکارب ۱۰ گرین، سپرٹ ایوینا ایرومیکس ۳۰ منم
 پیکر کارڈیم کو ۳۰ منم، سپرٹ کلورونام ۲۰ منم، ایکوا ایک اونس،
 ایسی ایک ایک خوراک فوراً پلائیں، بوقت ضرورت تین گھنٹہ بعد
 دوسری خوراک دے سکتے ہیں، درد معدہ میں مفید ہے۔
 نسخہ :- بسمتہ کارب ۱۰ گرین، پوڈرا گائنٹہ ۵ گرین، لائیوڈار مارینا
 ہائیڈرو کلورائیڈ ۱۰ منم، ایسڈ ہائیڈرو سیانک ڈائیسیوٹ ۳۰ منم، ایکوا
 کلورونام ایک اونس۔

ایسی ایک خوراک فوراً پلائیں۔ شدید درد معدہ میں بے حد مفید ہے۔
 اگر ضرورت پڑے، تو ۳ یا ۶ گھنٹہ کے بعد ایک خوراک اور دے سکتے ہیں۔
 نوٹ، بعض اوقات صبح کے وقت خالی معدہ ہونے کی صورت میں
 مقام معدہ پر سخت درد ہوتا ہے، اور بعض مارے درد کے وقت پھرتا ہے،
 اور مقام معدہ کو دباتا ہے، درد کی ٹیسیں بائیں شانہ تک جاتی ہیں، ایسے درد

کو پیٹ کا شدید درد ریشخ معدی یا گیسٹرک کریمپ BSRIC CRAMP
 کہتے ہیں، اس درد کے علاج میں مندرجہ ذیل نسخہ بے حد مفید و تجرب ہے۔

نسخہ: ہر سپرٹ ایونیا ایرومیتھک ۳۰ منم، سپرٹ ایچیر ۲۰ منم، ٹیکچرادیٹیم
 ۱۰ منم، ہیرپ زنجرس ۳۰ منم، ایجو اکلورونام ایک ادنس

ایسی ایک خوراک فوراً پلائیں، اگر ضرورت ہو، تو تین گھنٹہ بعد ایک خوراک
 اور دے سکتے ہیں، اس کی ایک خوراک سے درد فوراً رفع ہو جاتا ہے لیکن
 درد رفع ہونے کے بعد ایک سہل ضرور دینا چاہئے۔

بہتر اس درد کے لئے کوڈر یا کبرین کی ایک ٹکیہ گرم چائے کے ساتھ

کھلانے سے فوراً آرام آجاتا ہے، بعض اوقات درد شروع ہونے کے

ساتھ ہی کوئی خشک غذا مثلاً بسکٹ یا روٹی کا ایک ذالہ کھلانے سے درد

کو فوراً تسکین ہو جاتی ہے۔

گینیشیا فاس ۶ x ۶ بمقدارہ گرین، گرم پانی کے ساتھ کھلانے سے

تشخی درد معدہ فوراً رفع ہو جاتا ہے، شاذ و نادر ہی دوسری خوراک کی ضرورت پڑتی ہے

کالو سنتھ ۳۰ x ۳۰، ہر ایک گھنٹہ بعد ایک ایک خوراک دینے سے درد معدہ

کو فوراً آرام ہو جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل ہومیوپیتھی ادویات گینیشیا، برائیوینا، لاگو پوڈیم، کاربوویج

کبوریٹم میٹیکم وغیرہ نفخ شکم اور درد معدہ کے لئے مفید ہیں۔

بد مزاجی DYSPEPSIA (دوس پپسیا)

تعریف اور اس مرض میں غذا غیر منہضم خارج ہوتی ہے۔
وجوہات ہر بہ اکثر کھانے پینے کی بے اعتدالی، گیسٹرک جو س کا کم و بیش
ہونا، رنج و غم، کثرت مطالعہ، خون کی خرابی، آلات منہضم کی قوت ماسکہ
اور دالہ کا نقص وغیرہ اس کے اسباب میں۔

تشخیص معدہ کے منہضم میں فتور آجاتا ہے، درد، گرانی، بے چینی تروش
پیش ڈکار، کبھی دست، کبھی قبض، بدبودار ڈکار، ہاتھ پاؤں
کی ہتھیلیاں جلتا وغیرہ اس کی علامات میں۔

علاج اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کریں، اگر تروش ڈکار میں آتی
ہوں تو سوڈا بائیکارب، اگرین ایک خوراک، پانی میں ملا کر
استعمال کرنا فوری فائدہ دیتا ہے۔

سوڈامنٹ کی ۴ گوتیاں کھلانا بھی مفید ہیں۔

چولن ہاضم، سوٹھ، پوست، بلیہ زرد، فلفل دراز، سنوت، نمک سوخا
تمام ادویہ کو مسادی الوزن لے کر سفوف بناد کریں۔

مقدار خوراک ہاضمہ کے لئے تین تا چھ ماشہ صبح و شام گرم پانی کے ساتھ،
قبض کشائی کے لئے اتولہ بمراہ گرم پانی یا دودھ، بد مزاجی، پیٹ
درد، نفخ شکم، بواسیر، وجع المفاصل، قبض کے لئے بے حد مفید ہے
اکسیر معدہ، نمک سیاہ ۳ تولہ، اجرائن دیسی ۵ تولہ، نوشادر محسبہ
۵ تولہ، نیزاب گندھک ۲ تولہ،

پہلی تین ادویہ کو پیس کر نیزاب گندھک ملا لیں، خشک ہو کر سیاہ

سفوف بن جائے گا۔ خوراک اقلی ہمراہ پانی

درد غم معدہ کے لئے اکسیر ہے۔ دیگر امراض معدہ بد معنی، درد وغیرہ کو دور کرنے میں مجرب ہے۔

وتم اور فساد و استسوت، بعض اطباء کا دعویٰ ہے کہ اگر روغن کنجد تقریباً ۱۰ تولہ یا جائے، تو مٹی کھانے کی خواہش قطع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا دار و مدار تجربے پر ہے، قیاس پر نہیں ہے۔
نشا سستہ گندم بھی اس کے لئے مجرب ہے۔ خصوصاً اگر نمک ملا کر کھا یا جائے۔

جوشانہ پودینہ، اکو بخارا ۹ دانہ، اعلیٰ ۲ تولہ، زرشک ۹ ماشہ، زیرہ سفید ۹ ماشہ، پودینہ خشک ۳ ماشہ، الاحی خورد ۱۰ تولہ، مورینہ ۹ دانہ، ایک سیر پانی میں ڈال کر جوش دیں، مقدار خفاک ۱۰ تولہ کھاندہ ملا کر دیں۔ مقوی معجم سے اور مثلی کو رد کرتا ہے۔

آب انگورہ، ہینگ خالص ۲ تولہ، نوشادر دسی ۲ تولہ، نمک طعام ۲ تولہ، بوتل میں ڈال کر اوپر سے گرم آب بنا ہوا پانی ڈال کر بوتل بھر دیں۔ خوراک اچھے دن میں تین بار، معدہ کی رہا حی امراض اولہ درد معدہ وغیرہ کے لئے مجرب ہے، درد غم معدہ کو بھی مفید ہے، امراض نسواں یا انگورہ وغیرہ کو بھی مفید ہے۔

مکسچر ہاضم، اسٹیمپڈ، نامٹرو کلورک، حل، ۱۰ بوند، شکیر کارڈیم کو ۳۰ بوند، ٹائیگوار سٹرکینین ۳۰ معجم، سپرٹ کلوروفارم ۲۰ معجم، عرق پودینہ ایک ادس، اسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار بعد از غذا دیں۔ جب بخاری اور شقی ہوئی تو کاریں آتی ہوں، اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو بے حد مفید ہے۔

VOMITING & RETCHING

سے متلی

(دائے ٹنگ ریچنگ)

تعریف اس مرض میں غیر منہضم شدہ غذا تے کے ذریعہ خارج ہوتا جاتی ہے۔

وجوہات ہر معدہ کی خراش، دم زائدہ اور درد گودہ، دم جگر، رحم کے بعض امراض، دماغی امراض، فتق دہریا، مختلف بخاروں اور کئی قسم کے زہروں سے بھی قہقہہ آتی ہیں۔

تشخیص و علامات اس میں جی متلاتا اور بار بار تے ہوتی ہے۔

علاج اصل سبب مرض کو رفع کریں، کیونکہ یہ بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ اکثر اس کا سبب معدہ کے باہر ہوتا ہے، اگر کثرت خوری کی وجہ سے متلی ہو، تو تے کو ادینی چاہئے، نم معدہ پر دانی کا پلاستر لگانا بھی تے کو روکتا ہے۔

کا فور کا کسی رب میں ملا کر چاہنا، کا فور کا سونگھنا اور اس کا معدہ پر طلا کرنا گرم متلی اور تے کو بالخاصیت روک دیتا ہے۔

قرنفل روٹنگ بھی سرد تے کے لئے سخت نافع ہے، خصوصاً بچوں کے لئے بہت مفید ہے، خواہ سردی کی طرح باریک پیس کر سرد پانی کے ساتھ کھلائیں، یا پانی میں جو کش دے کر پلائیں، بلکہ ہتھیر ہے کہ قرنفل کے جو شانڈہ پر منسلکی رومی پیس کر چھڑک کر پلائیں، اس سے تے فوراً روک جاتی ہے۔

اگر دودھ پینے والے بچے کو تھے کی شکایت ہو، تو دودھ پلانے والی عورت کو قرتقل استعمال کرائیں، اس سے بچے کی تھے کو نفع ہوگا، اسی طرح اگر بقدر ۴ جو قرتقل کو خوب بارنگ میں کر ماں کے دودھ میں گھول کر بچے کو پلائیں، تو ایک دن میں تھے کو آرام ہو جاتا ہے، علامہ انطاکیؒ کی بہت ناریخ مردہ متلی اور تھے کو ساکن کرنے کے لئے مجرب ہے، خواہ کسی طرح استعمال کرایا جائے،

اگر تھے میں خاص معدہ سے خون خارج ہو رہا ہو جس کا سبب کسی رگ کا ٹک جانا یا قرحہ میں تامل پیدا ہو جانا ہو، تو لغت الدم کے مطابق اس کا علاج کریں، نیز سرکہ میں برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی ملا کر پلائیں، اس کا مجرب علاج ہے،

امرت دھارا اور مشربت الی بھی رفع تھے کے لئے مفید ہے، نسخہ :- کلوروڈین ۲۰ بوند، عرق سولف ایک ادنس،

ایسی ایک ایک خدک دو گھنٹہ بعد دیں، رفع تھے کے لئے مجرب ہے، گلوکوز وارڈ دو ادنس مرلیض کو پلائیں، تھے مفرط کے لئے مفید ہے،

اگر خون کی تھے آتی ہو، تو میمو پلاسٹین ۲ سی سی کا زیر جلد ٹپک کریں، اگر بہت زیادہ تھے آرہی ہو، اور جسم سے رطوبت کم ہو چکی ہو، تو نادرل سیلائن ایک پائنٹ کا دریدی انجکشن کریں، یا گلوکوز ۵ سی سی کا انجکشن کرنا بے حد مفید و مجرب ہے، تھے دفع ہو کر مرلیض کو طاقت بھی ہو جاتی ہے تھے متلی کے علاج میں ہومیو پیتھک ادویات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے،

پیکاک، آرسنک، کلکیر یا فاس، کیفرا دویہ اکسیری اخوات کی حامل ہیں،

HICCUGH (ہکف)

ہکلی

وجوہات اور بدہضمی، کلیجہ جینا، مگر کے فعل کی سستی، معدہ کا فسور، بچوں کو دودھ کے پھٹ جانے سے، ہکلی کی مرض ہو جاتی ہے۔ حساب عاجز میں تشنج ہو کر سکڑتا ہے، تو ہکلی آتی ہے۔

علاج معدہ کو فاسد مادہ سے پاک کرنا چاہئے، نمک ایک چمچ پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں، تاکہ کھل کر تھکے ہو جائے، معدہ صاف ہو کر ہکلی دور ہو جائے گی۔

کسی امتلائی ہکلی کے لئے جس کا مادہ لیسیدار ہو، مندرجہ ذیل اقراص بہت عمدہ ہیں، رصفۃ، قسط، زعفران، گل سرخ، مصطکی، سنبل الطیب ہر ایک ایک تولہ، اسارون ۶ ماشہ، صبر، افیون خالص ہر ایک ۳ ماشہ سب کو کوٹ چھان کر لعاب اسبغول میں ملا کر اقراص بنالیں، خوراک سواد دماشہ ہے، سخت ہکلی اور قلب نفس رعشیان لازم آ کے لئے یہ قرص بہت ہی سودمند ہیں، کیونکہ اسبغول اور افیون نم معدہ کی جس کو کم کرتی ہیں، سنبل الطیب اس کو تقویت دیتی ہے، اور مادہ کو تحلیل کرتی ہے، اسارون رطوبات کو مجاری بول کی طرف متوجہ کر کے مثاب کی راہ خارج کرتی ہے، صبر ان کو مجاری ثقل (براز) کی جانب مایل کر کے پاخانہ کے ذریعہ سے خارج کر دیتا ہے، اور قسط و زعفران متوی منفع اور مسخن دوائیں ہیں۔

معمولی ہکلی زور سے سانس روکنے سے بھی بند ہو جاتی ہے، کبھی دشتناک خبر سنانے سے بھی بند ہو جاتی ہے، تیز سوار سے بھی بند ہو جاتی ہے۔

اگر اچھکی کا علاج کرتے کرتے ٹھک جاوے اور وہ نہ روکے تو مریض کو چھینک لانے کی کوشش کریں، اگر مریض چھینک سے بھی اچھا نہ ہو تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔

علاوہ بری عاقبتوں کا کو بار یک پس کر شہد میں ملا کر چٹانا بھی مستعدائی پھل کے لئے مجرب ہے۔

پھلکی بند پستری رانی کو پانی میں حل کر کے خم معدہ کے اوپر ضماد کریں جب بہت زیادہ سوزش شروع ہو جائے تو اتار دیں، فوراً پھلکی بند ہو جائے گی۔

تخلیہ پھلکی ہر ایمائیل نائٹریٹ توڑ کر سونگھانے سے فوٹا پھلکی بند ہو جاتی ہے۔

اکسیر پھلکی، نمک سیاہ ۳ ماشہ، سرکہ ۲ تولہ۔

ایسی ایک خوراک مریض کو پلائیں، پھلکی کو بند کرتی ہے۔

معدہ کو گرم پانی سے دھونے سے بھی پھلکی بند ہو جاتی ہے۔

ٹیکہ پھلکی اور اکثر اوقات بہت تکلیف دہ پھلکی شروع ہو جاتی ہے، تو مارفین ۱/۲ گرین، اڈرین ۱/۲ گرین کا جلدی ٹیکہ کیا جاتا ہے جس سے پھلکی بند ہو جاتی ہے۔

پھلکی کا ڈاکٹری نسخہ اور سپرٹ ایونیا ایردیٹک ۲۰ بوند سپرٹ ایٹرس ۲۰ بوند، لائیکو مارفین ۱/۲ ٹیڈرو کلورائیڈ ۱۰ بوند، ایکو اکو و فارم،

ایک ادیس، ایسی ایک خوراک پلائیں، اگر ضرورت ہو تو دوبارہ بھی پلا سکتے ہیں، پھلکی روکنے کے لئے مجرب علاج ہے۔

سرد پانی پینے اور برف کے چوسنے سے بھی پھلکی بند ہو جاتی ہے۔

دو اسے مجرب برائے ہچکی : درست پودینہ ایک رتی گلقد میں ملا کر
دینے سے ہچکی آتی رک جاتی ہے۔

روٹ : بعض اوقات شدید امراض آنت میں پڑ جانے پر
معدہ، ہجڑ کا سکڑ جانا، تنہم البول کی وجہ سے متواتر ہچکی آتی ہے اور
اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں اصل امراض کے علاج
کی کوشش کرنی چاہئے۔

اکسیر ہچکی : رگنیشیا فاس ۶۰ (مقدار ۵ گرین) گرم پانی کے ہمراہ دن
میں تین چار خوراک دیں۔

اکثر اوقات پہلی خوراک سے ہی آرام ہو جاتا ہے۔ مجرب ہے۔

مہضمہ CHOLERA (کالرا)

وجوہات و تشخيص : اس میں مریض کو کثرت سے دست اور
نئے آتی ہے، اول تنگم میں درد ہوتا ہے، جی متلاتا ہے، پھر تے اور
دست شروع ہو جاتے ہیں، پہلے تو کچھ فضلہ وغیرہ خارج ہوتا ہے
لیکن بعد میں چادرلوں کی پیچ کی طرح پانی آنے لگتا ہے، اس مرض کے
تین درجے ہیں، یہ مرض عموماً صبح چار بجے شروع ہوا کرتا ہے
اور اس میں نئے داسہال ہوتے ہیں، یہ دو سے بارہ گھنٹے یا
کچھ زائد مدت تک رہتا ہے، جس میں مواد چادرلوں کی پیچ کی طرح شفاف
خارج ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور پیٹ کے عضلات میں
تشنج ہوتا ہے، مریض نڈھال، کمزور اور جسم سرد ہو جاتا ہے، اس
کے بعد دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔

(۱۲) اس میں مریض سرد ہو جاتا ہے۔ یہ شدت و خفت کے لحاظ سے چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہتا ہے۔ نبض بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ جلد کا درجہ حرارت کبھی کم کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ دست بند چہرہ پر مرونی چھا جاتی ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ جلد چھری دار ہو جاتی ہے۔ سانس چھوٹا اور آواز مدہم ہو جاتی ہے۔ اس درجہ میں اکثر مریض مر جاتے ہیں۔ بعض میں تیسرے درجہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱۳) اس میں نبض چلنے لگتی ہے۔ بخار ہو جاتا ہے۔ اور حالت بد بصیرت ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی اس درجہ میں شدید بخار اور غشی وغیرہ سے مریض مر جاتا ہے۔ یہ مرض سنا و غذا کا نتیجہ ہے۔ اور اکثر دبا کی طرح پھیلتا ہے۔ اس مرض میں استقلال اور دلیری سے علاج کرنا چاہئے۔

علاج اول موادنا سد کو اپنے آپ یا بذریعہ نمک اور تفتے آدرا دویہ وغیرہ سے خارج کریں۔ جب نہ سر بلا مادہ خارج ہو جائے تو پھر دست و تفتے بند کرنے کی کوشش کریں۔ اور حالات مرض کے مطابق ادویہ استعمال کرتے جائیں۔ شروع میں تفتے دست ہرگز بند نہ کریں جب تک کہ موادنا سد خارج نہ ہو جائیں۔

عرق عجیب : عرق پودینہ ایک پاؤ، کلورو ڈین یا کمیونڈر ڈین ۱۲ ڈرام دونوں کو ملا لیں۔ تیار ہے۔

مقدار خوناک ۱۲ اونس ہر ایک گھنٹہ بعد۔ میضہ کی پیاس سے۔ اسہال۔ پیٹ درد وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

ترباق : میضہ اور روح شفا یا امرت دھارا ۱۰ ماشہ، افیون ۳ ماشہ، عسل ۱۰ ماشہ، ملا لیں۔ بس تیار ہے۔

ترکیب استعمال : ۵ قطرے دوا ایک تولہ چینی سفید پر ڈال کر

آدم گھنٹہ بعد کھلائیں، اور برف چوسنے کو دیں، تھے، دست بند ہو جاتے ہیں، اور یہ دوائی اس وقت مفید ہے، جب کہ فاسد مواد کے معدہ صاف ہو جائے، اس کے استعمال سے فوراً تھے، دست بند ہو کر مرض دور ہو جاتا ہے، یہ نسخہ بہت مجرب ہے،

حب میمنہ: رینگ خالص امانشہ، کافور ۱۲ ماشہ، افیون ۱۲ ماشہ، فلفل سیاہ ۱۲ ماشہ، سونٹھ ۱۲ ماشہ،

کھل کر کے بقدر ۱۲ رتی گولیاں بنائیں، ہر چار گھنٹہ بعد ایک گولی دیں، پیاس کی حالت میں سرد پانی یا برف چوسنے کو دیں، مفید و مجرب دوا ہے بطور حفظ مالتقدم تندرست بھی استعمال کریں،

عرق میمنہ: پودینہ ۱ تولہ، الائی کلاں ۲ عدد، منقے ۸ دانہ،

نیم کوہ کر کے ایک سیر پانی میں جو کش دیں، جب آدم صاف ہو جائے، تو دودھ تولہ دفعہ سے دیتے رہیں، پیاس تھے، دست وغیرہ رک جائیں گے،

تھیکلہ: میمنہ کی علامات شروع ہوتے ہی سونٹھ ایک تولہ کوٹ کر گلاس میں ڈال کر اوپر سوڈے کی بوتل ڈال کر فوراً پینے سے تمام علامات موقوف ہو جاتی ہیں، مجرب ہے،

عرق گلاب: میمنہ کا مادہ سمیہ دور کرنے میں بالخاصہ مفید و مجرب ہے، اور پیاس کو بجھاتا ہے،

اگر تنقہ معدہ کے بعد پیاس لگے، تو برف چوسائیں، یا پختہ پاؤں کو سرد رکھیں، کبھی کبھی صندل، گلاب، کمیغیر کو مقام قلب پر ضا د کرنے سے تسکین ہوتی ہے،

اگر پختہ پاؤں میں تشنج ہو رہے ہوں، تو جائفل، لونگ، سونٹھ

میٹھے تیل میں جلا کر اطراف کی مالش کریں۔ اور تہ باق ہیضہ کا استعمال کریں
یا یعنی منٹ ایوینا یا ٹرین ٹائن کی مالش کریں۔

اور ہاپرٹائک سیلان سو یوشن ۲ یا منٹ کا وردی ٹیکہ کریں
اگر ہاپرٹائک کا ٹیکہ نہ ہو تو گلوکوز سو یوشن کا جس قدر ہو سکے۔ انجکشن
دیں۔ تعویت قلب اور رفع تشنج کے لئے مفید و مجرب ہے۔

اگر دست زیادہ آ رہے ہوں، اور بند نہ ہوں، تو ڈورس پوڈر
۵ گرین کی دو خوراک دیں، دست بند ہوں گے، یا حب ہیضہ کھانے کو دیں،
ہیضہ کا مکسچر ہر پیرٹ ایٹر ۳۰ بوند، آیل کریمو فلانی ۵ بوند، آیل
کیمو پیٹ ۵ بوند، آیل جونی پر ۵ بوند، آیل سلفورک ایرو میٹک ۵ بوند
انکو ۹ ڈرام، یہ ایک خوراک ہے۔ ہر آدھ گھنٹہ بعد دیں، آٹھ خوراکیں
چھ گھنٹہ میں پلائیں، عام طور پر اتنی ہی کافی ہوتی ہیں۔

اس سے تے، دست، آنتوں کا دم، درد وغیرہ فوراً دور
ہو جاتے ہیں، چھ سے بارہ گھنٹہ کے اندر جراثیم ہیضہ معدوم ہو جاتے
ہیں، ۹۵ فی صدی مجرب نسخہ ہے۔

دہی صاحب کا کیمفر ہیضہ کے لئے اکسیر الازہر ہے، دو قطرے
پانی میں ملا کر ہر آدھ گھنٹہ بعد دیتے رہیں، تمام علامات موقوف ہو
جائیں گی۔

عرق کاوند کا فور خالص ۲ تولہ، سرکہ ۶ تولہ
شیشی میں ملا کر ایک ماہ دھوپ میں رکھیں، شیشی کو ہر روز ہلا دیا
کریں، ایک ماہ بعد چھان کر محفوظ رکھیں،

مقدار خوراک ۵ بوند ہمراہ آب یا تاشہ میں ڈال کر دیں، ہیضہ کے لئے مفید ہے
دباؤ ہیضہ کے ایام میں اس کا استعمال ہیضہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

دیگر ڈاکٹری نسخہ جات جو ہیضہ میں مستعمل ہیں، ان کے لئے جاری کتاب
 ڈاکٹری فارماکو پیا جدید ملاحظہ فرمادیں۔
 اکثر مریض ہیضہ کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، ان کے لئے یہ نسخہ
 نہایت مفید ہے۔
 پیشاب جاری کرنے کا نسخہ: ۱۰ قلی شورہ ایک توہ کھول کر کے
 شاذ پر لپ کریں، پیشاب کھل جائے گا۔
 یا آٹھ کیمپتر سے کھول دیں، جس کا طریقہ استعمال احتیاس البول
 میں مذکور ہے۔

اکسیر ہیضہ: یہ دوا ہیضہ کے لئے بہت مجرب ہے، جبکہ اول درجہ
 گزر چکا ہو۔ دس سے زیادہ تجاوز کر چکے ہوں، بدن مانند
 برف سرد ہو چکا ہو، ناخن سیاہ ہو چکے ہوں، ایسی حالت میں یہ دوا
 اکسیر بے نظیر ہے۔

جائفل ۱ عدد، افیون ۰.۳ توہ، شکر ف پرنے دو توہ، گھی چھٹانک
 اول ہر ایک جائفل کے دو دو ٹکڑے کر میں، ایک ٹکڑہ ہر افیون ۶ ماشہ
 ۱۰ شکر ف ۳ ماشہ ڈال کر تمام جائفلوں کو سرخ کر کے بعد ازاں نکال
 کر مع شکر ف و افیون د جائفل کو پس کر رکھ لیں، پس تیار ہے۔
 مقدار شوراک اراتی تا ۳۰ رتی، ہر رات عرق سولف ہر دو گھنٹہ بعد۔

غذا مریض: دو دین روز تک جب تک مرض کا زور ہے مریض ہیضہ کو
 غذا مطلق نہ دیں، صرف سوڈا و اٹر عورتا پلا تے رہیں، جب مرض میں
 تخفیف ہو جائے، تو آش جو پلا لیں، پھر تدریج ساگروانہ اور مونگ کی
 نرم کچڑی اور ان کے بعد شوربا میں ڈبل روٹی یا نرم پھیکا کھکر دیں،
 آہستہ آہستہ غذا بڑھاتے جائیں۔

جن ایام میں یہ مرض شروع ہو ، پیاز ، اچار اور ترش چیزوں کا کھانا
معیند ہے ، تیزاب گندھک ۴ قطرے پانی میں ملا کر صبح و شام استعمال
کرنا چاہئے ، کسی قسم کی باسی غذا ، سبزی وغیرہ نہ کھانی چاہئے ، پانی صاف
پینا چاہئے ، جلاب ہرگز نہ لینا چاہئے ، مکان صاف ہونا چاہئے ،

COLIC دکالک

قولنج

وجہ پائنتہ و تشنجیں ہر انٹریوں میں سدہ کی وجہ سے تشنج ہوا کرتا
ہے ، مرین کے شکم میں نیچے کی جانب بہت سخت درد ہوتا ہے ، اس
یہ درد ناف کے گرد بائیں یا دائیں طرف ہوتا ہے ، اکثر قولنج آنت
میں سدہ پڑتا ہے ، اسی لئے اسے قولنج کہتے ہیں ،

علاج قولنج ، درد معدہ ، درد جگر اور دم امعاء میں فرق کریں ،
کیونکہ یہ اعضا قریب قریب ہیں ، اس لئے ان میں
مساج کو امتیاز کر لینا ضروری ہے ،

درد قولنج میں درد ناف کے گرد ہوتا ہے ، اکثر دائیں یا بائیں
طرف زیادہ ہوتا ہے ،

درد جگر ناف کے اوپر پیل کے نیچے دائیں طرف ہوتا ہے ،
سبب کی ٹیسس گندھے تک جاتی ہیں ،

درد امعاء میں بخار ہوا کرتا ہے ، لیکن درد قولنج نہیں ہوتا ، درد
معدہ مقام معدہ پر ہوتا ہے ، اور ناف کے گرد نہیں ہوتا ،

درد گردہ ناف کے دائیں یا بائیں بچھلی طرف شروع ہوتا ہے ،

جس کی ٹیس خبیثوں تک جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک یا دونوں ٹانگوں میں درد چلی جاتی ہے۔ اور مٹیاب قطرہ قطرہ درد سے اور کم آتا ہے۔

ربڑ کی بوتل کو گرم پانی سے غمر لیں، اور پیٹ پر ٹکوری کریں، جب درد میں کمی ہو، تو گرم پانی میں ۵ تولہ صابن سن لائٹ حل کر کے حقنہ کریں تاکہ بچے کی آنکھوں کا فصدہ دور ہو جائے۔ لیکن حقنہ کے پانی میں کمیٹر آئیں ایک ادنس اور روشن تار میں ایک ڈرام شامل کر لیں۔ اگر درد میں افادہ نہ ہو تو پیلے کسیر کی چند خوراکیں یا سفوف برش کا فورقلا دیں، جب درد میں تخفیف ہو جائے تو پھر مسہل دیں، ۵ تولہ کمیٹر آئیں کا

پلانا مفید ہے، کالک کسیر، ٹیکچر بیلا ڈونا ۷ منم، ٹیکچر ادیم ۳ منم، سپرٹ ایویا ایرو میٹک ۲۰ منم، سپرٹ کلوروفام ۱۰ منم، سوڈا بائیکارب ۵ اگرین عرق پودینہ ایک ادنس۔

ایسی ایک خوراک سرین گھنٹہ بعد دیں، جب قوی لہج کا درد بہت شدید ہو رہا ہو تو یہ نسخہ بہت مفید و مجرب ہے۔

قوی لہج کا شکہ : مارفین ہائڈروکلورائڈ ۵۰

مقدار شکہ : ۱ تا ۲ گرین، بذریعہ ہلدی، اس دوا کے ایپولز یا گولیاں

ہوتی ہیں، درد دور کرنے، نیند لانے، مختلف قسم کے اسپمال بند کرنے،

کے لئے تہہ ادب سے ایپولز ادب درجہ کی دوا ہے، ہر قسم کے تیز درد و لہج

درد متعدد، درد کربہ، درد مثانہ، درد دل، درد پسلی، ٹونیک، سینہ کے درد

کھانسی ہر قسم، درد کٹھن، عرق المنا، درد تہرہ، شقیقہ، اعصاب، حصص

کا تکلیف، سے آنا، استعاطا حل کو روکنا، تشخی امراض مثلاً مرگی، تشخی

عشتہ، کمیٹر یا کزادہ سے ٹے ٹے، ابتدا سے ہیضہ میں جب کہ

۵ سفوف برش کا ۵ کاسٹہ منہ ۳۲۰ ہر درج ہے۔

معدہ صاف ہو چکا ہو، اور دل کی حالت خراب نہ ہو، وغیرہ امراض میں مستقل ہے۔

مندجہ ذیل صورتوں میں ٹیکہ لگانا مضر ہے۔

۱۱۔ شیر خوار بچے کو۔

۱۲۔ پیچھے پڑے کے بیماریوں کے مریض کو جب کہ زیادہ کمزور ہو۔

۱۳۔ یعنی کھانسی کے مریض کو جب کہ نالیوں میں بلغم زیادہ ہو۔

۱۴۔ معمولی درد یا پرانا درد، سرسام، امراض دیگر، کمی خون، ضعف قلب کے مریض۔ ایسے مریضوں کو احتیاط سے ٹیکہ کرنا چاہیے، ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔

دیگس مارفین کے ساتھ اڑوپین کا ٹیکہ کیا جائے، تو اس کے مضر اثرات کم ہو جاتے ہیں، مارفین اڑوپین کے ایمپولز یا گولیاں اکٹھی بنی بنائی مل جاتی ہیں۔

نوٹ، اناڈی آدی کو اس قسم کے ٹیکے سے علاج نہیں کرنا چاہیے،

کیونکہ اگر اس سے فائدہ جلد ہو جاتا ہے، تو نقصان کا بھی خطرہ ہے، اور اس کے مضر اثرات کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔

حب دافع قوی لہجہ سیاہ، گندھک آمہ سار، فلفل سیاہ، زعفران

و نجیبیل، سیاہ گہ، ہوزن، چاگوٹہ و پتہ نکلا ہوا، جلد ادویہ کے برابر

سیاہ اور گندھک کی کھلی بنا لیں، اور باقی ادویہ ملا کر گولیاں بنادیں

نخود بنا دیں، شراب گولی تاہم گولی ہمراہ آب گرم یا مصری سفید کھلا دیں،

یہ گولیاں تو لہجہ کے لئے ہمیشہ سفید ثابت ہوتی ہیں، اور بلا ضرر ہیں

کبھی خطا نہیں کرتیں، ایک دو جلاب ہو کر آنتیں صاف ہو جاتی ہیں

اور درد کا فور ہو جاتا ہے۔

قبض

CONSTIPATION

(کالسنسی پیشن)

تشخیص وجوہات و تشخیص :- اس میں پاخانہ حسب طبع نہیں آتا، یا رنج حاجت کے وقت زیادہ دیر لگتی ہے، حواس کند اور اکثر درد سر کی شکایت خفقان، جسم کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے۔

قبض دو طرح کی ہوتی ہے ۱۔ عارضی اور ۲۔ دائمی
عارضی قبض تو خود بخود بھی رفع ہو جاتی ہے۔
علاج دائمی قبض کا ضرور علاج کرنا چاہئے، کیونکہ اس سے اور امراض پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔

سببلاشن کسپیج، ٹنگیشا سلفاس ۲ تولہ، سوڈا سلفاس ۱ تولہ، پانی خالص ۵ تولہ، سب کو باہم حل کر لیں۔
مقدار خوراک ۵ تولہ تا ۵ تولہ، قبض دور کرنے اور دست ۵ نے کے لئے بے ضرر اور مفید دوا ہے۔

حب منفی :- سقمونیا ۱ تولہ، تخم جنطل ۶ ماشہ، مصبر ۲ تولہ، اجوائن خواسانی ۱ تولہ، غارلقون ۱ تولہ۔
سب کو علیحدہ علیحدہ پیس کر سرمہ کی طرح کر کے شہد کی مدد سے

غذوی گولیاں بنا دیں۔
مقدار خوراک ۲ گولی قبض دور کرنے کے لئے اور چار پانچ گولی اسہال لانے کے لئے ہمراہ آب گرم یا دودھ استعمال کریں۔

ہر قسم کی قبض، رنج، سردی اور دیگر امراض معدہ میں

قبض دور کرنے کی ادل درجہ کی دوا ہے۔

دو اسے قبض ہر پلو گیسر ہائٹرا ۱ ڈرام، کیلومل ۲ گرین، ملا کر رات کو ہمراہ دودھ گرم دیں۔ صبح کھل کر اجابت ہوگی، مفید و تجربہ آور بالکل بیضر ہے۔
سفوف مبارک ہر جلا بہ ہر پڑ عمدہ ۶ تولہ، کیلومل اتولہ، روغن بادام ۸ ماشہ
سفوفیا ۲ تولہ، سفوف بنا کر روغن بادام میں چرب کریں۔

مقدار خوراک ۳ ماشہ پانی، دودھ، عرق یا شوربا میں چل کر کے پلاویں۔
ہر موسم بہر سراج کے موافق بے ضرر اور امیرانہ مصلحت سے ایک خوراک سے
کھل کر دست آجاتے ہیں، جبہ حبشی، گھبراہٹ وغیرہ نہیں ہوتی۔
دیسگر ڈنگ ہر پڑ ۶ تولہ، ایک خوردنی ۲ تولہ، سفوف کر کے باقم پلاویں۔
مقدار خوراک ۶ ماشہ بوقت صبح قبل از غذا ہمراہ آب باقی۔

دائمی قبض کا واحد علاج ہے۔

حسب قبض ہر مصرعہ ۶ تولہ، مرچ سیاہ ۳، تولہ، سوہاگہ بریاں
۹ ماشہ، اجوان دیسی ۲ تولہ۔

سب کو باریک کر کے عرق گھیکور میں کھول کر کے کیسٹرائیل میں چرب
کر کے خوردی گولیاں بنائیں۔

خوراک ۲ سے ۴ گولیاں تک پانی یا زودھ سے دیں، رفع قبض
سرور، بند حصین وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے۔

حسب جلا سبب ۱۰ شکر رومی ۳ تولہ، سہاگہ خاتم ۶ تولہ، معزجہ لگوٹہ
مدیر ۱۲ تولہ، آب لیموں ۲۰ عدد میں کھول کر کے کالی مرچ کے برابر گولیاں بنائیں
خوراک ۲ سے ۴ گولی ہمراہ شربت کھانڈ دیں، مستولی قبض کے
لئے ایک گولی۔

غذا اور دہی، لسی، چاول وغیرہ دیں۔

مسٹر لٹریچر : رہنی بنائی دوائی ہوتی ہے، ایک کاغذ میں دو پٹیاں بند ہوتی ہیں، ایک سفید اور دوسری نیلے رنگ کی،

دولوں کو علیحدہ علیحدہ پانی میں حل کر کے باہم ملا دیں۔ جو شش پیدا ہوگا۔ اُچلتے ہی فوراً پی لیں۔ قبض دور کرنے کے لئے مفید و مجرب ہے۔

سید لہ پوٹور: سوڈیم ہڈاسمٹارڈ ٹاریٹ ۱۶ گرامین۔ سوڈا بائیکا رب ۸ گرامین ایک بڑی پیڑیہ میں اور دوسری پیڑیہ میں اسید ٹارٹک ۸ گرامین ہوتی ہے۔

داخلی قبض کے لئے با دام روغن اعلیٰ ۱۰ تولہ ایک یا دو درجہ میں

ملا کر سنے سے دائمی قبضہ رفع ہو جاتی ہے۔
 مکمل قبضہ کشا، ایکسٹریکٹ کبجیلا، اسگریٹ، ۲۰ منہم، ایکسٹریکٹ گلیر
 پائیز، ایکوٹیڈ، ۳۰ منہم، فیکچر بیلڈ ڈرن، ۱۰ منہم، فیکچر بکس و امیکا، ۵ منہم،
 سپرٹ ایوینیا ایر و میٹک، ۲۰ منہم، ایکو اکور و نارم ایکب اولس
 ایسی ایک خوراک رات کو سوتے وقت دیر، دائمی قبضہ کے لئے

مفید ہے، قبض و دور کرنے کا عجیب طریقہ

پیٹ پر گھی یا دام روغن کی مالش کرنے سے تھپن دامن دیر ہو جاتی ہے مالش کا طریقہ بڑی آنت کے وقوع کے مطابق ہونا چاہئے۔ پیٹ دامن کو طے سے نیچے کو ادبر اور پھر پسلیوں کے پاس ناف سے ادبر پیٹھا دامن سے بائیں کو ادبر پھر ادبر سے نیچے کو مالش کرنی چاہئے۔

امراض اور درد تو ایچ وغیرہ میں سخت نقص ہو۔ تو بحال کے تیز مہلاب دینے کے حقہ کرنا بہت مفید و تجربہ ہے۔

ایک سیرپا فی نیم گرم میں ۵ توڑے صابن حل کر کے انمیس کریں۔

یا گلیسرین کی بھکاری کریں اور پیٹ پر کمپرائزڈ میں قدرے تار میں ملا کر لٹائی کریں
اگر معمولی قبض ہو تو معمولی عین چیزیں دینے سے رنج ہو جاتی ہے۔

قبض دور کرنے کی پیسٹ ادویات

اگے رول AGAROL مقدار خوراک اتنا ۲ ڈرام
پیرولا جسر PATRALAGAR مقدار خوراک ۲ ڈرام سوتے وقت
دجی میل لکزیوٹیلٹ : مقدار خوراک اتنا ۲ ٹمکیہ سوتے وقت
بروک لکس : مقدار خوراک اتنا ۲ ٹمکیہ

یہ ادویہ ہر قسم کی قبض کو رفع کرتی ہیں اور عام استعمال کی جاتی ہیں
لیکن پاکستان کے مشہور و معروف جنیات اور امراض جلد کے ماسٹر ڈاکٹر
خالد غزنوی صاحب ایم بی بی ایس ایم ڈی لنڈن کتاب "جنسی مسائل"
میں لکھتے ہیں۔

غیر ملکی ادویات جو قبض کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ان سے
ایسی ادویات زیادہ مفید ہیں۔

مثلاً جیلکا، سینول مقدار خوراک ۲ ڈرام رات کو سوتے وقت
کھانا ہر قسم کی رنج قبض کے لئے مفید ہے۔
ہر پڑ زرد کا کھانا معدہ کو طاقت دینے کے علاوہ ہر قسم کی
قبض کو رنج کرتا ہے۔

گلتند ایک تولہ ہر رات کو سوتے وقت کھانا قبض
رفع کرنے میں بے نظیر ہے۔

باقی روغن اقلہ ایک یا دو دودھ گرم میں ملا کر پینا ہر قسم کی
قبض نئی و پرانی کو رفع کرتا ہے۔

دیدان الامعاء ریٹ کے کیرٹے

INTESTINAL WORMS

(ان ٹائٹل ورمز)

وجوہات: رانتوں میں تعفن، مٹی، سرطی اور تپاسی اشیاء کا کھانا، بچی سبز یوں کا کھانا، اس کے خاص اسباب میں،

تشخیص و علامات: مفعد میں خارش ہوتی ہے، منہ سے پانی بہتا ہے، کبھی کبھی پاخانہ کے راستہ سے نکلتے ہیں، کمی خون کی علامات پائی جاتی ہیں،

انسان کی انٹریوں میں چار قسم کے کیرٹے پائے جاتے ہیں، کدو دانے ریٹ ورم، اس کی لمبائی پانچ سے بیس گز تک ہوتی ہے، تخم کدو کے مشابہ ہوتے ہیں، ٹکڑے مریض کے براز میں خارج ہوتے ہیں،

چمڑے (مخترید ورم) ان کی لمبائی ۱/۲ سے ۱/۳ انچ تک ہوتی ہے، ان کی تعداد ہزاروں تک ہوتی ہے، اور براز میں اکثر خارج ہوتے ہیں، کیچوے (رادنڈ ورم) ۳ سے ۸ انچ تک لمبا ۱/۲ انچ موٹا ہوتا ہے، چھوٹی آنتوں میں رہتے ہیں، دو تین یا زیادہ ہوتے ہیں،

اول تین دن تک مریض کو دودھ میں شکر ملا کر

پلاتے رہیں، تاکہ تمام کیرٹے معدہ اور آنتوں کی

علاج

مگرہ سے باہر نکل آئیں، پھر مذکورہ دواؤں میں سے کوئی دوا استعمال

کریں۔ اور بعد میں دوائی کے مطابق جلاب دے دیں۔ تاکہ تمام کیرٹے
مردہ ہو کر خارج ہو جاویں۔

دوائے ویدان اور صبر سقرطری، کسیدہ، کبیول، سنوٹین ہر ایک
تولہ تولہ، بار ایک پیس کر سفوف بنا دیں۔

مقدار خوراک: بچوں کو ۴ رتی تا ایک مائندہ ہمراہ آب تازہ، یہ دوائی
کیرٹے مار کر نکالنے کے لئے بہت زور اثر ہے، تجربہ شدہ ہے۔

اکسیر ویدان: شربت افستین ایک حصہ، اکسیر کیکٹ میل فرن
لیکو ٹیڈ دو حصہ، مقدار خوراک اتولہ ہمراہ آب تازہ

ترکیب: سقوال، ایک درون غذا نرم، شیریں دلیا وغیرہ کھائیں
بعد رات کو سوئے وقت ایک خوراک پییں، صبح ۵ تولہ کسیر اکل کا
جلاب لیں۔ تمام گرم مردہ ہو کر خارج ہو جاویں گے۔

حقیقتہً در سوتی کیرٹے پیٹ سے مشکل دور ہوتے ہیں، ان کے لئے
حقیقتہً بہت مفید ہے۔

روغن تارپین ۲ تولہ ڈیڑھ سیربانی میں ملا کر حقیقتہً کریں، یا معصری
کو پانی میں حل کر کے حقیقتہً کریں، گرم امعا دور ہو جائیں گے۔

اگر رات کو سوئے وقت ترکیب دیں، تو روغن تارپین سے
بچا یہ نڈ کر کے معتد میں لگا دیں، آرام ہو گا۔

کدو دانوں کا مجرب علاج: در نوشادر ایک تولہ، درق قلعی بار ایک درگڑ
ہو سے ڈیڑھ تولہ، دونوں کو خوب کھرائ کر لیں، پس تیار ہے۔

ترکیب: سقوال، ارادہ مرین کو سوتالی وغیرہ کھلائیں، پھر ایک
نڈ شش لسی یا وہی سکے سا نقد دیں، سات دن تک روزانہ ایک خوراک دوائی

دیتے رہیں، ساتویں دن جلاب دیں، کدو دانے خارج ہو جائیں گے۔

سینٹا پھل : یہ ہندوستان کے علاقہ میں ایک پھلدار درخت ہے۔ جس کو خربندے کی مانند پھل لگتا ہے۔ ہندو لوگ ان کو سینٹا پھل رکاشت پھل، اور نڈ خربندہ وغیرہ کہتے ہیں۔ اور تھواروں پر بطور ثواب کھاتے ہیں۔ کدو دانے رفع کرنے کے لئے ادل درجہ کی دوا ہے۔

طریق استعمال : ایک چھٹانک بیج لے کر ابال کر چھپکا انا کر تخم کو دودھ میں رگڑ لیں۔ بوقت صبح بنا بند کھائیں۔ دو گھنٹے بعد کسٹرائل پلا میں کدو دانے خارج ہو جائیں گے۔

اگر بیج نہ مل سکیں۔ تو ان کے پتوں کا پانی نکال کر پانی میں جھرت کر کسی گرم امعاء آبیوڈم اور ٹیگر اچھید۔ پانی تین حصہ ایک شیشی میں ملا لیں۔ مقدار خوراک تین قطرے ہر تیسرے گھنٹے بعد۔

سوتلی کپڑے یعنی چمڑے نگانے کی اکسیری دوا ہے۔ جہاں سنٹوین فیل ہو جائے آبیوڈم اکسیر ہے۔ رڈاکٹرائس۔ سی میکے تریاق کدو دانے نہ کالی آبیوڈم ۵ گریں۔ آبیوڈم ۴ گریں۔ پانی ایک ادنس۔ مقدار خوراک ۱۰ قطرے ہر تیسرے گھنٹے بعد دیں۔

کدو دانے نگانے کے لئے لا جواب دوا ہے رڈاکٹرائس (اکسیر کچڑے)۔ سنٹوین ۴ گریں۔ کیوئل ۴ گریں۔ شوگر آف ملک ۵ گریں۔ یہ خوراک جوان آدمی کے لئے ہے۔

ایسی ایک پڑیہ رات کو سوئے وقت منواتر تین روز کھلا رہنے کے بعد چھوٹے روز ٹکین یعنی گیند شیا کا جلا اب دیں۔ کچڑوں کے اخراج کے لئے مجرب ہے۔

تریاق دیدان : کر سٹر آئیڈن : ایک پیسٹ دوا ہے۔

مقدار خوراک جوان آدمی کے لئے ۵ گولیاں پانی کے ساتھ منالی

معدہ دیں، لیکن دوا کھلانے کے بعد چار گھنٹہ تک کوئی غذا نہ دیں، پانی
 پلانے میں ۲۴ گھنٹہ بعد ایک ٹمکین جلاب دے دیں،
 دھوٹ، گولی چبانے کے بغیر نگلنی چاہئے،
 ہر قسم کے ریمان الامعاء، ٹنگ دم، ٹیپ دم، کیچوے، چوڑے اور
 کدو دانوں کے لئے اکسیر ہے،
 پھر فوٹ کی پیسٹ دوا، بوتولان BUTOLAN دوا سختہ بائریکینی،
 مقدار خوراک ۲ گولی دن میں تین بار دیں، ۵ دن تک، سوئی کٹریں
 کے لئے نہایت مجرب ہے،
 دھوٹ، سنوٹین کے استعمال سے پیشاب کا رنگ زرد ہو جاتا
 ہے، خیال رکھیں،

ILEUS

آنت میں کل پڑ جانا

(ایلاؤس)

وجوہات ہر سوزش امعاء، زخم امعاء، سرطان امعاء، انٹریوں
 کے راستہ کا تنگ ہو جانا یا بالکل بند ہو جانا وغیرہ اس کے اسباب ہیں
 اس میں انٹری کے اندر بل پڑ جاتا ہے، یعنی
 تشخص و علامات اور پرکاشہ نیچے چلا جاتا ہے، مریض کو سخت
 قبض، بار بار تے دور تے میں پاخانہ کا اخراج اس مرض کی خاص علامت
 ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں شدت کا درد ہوتا ہے،
 کسی پہلو آرام نہیں آتا،

علاج شروع مرض میں گرم پانی کا حقنہ کرنا چاہئے۔ اگر درد اور نفع شدت اختیار کر جائے، اور کمزوری بڑھ جائے، تو سو اسے اپریشن (عمل جراحی) کے کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے پاس اس مرض کے دوران پرکٹش میں کئی مریض آئے ہیں، جن کو ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ہسپتال میں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ سکا، وغیرہ بالذمہ! انتباہ :- یہ ایک خطرناک مرض ہے، جس وقت کوئی مریض اس مرض کا آئے، تو اپریشن کا مشورہ دینا چاہئے۔ درنہ مرض کی شدت ایک دو دن کے اندر ہی مریض کو ختم کر دیتی ہے۔ مریض کو سخت جواب دیئے اور ادویہ کی آزمائش کرنی مریض پر ظلم کرنا ہے۔

APPENDICITIS

۴۰
دردِ لُٹا بڑھانے والا

(اپنڈیسائٹس)

وجہ پائنت :- کئی مریضوں کو قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات زائد اور میں انگود یا کوئی کڑا چیز حبس ہو جاتی ہے۔ بعد یہ تحقیقات کے مطابق سٹرپٹ کوکائی جراثیم کی سمیت سے یہ مرض ہوتا ہے۔
تشخیص و علامات - مریض درد کی شکایت کرتا ہے، درد شدت سے ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد درد اس پیٹرو میں بڑھ جاتا ہے، جی مٹاتا اور قے آتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے۔

دائیں پیڑ کو دبانے سے وہاں پر ایک ابھار یا رسولی محسوس ہوتی ہے۔
 احسام : عموماً چار یا پنج دن کے اندر دم تحصیل ہو جاتا ہے
 اگر مرض شدید ہو، اور پیڑ این جاے، تو سوائے آپریشن کے
 کوئی علاج نہیں ہے،

علاج : درد شروع ہوتے ہی مریض کو بستر پر لیٹا کر اس کے سر
 کو سینکنا چاہئے۔ گرم پانی میں صابن گھول کر این کرتیں
 رفع درد کے لئے مسکنات کا استعمال کریں۔

دینین : گرین، ارڈین، گرین کا جدید انجکشن کریں، اگر
 مریض شدت درد کی وجہ سے بے چین ہو، تو انجکشن لگانا وقتی طور پر
 مفید ثابت ہوتا ہے۔

جدید علاج : سلفا ڈایازین ۲ ٹیکہ ہر تیسرے گھنٹہ بعد دیں،
 دس دن کے استعمال سے دم میں بے حد تخفیف ہو جاتی ہے، درد
 اور دم وغیرہ رفع ہو جاتا ہے۔

پینسلین : اس مرض کا کامیاب علاج ہے، ہر چھ گھنٹہ بعد ۴ لاکھ
 یونٹ پینسلین کا عضلاتی انجکشن کریں، تین انجکشنوں سے دم وغیرہ
 بالکل رفع ہو جاتا ہے، پانچویں دسویں ۴ لاکھ ہر چوبیس گھنٹہ ہولگانی چاہئے
 تجربہ : نسخہ : ۱۰ ٹیکہ بیلا ڈونا ۱۰ بوند، گلیسینیا سلفاس ۱ ڈرام،
 پیرٹ کادر فام ۱۰ بوند، ایکرا ایک ادلس۔

یہی کب ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد پلائے، ایک دوپانے
 آجائیں گے، شروع مریض میں یہی حد مفید و تجربہ ہے۔

یہ بھی اس مرض کا پانچ چھ دفعہ دواہر پڑھیکا ہے، ابتداً معدہ میں
 گرانی اور بے چینی معلوم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زائدہ امور پر

درد شروع ہو جاتا ہے ، اور ساتھ معمولی حرارت بھی ہو جاتی تھی ،
معمولی تھیں کشائی کے بعد مکمل آرام کرنے اور مقام درد گرم ٹمکور

کرنے سے آرام ہو جاتا تھا۔

اور دن میں پیار خوراک لاسکوپو پو ڈیم $\times 30$ ہوتی ہے پختی دوا چار دن تک استعمال کی جاتی تھی اب ماشاء اللہ دو سال سے مکمل آرام ہے۔
میرا تجربہ ہے کہ جس چیز کے استعمال سے دورہ پڑتا ہو، اس سے مکمل پرہیز کریں، اور دوران درد میں کامل آرام کرنا چاہیے۔

دوڑتے ہوئے عام طور پر کمزور محسوس ہوتا ہے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں
غفلت اور دودھ سوڈا اور زود مشہور دیس ڈاکٹر برک کوڈے نے لکھا ہے کہ
مردم زائد و امور کا واحد علاج کاٹ پھینکنا نہیں بلکہ پیشہ میں اور سلفا گروپ کی دیگر دوائیوں سے کرنا چاہیے

اسہال
جب مرض کا حملہ بار بار ہو، تو پھر اپریشن کرنا چاہئے۔
DIARRHOEA (دایریا)

ایہاں

DIARRHOEA (دایریا)

تشخیص و وجوہات

پتے پتے دست بغیر کسی تکلیف کے آتے ہیں جو کہ چھوٹی آنٹوں کے فعل کی خرابی سے آتا کرتے ہیں جو کبھی بیدار، صغریٰ یا فونی مٹا لے رنگ کے یا یا جھاگ دار ہوتے ہیں اکثر گندی خراب غذاؤں کے استعمال زیادہ مرچ گرم مصالح تند علی موسم زیادہ گوشت خشک عرق رقیق دانی قندیل پیچھے انڈیشوں میں اسدہ زخم یا کڑی سے تیز حبلا سب لینا درم پھر کا پھیٹ جانا وغیرہ بہتے دست آتے گتے ہیں۔

علاج اور غذائے کھانی چاہئے بوقت ضرورت غذا نرم اور زود ہضم کھانی چاہئے

مندرجہ ذیل نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا مفید ہے۔ اگر پیٹ میں سُدہ معلوم ہو، تو اول اس کو بذریعہ خفیف مسهل خارج کرنا چاہئے۔ پھر کوئی قابض دوا دے دیں، دست فوراً بند ہو جائے گی۔ سفوف حالبس، موچرس، مائیں، گل دہا دا، بل کھتہ، کوکنار، رال خشک ہر ایک ایک حصہ، مصطکی دو حصہ۔

سب ادویہ کو کوٹ کر سفوف بنا دیں۔ مقدار خوراک ۵ رتی، دن میں تین بار، ہمراہ آب دیں، نہایت قابض سفوف ہے۔ دستوں کو بند کرتا ہے۔

سفوف برش کا فورہ، افیون خام اتولہ، جدوار خطائی ۹ ماشہ، کافور ۳ ماشہ، ہارک مثل نشاستہ کر لیں۔

چینی سفید ۱۶ تولہ ملا کر کھرن کر کے یک جان کر لیں۔ مقدار خوراک ۲ رتی تا ایک ماشہ ہمراہ آب، دست، پچیس خون کا آنا، پیٹ درد، درد سر، شقیقہ، عصابہ، درد گردہ، درد جگر، درد دل، حمل کا گرنا وغیرہ امراض کے لئے سوفی صدی مجرب علاج ہے۔ بچوں اور کمزور دل والوں کو اس کا استعمال ممنوع ہے۔

مغرب نسخہ ۱۰ کھتہ سفید اتولہ، الاچی خورد اتولہ، طباشیر اتولہ، سنگ براج رکشتہ، اتولہ، چینی سفید اتولہ، جملہ ادویہ کا سفوف بنا دیں۔

مقدار خوراک ۲ ماشہ تا ۳ ماشہ ہمراہ دہی یا لسی، ہر قسم کے خونی دستوں کے لئے قابل بھر دہ دوا ہے۔ چند خوراکوں سے مکمل آرام ہو جاتا ہے۔ سفوف اسہال، بیلگری حسب ضرورت سفوف بنا لیں۔

مقدار خوراک ۳ ماشہ ہمراہ شربت انار ۰۲ تولہ، دن میں تین بار۔ ہر قسم کے دست بند کرنے کے لئے مفید و مجرب ہے۔

برائے اسہال خونی : رکتہ سفید، سوچوس، گبرور، رال، کثیرا گوند
 خون سیاہ شان، سنگ جراحیت مساوی الوزن کے کر ایک صوف کریں،
 مقدار استعمال ایک ماشہ تا دو ماشہ چاروں کے پانی یا شربت
 انجبار کے ساتھ استعمال کریں، خونی دستوں کے لئے اکسیر ہے خواہ
 کسی قسم کے ہوں۔

ایضاً : سوچوس ۲ تولہ، افیون خالص ۳ ماشہ، کافور دسی ۶ ماشہ
 تینوں کو جامن کے پتوں کے رس میں تین چار گھنٹہ بھرت کر کے
 بقدر غلظت گولیاں تیار کریں۔

مقدار خوراک ۲ گولی دن میں دو یا تین مرتبہ ہمراہ پانی دیں خونی دستوں
 کے لئے زرد سفید و مخرب ہے۔

برائے اسہال گرمائی : رکتہ سفید ۵ ماشہ، اناروانہ ۵ ماشہ،
 زیرہ سفید، زردور، گرد سماق، زرشک ہر ایک ۳ ماشہ، الاجی خوردہ عدد
 سب کو پانی میں پیس کر چھان کر شربت انار ۲ تولہ ملا کر استعمال
 کریں، اسہال گرمائی، پیاس و غیرہ کے لئے اکسیر ہے۔

دو اسے مخرب : ہر افیون اگرین دن میں تین خوراک پانی سے دیں،
 ہر قسم کے دستوں کو بند کرنے کے لئے مخرب ہے، قوی حابس اسہال و دابہ
 دیکھا : روغن کافور ۵ تا ۱۰ بوند کھانڈ میں ملا کر دیں، دست
 لئے پیاس بے حسنی اور تشنج کو رخت کرتا ہے۔

دو اسے اسہال شوزشی : رکتہ سفید، سلاس ۷ گریں، ڈورس پوڈر ۵
 گریں، سیلول ڈا گرین۔

ایسی ایک پڑی چار گھنٹہ بعد دیں، صفیری دستوں کے لئے نہایت
 مفید ہے۔

صفرادی دستوں میں تنقیہ صغرا کے بعد قابض ادویہ دینے سے
دست بند ہو جاتے ہیں۔

دو اسے اسہال شدید : سلفا گنتا ڈین پہلی خوراک ہم ٹکیہ پھر سرخار
گھنٹہ بعد دو ٹکیہ دیں، شدید اسہال اور مہیضہ کے لئے مفید و محرب ہے
ایضاً : کلورو ڈین یا کمفور ڈین ۱۰ ابوند، ایکوا ایک اونس،
ایسی ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں، ہر قسم کے دستوں میں
مفید ہے، بہترین ودائی ہے۔

بدامانت : دست آنے سے اگر طبیعت میں فرحت اور سبکی ہو،
تو بند کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر پیٹ میں نا ہضم شدہ غذا ہو، تو
اس کو بذریعہ حقنہ یا مسهل خارج کر کے پھر دست بند کرنے کی دوا دیں
اسہال مزمن یا سنگینی میں غذا اس کے متعلق احتیاط لازمی ہے،
کسی قسم کی ٹھوس غذا، مرچ، گرم مصالح، گوشت وغیرہ استعمال نہ کریں
جب تک کہ مکمل آرام نہ آجائے۔

دوران علاج میں وہی چا دل، کلچر می، دودھ، ڈیل روٹی،
چنے کا پانی وغیرہ دے سکتے ہیں۔ سوداگر ایک پرہیز۔

DYSENTERY

(روہلینٹری)

تیچیش (زحیر)

تشخیص وجوہات و تشخیص اس مرض میں بڑی آنتوں اور رودہ مستقیمہ میں دم ہو کر زخم بن جاتے ہیں جس سے پیٹ میں مروڑاٹھ کر درد کے ساتھ اجابت ہوتی ہے اور پاخانہ کی بجائے تھوڑا سا فضلہ پیپ (آؤں) میوگس نمبرین اور خون ملا ہوا خارج ہوتا ہے، پاخانہ کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور حاجت کے وقت بہت زور لگانا پڑتا ہے بڑی آنت کے آخری حصہ میں منفرد کے قریب سخت درد بھی ہوتا ہے اور شدت مرض میں پانچ پانچ دس دس منٹ بعد قضا کے حاجت کے لئے بیٹھنا پڑتا ہے اور کالج بھی نکلی شروع ہو جاتی ہے بخار ساتھ ہوتا ہے۔

اطباء قدیم نے اس کی دو قسمیں مقرر کی ہیں۔

(۱) تیچیش صادق (۲) تیچیش کاذب۔

اور تعریف یہ کی ہے کہ تیچیش صادق میں انتڑیوں میں سکہ نہیں ہوتا، اس کا علاج حاسبات اور خشک ادویات کا استعمال ہے۔ تیچیش کاذب میں انتڑیوں کے اندر سکہ پیدا ہو کر رکاوٹ ہو جاتی ہے اور سکہ کی وجہ سے پاخانہ کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔

بب تک پہلے سکہ خارج نہ کیا جائے، ایسی تیچیش کا علاج کرنا مشکل ہے، اس لئے اس کے علاج میں پہلے طبیات مثلاً کمپرائل وغیرہ سے سکہ رفع کرنے کے بعد حاسبات اور خشک ادویات استعمال کرنی چاہئیں۔

طب سائے جدید یعنی ڈاکٹروں نے اس کو جراثیمی مرض قرار دیا ہے۔
 کہ یہ متعدی یعنی چھوت کی مرض ہے۔ جو ایک مریض سے دوسرے کو
 بالواسطہ پہنچتی ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ سر ایک کا علحدہ علحدہ علاج ہے
 ۱۔ ایک ڈیسنٹری در اس مرض کا سبب حیوانی امیبا یعنی جراثیم
 جس کو انٹیا امیبا سٹولائی ٹیکا کہتے ہیں۔ ہوتا ہے۔

یہ مرض آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ عکبر میں ورم ہو جاتا ہے
 اور اسال میں خون سینی مایل اور نیلی مٹی جھلی نہایت متعفن اور بد بو دار
 علی ہوئی ہوتی ہے۔ دستوں کی تعداد کم اور مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
 اور مرض بار بار عود کرتا رہتا ہے۔ جب کہ علاج نامکمل ہو۔

۲۔ بیکٹری ڈیسنٹری :- اس بیکٹری کا سبب ایک خاص قسم کا نباتاتی جراثیم
 ہے۔ جس کی تین قسمیں ہیں۔ اور ان کے نام ۱۔ جرڈمہ شیگا ۲۔ جرڈمہ
 فلیکس ۳۔ جرڈمہ سوئی ہیں۔

اس کا آغاز نہایت تیزی اور شدت سے ہوتا ہے۔ پاخانے کی
 بار بار حاجت ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ دست تعداد میں
 زیادہ ۲۰-۴۰ دفعہ اور مقدار میں کم ہوتے ہیں۔ دستوں کے ساتھ
 خون کی آلائش اور غشائے مخاطی بعضی جھلی بھی خارج ہوتی ہے۔ اس مرض
 میں اعضائے ہضم بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مرض دوبارہ نہیں
 ہوتا۔ البتہ مزمن صورت اختیار کر جاتا ہے۔

بیری کے میں مجموعی حیثیت سے اس مرض کی دو ہی قسمیں ہیں۔

۱۔ بیکٹری ساذج یعنی سادہ اور ۲۔ بیکٹری جراثیمی

۱۔ بیکٹری ساذج میں زہر صادق و کا ذب دونوں انتہا۔ اور گرم

مصابیہ۔ کچے دودھ کے پینے۔ کچے پھلوں کے کھانے۔ خوابی غذا۔

نیز جلاب اور دیگر سادہ اسباب سے پیدا ہونے والی پیچش شمار ہو سکتی ہے۔
 (۲) پیچش جراثیمی میں جراثیم سے پیدا ہونے والی پیچش کی تمام قسمیں خواہ وہ امیبا بیسلری، بیلریل جراثیم، جراثیم سلیہ، ٹائیفائیڈ یا حشرہ سے ہو، شمار کی جا سکتی ہے، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ علاج کیا جا سکتا ہے۔

ہومیو پیتھی سائنس کے پیش نظر پیچش کو سادہ اسباب یا جراثیم کی قوت مدبرہ بدن یعنی وائیل فورس کے ساتھ مقابلہ کا نتیجہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہومیو پیتھی علاج میں طبی برہمن کی حاد مزمن پیچش کا علاج ہو سکتا ہے۔

مرض پیچش کے اسباب خواہ جراثیم ہوں یا دیگر سادہ اسباب ہوں، یا قوت مدبرہ بدن کا ان سے مقابلہ سمجھا جائے، دونوں صورتیں صحیح اور درست ہیں۔

اور اطباء قدیم کی یہ تقسیم کہ مرض پیچش سردی یا غیر سردی دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو علمی تقسیم نہیں کہا جا سکتا، البتہ سردے کو پیچش کا ایک سبب قرار دیا جا سکتا ہے۔

اصول علاج اس مرض کے علاج میں اسباب مرض کی تشخیص اور ان کا رفع کرنا علاج میں کامیابی کی

ضمانت ہے۔

علاج اگر پیچش کا ذب ہو، تو ۴۴ ڈیگسٹرائیل نیم گرم دودھ میں ملا کر مریض کو پلائیں، جب سردے سے خارج ہو جائیں، تو مندرجہ ذیل نسخوں سے کوئی دوا استعمال کریں، آرام ہو گا۔

اکسیٹر پیتھ: ہر ایم بی ۶۹۳ دو گولی۔ گم اکیٹیا رگوند کیکر، ایک ڈرام
 کیسٹر ایل ۱۰ ڈرام، آب تازہ یا عرق سولف ایک ادس، یہ ایک خوراک ہے
 ترکیب ساخت: ہر اول گولی کو کھرل کریں، پھر ٹوند ٹمکیر ملا دیں،
 عتوڈا سا پانی ڈال کر حل کر کے خوب کھرل کریں، پھر قطرہ قطرہ کتھرائیل
 ڈالنے جائیں، جتنے کہ کیسٹر ایل ختم ہو جائے، پھر باقی ماندہ پانی ملا کر
 کھرل کریں، قسقی جیسا سفید محلول تیار ہو جائے گا۔

ایسی تین چار خوراک دن میں دیں، بچوں کو حسب عمر دیں، ہر قسم
 کی پیتھ خونی، بلغمی، آؤں، خون کا آنا، بخار، کھانسی وغیرہ کا ایک روزہ
 علاج ہے، ایک مریض کے لئے چھ خوراک کافی ہیں، بچوں، بوڑھوں اور
 جوڑوں کے لئے یکساں مفید ہے

دیگر ایم بی ۶۹۳ سبازول کی گولیاں تنہا ہی دست پیتھ
 کے لئے مفید و مجرب ہیں۔

سولف پیتھ: سولف، سٹڈ، ہیلہ سیاہ، خشک شہر ایک ہ تولہ
 سولف کر کے ردغن زرد میں چرب کر لیں۔

مقدار خوراک ۳ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ عرق سولف دیں پیتھ
 سدھی، غیر سدھی، بلغمی اور خونی وغیرہ کے لئے اکسیٹر پیتھ تاثیر ہے،
 ڈیسنٹری پوڈر، سوڈا بائیکارب، گرین، بسمتہ کارب، گرین،
 ڈورنٹس پوڈر، گرین، یہ ایک خوراک ہے۔

اول کیسٹر ایل دے کر پیٹ صاف کر لیں، پھر یہ دوا ہمراہ عرق
 سولف یا آب تازہ دن میں تین خوراک استعمال کریں۔

ہر قسم کی نئی دیرانی پیتھ، خونی، بلغمی، آؤں کا آنا، پیٹ درد
 دست، ضعف معدہ و امعاء، خرابی ہضم، زلزلہ الامعاء، سنگھم سنی وغیرہ کیلئے مجرب ہے

پیش کی گولیاں سلفا گکنا ڈین SLFAGAYNADEN

خود ایک گولی دن میں چار مرتبہ ہمراہ آب، ہر قسم کی خونی، یعنی پیش جس میں میو کس ٹیسٹن خارج ہوتی ہو، کے لئے اول درجہ کی دوا ہے، دیگر آلات، انہضام وغیرہ کے لئے بھی مستعمل ہے۔

انسٹرو وایو فارم: مقدار خود ایک گولی میں ۲ گرین سوڈا بائیکارب
ہلا کر دن میں ۲ مرتبہ دیں، معدہ و امعاء کی خرابی، دست، پیش میں مجرب ہے۔
پچول: شکر و رومی، سوہاگہ، مصطکی رومی، افیون ہر ایک ہموزن
باریک پس کر گولیاں بقدر غلغلہ دیا کریں، خود ایک گولی ہمراہ
آب تازہ دن میں تین بار۔

زجیر صادق، خونی، یعنی دست وغیرہ کے لئے قابل عبور و سر
چیز ہے، شکر مٹی کے لئے بھی مفید ہے۔

پیش کی ویسی دوا: یہ ہباز ۴ ناشہ، رشتہ خلی ۴ ناشہ
دونوں کو آدھ پار پانی میں گھل کر رکھیں، تقریباً ایک گھنٹہ بعد
ہلا کر چھان لیں، دن میں تین چار دفعہ دیں۔

اسمال: پیش خونی، آؤں وغیرہ بند کرتی ہے،
پیش کا ٹیکہ۔ ایسے پین ایڈرو کلورائیڈ

ترکیب استعمال: ہر روز ۱۲ سے اگر بن عضلاتی یا جلدی ٹیکہ کریں،
ہر قسم کی جراثیمی پیش، ایسے بک ڈینسٹری، خونی، یعنی پیش، درم حلیہ
وغیرہ کا بہترین علاج ہے۔

نوٹ: ایک دو ٹیکوں سے آدم آجاتا ہے لیکن کورس ۶ یا ۱۲ ٹیکے
میں، شام کے وقت لگانا زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے نئے
آتی ہے، شام کو ٹیکہ لگانے سے وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ اکثر مریضوں کو

ٹیکہ لگانے سے ہی نئے شروع ہو جاتی ہے۔
 سٹریٹو مائیٹسین ۱۰ گرام کا سفیداتی ٹیکہ کریں۔ پچپن کے لئے دو
 تین انجکشن ہی کافی ہیں۔

حسب علامات آنٹوز کی سفاتی پیٹ درد، مردڑ کے لئے
 ادویہ کا استعمال کرنا چاہئے۔
 انتباہ: ہر میڈری ڈیسنٹری کی ادویہ ایک ڈیسنٹری کو کوئی
 فائدہ نہیں دیتیں۔ اسی طرح ایک کی میڈری کو بھی فائدہ نہیں دیتیں
 اس لئے تشخیص نہایت ضروری ہے۔

اکسپیریمینٹ: یہ ایک عجیب و غریب تجربہ دوا ہے جس کے استعمال
 سے ایک دن میں ہی پچپن، مردڑ وغیرہ رفع ہو جاتے ہیں یہ مبارک
 دوا ہر مطلب میں تیار رہنی چاہئے۔ نسخہ یہ ہے۔

گل دھار، اندر جو شیریں، سوچر، سودھ پھٹانی، ناگر موغہ،
 افسیون خالص، پارہ رگندھک، بیلگری، تمام ادویہ مساوی وزن میں،
 اول پارہ اور گندھک کو باہم ملا کر خوب کھل کر شے کا جیل کی مانند
 بنا لیں، پھر ہر ایک دوائی کو علیحدہ علیحدہ سفوف کر کے یک جا ملا کر
 کھل کریں، تیار ہے۔

مقدار: خوراک ارنی تا ۳ رتی دن میں تین چار مرتبہ دہی کی لسی کے
 ساتھ کھلا دیں، خواہ کسی طرح کے پچپن، مردڑ ہوں، دو چار خوراکیں سے
 ہی آرام آ جاتا ہے، اکسپیرین دوا ہے۔

اگر پیٹ میں سڈہ معلوم ہو تو پہلے کیسٹرائل ۵ تولہ یا پھلکا
 اسبزل استعمال کر کے سڈہ کو رفع کر کے پھر یہ دوائی دیں۔ پیشانی
 فائدہ ہو گا۔

دو اسٹے پیچش : درجب آنتوں میں دم کی ابتدا ہو۔ آنتوں میں درد مروڑ اور پیچش شروع ہی ہو تو اس وقت تھیکا اسبغول ۶ ماشہ ہمراہ تشریت کھانڈ دن میں تین دفعہ استعمال کرائیں اس کے استعمال سے ایک دن میں ہی پیچش کی علامات رفع ہو جاتی ہیں بعد میں گرم مصالح اور سرخ مرچ سے یہ سیر لازمی ہے۔ بے نظیر نسخہ ہے۔

حب پیچش : در درج ۵ تولہ قلمی شورہ اتولہ ، افیون ۳ ماشہ ، درج اور قلمی شورہ کو الگ الگ پیس کر با ہم ملا لیں ، افسیون کو قدرے گلاب میں حل کر کے داخل کریں ، تمام سفوف عرق آمیز افیون میں بھیک جانا چاہئے ، دو گھنٹہ کھل کر کے حب بقدر اوتی تیار کریں ، مقدار خوراک ۲ گولی ہمراہ تازہ پانی دن میں تین دفعہ دیں ، زحیر صادق دکاذب کی ہر حالت میں مفید ہے۔

دو اسٹے پیچش : اہسل بریاں ۸ ماشہ ، زہرہ سیاہ بریاں ۸ ماشہ تخم گزنہ ، تخم خضخشا شش ، تخم سریا ، افسیون ، تخم کر فس ، اجوان خراسانی ہر ایک ۱۰ ماشہ ، افسیون اتولہ ، اسبغول بریاں ۸ ماشہ ، ہالیوں بریاں ۸ ماشہ ، بغیر کوٹنے کے ملا دیں۔

مقدار خوراک ۲ رتی تا ایک ماشہ دن میں ایک خوراک کافی ہے۔ اتنا زود اثر اور حیرت انگیز نسخہ ہے کہ ایک خوراک سے ہی پیچش رفع ہو جاتی ہے ، خصوصاً پرانے دستوں اور پیچش کا خاص علاج ہے۔

دو اسٹے جدیدہ : بولس کمپنی نے ایک جدید مرکب تیار کیا ہے ، ہر قسم کی پیچش کے لئے مفید و مجرب ہے۔

سینپشن آف سلفا گٹنا ڈین مقدار خوراک اڈم ، ایکو ۱۱ اونس دن میں دو چار خوراک دیں۔

لیکن دوائی استعمال کرنے سے پہلے شیشی کو ہلانا ضروری ہے۔

پیشکشی کے لئے بے حد مفید ہے۔

پیشکشی کا مکسچر ہر گینٹیا سنڈاس ۴ ڈرام، ایکوا ۲ اونس
 باؤم ملا کر گرم کوئی سسٹم کہ گینٹیا پانی میں حل ہو جائے، سرد
 ہونے پر مریض کو آدھ آدھ گھنٹہ بعد پلائیں، ایک دو دست آکر پیشکشی
 خود بخود بند ہو جائیں گے۔ پیشکشی ڈیسنٹری کا خاص علاج ہے۔

نوٹ، بعض اوقات مرض خسرہ یا محرکہ میں شدید پیشکشی ہو جاتی ہے
 اس حالت میں پیشکشی کے علاج کے علاوہ اصل مرض کے علاج میں
 کوشش کرنی چاہئے۔

پیشکشی کی خاص دوا

ابھی کوٹین رے سیکر، مقدار خوراک اتنا ٹمکیہ دن میں چار بار

ایبیا ڈیسنٹری یعنی صفراوی پیشکشی کا خاص علاج ہے۔

علامات کی شدت ایک دو دن میں ہی کم ہو جاتی ہے، لیکن شافی
 علاج کے لئے کم از کم دس دن تک علاج کرنا چاہئے، جس مریض کو
 ایسے بین کے ٹیکے لگائے جاتے ہوں، اس کی اعانت کے لئے بھد ٹوٹر ہے

پیشکشی کا ہومیوپیتھک علاج

مرکیورس کار ۳۰ x پیشکشی کے لئے بہترین دوائی ہے، جب پیٹ میں
 درد، مروڑ، بار بار حاجت اور زور لگانا پڑے، پاخانہ خون آمیز، گدلا
 اور اس میں چھوٹے میوکیس نمبرین کے خارج ہوتے ہوں، وغیرہ امراض
 کے لئے اکسیر بے نظیر ہے۔

پیشکشی کا سونی صدی مجرب علاج ہے۔

دیگے مطابق علامات اسپیکاک ۳ یا ۳۰ - بلا ڈوٹا، نکس و امیکا
 کا کوسٹنٹ، آرٹیک، نکس و امیکا وغیرہ بھی مفید ادویہ ہیں،
 تریاق پیچیش پر پیچیش مزمن جو ایسے ظہن کے انجکشن اور دیگر ادویات
 سے رفع نہ ہوتی ہو، ایسی پیچیش میں اسپیکاک ۳ کی ایک خوراک
 پیچیش کو ہمیشہ کے لئے دور کر دیتی ہے، اور پیچیش مزمن کے علاج میں
 میں کبھی ناکام نہیں رہا، ڈاکٹر کانشی،

اکسیر پیچیش مزمن پر دیکسینیم ۱۰۰۰، دو ہفتہ بعد ایک خوراک دیں،
 مزمن پیچیش کے لئے اکسیر ہے، (رکانشی)

دوائے ڈیسنٹری، یہ بایو کیمک طریق علاج کا مرکب نسخہ ہے، جو ہر قسم
 پیچیش، خولی، بادی، یعنی، نیچے، بوڑھے، جوان اور عورت کو جو، بہت
 جلد اثر کرتا ہے، اور قنات غذائی کی جلد تکالیف کو فوری طور پر رفع
 کرتا ہے، نسخہ مبارک یہ ہے،

گلکیر یا فاس ۲ ڈرام - غیرم فاس ۲ ڈرام - بگنیشیا فاس ۲ ڈرام،
 کالی فاس ۲ ڈرام، گلوکوز ۴ انس، جلد ادویہ کر باہم ملا کر کھول کریں،
 مقدار خوراک ۱۰ اگرین، کمزور بچوں کی پیچیش میں جن کی ہڈیاں
 کمزور ہو چکی ہوں، خصوصیت سے مفید ہے، بہترین ٹانگ معوی بھی ہے،
 دو تین دفعہ کے استعمال سے صحت ہو جاتی ہے،

اکسیر پیچیش، ٹریٹ فاس ۶ ڈ (۲ اگرین)، گلکیر یا فاس ۶ ڈ
 (۲ اگرین)، یہ ایک خوراک ہے،

ایسی چار یا چھ خوراک دن میں دیں، ہر قسم کی پیچیش اور اسہال
 کے لئے مفید ہے، لیکن بچوں کی پیچیش، اسہال اور وائٹ نکالنے
 کے زمانہ کی جلد تکالیف کے لئے اکسیر ہے،

ہدایات متعلقہ علاج پچیش -

مریض پچیش کو کوئی تیز اثر والی غذا، کھاری ترش اور مسختہ جو چپا کر کھائی جائے، زیادہ نمک، مرچ، گرم مصالح جیسے شہد یا ادینی وغیرہ نہ دیا جائے، کیونکہ ایسی اغذیہ اپنی تیزی اور لذت کی وجہ سے آفتوں کی اس خدائش کو جو باعث مرض ہے، بڑھا دے گی، مریض پچیش کی غذا نرم، سیال اور پھکی، دودھ چادل، آش بخور، ساگو دانہ، اسبغول کی کھیر، دہی وغیرہ زیادہ مفید ہیں۔

علاج میں حواضات اور تکالیف کا خیال رکھنا چاہئے، اگر درد اور مروڑ زیادہ ہوں، تو پہلے دافع درد ادویہ، اگر آئول زیادہ ہو، تو لعابدار ادویہ، اگر خون زیادہ ہو، تو خون بند کرنے والی ادویہ استعمال کریں۔

(سپرو)

SPROE

سنگری منی

وجوہات، درگرم ممالک کے باشندوں کو اکثر ہوتا ہے، زیادہ تر عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، اس میں آنتوں کی دیواریں پٹلی ہو جاتی ہیں، اور ان پر سخی زخم بھی بن جاتے ہیں، انٹریاں کمزور ہو جاتی ہیں، وضع حمل کے بعد عورتیں عموماً اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

اس مرض میں کبھی ہست، کبھی قبض ہو جاتی ہے، منہ میں تشنہ، چھالے پیدا ہو جاتے ہیں، نگلنا دشوار ہو جاتا ہے، نمک اور مرچ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، کمی خون ہو کر جسم کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔

تریاق سنگرہنی، کمپولان دباؤ، ایک سی سی ہفتہ میں ایک بار،
سات دن تک عضلاتی ٹیکہ کریں، یہ لیور ایکسٹریکٹ کا بخاراتی
نام ہے، سنگرہنی، کمی خون کا شافی علاج ہے۔
تریاق سنگرہنی وٹامن بی ۱۲ ایک سی سی ۵۰۰ مائیکروگرام کا روزانہ عضلاتی
ٹیکہ کریں، ایک دو ٹیکوں سے ہی فائدہ شروع ہو جاتا ہے، سات انجکشن
لگانے سے تمام علامات رفع ہو جاتی ہیں، وٹامن بی ۱۲ سنگرہنی کا
شافی علاج ہے۔

جدید دوا ۱۱، فولک ایسڈ ۲۰ بی گرام روزانہ دو ہفتہ تک کھلانا مرض
سنگرہنی ریسرو، کا جدید کامیاب علاج ہے۔
اکسپیرسنگرہنی اور پوست کو اچھال ایک سیر کو پانچ سیر پانی میں ڈال کر
آگ پر پکائیں، جب پختہ ہو جائے، تو اتار کر باقی ماندہ پانی صاف کر لیں
اور پوست پھینک دیں، ایک پاؤنڈ سیاہ ملا کر قوام بنائیں، پھر ادویہ ذیل
سفر کر کے ملائیں۔

ناگر موختہ، موچرس، گل دباؤ، مغز معجز ہے، بل کھتہ، بارہ ٹیک
دستور، اندر جو پیتھس ہر ایک تولہ تولہ ملا دیں، جب غلیظ قوام معجون کی طرح
ہو جائے، تو اتار لیں، ایک پاؤنڈ اور ایک چھٹانک روشن دند ملا کر رکھ لیں،
مقدار خوراک اتولہ دن میں دو بار ہمراہ لسی رہی، ہر قسم کے امہالی پرانی
سنگرہنی کے لئے مجرب المجرہ دوا ہے۔

اکسپیرسنگرہنی، یکشتہ خرمرہ نورد ۴ ماہہ یکشتہ سنگرہ ۲ ماہہ، نمک
۴ رتی، شہد ۲ تولہ، یہ ایک خداک ہے۔

مرغین کو ایسی دو خوراک دن میں دیں، اوپر سے ایک پاؤں دی پلا دیا
کریں، غذا دی چا دل یا دی پھلکا دیں، دودھ، گرم مصالح، سرخ مرچ

دیر ہضم ہشیاہ سے پرہیز کریں، چار دن کے استعمال سے جلد علامات
سنگرہنی کو فائدہ ہو جاتا ہے، رہنما من والا سرار!

سنگرہنی اور پچیش کا لاجواب نسخہ، شکر ف روحی، تولہ، فلفل دراز، تولہ
مرچ سیاہ ۲ تولہ، لونگ ۲ تولہ، عقرقرحہ ۲ تولہ، سہاگہ ۲ تولہ، پھنک
۲ تولہ، پانی اور ک آدھ سیر۔

جلد ادویہ کو اور ک کے پانی میں کھول کر کے تمام پانی جذب کر دیں
اور خودی گولیاں بنا کر لیں۔

خوراک ایک گولی دن میں دو خوراک دیں، ہمراہ آب تازہ، نیچے کو
حسب عمر کم دیں۔

لا علاج سنگرہنی اور پچیش کا کامیاب علاج ہے۔

نوٹ، سنگرہنی کے علاج میں قابض ادویات کوئی فائدہ نہیں کرتیں۔
تہ یاقی سنگرہنی، ہر ہفتہ کارب ایک ادش، ہفتہ سب ٹائٹرا س ایک
ادش، ہفتہ سیل سلا س ایک ادش، کٹیولین ایک ادش، سیول ۴ ڈرام
ملا کر رکھ لیں، خوراک آٹھ سے ۲ ماہ تک صبح و شام کھلا دیں، سنگرہنی
اور عام دستوں کے لئے ایک کامیاب دوا ہے۔

حب سنگرہنی، گندھک آملہ سار، مصطفیٰ، پارہ مصطفیٰ، تخم دھتورہ سیاہ
شکر ف مدبر، مٹھا بندسیر مدبر، انیسون ہر ایک تولہ تولہ لیں۔
گندھک اور پارے کی کھلی بنا کر جلد ادویہ سفوف کر کے ملا لیں، اور
اور ک کے پانی کی مدد سے گولیاں بقدر خود تیار کریں۔

خوراک ایک گولی صبح، دوپہر، شام، ہمراہ جو شانہ کوڑھک استعمال کریں،
کشتہ منور ۲ رتی بوقت صبح دہی سے کھلا لیں، پر اسے اسہال اور سنگرہنی
کے لئے اکسیر ہے۔

اکسیر سنگہ منی :۔ کشتہ سونا ۱ ماشہ ، کشتہ چاندی ۲ ماشہ ،
کشتہ دکرانت ۳ ماشہ ، کشتہ موتی اصلی ۴ ماشہ ، پارہ مصفی ۵ ماشہ
گندھک مصفی ۸ ماشہ

ترکیب ساخت :۔ ادل آدمی گندھک کو بنگرے کے رس میں
کھول کر یں ، تقریباً دو پیر کھول کر کے پارہ ڈال کر کھول کر یں ، جب پارہ
نا بود ہو جائے ، تو چند ادویہ ڈال کر تین گھنٹہ کھول کر یں ، بعد ازاں بخور پیٹھ پی
گندھک بقایا ڈال کر کھول کر یں ، یہاں تک کہ تمام گندھک ختم ہو جائے ،
پھر اس کو ایک روہے کی کڑا ہی میں ڈال کر ادبوں کی آگ پر رکھ کر گھلا دیں
جب اچھی طرح پھل جائے ، تو زمین پر گیلی مٹی بچھا کر اس کے اوپر کیلے
کا پتہ رکھ دیں ، اس کیلے کے پتہ پر کھلی ہوئی ردائی ڈال دیں ، ایک اور
کیلے کا پتہ اس پر رکھ کر گیلی مٹی اوپر بچھا دیں ، سرد ہونے پر کیلے کے پتہ
سے علیحدہ کر لیں ، اور شیشی میں محفوظ رکھیں ،

وقت ضرورت پس لیں ، ایک مریض کو دس خوراک دیں ، روزانہ
ایک رتی دی کے ساتھ دیں ، اور روزانہ نصف نصف رتی بڑھاتے جائیں ،
پھر دس رتی پر ہٹ جائیں ،

حمد علامات سنگہ منی ، دست ، مروڑ ، پیش ، اچھارہ ، پیٹ درد
کے لئے اکسیر ہے

غذا اچھا چھ ، دال کچھ پی ، دال چاول دیں ،
روٹ ، ، مریض سنگہ منی کو تازہ کھجی نیم بوشت ۱۰ پونڈ کھلانا ہے حد
مفید ہے ،

انتباہ :۔ سنگہ منی کے مریض کو تیز مساجل نہیں دینا چاہئے ، ورنہ
جریان خون کا اندیشہ ہوتا ہے ،

اکسیر سنگرہنی پر پارہ مصفیٰ اولہ، گندھک آملہ سار اولہ، دونوں کو باہم ملا کر ہلکھٹا کھل کریں، بتا رہے ہیں کہ کبھی میں مندرجہ ذیل ادویہ ملا لیں، اندر جو شیریں، ناگر موہنہ، موچر س، گول دہاوا، اینون تولہ تولہ حسب دستور سفوف تیار کریں، مقدار خوراک ارقی صبح، دوپہر، شام دن میں تین مرتبہ، لغو رخ انار دہ یا شربت سکجین کے ساتھ کھلا لیں سنگرہنی اور اسہال مزمنہ کے لئے اکسیر کی نسخہ ہے، علاوہ ازیں قے، اسہال پیش، مہیضہ میں بھی اکسیر ہے، چیتہ خوراکوں سے مکمل آرام ہو جاتا ہے۔

سنگرہنی کا ہومیو پتھی علاج

اگر مریض کو بغیر درد کے غیر منہضم غذا کے دست آویں کھانا کھانے کے بعد بھی مریض کو پاخانہ جانا پڑے ہے حد کمزوری ہو، اور پاخانہ تھلہ جلد آئے، تو چاکنا ۳۰ مفید ہے۔ اگر پیٹ میں نفخ اور تسخنی ہو، پاخانہ کا رنگ سفید ہو، منہضم غذا کے پانسانے آئیں کمزوری دن بدن بڑھتی جائے، تو ٹکیر یا کاسٹا مفید ہوگا۔

اگر پاخانہ پتلا ہو، غذا غیر منہضم نہ لے، زبان کا رنگ سرخ بن جائے، کسا پیٹ، جڑ جڑ اپن، کمزوری اور بے چینی حد سے زیادہ پائی جائے تو آرسنک ۳۰ مفید ہے۔

فیرم ناس، پاڈونا کم، کیو میلا، ٹکس وائیکا، کالو سٹونجہ بھی مفید ادویہ ہیں۔

PILES OR HAEMORRHOIDS

ہوا سیر

(پائلیز یا ہیمورا ئیڈز)

تشخیص وجوہات و تشخیص : اس کی دو قسمیں ہیں، داہل خونی اور باہل، باہل خونی میں مسوں سے خون آتا ہے، اور باہل میں درد بخار شش بہت زیادہ ہوتی ہے، خون کبھی پاخانہ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور کبھی بعد از پاخانہ، قطرہ قطرہ یا لگاتار خارج ہوتا ہے، مریض بواسیر کو اکثر قبض رہتی ہے، زیادہ مرج، گرم مصباح کا استعمال، دائمی قبض، کمزوری جگر، تیز جلاب، پیٹ کے کپڑے، عورتوں کو دوران حمل میں یہ مرض ہو جاتا ہے، اس مرض میں قبض نہ ہونے دیں، اور مستدرجہ ذیل

علاج

اس میں سے حسب علامات استعمال کریں،
اکسیر ہوا سیر : روغن مغز نیم، رسوت خاص مسادی الون کھریل
کر کے سفوف بنائیں

مقدار خوراک ۲ رتی دن میں دو بار ہمراہ آب تازہ دیں، اور مسوں پر یہ ضماد لگا دیں،

نشہ ضماد : رسوت، مغز بنولہ، گیرد، افیون ہونڈن، وزلین ملا کر مسوں پر لگائیں، اندرونی و بیرونی استعمال سے ہر قسم کی بواسیر رفع ہو جائے گی،

اکسیر ہوا سیر : سیاب ۹ ماشہ، روج ترکی ۳ ماشہ، سککہ ایک تولہ، اول سیاب دسکہ کو آگ پر رکھ کر گرم کریں، اور روج کو پیس کر ایک ایک چٹکی ڈالتا جائے، جب سب کی رکھ ہو جائے، تو شہد اتولہ

۴۰ گولیاں بقدر بخود کے بنا دیں۔ چہل روز تک کھلا دیں، بواسیر ہر قسم جاتی رہتی ہے، مجرب ہے۔

تریاق بواسیر: رسوت خالص ۲ تولہ، تخم نیم ۲ تولہ، تخم سرس ۲ تولہ، کشتہ سونا کھی ۴ ماشہ، کشتہ مرداسنگ ۴ ماشہ، اکیرٹیکٹ، میسے میسے اتولہ،

حمد ادویہ کھل کر کے گولیاں بقدر کنار جنگلی بنا دیں، خوراک اگلی تا ۲ گولی دن میں تین بار ہمراہ آب تازہ۔

بواسیر کا تریاق کامل ہے، چند دنوں کے استعمال سے بواسیر کا نام و نشان نہیں رہتا، اگر بواسیری مسوں میں سخت درد ہو، تو پوست کی ٹکڑی کرنا یا گرم پلٹس باندھنا مفید ہے۔

دسگہ: ریٹھ کا چھلکا، بیلگری، تخم سرس مساری الون، کھل کر کے بخود بخودیاں بنائیں۔

مقدار خوراک اگلی تا ۲ گولی دن میں دربار بخونی بواسیر کے لئے مفید ہے۔

اکسیر بواسیر: گنڈا قشر نیم ۲ تولہ، مغز تخم نیم ۲ تولہ، روغن زرد پاؤ، ترکیب ساخت: سب کو روغن زرد میں کر پیں، اور خوب گھوٹ کر محفوظ رکھیں۔

طریقہ استعمال: قرینا ۴ ماشہ ہر روز صبح چاٹ لیا کریں، اور شہادت انگلی اس میں لٹھڑ کر ہر روز پاخانہ کی جگہ مل دیا کریں، انشاء اللہ ایک مہینہ میں بواسیر کا نام و نشان نہ رہے گا۔

دوا سے بواسیر وہ ہم الفار اتولہ، پتہ گائے ایک عدد، پتہ گائے اندر سنگھیا ڈال کر منہ باندھ کر کسی ادنیٰ جگہ لٹکا دیں،

حتے کہ خشک ہو جائے بکھل کر کے بقدر مسور گولیاں بنائیں ،
 خوراک اگلی ہمراہ مکھن ، غذا مرغی ، دودھ گھی خوب کھائیں
 خونی بواسیر کے خون کو بند کرنے کے لئے نہایت سریع الاثر ہے ،
 اکسیر بواسیر : پرست ہرڈ کلاں ، پرست بھیرا ، پرست آملہ ، چھوٹی
 ہرڈ ہر ایک پانچ پانچ تولہ ۔

جملہ ادویات کو نہایت باریک پس پس ، پھر گروندہ کا رس بنینا نامی
 کا رس ، سنگھنی کا رس ، شامترہ کا رس اس قدر ڈالیں کہ جملہ ادویات رس
 میں تر ہو جائیں ، خشک ہونے پر ۵ تولہ گھی گائے میں چرب کر کے مندرجہ
 ذیل ادویہ کا اضافہ کریں ۔

بابرنگ ، چاکسو سنار کی ، گندھک مصنے ، زبیرہ سفید ہر ایک
 پانچ پانچ تولہ ، مغز تخم نیم ۱۰ تولہ ، ان سب کا سفوف کر کے ملا دیں ۔

پھر جملہ ادویہ کے وزن کے برابر رسوت خالص ملا کر مویوں کے
 پانی میں اکیس یوم بکھل کر دیں ، ۲ تا ۴ رتی کی گولیاں بنیاد کریں ۔

خوراک اتنا ۲ گولی صبح و شام ہمراہ دودھ گائے ، اگر قبض سخت
 ہو ، اور پاخانہ کے وقت خون آئے ، تو اتنا ۵ تولہ ست اسفول کھلانا چاہئے
 تریاق بواسیر : ہر تال درقیہ ۵ تولہ ، ہر تال زردہ ۵ تولہ ، پھلکڑی سفید
 و سرخ ہر ایک ۱۰ تولہ ، پانی آک آب نادیدہ ۵ تولہ ، سرکہ خالص دلائی ایک بوتل
 ایک بوتل میں ڈال کر چالیس دن کسی سلائی آہنی سے روزانہ ملا
 دیا کریں ، چالیس دن کے بعد ایک مٹی کی ہنڈیا میں ڈال کر دوسری ہنڈیا
 اوپر دے کر دونوں کا آٹے سے منہ بند کر دیں ، خشک کر کے آگ پر رکھ
 دیں ، نیچے نرم آگ جلا لیں ، اندر سے آواز پیدا ہوگی ، جب آواز نکلتی بند
 ہو جائے ، تو پھر آدھ گھنٹہ بعد امار لیں ۔ سیز رنگ کی زردی مایل ودائی تیار ہے

جو بچلی منہ یا میں ہوگی۔

ترکیب استعمال : درقوڑی سی دوائی سرکہ میں ملا کر یا ویسے ہی
صبح و شام مسوں پر لگائیں۔ پہلے دن مسوں سے پانی نکلے گا پھر پھول
کر سخت اور سیاہ ہو جائیں گے۔ دوسرے دن کے بعد یہ پلٹس بنا کر باندھیں
آٹا ایک پاؤ گھی ۵ تولہ پانی بقدر ضرورت ملا کر مانند حلوائے
کے پکائیں جب پک جائے اتار کر مسوں پر باندھیں۔ دن رات میں
چار یا پنج دفعہ یہ پلٹس باندھیں۔ ایک ہفتہ کے اندر اندر تمام مٹے
گر جائیں گے۔ صرف گھی جلا کر لگاتے رہیں۔ بواسیری مسوں کے لئے
اکسیری نسخہ ہے۔
بواسیر کے نسخہ انچ خصوصی

ہمارے ملک میں بعض ایسے بواسیر کے علاج کے ماہر ہیں کہ
ایک دن میں ہی بواسیر کا علاج کر دیتے ہیں۔
اول پاخانہ کی جگہ پر سینگی لگاتے ہیں جس سے مٹے باہر نکل
آتے ہیں۔ اس کے بعد مسوں کو بارہک بال سے باندھ دیتے ہیں۔
اور دوبارہ مسوں کو اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تین گھنٹہ بعد دوبارہ سینگی
لگاتے ہیں۔ سینگی لگانے سے جڑوں سمیت مٹے باہر نکل آتے ہیں
مسوں کو بال سے باندھتے وقت ایک معمولی سی دوائی لگاتے ہیں
بعض مریضوں کے مٹے خارج نہیں ہوتے۔ ان کو چھٹی سے پکڑ کر
نکال دیتے ہیں۔ اور یہ بہت کامیاب علاج ہے۔ سینگی لگانے کی کراہیت
کی وجہ سے میں نے یہ علاج کبھی نہیں کیا۔
اکسیر بواسیر : شکبیا سفید اتولہ : مغز گھیکوار ایک پاؤ۔
ہر دو کو کڑھی میں ڈال کر ہلکی آبخ پر پکائیں جب گودہ جیل جائے۔

سنگیا کو نکال ہیں۔

یہ سنگیا اولہ، کتھ سفید ۴ تولہ، سرود کو بار یک میں ہیں، بقدر
ارتی لعاب دہن میں حل کر کے مستوں کے گرد لگائیں، ادھر روئی کا
پھیا یہ رکھ کر ٹکڑے باندھ دیں، خوب پانی خارج ہوگا، جلد جلد روئی
کا پھیا بدلتے رہیں، بواسیری مستوں کے لئے تریاق ہے، متے جڑوں
سے جھڑ جاتے ہیں، دوبارہ بھی پیدا نہیں ہوتے، خواہ کس قدر بد پیری
کی جائے۔

دلوٹ، یہ دوا دودھ مرض کے وقت استعمال نہ کریں، بلکہ

جب خون بند ہو، تو اس وقت لگائیں۔

بواسیری کی اکسیری مرہم، گائے کے تھن کو کسی پتھر کی پل پر رکھ کر ادھر
سیسہ یعنی سیکہ کا ٹکڑا اس قدر رگڑیں کہ تھن کا رنگ سیاہ ہو جائے،
پس تیار ہے۔

ترکیب استعمال، بعد از فراغت صبح و شام مستوں پر لگایا کریں۔

چند دنوں کے اندر متے بالکل خشک ہو جائیں گے، مجرب ہے۔

اکسیر بواسیر، سم الغار سفید ۲ تولہ، رسکپور ۲ تولہ

جو کو ب کر کے ایک پیالہ میں ڈال کر بطریق معروف جو سرا ڈالیں۔

ارتی جو سر دغن سرسوں میں ملا کر مستوں پر لگائیں، پھر آگ پر پیٹھ کو سینگ

دیں، صبح و شام لگاتے رہیں، جب متے پھول جائیں، آٹا اور گھی کی پٹس

بنا کر باندھیں، جب متے گر جائیں، تو گھی جلا کر لگائیں۔

بواسیر کے علاوہ بگندہ کے لئے بھی یہ نسخہ اکسیری اثرات کا

حامل ہے، نادرہ روزگار نسخہ ہے۔

پائلو مکسچر، ایکسٹریکٹ ہے میس لیکوئیڈ، امف، ایکسٹریکٹ ارگٹ لیکوئیڈ

۵ منم، ٹیکچر نکس دامیکا ۱۰ منم، سپرٹ کلوروفارم ۲۰ منم، ایکوا ۱۱ ادنس
ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں، بواسیر کا طن مہند
کرنے کے لئے مفید و مستعمل ہے۔

نوٹ، بواسیر کا خون اگر بہت سیاہ خارج ہو رہا ہو تو اس کو
بند نہیں کرنا چاہئے، خود بخود بند ہو جائے گا۔ بعد
میں دوائی استعمال کریں۔

مرہم بواسیر :- گیلک ایسڈ ۱۰ ڈرام، کوکین ۸ گرین، ٹیکچر اپیم ۱۰ ڈرام
دین لین ایک ادنس، ملا کر مرہم بنا دیں۔

بوقت ضرورت معقد کے اندر اور مسوں پر لگا دیں، بواسیری درد اور
مسوں کے پھوٹنے کے لئے بے نظیر مرہم ہے، نیز مسوں کو خشک کرتی ہے۔
غذا اور بواسیر کے مریضوں کو مصالح دار اغذیہ، ثقیل اور بادی چیزوں
مثلاً ماش کی دال، آلو، اروی، کچا لوسے پر سبز کراہیں، غذا، رقیق مثلاً
پسش جو، ساگوراند، دلیا، مونگ کی دال، نرم کھجڑی دیں۔

بواسیر کا ہومیوپیتھک علاج

اکسیر بواسیر :- کلکیر یا فلور ۶، ر۵ گرین، روزانہ چار خوراک پانی
کے ساتھ دیں، ایک دو ہفتہ تک کھلائیں، ہر قسم کی خونی و بادی بواسیر
کے لئے مفید ہے۔

تجربہ :- ایک بچہ جس کے متے بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے، اند
پاخانہ کرنے وقت آستے بے حد تکلیف ہوتی تھی، اور ساتھ خون بھی خارج
ہوتا تھا، کلکیر یا فلور کے چند دنوں کے استعمال سے بالکل تندرست ہو گیا۔
اور اسی دوا کی مرہم بنا کر لگائی گئی تھی۔

اگر غنی بوا سیر ہو۔ معمولی اور ملین پاخانے آئیں، تو مے میس ۱۰
دیں، اور خارجی طور پر مے میس ۵ کے ۲۰ قطرے ۵ چھٹا تک پانی میں ملا
کر مفعد کو صبح و شام دھوئیں۔ اور رات کو اسی محلول میں کپڑا کر کے
مستوں پر رکھیں، یا مخرج کے اندر کی طرف۔

اگر بادی بوا سیر ہو، خصوصاً وہ لوگ جو بیچھڑ کر کام کرتے ہوں،
اور جو قبض کا شکار رہتے ہوں، نکس دام ۳ دیں۔

اگر مفعد پر جلن ہو، خارش، چھیلن، پاخانے کے بعد کاٹنے والے
درد، متے باہر نکل آئیں، قبض ہو، تو ٹامپک ایسڈ ۳ دیں۔

جب مفعد اور مبرز میں بہت بے چینی ہو، کمر میں درد اور قبض
کارچ نکلے، گھوٹا خون ساتھ نہ ہو، اور چلنے پھرنے سے تکلیف میں
زیادتی ہو، تو اسکوئس ۳ دیں۔

بوا سیر میں پھوڑے کا سادہ، خارش، مٹی باہر نکل آئیں
اور ان کا رنگ بننا ہو، متعفن ہوں اور پک جائیں، جلن کے ساتھ مبرز میں
سویاں چھیننے کا احساس ہو، تو کاربودیج ۶ دیں۔

بادی بوا سیر، مفعد اور مبرز میں بوجھاد پھوڑے کے سے درد کے
ساتھ، بیچھنے اور کھڑے ہونے سے درد میں زیادتی، تازہ ہوا میں سانس
لینے سے بھی درد بڑھے، پاخانہ کے بعد ذرا سا زور لگانے سے کارچ
باہر نکل آئے، مبرز میں تیز جلندار درد ہو، تو اگنیشیا ۳ دیں۔

پیلے انسانوں میں جن کی طبیعت زانہ ہو، قبض یا بغیر قبض کے
آؤں نکلے، تو پلسا بیلا ۳ دیں۔

جب حادثہ تکلیف رفع ہو جائیں، اور صرف دم باقی رہ جائے، تو
فلورک ایسڈ ۶ دیں۔

خروج مقعد (کایچ نکلتا) PROLAP SUS ANI

(پرولیپس، انائی)

تشخیص و وجوہات : اس مرض میں مریض کی کایچ رفع حاجت کے وقت نکل آتی ہے، اور بہت تکلیف دیتی ہے، اکثر پیش شدید کے بعد کمزور مریضوں کو یہ عارضہ ہو جاتا ہے، عموماً زیادہ تو نیچے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں،

علاج : مرض کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور مقامی طور پر حاسب اور خشک ادویات کا استعمال کریں، اگر پیش ہو،

تو اس کا علاج کریں،

دوائے خروج مقعد : ہیکڑی ۵ گرین یا ٹینکچر سٹیل، قطرے پانی ایک ادس میں حل کر کے کایچ پر لگا کر اندر داخل کر دیں، لنگوٹ بندھوا دیں، اور اندرونی طور پر مقویات فولاد وغیرہ کھلائیں، کایچ نکلن، کمزوری وغیرہ کے لئے مفید ہے،

اطریفل خبیث الحدید : جو ہے چون مصفا ایک تولہ کو سرکہ عمدہ ۱۲ تولہ میں ۱۵ دن بھگو رکھیں، پھر سرکہ سے نکال کر باوام روغن حشریوت کے ہمراہ یہاں تک کھرن کریں کہ سرمہ کی مانند باریک ہو جائے،

یہ منور ایک تولہ، تڑپیلہ (برٹریہیرٹہ آلمہ) مرچ سیاہ، حشری، سنبل، سونمٹ، مختراں ہر ایک سات سات ماشہ، تخم گندنا ۲ تولہ، سوئے ۲ تولہ، شہد تمام دواؤں کے وزن سے دو چند،

جملہ ادویہ کو باریک پس کر شہد ملا کر معجون تیار کریں،

مقدار خوراک امانتہ صبح و شام ہمراہ عرق سولف دیں۔ خروج المفعد کے لئے بالخاصہ مفید ہے۔
 وٹامن ڈی جس کا تجارتی نام ایڈیکسولین (کلیکسول) ہے۔
 مقدار خوراک ۵ تا ۱۰ بوند دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔ کایخ نکلنے کے لئے بے حد مفید ہے۔ کمزور بچوں کے لئے بے حد مقوی و دوا ہے
 خروج المفعد کے مریضوں کو غذا مقوی دینی چاہئے۔
 پیہ پیتر:۔ صرخ مرچ، مصالحہ دار گرم، اغذیہ سے پرہیز کریں۔

خروج المفعد کا ہومیوپیتھک علاج

اگیشیا ۳۰، اس مرض کی خاص دوا ہے۔ بچوں کو شروع بیماری میں دی جاتی ہے۔ بار بار حاجت ہوا کرتی ہے۔ اگر مفعد سے خون نکلے، اور پیش میں خون اور آؤں آئیں، تو پھر ہیلڈونا ۳ مفید ہے۔ بچوں کے دانت نکلنے کے زمانہ میں جب جگر کی تکلیف بھی ہو، اور اسہال آئیں، تو پاڈونا سلیم ۶ مفید ہے۔ اگر زرد رنگ کے اسہال آئیں، اور پاخانہ میں آؤں بھی آئے، درد کی شکایت بھی ہو، تو مرکبوری ایس سالو ۶ مفید ہے۔

اگر تکلیف کافی زیادہ ہو جائے، یہاں تک کہ پیشاب کرتے وقت بھی مفعد باہر آجائے، تو ایسڈ میو سا سلیم ۳۰ بہترین دوائی ہے، اگر کسی دوائی سے آرام نہ آتا ہو، اور پیٹ کے پچھلے حصہ میں نفخ کی شکایت بھی ہو تو لاسکو پوڈیم ضرور فائدہ کرتا ہے۔

اکسیر خروج مفعد: کلکیریا فلور ۶ ر ۱۲ گرین ۱، کلکیریا فاس ۶ x ۶ ر ۲ گرین ۱، روزانہ چار خوراک پانی کے ساتھ دیں، خروج مفعد یعنی کایخ نکالنا کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

بھگندر

وجوہات : کثرت گوشت خوری ، میٹھی چیزوں کا کثرت استعمال ،
شراب خوری ، نیز مہل کی عادت ، گرم مصالح کا کثرت استعمال وغیرہ اس
کے اسباب ہیں۔

تشخیص و علامات : رفع حاجت کے وقت مقعد میں جلن اور درد
ہوتا ہے۔ اور مواد ناصور کے سوراخ سے
ہر وقت ہنسا رہتا ہے۔ اور یہ دو قسم ہے۔ ۱۔ نافذ اور درد ، غیر نافذ ،
اگر اعانے مستقیم کے اندر سوراخ ہو گیا ہو ، اور پاخانہ اس سے
نکلتا ہو ، تو لا علاج ہے۔

علاج : بھگندر کے زخم کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے ، جب
ادویہ کے استعمال سے نافذ نہ ہو ، تو پھر اپریشن
کرنا ہی شافی علاج ہے۔

اکسیر بھگندر : شکر ڈی ، سندھور ، مردہ سنگ ، سنگ جراحیت ،
ہر ایک ۲ تولہ ، نیلہ شکر مختار ۶ ماشہ ۔

جملہ ادویہ کو نیم کوب کر کے کسی برتن میں ڈال لیں ، چھ لٹے پر چڑھا
کر نیچے بری کی آگ جلا دیں ، ایک گھنٹہ بعد ادویہ بالکل خشک ہوں گی ،
میں نم محفوظ رکھیں ۔

خوداک ۴ رتی تا ۸ رتی ہمراہ کھن یا ملائی دن میں ایک بار صرف ،
برقم کے ناصور ، ٹھنیر ، بھگندر ، بوداسیر ، سوداک اور پرانے پیسے زخم

جن سے گندی، بدبودار اور سب ملا خون خارج ہوتا رہتا ہو۔ کے لئے
مفید ہے، اگر زخم نافذ ہو، یعنی امعائے مستقیم کے اندر سوراخ ہو،
اور پاخانہ اس سوراخ سے بھی نکلتا ہو، تو لا علاج ہے، ورنہ علاج کے
قابل ہے۔

ردغن نامی صورت ہے۔ ردغن تارپن ایک ادس، آئو ڈونام، اڈام
دونوں کو ملا کر بتی تر کر کے ناصور کے اندر داخل کر دیں مفید و مجرب ہے
دلروزہ یہ لاہور کے ایک حکیم کی تیار کردہ دوائی ہے جو بھگندر کے
لئے نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

ترکیب استعمال: ایک یا دو قطرے بھگندر کے سوراخ میں
صبح و شام ٹپکائیں۔

علامہ ازیں یہ دوائی داد چنبیل، پھوڑے، پھنسی، درد دانت
اور نہ ہریدے جانوروں کے کائے طے کو بھی مفید ہے۔

تجربہ: بھگندر کے ایک مریض کا میں نے علاج کیا، جو بالکل
تندرست ہو گیا، جس پر اکسیر بھگندراور دلروزہ استعمال کیا گیا، غذا میں چھلی
کا تیل اور مرغن غذا میں خوب کھلائی گئیں، حالانکہ وہ کافی ڈاکٹروں سے
علاج کروا کر مایوس ہو چکا تھا۔

اکسیر بھگندراور سم الغار سفید زرد، سرخ، سیاہ ہر ایک ایک تولہ لے کر دیسی
شراب ایک بوتل میں کھل کر دیں جب تمام شراب جذب ہو جائے، تو بخودی گولیاں
بنا کر خوب خشک کر کے حسب دستور جو سرائیں۔

مقدار خود اک اچا دل کھن یا بالالی میں رکھ کر دن میں دو بار کھلائیں بھگندر
ناصر، ابواسیر، خنازیر، سوزاک، آتشک مزمن، چنبیل، واد، خارش کے لئے
مفید و مجرب ہے۔

باب ہفتم

جگر تلی اور پتہ کی بیماریاں

ضعف جگر ANIMIA (انیمیا)

وجوہات تشخیص در بویزخونی، کثرت حیض، لیکوریا، نازک کشتی، کثرت جماع، وغیرہ سے یہ شکایت ہوتی ہے۔ جلد، جسم، چہرہ، کارنگ، پھیلا، زردی مائل، مسوڑھے، ناخن سفید، ہاتھ، پاؤں سرد، حقوڑی محنت سے دم چڑھ جانا، ہاضمہ خراب، قبض، سر چلنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، پست ہمتی وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔

علاج اصل اسباب کی تشخیص کر کے اسباب کا ازالہ کرنا۔
معدہ اور جگر کی تقویت کے لئے فولاد و ادل درجہ کی دوا ہے۔ یعنی بالخاصہ معید ہے، اور جلد طریقہ سے علاج کی مسئلہ دوائی مانی گئی ہے۔

لور ایکسٹریکٹ اور ڈٹامن بی ۱۲ بھی اس مرض کا کامیاب علاج ہے۔

کبد و دل : ایک ٹریٹ ٹریٹ کے سائی لیکو بیڈ ایک اونس ، ایک ٹریٹ ٹریٹ خوشن کو
ایک اونس ، ٹینکچر ٹیکس و امیکا اڈرام ، ٹینکچر کارڈیم کو ایک اونس ، ایسڈ
ہائیڈرو نائٹرو کلورک ڈال ۲ . ڈرام ،

سب کو بوتل میں ڈال کر خوب ہلادیں ، بس تیار ہے ۔

مقدار خوراک اڈرام ۵ تولہ پانی میں ملا کر دس دن میں تین بار بعد از غذا ۔
اگر تلی زیادہ بڑھ گئی ہو تو پچھلے ایک اونس کنیشیا کلاب دے کر دوائی
م شروع کریں ، جگر و معدہ کی تمام امراض کا واحد علاج ہے ، ضعف جگر
درم جگر ، درد جگر ، عظم جگر ، یرقان ، حیات کبدی ، نوبتی بخار ، تپ تلی ،
بد ہضمی کی جھوک ، دائمی قبض ، نفخ ، ہاتھ لیا مرانی ، بواسیر ریاحی میں مفید
و مجرب ہے ، جن لوگوں کو کھایا پیانا لگتا ہو ، ان کے لئے لاجواب چیز ہے
استعمال کریں ،

اگر ضعف جگر کے ساتھ سود مزاج گرم جگر کی بھی شکایت ہو ، زرز شک
کو کلاب خالص میں جگو کر صاف کریں اور مرثبت سیب یا ہی سے بیٹھا کر کے
طباشیر یا ایک پیس کر چھڑاک کر ہلائیں ، بہت نافع ہے ،
جگر طبعاً موہیز کو پسند کرتا ہے ، اگر اس کو صحت ناری کے ساتھ کھایا
جائے تو بہت ہی مسکن ہے ،

اکسیر جگر : ریوند حطائی ۵ تولہ ، نوشادر اتولہ ، قلعی شورہ اتولہ ، کالی مرچ
اتولہ ، سفیل الطیب اتولہ ، سادج ہندی اتولہ ، سفوف تیار کریں ،
خوراک ۸ رتی تا ۲ ماشہ ہمراہ دودھ کبری یا عرق کاسنی دن میں تین بار
جگر کے تمام امراض ضعف جگر ، یرقان ، تپ تلی ، سودا لعینہ ، طسیر یا
بخار کے لئے عجیب الافر ہے ،

کنشتہ فولاد : برادہ فولاد ۵ تولہ کو چینی کے برتن میں ڈال کر اوپر

جامن کا پانی اس تیلہ ڈالیں کہ برادہ سے چار انگلی اوپر رہے، اس کو دھوپ میں رکھیں جب خشک ہو جائے، تو آب انار ترش بھی اس قدر ڈالیں، جب یہ خشک ہو جائے، تو آب لیموں ڈالیں، تین بار اسی طرح کرتے سے نہایت اعلیٰ کشتہ ہوگا، کھول کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں، مقدار خوراک ۲ تا ۲ رتی ہمراہ کھیں، گرمی جگر، ضعف عجز، کو دور کرتا ہے، بدن میں خون پیدا کر کے رنگ کو سرخ کرتا ہے، جریان، احتلام کو بھی مفید ہے،

قرص گل قابض: ۳ گل سرخ ۳ ماشہ، ریوند چینی، لک مغسول، گوند کبک کبریا کشتی، ہر ایک پانچ پانچ ماشہ، بالچھڑ ۲ ماشہ، عود ۳ ماشہ، خرفہ بریاں ۶ ماشہ، گل ارمی ۷ ماشہ، عرق سونف بقدر ضرورت میں قرص بقدر ۴ ماشہ بنائیں،

مقدار خوراک ۲ ماشہ ہمراہ شربت بزدری، ضعف جگر، اسہال کبدی بخار، کھانسی، چہرے پر سوجن پڑنا، درم کے لئے جگر بامحرب ہے، تریاق بھس، رخت الحدید یعنی منور کا کشتہ جو آب لیموں، جامن، ترچہ پلہ یا لسی میں کیا گیا ہو،

مقدار ۳ ماشہ کھن میں ملا کر کھلائیں، روزانہ آدھ ماشہ تک بڑھاتے جائیں، ۶ ماشہ تک بڑھا کر پھر کم کرتے جائیں کشتہ کھلانے کے آدھ گھنٹہ بعد آدھ رٹ کا پلا دیا کریں، پہلے دن شام کو ترچہ پلہ یعنی سرسٹ بھڑا، آملہ تین تین ماشہ آدھ پاد پانی میں ٹھکودیں، دوسرے دن شام کو یہ پانی پلا دیں، اسی طرح ایک ہفتہ تک کشتہ منور اور ترچہ پلہ کا پانی استعمال کرتے رہیں، اگر تین چار ہفتہ اسی طرح استعمال کرایا جائے، تو ضعف جگر، کمی خون، ہونٹوں کی سفیدی اور دیگر کمی خون کے عوارضات کا

نام و نشان نہیں رہتا، چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، ایک مریض کو ایک پاؤ کشتہ کھلانا چاہئے۔ معمول و تجرب ہے۔
 کمی خون کا اکسیری نسخہ ہر ملیہ، بلیہ، آئل ہر ایک ۵ تولہ، نفعل و راز
 زیرہ سیباہ، دانہ الاچی خورد و کلاں ہر ایک تولہ تولہ، لوہے چون عمدہ
 ۵ تولہ، مصری ۱۰ تولہ، دی ایک سیر۔

تمام اشیاء لوہے کی کڑائی میں ڈال کر لوہے کے دستے سے
 کھری کریں، جتنے کہ خشک ہو جائے، دوبارہ ایک سیر اور دی ڈال کر کھری
 کریں، اسی طرح پانچ بار ایک ایک سیر دی ڈال کر کھری کریں، جب انگلی سے
 پٹک معلوم نہ ہو، بقدر کوکن ہر گولیاں بنالیں، یا سفوف رہنے دیں،
 مقدار خوراک ۳ ماہتہ صبح و شام ادھر ڈکا کے ساتھ استعمال کریں
 ضعف ہو کر جس کمی خون کی تجرب دوا ہے۔

کشتہ فولاد، برادہ فولاد حسب ضرورت لے کر کسی چختہ نہ گھسنے
 والے کھری میں ڈال کر آب کنوار گندل داخل کر کے کھری کرتے رہیں،
 جب پانی خشک ہو جائے، تو آب کنوار گندل اور ڈال کر کھری کریں، اسی
 طرح اس حد تک پسائی کریں، کہ برادہ فولاد غبار کی مانند ہو جائے، جس
 کی علامت یہ ہے کہ وہ پانی پر ہی تیرتا رہتا ہے، پس تیار ہے۔
 مقدار خوراک ایک رتی کھسن یا بالائی میں دن میں دو بار دیں،
 ضعف ہو کر کمی خون، ضعف بدن کے لئے تجرب ہے، جسم کی رنگت

سرخ کرتا ہے۔

مشر بہت استثنیٰ، ہر شام ترہ ۳ تولہ، استثنیٰ ۲ تولہ، اعلیٰ ۱۰ تولہ،
 گل سرخ ۱۰ تولہ، موثر منقہ ۵ عدد، آلو بخارا ۵ دانہ
 ایک سیر پانی میں رات کو گھلو کر صبح جو کشتیں دے کر چھان لیں،

اور ۳ پاؤ مصری ملا کر شربت تیار کر دیں۔
 مقدار خوراک ۴ تولہ صبح، دو ہر، شام، همراه عرق کوکاسنی وغیرہ
 پرانے پیریا، ضعف جگر، سوء الحشہ کے لئے نہایت مفید ہے۔ اور
 صفرا سے بخار، یاس، سوچن کے لئے تریاقی ہے۔
 یونانی حیطہ: عرق کوکاسنی ۵ تولہ، آب زلال کاسنی ۵ تولہ، شربت بزرہی
 ۲ تولہ ملا کر ملائیں۔
 اکثر امراض جگر کا مجرب علاج ہے، خصوصاً حرارت جگر کے لئے

مفید ہے۔ جگر
 ضعف جگر کا ٹیکہ: پور ایکسٹرکٹ ۲ سی سی روزانہ عضلاتی ٹیکہ کریں
 ایک مہینہ تک، اور خوردنی طور پر مرکب فولاد، فرسولیت ٹیکہ (گلیسیو)
 دن میں چار ٹیکہ بعد از غذا ۱۵ دن تک، استعمال کریں۔

اگر فرسولیت نہ ملے، تو کشتہ فولاد یا منور ۳ رتی دن میں تین
 دفعہ استعمال کریں، ہمراہ جوارش جالینوس یا معجون حیث الحدید و عرق
 سولف، اس کورس سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔

اگر دوبارہ ضرورت پڑے، تو ایک ماہ بعد اتنا کورس اور دیں،
 کمی خون، بھس، ضعف جگر کا کامیاب علاج ہے۔
 نوٹ، پور ایکسٹرکٹ مندرجہ ذیل ناموں سے کمی کمپنیاں کا تیار
 کر دہ مل سکتا ہے۔

پلاگزن، گلیکسوم، کیولان، رباٹر، پور ایکسٹرکٹ، ریلی،
 کسپا، اسکوب، وغیرہ۔

تریاق کمی خون، کاپرساٹراس ۲ تولہ، سم الفار ۲ تولہ، پیراکی کاب
 ۴ تولہ، عرق کلاب و ذبول میں کھول کر لیں، پس تیار ہے۔

مقدار خوراک ۵ گرین صبح و شام دودھ کے ساتھ بعد از غذا دیں،
خون کے سرخ ذرات یعنی ہموگلوبین کو زیادہ کرنے کی خون وضعف
حکمر بھٹس، عام جسمانی کمزوری کے لئے اکسیریزین دوا ہے،

خون وضعف حکمر کی جدید تحقیق

یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے، کہ جسم میں خون کی کمی یا نقص الدم (انیمیا)
دھما من بی ۱۲ کی کمی کا نتیجہ ہے، خواہ یہ دھما من کی کمی نقص التغذیہ یا
کسی بیماری کی وجہ سے ہو، دھما من بی ۱۲ کے استعمال سے ہی یہ کمی پوری
ہو سکتی ہے، اور کمپیادی امتحانوں سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے، کہ پور
ایکسٹریکٹ انٹی پرنی شش انیمیا جزو اور دھما من بی ۱۲ ایک ہی چیز ہے
یہ دھما من کی تجارتی ناموں سے ملتا ہے،

سیٹامین CYTAMIN (گلیکسو) ایک سی سی کے چھ ایلیو لز کا
بند کبس ملتا ہے،

مقدار استعمال: ایک سی سی ۱۰۰۰ مائیکرو گرام بذریعہ عضلاتی انجکشن
ہر تیسرے دن استعمال کریں،

نسیب بھٹس، کمی خون، رخوہ زچگی کی وجہ سے ہونے والے اممال
سیر و سنگرتنی، وغیرہ کے لئے اکسیریزین، چھ سے بارہ انجکشنوں
سے مکمل شفا ہو جاتی ہے،

نوٹ: اب گلیکسو کمپنی نے ۲۵۰، ۱۰۰۰ مائیکرو گرام کے انجکشن
تیار کر لئے ہیں، جو تین دن، ہفتے یا مہینے میں ایک لگانا پڑتا ہے،
اس کے استعمال میں ہمارا معمول یہ ہے، کہ جب دھما من بی ۱۲
کا استعمال شروع کیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی مرکبات فولاد بھی استعمال کر لئے

جاتے ہیں۔
 غذا و پیرمیز: ضعف جگر کے مریضوں کو گرم چکنی چیزوں، گوشت
 پس، پیاز، چائے، شراب، جماع سے پرہیز کرنا چاہئے۔
 غذا میں شوربا، کدو، مونگ کی دال، دلیا، گندم کی روٹی، آتش
 بخور، پاک و غیرہ دیں۔

BILIARY COLIC

درد جگر

بیلیری کالک

تشخیص: یہ مقام جگر سے درد اٹھ کر درد کی ٹیسس شکم
 پشت اور دایسے کندھے تک جاتی ہیں، کبھی شدت درد سے غشی تک
 نسبت پہنچ جاتی ہے، اس میں صفراوی علامات ظاہر ہوتی ہیں،
 مخرج صفرا اور مسکنات کا استعمال کریں۔

علاج: شدت درد میں مارینین پلے گرین کا جلدی ٹیکہ کریں، جگر پر
 انٹی ندو جین کا پلاسٹر کر کے گرم ٹکڑا کریں۔

مندرجہ ذیل کچھ بے حد مفید ہے۔
 ٹینکچر بیلادونا ۱۲ منیم - ٹینکچر ادیتیم ۴ منیم، ایکوا کلوروفارم ۶ ڈرام
 ٹینکچر بنائیں، ایک چمچہ خورد ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے
 بعد پلائیں۔

روغن زیتون ۱/۲ اونس قبل از غذا پلانا بہترین علاج ہے۔

ورم جگر

HEPATITIS

ایسے ٹائی کس

تعریف :- اس مرض میں جگر میں ورم ہو جاتا ہے ،
 وجوہات :- مرض پچھن ، آتشک ، جگر پر چوٹ لگنا ، طیریا کا زمر ،
 شدت کی گرمی ، کثرت شراب نوشی ، گوشت اور گرم مصالح کا زیادہ
 کھانا وغیرہ اس کے اسباب ہیں ،

تشخیص :- مقام جگر یعنی دائیں جانب کی پسلیوں کے نیچے کسی قدر ورم
 میں معلوم ہوتا ہے ، مقام ناف کو دبائے اور سانس لینے
 سے درد ہوتا ہے ، ہنسی اور کندھے میں درد ہوتا ہے ، کبھی قبض ،
 دست رفتہ اور متلی ہوتی ہے ،

اگر جگر میں ورم ہو ، تو درد کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے ،

اگر جگر کے خلاف میں درد ہو ، تو بخار نہیں ہوتا ،

مقام درد پر گرم ٹکڑ کر کے ، اتنی کا پلٹس باندھیں ، یا

علاج :- انٹی فلو جیٹین پلاسٹر لگائیں ،

مکسچر ورم جگر :- ایک ٹریکٹ ٹری کے سائی ٹیکوئڈ اڈرم ، ٹیکچر کلوروفارم

۱۵ گرام ، ٹیکچر آرنیکا ۱۵ گرام ، ایوینا کلورائیڈ ۱۵ گرام ، ایسڈ

ہائیڈروکسائیڈ کلورک ڈل ، ۱۵ گرام ، ایجو ایک اونس ،

ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں ، یہ نسخہ ورم جگر میں مہل

دینے کے بعد بہت مفید ہے ، درد کو دور کرتا ہے ، اور ورم کو دور کرتا ہے

اگر ورم زیادہ ہو ، اور تکلیف دے ، تو انٹی فلو جیٹین پلاسٹر یا

یا محلل اعظم پلستر مقام جگر پر لگا دیں، چند دنوں کے استعمال سے یہ مرض دور ہو گا۔
 اگر تپش کے بعد دم جگر ہوا ہو، تو ایسے ٹین ہائیڈرو کلورائیڈ
 ۱۲ گرین کا ایکشن ہفتہ میں دوبار کرنا مفید و تجرب ہے۔

یرقان JAUNDICE (جائڈس)

تشخیص: در اس مرض میں سب سے اول آنکھوں
 کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے، ناخن، چہرہ، بازو آخر میں سارا جسم
 زرد ہو جاتا ہے، پاخانہ سفید، پیشاب زرد، گہرا براؤن ہوتا ہے
 قبض ہستی، کاپی، منہ کڑوا، درد معدہ عموماً معدولی بخار بھی ہوتا ہے
 صفراوی نالیاں بند ہو کر صفرا خون میں جذب ہو جاتا ہے، آخر میں بدن
 پر خارش شروع ہو جاتی ہے، یہ مرض اکثر گرم اشیاء کے استعمال
 سے ہوتا ہے جس سے صفرا کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔

علاج: اصل سبب کو دور کریں، اگر اعظم غلیظ کی وجہ ہو۔
 تو مریض کو قے کرائیں، تاکہ بیلغم خارج ہو کر نالیاں
 کھل جائیں۔

دیگیں اس مرض میں سہل دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
 کاسنی کا استعمال امراض عکریں یا تحاصد مفید ہے۔
 برائے یرقانی سددہ در معزہ پیغوزہ، آمانشہ، مویزہ، تینفہ، اولہ،
 گندھک زرد سواد و ماشہ، انیسون، تخم کرفس، نخود سیاہ، کنذر سفید

ہر ایک سات سات ماشہ ، سب کو کوٹ چھان کر رکھیں ، اور اس میں سے ساڑھے چار ماشہ سفوف پانی کے ساتھ چند روز کھائیں ، یرقان سدتی کی شافی دوا ہے ، تجربہ شدہ ہے ۔
 طبی حیلہ : عصارہ ریوند ۲ ماشہ پیس کر ، ہمراہ آب مرین کو کھلا دیں اس سے ایک دو دست ہو جائیں گے ۔

شریت انار سر روزوں میں چار دفعہ پلائیں ،
 تخم کاسنی اتوار ، نمک لاہوری ۶ ماشہ ، پیس کر پانی میں کھل کر کے ایک پاد پانی میں آگ پر گرم کریں ، جب پانی تھپٹ جائے ، توصاف کر کے پلائیں ، مجرب ہے ،

کشتہ قلعی پارہ شورے والا ہر قلعی مصفی ۵ تولہ ، پارہ ۵ تولہ قلعی شورہ ۲۰ تولہ ،

پیسے قلعی کو پھلکا کر پارہ میں ڈال کر گرہ کر لیں ، گرہ کو کھل میں ڈال کر باریک پیس لیں ، اور تھوڑا تھوڑا قلعی شورہ ڈالتے جائیں ، اور کھل کر جائیں ، اتنے بڑے برتن میں ڈالیں ، کہ ۸ حصہ خالی رہے ، اس کے منہ پر ڈھکنا دے کر اور روزی پتھر یا اینٹ رکھ دیں ، کھلی جگہ میں دس سیر اُپوں کی آگ دیں ، شعلے نکلیں گے ، سرد ہونے پر قلعی کا کشتہ نکال لیں ، پیس کر پانی میں دھو ڈالیں ، اور پانی ڈال دیں ، جب پانی نہختر جائے ، پانی گرا دیں ، دو چار بار دھونے سے شوریت نکل جائے گی خشک کر کے محفوظ رکھیں

مقدار خوراک یرقان والے کو ۱ ماشہ ہمراہ کھن ، تین چار خوراکوں میں آرام ہوگا ، علاوہ ازیں جربان ، احتلام ، ذکات حس کو مفید ہے ، مقدار خوراک ۲ رتی ہمراہ کھن ۔

اکسیر یرقان ہر اعلیٰ ۳ تولہ، پوست طیبہ زرد ۱۶ تولہ، سفید
۱ تولہ، بنفشہ ۱ تولہ، تخم کثوث پو علی میں باندھا ہوا ۱ تولہ، تخم باقلا
۱۰ ماشہ، تخم کاسنی، پر سیاہو شاں ۱۰ ماشہ، صوف ۷ ماشہ، کرکس ۷ ماشہ
تمام دراول کو نصف سیر پانی میں جوش دیں، اور اس میں مغز
امتناس ۴ تولہ، شکر سرخ ۴ تولہ ملا کر صاف کر لیں۔

پھر اس میں غار یقون ۳ ماشہ، سقمونیا و قاتی ۴ رتی پیس کہ
ملا دیں، اس کے تین حصے کریں، ایک ایک گھنٹہ بعد ملا لیں۔

زرد یرقان جو سکہ کی وجہ سے ہو، کے لئے فوری طور پر
مؤثر ہے، ایک ہی دن میں یرقان ختم ہو جاتا ہے، سکہ اور صفرا کو
خارج کر دینا ہے، معمول مطلب ہے۔

حسب یرقان ہر گل غافث، گل بنفشہ، گل سرخ، تخم کاسنی ہر ایک
۳ تولہ، تخم کثوث ۲ تولہ، آب کاسنی سبز مروق کے ساتھ گولیاں بقدر
نمود بنا لیں۔

خوراک ۲ گولی صبح، دوپہر، شام پانی سے کھلا لیں، یرقان کے
لئے مفید ہے۔

یرقان کا کسیر ہر ایڈ ہائیڈروکسائیڈ کورک ٹل ۱۰ منم، ایکریٹک
ٹیکے سائی لیکو بیڈ ۱ ڈرام، ٹیکچر جنسن کو ۳ منم، ٹیکچر کارڈیم کو ۳ منم،
سیرپ آرٹیشائی ۱ ڈرام، ایکوا ایک اولس۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں، یرقان کے
مغرب ہے، اگر

اگر قبض ہو جائے تو اس میں ایک ڈرام سوڈا سلفاس ملا دیں، غذا
سادہ نرم اور زود ہضم دیں، روغنی اور نشاستہ دار اغذیہ سے پرہیز کریں۔

جھانڈس کسچہ: پوٹاسیم ٹائٹریٹ ۲ ڈرام، پوٹاس بائی ٹائٹریٹ ۲ ڈرام
 پوٹاسیم مائیکسٹ ۲ ڈرام، پوٹاسیم کلورائیڈ ۲ ڈرام، ایکٹرکٹ سٹرکٹس
 سائی ٹیکسٹ ۲ ڈرام، پوٹاسیم ایسیٹ ۲ ڈرام، پوٹاسیم سلفائیڈ ۲ ڈرام
 سڈاسلفائیڈ ۲ ڈرام، گلیشیا سلفائیڈ ۲ ڈرام، ایکٹرکٹ سٹرکٹس
 سب کو ملا کر شیشی میں حل کر لیں، خوراک ایک ادس دن میں
 عین بار، یرقان، سودا، قیہ، سہہ، جگر، درد جگر، قیض بخار وغیرہ
 کو دور کرتا ہے۔

اکسیر یرقان: پوٹاسیم بی ۱۲، ایک سی سی ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ مالیکوگرام
 روزانہ عضلاتی ٹیکہ کریں۔

اور خوراک اسٹون میں تین ٹیکہ کھا نے کو دیں، صبح، دوپہر، شام
 ایک ایک ٹیکہ، چار دن کے استعمال سے پرانے سے تیرا یرقان بھی
 رقع ہو جاتا ہے، مجرب و مفید ہے۔

یرقان کا ہومیو پیتھی علاج

اگر زرد پاخانے آئیں، اور دامنے ٹٹانے کی بڑی کے نیچے درد ہو، تو
 چیلڈنیم ۳ دیں، اگر جگر میں دم ہو، اور پاخانے کا رنگ سفید ہو، تو
 چائنا ۳ مفید ہے۔

اگر جگر میں تیز درد ہو، اور دامنے جانب لیٹنے سے درد میں کمی
 ہو، تو برا یوٹیمیا ۳ دیں۔

منقذی اور حملک یرقان کے لئے فاسفورس ۳۰ مفید ہے
 اگر مزمن یرقان ہو، تو آئیوڈیم ۳۰ مفید ہے۔

ANLARGMENT THE
SAPLAN

ناب تلی

انلارجمنٹ آف وی سیلین

تعریف : اس مرض میں تلی بڑھ جاتی ہے،
وجوہات و شخص : یہ پیریا بخار کے بعد تلی اکثر بڑھ جاتی ہے، جو
ناف تک اور بعض اوقات سارے پیٹ میں پھیل جاتی ہے، مریض
کو چلتے پھرتے دم چڑھ جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، معمولی بخار
پائیدار ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بائیں طرف
ٹوٹنے سے باسانی معلوم ہو جاتی ہے،

علاج : اگر تلی بڑی اور نرم ہو تو کمین مسہل اور مرکبات فولاد
سے تلی اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، اگر سخت
ہو تو پہلے محمل اور ام ادویہ کے پلاسٹر لگا کر تلی کو نرم کرنا ہے حد
ضروری ہے،

اکسیرالطحال : فیبرایٹ کوئین سائٹراس ۵ گرین، فیبرائی سلفاس ۵ گرین
کوئین سلفاس ۲ گرین، لائیو آر سٹک ۲ منیم، ایڈ سلفیورک
ڈائی کیوٹ ۱۰ منیم، میگنٹ ۴ ڈرام، سوڈا سلفاس ۴ ڈرام، ایجو
کلوروفارم ایک اونس،
ایسی ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں، تلی کو کم کرنے کے لئے
اول درجہ کی دوا ہے،

میان و شخص : جب تلی بڑھ گئی ہو، اور سوج گئی ہو، ہاتھ لگانے سے درد
کرتی ہو، اور کبھی پیریا بخار بھی ہو جاتا ہو، وغیرہ علامات کے لئے در شکر

بہترین فائدہ مند دوا ہے۔ پانچ سے پندرہ قطرے دن میں تین بار ہمراہ
آب وں۔ ہومیو پیتھک علاج کی بہترین مسئلہ دوائی سے
دوا و الطحال پر کوئین سلفاس ۳ ماشہ، ایڈ سلفیورک ڈا سیلیوٹ
۶ ماشہ، فیرائی سلفاس ۲ ماشہ، مگنیشیا سلفاس ۵ اتولہ، عرق پودینہ
۳ پاؤں۔

اول کوئین کو ایڈ میں حل کریں۔ پھر سب کو باہم عرق پودینہ میں
حل کر لیں۔ غوراک ۱، اتولہ صبح و شام پلائیں۔
تھاپ ٹلی جگر کا بڑھ جانا، پتھر ٹلی فیور، کمزوری معدہ وغیرہ
کے لئے مفید و مجرب ہے۔

سیلین کسچر پر کوئین سلفاس ۶ ماشہ، سلفورک ایڈ ڈا سیلیوٹ
۹ ماشہ، مگنیشیا سلفاس ۲، اتولہ، فیرائی ایڈ ایوینا ساٹرا اس
اتولہ، ایوینم کلورائیڈ اتولہ، ایگوا ایک پونڈ۔

سب کو باہم ملا لیں، مقدار غوراک ۲ اتولہ صبح و شام، روٹی چاول
یا دلیا کھلا کر بعد میں دوائی پلائیں۔

پرانا بلیر یا تھاپ ٹلی، ضعف جگر، منجم کی خرابی، سوجن وغیرہ

کے لئے اکسیر ہے۔

شریبت تھال پر حب قرطم، سولف، تخم کاسنی، تخم خربوزہ، تخم
خارن، معز کدو، شیریں، شائترہ، مگو خشک، تخم خرفہ بکلی سیاہ
برگ تھاد ہر ایک اتولہ اتولہ گل بنفشہ، گاوزبان، خطلی، پٹھی منشتر،
بیخ کاسنی، انیسوں، بال جھڑ، گل غافث، انسیتین، تخم سنخا لو،
انیس، معز کربجہ، سمندہ چل ہر ایک سات سات ماشہ، ابخر زردہ ماشہ
مویز منفع ۳ اتولہ۔

گرم پانی ڈیڑھ سیر میں بھگو کر جوش دے کر صاف کر کے ۳ پاؤ کھانڈ ملا کر
مشربت تیار کریں۔

مقدار خوراک ۳ تولہ صبح ۳ تولہ شام پانی ملا کر پلا یا کریں۔ درم طحال
عظم طحال، طیر یا مزمن، صنف جگر، سور القینہ کے لئے نہایت مجرب
تیر بہد ف سے۔

اکسیر الطحال: سرکہ انگوری ایک سیر، نوشادر ۵ تولہ، ابخر دلائی اپاؤ
تینوں چیزوں کو عمدہ چینی کے برتن میں بھر کر اچھی طرح منہ بند
کر کے گیارہ روز کے بعد کھول لیں، پس تیار ہے۔

مقدار خوراک روزانہ خالی معدہ دو ابخر کھلائیں، اور ادیر سے عرق
سولف پلائیں، اس کے چند روزہ استعمال سے بڑھی ہوئی تلی اپنی اصلی
حالت پر آجائے گی، قبض رفع ہو کر جلد کی رنگت سرخ ہو جائے گی، تلی
کے عوارضات کے لئے بیش قیمت دوا ہے۔

دیگرا: نوشادر ۵ تولہ، بچی کھارہ ۵ تولہ، قفل دوازہ ۲ تولہ، جو کھار
۲ تولہ، سفوف تیار کریں۔

مقدار خوراک ۲ تا ۴ رتی ہمراہ عرق سولف یا کوردن میں تین بار،
تلی دگر کے عوارضات کے لئے اکسیر ہے۔

تلی کی گولیاں: نوشادر ۱ تولہ، مقبیر ۲ تولہ، تلی شورہ ۲ تولہ، سہاگہ
۴ تولہ، سرکہ ۸ تولہ۔

جلد ادویہ کو کھل کر کے گولیاں بقدر ۲ رتی تیار کریں، ایک گولی صبح
ایک گولی شام ہمراہ آب، تلی بڑھ جانے اور دیگر امراض تلی کے لئے
مفید ہے۔

دھٹ، یہ مرض آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے، اس لئے اس کا علاج

دو تین ہفتہ تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ عرصہ تک بھی کرنا پڑتا ہے۔
 پرہیز: درحقیقت اشیاء، میٹھی چیزیں، مکھن، دال چنے، دال ماش سے پرہیز کریں۔
 غذا: معمولی، بھوک سے کم، گندم کی روٹی، شوربا، مولیٰ کا سانس، ترکاریاں، آم کا اچار یا دیگر اچار وغیرہ بہت مفید اغذیہ ہیں۔
 مولیٰ کا استعمال تلی، جگر، گردے اور مثانے کی امراض میں مفید ہے۔

DROPSIE

(دراپسی)

استسقا یا جلودہر

تعریف: اس میں کسی حصہ جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔
 دوران خون کی رکاوٹ کے سبب اور قوت جاذبہ و جراثیم کم ہونے کے باعث آب خون تراوش یا کر جلد کے نیچے کسی اندرونی اعضاء میں جمع ہو جاتا ہے۔ دل، جگر، اور گردہ کی خرابی سے یہ علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پانی تمام جسم میں جلد کے نیچے جمع ہوتا ہے، اور سارا جسم پھول جاتا ہے، یا صرف پیٹ میں جمع ہوتا ہے، پیٹ مشک کی مانند پھول جاتا ہے۔
 کبھی دماغ کے پردوں کے درمیان آب خون جمع ہونے لگتا ہے اور سر بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پیچڑوں کے غلات میں، کبھی دل کے غلاف میں خون جمع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خصلوں میں آب خون جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں۔

علاج : اسباب کے مطابق ازالہ کر کے مندرجہ ذیل نسخہ استعمال

کریں۔

دوائے استسقا : در عصارہ ریوند اماشہ ر قلمی شورہ ۳ ماشہ ،
دو دوں کو کھل کر یں یہ ایک خوراک ہے ، ہمراہ عرق سولف استعمال
کریں ایک مہینہ تک روزانہ ایک خوراک دیتے رہیں ، پاخانہ کے ذریعے
پانی خارج ہوگا۔

استسقا ڈراپسی کا پانی بذریعہ آلہ ٹوکا رہی نکالا جاتا ہے جو لائق
تجربہ کار معالج ہی نکال سکتا ہے۔

اکسیر استسقا : بریہ اکسیر استسقا کی اس قسم میں مفید ہے جس کو دبائے
سے گڑھا پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری اقسام میں مفید نہیں ہے۔
نسخہ : در سفوف سنار کی اتولہ ، لونگ اتولہ ، شہد خالص اتولہ ،

پہلی سرد ادویہ کو علیحدہ علیحدہ باریک پیس کر شہد میں ملا لیں ، پس
نیار سے ادویہ تین خوراک میں۔

ترکیب استعمال : در مریض کو دو گھنٹہ قبل از مغرب غذا کھلائیں ، پھر
شام کے وقت دوا کا تیسرا حصہ کھلا دیں ، دوا کھلانے کے بعد پانی ، غذا
اور کوئی چیز مریض کو ہرگز نہ دیں ، حتیٰ کہ صبح ہو جائے ، مریض کو رات ہی
اسہال شروع ہوں گے جو چار پانچ سے بیس تک بھی ہو جاتے ہیں ،
ان کو بند نہ کریں ، اور نہ ہی گھبرا ئیں ، مریض کو کوئی تکلیف نہ ہوگی ، اور نہ ہی
پیس گھٹے گی ، صبح تک آدھا درم جسم کا زرخ ہو چکا ہوگا ، صبح کو سوکھی روٹی
اور کباب کھانے کو دیں ، اور پینے کو گرم پانی

پھر شام سے دو گھنٹہ قبل ہی غذا کھلا کر شام کو دوسرا حصہ دوائی کا
کھلا دیں ، اس بات دست بہت کم آئیں گے ، مریض صبح کو تندرست ہوگا۔

جسم سے دم وغیرہ خارج ہو چکا ہو گا۔ صبح سوکھی روٹی اور کباب کھانے کو دیں۔ اگر ضرورت سمجھیں، تو تیسری خوراک دے دیں، ورنہ وہ خوراک ہی کافی ہیں۔ پانی کا بکثرت استعمال اور تیز چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔

پن دن کے بعد معجون خبث الحدید ۲ ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق کو وکاسنی یا کشتہ فولاد ۲ رتی دن میں دو بار ایک ہفتہ تک دیں۔ تاکہ دوبارہ مرض ٹوٹنے کا خطرہ نہ رہے۔ جو گوشت نہ کھا لیں، وہ دال اور ہر کی کھالیں ٹیکہ استسقا۔

نپٹال (NIPTAL) مقدار ایک سی سی عضلاتی ٹیکہ ہفتہ میں دو بار کریں۔

ترکیب استعمال: ٹیکہ لگانے سے پہلے ۲ گھنٹہ ۳۰ گرین ایمر نیم کلورائیڈ ہمراہ آب کھلا دیں، بعد میں بعد ایک سی سی عضلہ ٹیکہ لگائیں لیکن جس شخص کے گردے کمزور ہوں، اس کو نہ لگائیں، اور ایک سی سی سے زیادہ نہ ہو۔

ضعف عامہ اور کمزوری قلب کی صورت میں سپرٹ ایونیٹا ایرد میٹک

مسک وغیرہ بلا لیں۔ ٹیکہ لگاتے کے بعد پانی شروع ہو جائے گا، اور باسنتہ بول جسم کا تمام پانی خارج ہو جائے گا، جب پانی جسم میں خون سے علیحدہ ہو کر جسم کے کسی حصہ میں جمع ہو نے لگتا ہے، تو یہ ٹیکہ اس کو بذریعہ پیشاب خارج کر دیتا ہے۔ جسم سے پانی خارج کرنے کا ادل درجہ کا انجکشن ہے۔ جبہ ڈاکٹر دن کا معمول ہے۔

کسبیر ۲۰، ایونیم کلورائیڈ ۲۰، ۲۰ گرین، ایکٹریکٹ ٹریکسے سائی ۱۰ ڈرام، شکر حبشہ کو ۱۰ ڈرام، فیبری ایٹ ایونیٹا سائٹراس ۱۰ گرین، ایکٹریکٹ ایونیم،

ایسی ایک خوراک دن میں تین بار دیں ، پانی خارج کرنے کے بعد یہ نسخہ استعمال کرائیں۔

کی خون ، کمزوری ، استسقا ، سور القینہ ، ضعف عجز وغیرہ کے لئے

علامہ الطیب کی ، استسقا کے لئے مزدوجہ ذیل نسخہ میرا تجربہ ہے۔
 صفتہ : گند عسل ۵ ٹولہ ، تخم شبت ۲ ٹولہ ۹ ماشہ ، تربہ ،
 تخم کرنس ہر ایک ۵ ماشہ۔

سب کو تقریباً سو اسیر پانی میں جو کشش دے کر جب پانی چھٹا حصہ
 باقی رہ جائے ، تو ل چھان کر ریوند چھٹی ۲ ماشہ چھڑک کر پلائیں ،

حب استسقا ، ۱۰ ماشہ ، ناکخواہ ۳ ماشہ ، تخم اجود ، ہلدی ، زنجبیل ہر ایک
 ۴ ماشہ ، مرج سیاہ ، ہر ایک ۳ ماشہ ، ریوند عصارہ

سب کو آب برگ مدار میں کھل کر کے چھنے کے برابر گولیاں

بنالیں۔
 مقدار خوراک ایک ایک گولی دن میں تین دفع عرق کاسنی ،
 عرق کمر ، عرق بادیان ہر ایک ۵ ٹولہ ، مشربت دینار ۲ ٹولہ کے ساتھ کھلا
 دیا کریں استسقا اور سور القینہ کے لئے تجربہ ہے۔

حب صبر زرا ابوالادوم ، پوست بیلہ زرد ، اجوان ، مرج سیاہ
 بدھارا ہر ایک ایک درم ،

نام دواؤں کو کوٹ چھان کر چھنے کے برابر گولیاں بنائیں ،
 مقدار خوراک ۳ ماشہ ہمراہ عرق کاسنی دیکوہ ۵ ٹولہ کے دیں ،
 استسقا کے لئے مفید و تجربہ ہے۔

بار ایات پر اگر استسقا کے مریض کو بہانے کی حاجت ہو۔
تو کھاری نمک میں کر پانی میں ملائیں، اور پانی کو چاند روز و صوبہ میں
رکھیں۔ پھر گرم کر کے اس سے غسل کریں۔
دریائے ستور کے پانی سے بہانا بھی مفید ہے۔

استسقا کا ہومیو پیتھی علاج

استسقا سادہ، حاد اور بخار کے ساتھ ہو، تو آکونائٹ ۳۰ دیں، حاد
استسقا میں اگر پیاس بالکل نہ ہو، تو ایپس ۶ مفید ہے۔
اگر دم گردہ کے آغاز میں استسقا کی کیفیت پیدا ہو جائے
تو بھی ایپس ۶ ہی مفید ہے۔

اگر استسقا میں مریض کے پیشاب کا رنگ سرخ ہو، اور پیشاب
میں البیومن خارج ہو، اور پیاس کی بھی زیادتی ہو، اور کمزوری بھی
ساتھ ہو، تو آرسنک ۳۰ مفید ہے۔

اگر استسقا سیاہ ہو، پیشاب کم آئے، تو سیلی بورس ۳۰ دیں
پیٹ پر دم ہو، اور پیشاب رک جائے، تو اسکو بیل ۳۰ دیں۔
حکمر کی تکالیف کے استسقا کے لئے ایوساٹم کین ۵ قطرہ
اس دوا کو ذرا احتیاط سے بڑھانا چاہئے، کیونکہ ذکی الحس مریضوں کے
پر فے پیدا کر دیتا ہے۔

اگر دل کی عضوی تکالیف سے استسقا ہو، تو آرسنک آکٹوڈاٹ
۳۰ دیں، دل کے عضلات کی خرابیوں سے استسقا، نبض چھوٹی، تیز
بے قاعدہ، دم کا پھولنا، حلق یا معدے میں مثلی، فے، اسپہال ہوں،
نوسٹرو فٹس ۵ ۳۰ دیں۔

باب دہم

گروہ . مشانہ اور قضیب کی بیماریاں

RENOL COLC

درد گروہ

اینل کالک

تشخیص

و جو باستانہ در جب پتھری گروہ سے نکل کر حالت میں داخل ہوتی ہے۔
 رشتہ نشین درد رہتا ہے۔ درد کی عیس مقام گروہ سے اٹھ کر پیٹھ کی طرف
 شصہور تک جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ٹانگہ بھی چلی جاتی ہیں اور مرہن سیدھا
 نہیں چلی سکتا۔ پیشاب کے حادثات بار بار در قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پتھری در
 گروہ درد و پتھری کے اسباب میں۔

درد گروہ۔ درد شکم اور درد میں فرقی کرنا ضروری ہے۔

درد شکم میں درد ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے۔ درد کے بعد مرہن کو اکثر رقان
 ہو جاتا ہے۔ اور درد فوجی یعنی درد سے سے ہوتا ہے۔

درد شکم اور فوجی معدی میں ناف کے ارد گرد یا انٹریوں میں درد ہوتا ہے
 نفخ اور بڑھتی کی شکم ہر ت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک ۱۸ رتی ہمراہ آب تازہ ، درد گردہ کی آسان دوا تڑپتے ہوئے مریض کو صرف ایک خوراک سے آرام آ جاتا ہے۔

اگر شدت کا درد ہو تو مارفین ۲ گریں ، ارڈوپین ۱/۲ گریں کی جلدی پیکاری کریں ، فوراً آرام ہوگا ، مفید و مجرب ہے۔

ضماد تسکین :- اجوائن خراسانی ، افیون ، زعفران ، کندر ہر ایک ۳ ماشہ سفوف کر کے سفیدی بیضہ مرغ ملا کر کاغذ پر پیستر کر کے مقام درد پر لگائیں ، فوراً آرام ہوگا۔

دوائے درد گردہ :- جو کھار ، قلی سوزہ ، نوشادر ، سہاگہ ، پھٹکڑی نمک سیندھا ، مرچ میاہ ، منگ ہود ، اجوائن خراسانی ، میرا منگ ، نمک سفید ہر ایک ۲۰ گرام ، افیون ۳ ماشہ سب دواؤں کا باریک سفوف تیار کریں ،

ترکیب استعمال :- ۳ ماشہ دوائے گرم پانی سے دیں ، اور ادھر سے ۳ ماشہ بادام روغن پانی میں ملا کر دن میں تین دفعہ دیں ، درد گردہ جو پتھری یا ریت کی وجہ سے ہو سکے ، کسمیرت ، ایک خوراک سے ہی فائدہ شریع ہوئے گنتا بہت۔

درد گردہ کا ٹیکہ :- مارفین ۲ گریں ، ارڈوپین ۱/۲ گریں کی جلدی ٹیکہ کریں ترکیب استعمال :- ہر ایک ٹیکہ مارفین کی ۱/۲ گرام سفوف تیار کریں ، آگ پر گرم کریں ، ٹھنڈا ہوئے پر جلدی ٹیکہ کریں ، پانی سے ۳ ماشہ کے اندر درد گردہ ریش ہوگا ، درد رفع ہونے کے بعد آگ سے گرم کر کے استعمال کریں۔

نوٹ :- اگر اس کے بعد ۲۵ سی سی کو راجین ٹیکہ کر دیا جائے تو مارفین کے ذریعے اثرات کا خدشہ نہیں رہتا ، مگر در قلب کے مریضوں کو مارفین احتیاط سے دینی چاہیے آج کل سبائین کا تیار کردہ انجکشن ۲۵ سی سی نام سبائین ہے ۲۰ سی سی کے

ایمپولز ہوتے ہیں ، ایک ٹیکہ بچوں کا جلدی یا عضلاتی انجکشن کریں ، درد گردہ عضلات اور جگر کے لئے مفید ہے۔

کسیچر درد گردہ : پوٹاسیم بائیکارب ۲ ڈرام ، پوٹاسیم اسیٹس ۲ ڈرام ،
اسپرٹ ایٹھ ناٹرس ۲ ڈرام ، ٹینکچر ہائیکوساٹس ۲ ڈرام ، انفیوژن ایجوچارونس
یہ آٹھ خوراکیں ہیں ، ہر چوتھے گھنٹے بعد ایک خوراک پلائیں ، درد گردہ
ریگ گردہ ، پتھری کے لئے مفید ہے ۔

الفضا : ٹینکچر بیلڈونا ۱۰ منم ، اسپرٹ ایٹھ ناٹرس ۲۰ منم ، اسپرٹ کلوروفارم
۵۰ منم ، ٹینکچر ہائیکوساٹس ۲۰ منم ، لائیو مارفیا ہائیڈروکلور ۲۰ منم ، ایجوچارونس
ایسی ایک خوراک ہر تین گھنٹے بعد دیں ، شدت زد کو روکنے کے لئے بہترین
دوا ہے ، ایک خوراک سے درد بند نہ ہو ، تو دوسری خوراک پلا دیں ، گردہ کے
مقام پر ٹنگو رکھیں ، یارانی کا پلستر لگا دیں جب پلستر چھٹے گئے ، تو اتار دیں ،
درد گردہ ددر کرنے کے لئے بہترین علاج ہے ،

اگر باوجودیکہ ادویہ کے استعمال سے درد میں افادہ نہ ہو ، اور پتھری کی
علامات پائی جائیں ، تو مریض کا اکسیرے کرنا چاہئے ، اگر گردے یا مثانہ میں
بڑی پتھری دکھائی دے ، تو پریشین کرانا ہی نشانی علاج ہے ۔

RENAL CULUS

نیاکیل کیولس

گردہ کی پتھری

وجہ پائیدار تشنہ و تھکاوٹ اور عام گردہ درد ہے ، گردے سے جبکہ سخت
معلوم ہوتی ہے ،

علاج : معمولی ریگ ، ورتھری کنگ بار ، تو ادویات کے استعمال سے ہی
رفع ہوجاتی ہیں ، جب پتھری بڑی ہو جائے ، جس کا صحیح پتہ اکسیرے سے ہی
ہو سکتا ہے ، اس وقت پریشین کرانا ہی اس کا نشانی علاج ہے ۔

مندرجہ ذیل نسخہ جات معمولی پتھری، رنگ اور کنکریوں کے لئے مفید و تجربہ ہیں۔
 امروسیا، بر قلمی شوزہ ایک پاؤ، نوشادر ویسی ۵ تولہ، سہراگ سفید ۵ تولہ
 سنگ بودہ ۵ تولہ، پوست ریچھا ۲ عدد، جوکار ۵ تولہ، بھلا نوسے ۱۰ تولہ،

ترکیب ساخت : بھلا نوسے کے سوا جملہ ادویہ کو علودہ علودہ باریک
 کر دیں، قلمی شوزہ کو برسنی کڑا ہی میں ڈال کر چوٹے پر رکھیں جب پھل جائے
 تو نوشادر ڈال دیں، اسی طرح بکے بعد دیگرے تمام ادویہ ڈال دیں، آخر
 میں بھلا نوسے ایک ڈالیں، تاکہ اس کو آگ لگ جائے، ایک بعد دیگرے تمام
 بھلا نوسے ختم کر دیں، جب تمام بھلا نوسے جل جائیں، پتھر بہت سرد ہونے
 پر پیس کر محفوظ رکھیں۔

مقدار خود ایک دراق تا ۲ دراقی بھراہ آب یا بدرقہ مناسبہ دن میں تین
 بار دیں، تمام جسمانی امراض کے لئے واحد دوا ہے، سنگ گردہ، ششانہ، مرارہ
 علامت جگر اور آب تلی کو زایل کرنے کی یقینی دوا ہے نیز وزم غصہ قدیمہ،
 بندشش بول، دود گردہ ریخی کے لئے تیار ہے۔

نسوانی عوارضات مثلاً وزم رحم، اشتقاق رحم، بملایت رحم، بندشش
 حیف کو زفع کرنے میں کثیر ہے۔

بچوں کی امراض مثلاً ام المعبیان، سوکھا چمڑا، ذبہ وغیرہ امراض میں
 شیر مادر میں پانی مل کر کے پلانا اشد مفید ہے۔

امراض اشتقاقی، سمبہ اور اس کے عوارضات کے لئے اہمال روکنے
 کے لئے ہمدانہ کنبین یا عرز پر دہنہ استعمال کرنا شایع علاج ہے۔
 جلدی امراض مثلاً داد، چنیل، پھوڑا، بھنسی، گینگ وغیرہ کے لئے
 روغن سرسوں میں ملا کر مالش کریں۔

تہ یا ق مثانہ، سنگ بہ باقی، تولہ کشتہ سنگ بودہ ۲ تولہ، قلمی شوزہ ۲ تولہ

نمک مولی اتولہ . اظفار الطیب ۲ تولہ . تمام دواؤں کو علحدہ علحدہ بار یک پس کر ملا لیں .
 مقدار خوراک : ۱ ماہ ۲ تا ۲ ماہ صبح و شام مندرجہ ذیل سردائی سے دیں
 تخم خر بوزہ ۲ ماہ . تخم خیارین ۵ ماہ . سولف ۲ ماہ . تخم کھجور ۳ ماہ .
 تخم کاسنی ۵ ماہ . پتھر کی کوئٹی میں گھوٹ کر بمقدار مناسب پانی ملا کر دوائی
 مندرجہ بالا دیں . پتھری . کنکر مثانہ . احتباس بول اور دیگر امراض مثانہ کا
 تریاق ہے . ایک مہینہ تا ۲ مہینہ استعمال کریں .

کشتہ حجر الیہود : حجر الیہود ۵ تولہ . سنگ سرماہی ۳ تولہ . سنگ لاجورد
 ۲ تولہ . سنگ مقناطیس ۵ تولہ . سنگ راسخ ۲ تولہ .
 سب کو شیرہ ٹھیکر ایک پاؤ میں کھل کر کے ٹکیہ بنائیں . اور دس سیر
 ادویوں کی آگ دیں . دس آگ پوری کریں . بس تیار ہے .

مقدار خوراک : ۱ رتی تا ۲ رتی ہمراہ آب . درد گردہ جو پتھری کے
 باعث ہو . فوراً رفع ہو جاتا ہے . ریگ گردہ و مثانہ کے لئے اکسیر الازہ ہے .
 اول درجہ کا پتھری توڑ ہے
 دفوٹ : تا حال ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی . جو پتھری کو مکمل طور پر
 خارج کر دے . اور اپریشن کی ضرورت نہ ہے .

NEPHRETIS

(نفرائٹس)

ورم گردہ

تعریف : ورم گردہ کی دو قسمیں ہیں . ۱ . شدید ورم گردہ اور ۲ . پرانا ورم گردہ
 اس مریض میں پیشاب کے ساتھ البیومن خارج ہوتا ہے .
 وجوہات : جسم میں خون و صفرا کی زیادتی . پتھری کا پیدا ہونا . گردے کے

مقام پر چوٹ لگنا، کثرت شراب خوری، میٹھی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا، مرض نفرس، خرابی جگر، آشک، سل، چھک، خناق، ربائی، سخت سردی لگنا، خراش کن بیماریات کا کثرت سے استعمال، تیلی نکھی، کاربالک ایسڈ کا کھا جانا وغیرہ اس کے وجوہات ہیں۔

تشخیص گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، اور اس سے نوشادر کی بو آتی ہے، جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے، تو پیشاب کے ساتھ پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے، جب یہ مرض سردی سے ہوتا ہے، تو جلد ہی تمام بدن سوج جاتا ہے، کمر میں درد اور بوجھ معلوم ہوتا ہے، اگر مرض کے ساتھ ٹیوینا ہو جائے، تو اکثر موت واقع ہو جاتی ہے، اگر سردی گریے مبتلائے مرض ہو جائیں، تو مرض استسقا ہو جاتا ہے، تمام جسم کی سوجن کے علاوہ چہرہ اور پونے سوج جاتے ہیں۔

اصول علاج پینہ لانے کی کوشش کریں جس کے لئے پینہ اور ادویات کا استعمال کریں، منشیات سے پرہیز کریں، اگر کمی خون سے ہو، تو فولاد کے مرکبات استعمال کریں، گردوں کو عاف کرنے کے لئے ہلکی پیشاب اور ادویات دیں، مریض کو گرم کپڑے پہنا کر گرم مکان میں گرم بستر پر رکھیں، شدید حالات میں سوائے دودھ کے اور کوئی خوراک نہ دیں، دودھ میں اگر دانہ ملا کر بھی کھلا سکتے ہیں، مخزش غذا، انڈا، گوشت، شراب سے قطعاً پرہیز کریں، کمر میں درد ہونے کی صورت میں سینک کریں۔

بناوٹ البرور: مخز تخم خربوزہ ۵ ماشہ، مخز تخم نیارب ۵ ماشہ، مخز تخم کدوئے شیریں ۳ ماشہ، بذر البیج ۳ ماشہ، تخم کرفس ۳ ماشہ، تخم خرفہ ۲ ماشہ، تخم خطمی ۳ ماشہ، مخز بادام مقشر ۳ دانہ، گوند کثیر ۳ ماشہ، بست بلخی ۲ ماشہ

گیل اومنی سہ ماہیہ . تخم خشخاش ۳ ماشہ . سب کو پانی میں پیس کر لعاب بھی دانہ
بقدر حاجت ڈال کر دو ماہیہ کی مقدار کے قرص تیار کریں .

مقدار خوراک : ۲ قرص ہمراہ عرق سولاف دگاؤ زبان ۱۰ تولہ دیں .

دن میں تین یا چار خوراک دیں . دم گرم گروہ . قروح گروہ . مثانہ حرقت البول .
اور عسر البول کے لئے نہایت مفید و مجرب ہے .

نسخہ : پوٹاسیم سائٹریس ۳ گرین . پوٹاسیم بائیکارب ۵۰ گرین . پانی
ایک ادیس . ایسی ایک خوراک ہر چوتھے گھنٹے بعد پلا دیں .

گروہوں کو صاف کرنے اور ہلکا رکھنے کے لئے یہ نسخہ بے حد مفید
و مجرب ہے . دم گرم گروہ کے مریض کو یہ نسخہ ضرور استعمال کرنا چاہئے .

دم گرم گروہ کے علاج میں تیز پیشاب آور ادویات استعمال نہیں
کرنی چاہئیں . جب یہ مرض پرانا ہو جائے . تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا .

جب مرض میں تخفیف ہو جائے . تو تقویت کی کوشش کرنی چاہئے .

جس کے لئے سمیرپ آفٹ مہیوہ گلوہین اڈرام فی خوراک دن میں تین بار
دینا چاہئے . کمی خون کی صورت میں کسٹھنٹہ فولاد پے رتی . و دوا انگسک .

۶ ماشہ میں ملا کر کھلائیں اور میٹامین ۲۵۰ ملے گرم کا انجکشن لگائیں .
کمی خون رفع ہو کر تقویت ہو جائے گی .

نوٹ : پیرہ کا تھج یعنی ہو جانا ہونا . پیشاب کا کم مقدار میں آنا

اور اس میں البیومن کا خارج ہونا دہم زدہ کی صحیح علامت ہے .

اس مریض کے علاج میں گرمیوں کو آرام دینا . گرم ٹھکر کرنا

سپینہ نا اور منشیات سے پرہیز کرنا شفا یابی کا ضامن ہے .

ہینہ ہینہ ہینہ ہینہ

ضعف گردہ

وجوہات ہر دم گردہ کثرت جماع، اندوں کا زیادہ استعمال، گھوڑے کی سواری، سل اور عصبی امراض، جگر کا مزاج ناسد ہو جانا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

تشخیص: ہر اس مرض میں پیشاب کی بار بار حاجت ملتی ہے مگر میں حتم گردہ پر درد ہوتا ہے، درد سر، پسینہ کا کھانا کبھی اسہال اور کبھی قبض ہو جاتی ہے، پیشاب میں اندے کی زردی کی مانند مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردے کمزور ہو کر ضعف باہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بغیر حاجت کے پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔

علاج: اصل سبب کو دریافت کر کے اس کا اندیک کریں، جماع سے پرہیز کریں، اگر تب شروع میں البومین آئے سنگ تڑھکارت اور کمزوری دور ہو جائے سے مرمتی خود بخود رفع ہو جاتی ہے، ضعف عصبی کی وجہ سے ہو تو حسب ثن ب رہبرین استعمال کریں۔

معجون برائے ضعف گردہ: در مغز اخروہ، برباں، مغز بادام شیریں، مغز فندق، مغز جالغوزہ، مغز چودنی، براک، تولہ تولہ، باجھڑ، اساروں، جہ زبوا، کھنڈ مقشر، سورجیاں شیریں، جہانیاں، نم، بیدار، انار، دارچین، براک، ماش، لوزری، سرخ، سفید، عطران، زبانی، لوز، تخم بیون، براک، ماش، مغز نارنگی، ماش، سدا جنت، ملی، ماش، سب کو خوب باریک کر کے تین گنا نشہ شامل کر کے معجون بنا لیں۔

مقدار خوراک : ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام ۶ ماشہ سیر و دودھ کے ساتھ
 کھائیں۔ گردوں کو مضبوط بناتی اور تمام اعضا کو خوب طاقت دیتی ہے۔
 اکسیر سنگ گردہ : ۱۰ تلی شوره ۵ تولہ ، نوشادر ۱ تولہ
 سہاگہ ۱ تولہ ، جو کھار ۱ تولہ ، سنگ یہود ۲ تولہ ، پوست بھجڑ ۳ عدد
 بھلا نودہ ۱۲ عدد۔

ادل شوره کو کسی کڑا ہی میں پگھلا لیں۔ پھر اس شورے میں ایک
 ایک بھلا نودہ ڈال کر جلاتے جائیں۔ جب چھ بھلا نودے ختم ہو جائیں ، تو
 تمام دواؤں کو باریک پیس کر ملا لیں۔ اور باقی ماندہ بھلا نودے بھی حسب
 سابق جلا لیں۔ دوا خاکستری رنگ کی تیار ہوگی۔ یاد رہے کہ آگ بہت
 تیز جلاتی پڑے گی۔

مقدار خوراک : ایک ایک رتی دن میں دو بار کھلائیں ہمراہ شربت
 بزوری یا سادہ شربت۔ ہر ماہ ایک مہینہ استعمال کریں۔ گردہ و مثانہ کی
 پتھری نکالنے کے لئے اکسیر ہے۔ درد گردہ اور ضعف گردہ کے لئے بھی
 اکسیر ہے۔

درد گردہ کے لئے چار گزین اینین ہمراہ شامل کریں۔ صرف ایک دو
 خوراک کافی ہوتی ہیں۔
 سفوف حجر الیہود : ۱۰ حجر الیہود ۳ تولہ ، مغز تخم خرفہ ، خبیارین
 گو کھرو ہر ایک ۲ تولہ ، بادیان ، تخم کرمنس ، مہندی ، صمغ عربی ہر ایک ۱ تولہ
 تمام آردیہ کو کوٹ چھان کر سفوف تیار کریں۔

مقدار خوراک : ۳ ماشہ ہمراہ جو شانہ نخود دیں۔ سنگ گردہ ، سنگ مثانہ
 ضعف گردہ کے لئے اکسیر ہے۔

خونی پیشاب آنا

HAEMATURIA

ہیمے ٹوریا

تعریف : اس مرض میں پیشاب کے ساتھ خون مل کر آتا ہے۔
 وجوہات : گردہ اور مثانہ میں پتھری پیدا ہو جانا، درم گردہ، گرم چیزوں کا
 کثرت سے استعمال کرنا، مرض سکروی اور چیچک، بواسیر کے خون کا بند ہو جانا، زلی
 صدمات، کبھی عورتوں میں حیض کے رک جانے پر خون آمیز پیشاب آنا شروع
 ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اور تارپین کے تیل کے استعمال سے بھی خونی پیشاب آنے لگتا
 تشخص : کبھی خالص خون آتا ہے، اور کبھی پیشاب کے آگے یا پیچھے آتا
 ہے۔ سردی کی وجہ سے خونی پیشاب آنے پر مریض کو پہلے سردی لگتی ہے
 پھر خون آمیز پیشاب آتا ہے جب گردوں سے خون آتا ہے، تو گرم گردوں
 کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے، اور خون پیشاب سے پہلے آتا ہے، خون کا
 رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔

علاج : اس مرض کا علاج کرنے سے پہلے عمل سبب مرض کو معلوم
 کریں سبب معلوم ہونے کے بعد علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے مریض کو آرام سے
 بستر لیٹائیں، اگر مرض سردی کی وجہ سے ہو، تو سردی سے بچائیں، اور گرم چائے
 پلائیں، اگر چوٹ لگنے سے ہو، تو آرنیکا ۳۰ کی ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں،
 اور تینے مہیس ۳۰ کی ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں، گردہ کے مقام پر برف لگائیں
 یا سرد پانی میں کپڑا تڑکے رکھیں۔

دو آئے خون بند : کینڈیو ایکسٹ ۲۰ گرین، ایسی ایک ایک خوراک دن
 میں چار مرتبہ دیں، خون بند کرنے کے لئے مفید ہے۔

خون بند کرنے کا ٹیکہ : لائیواریڈین لین بیلا طاقت کا سولوشن

مقدار، اتم، جلدی انجکشن کریں، ۱۰ قطرے دوائی مذکور کے پانی میں ملا کر تین
تین گھنٹہ بعد پلا تے رہیں، خون بند کرنے کے لئے مفید و مجرب ہے،
سفوف حالبس، برکشتہ سنگ جراح، پھٹکڑی بریاں ہر ایک مساوی وزن
لے کر ہر ایک سفوف کر لیں، مقدار خوراک ایک ماشہ ہمراہ شربت انجبار ۳ تولہ اور
دودھ کی تسی میں ملا کر دیں، بخولی پیشاب کو روکنے کے لئے مفید و مجرب ہے
چٹکلا لول الدم، ۲۰ لودھ پٹھانی ۵ تولہ سفوف تیار کر لیں، مقدار خوراک ماشہ
شربت انجبار کے ساتھ دیں، دن میں چار مرتبہ خون بند کرنے میں مفید ہے،
شحنہ لول الدم، برکشتہ بارہ سنگ ۲ رتی، کثیرا ایک ماشہ، اسی ایک ایک
خوراک دن میں تین بار دیں، بول الدم کے لئے مفید ہے،

پیشاب کا بند ہو جانا

تضرعیت، اس میں پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے یا قطرہ قطرہ آتا ہے،
وجوہ است و تشخیص، ہر پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، اور رگ رگ
کر آتا ہے، پیشاب کی دھار بار بار ہو جاتی ہے، پراسیڈرٹ کے بڑھ جانے،
پخیزی، یا انالی میں رکاوٹ ہونے سے پیشاب بند ہو جاتا ہے،
علاج، ہر مریض کے نشان پر گرم پانی کا ٹریڈ دیں، فوراً پیشاب جاری
ہوگا، مولی کا نمک دیں، اگر نہ ملے، تو مولیوں کو کورٹ کر پانی نکال لیں، مقدار
۳ تولہ در تین دفعہ پلائیں، پیشاب کھولنے کے لئے عجیب الاثر دوا ہے،
اگر ان تدابیر سے کام نہ لیجے، تو اس لئے کھینچ لیٹ سلائی سے پیشاب خارج کر دیں،
اس لئے کھینچنے سے پیشاب نکالنے کا طریقہ، براہ اول، آنہ کھینچ کر گرم پانی میں
حمام کر لیں، اور کھینچنے میں شکر کر لیں، پھر مریض کو چیت لٹا کر اسے کہیں کہ

پیشاب کا پیدائہ ہونا

ISCHURIA

(اس کیوریہا)

تعریف : اس مرض میں پیشاب پیدا ہونے کی بجائے خون میں جذب ہو کر نشیج پیدا کر دیتا ہے۔

وجوہات و تشخیص : پیشاب میں البیومن آنا، دم گروہ وغیرہ اس کے وجوہات ہیں۔ اگر پیشاب کی نالی میں کینچر داخل کر کے مشائے تک داخل کی جائے تو پیشاب بالکل ہی نہیں نکلتا، مگر اور سر میں پھوڑا پھوڑا درد ہوتا ہے۔ پیشاب کا زرخون میں جذب ہو جانا ہے۔ مریض پر نشیج اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اس مرض سے مریض کا بچنا مشکل ہے۔ مریض تین چار روز میں مر جاتا ہے۔

علاج : مریض کے دواں گردوں پر سرد و جانب ٹلاس لگا لیں، رطبی بوتل کے ذریعے سینگ دیں گرم پانی میں بٹھائیں اس میں کوئی تیز درد دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔

پیشاب پیدائش کا دوا بھی انجکشن کریں۔ رفع قنبض کے لئے

کیوریل یا گلیٹیشیا یا کیراسین یا ہلاب دیں

یاد رہے کہ اس مرض میں پیشاب کے نہ آنے سے مریض کو ابتدا میں بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ گردے پیشاب کو بالکل پیدا ہی نہیں کرتے۔

دیابیطس

DIA BETES

(ڈیٹس یا بیٹس)

وجوہات و تشخیص : اس مرض میں پیشاب کے اندر شکر بہت خارج ہوتی ہے۔ پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے، پیاس اور بھوک زیادہ لگتی ہے،

جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، مردوں میں قوت باہ زایل ہو جاتی ہے، اور عورتوں میں حصص آنا بند ہو جاتا ہے، جسم پر پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مریض کے پیشاب پر کڑے کھوڑے جمع ہو جاتے ہیں، پیشاب کی بو گھاس کی مانند ہوتی ہے، خون میں شکر کی مقدار فی ہزار میں ایک یا دو یا تھوڑا حصہ کی بجائے دو یا تین فی صد ہو جاتی ہے، اور پیشاب کا وزن مخصوص ۱.۰۲۵ سے ۱.۰۷۰ تک ہو جاتا ہے، اس مرض کے زیادہ دیر تک رہنے سے دم گردہ ہو جاتا ہے، اور پیشاب میں البیومن بھی خارج ہونے لگتی ہے، اور شدید حالتوں میں غشی ہو جاتی ہے، جسے ذیابیطس تو ما کہتے ہیں، اگر ذیابیطس کے مریض کے جسم پر زخم ہو جائے تو جلدی تندرست ہونے میں نہیں آتا،

علاج: ذیابیطس کے مریض کو میٹھی غذاؤں سے مکمل پرہیز کرنا لازمی ہے، سبز تقزیع کرنا، نگار و تردد سے آزاد رہنا، دماغی محنت سے مکمل پرہیز کرنا، روزانہ خانا معمولی ورزش کش کرنا بہت مفید ہے۔

اکسیر ذیابیطس عارضی اور اولی مریض ذیابیطس کے پیشاب کے امتحان کرنا ضروری ہے، پیشاب کے امتحان کے بعد سبز تقزیع کرنا چاہیے، البیومن سو لیو بل جاتا، ایسٹ، شکر کی مقدار کے مطابق غذا اٹھانے کے آدھ گھنٹہ پہلے جلدی ٹیکہ کرنا چاہیے۔

اگر بیمار لگائے کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے، اور دل دھڑکنے لگے، تو فوراً ایسی شکر یا کھانڈ کا شربت یا کارکوس ایک اونس پانی میں ملا کر پلانا چاہیے، اس علاج سے شکر آتی بند ہو جاتی ہے اور تمام علامات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ علاج عارضی ہے اور تمام مریضوں کو پلانا پڑتا ہے۔

ذیابیطس کے مریض کے لئے جامن کا کھانا ہے، مفید ہے، کچا انار

بھی اس مرض کے لئے مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریض اکثر قبض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مناسب عینات اور معتدل حقنوں سے قبض رفع کرنی چاہئے۔

ذیابیطس کا ہومیوپیتھی علاج

اگر صاف پیشاب زیادہ مقدار میں آئے، اور اس میں شکر کی آمیزش نہ ہو تو سکر کلا ۳۰ برٹین گھنٹہ بعد خوراک دیں۔ اگر پیشاب کی زیادتی زیادہ تر رات کے وقت ہو تو فاسفورک ایسڈ ۱۲ برٹین گھنٹہ بعد دیں۔ اگر ان ادویہ سے فائدہ نہ ہو تو میورکس ۶ یا یورینم ۳۰ - ۲۰۰ دیں۔

اگر پیشاب کی زیادتی کے ساتھ شکر بھی موجود ہو، اور یہ شکایت اعصابی خوابوں سے ہو تو فاسفورک ایسڈ ۱۲ - ۳۰ سر آٹھ گھنٹہ بعد دیتے رہیں۔ اگر باطن کی خوابوں سے ہو تو یورینم ٹریٹ ۳۰ - ۲۰ دیں۔ اگر اس کے ساتھ تشنہ پریشانی ہو تو ارنیم ٹریٹ ۳۰ دیں۔ اگر بے چینی، کمزوری اور جلد میں اکسما ہو تو کرڈیم ۶ گھنٹہ سے اگر مرض ہو تو ٹریٹم سلفٹ ۲، اگر چوٹ لگنے سے ہو تو ہرنیکا ۳ مفید ہوگا۔ اگر یہ ادویہ ناکام رہیں تو سالیسیا ۳ دیں۔ اگر ذیابیطس کے ساتھ غلغلہ ہو تو ارنیم ۳۰ دیں۔

نوٹ: اس مرض میں غذائے خالص خیران رکھنا چاہئے۔


انڈوں کا اسے خیران بہت حد تک مفید ثابت ہوتا ہے۔

اگر کسی خواہش سے انڈے نہ کھائے جاسکیں تو ان

کی جگہ بادام استعمال کریں۔ شکر کا استعمال بالکل موقوف

کر دیں۔ دودھ، کھن اور دیگر معوی غذائیں استعمال کریں۔

(۳) پچھلے حصہ جسم میں دردوں کے مقامات



تغی (۴)
درم
نکاد

(۵) هر
مقد
تغی
پی کی
(۶) هر
(۷) هر

تغی
پی کی
تغی
پی کی

سوزاک GONORRHOEA گنوریا

بہات و تشخص یہ ایک متعدی مرض ہے جو گونوکا کل بکٹیریا جراثیم
 ل سے پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں زخم ہو جاتا ہے۔ خون اور
 آنا شروع ہو جاتا ہے۔

ابتدا میں نائزہ کے سرے پر خواش ہوئی ہے۔ پھر درد ہونا شروع ہو
 ہے۔ اور پیشاب چیر کر درد سے آتا ہے۔ اس مرض کے عموماً چار درجے
 میں۔

درجہ اول اس کا دودھ آٹھ پہرے سے دو دن تک رہتا ہے۔ صرف نائزہ
 سے پر خواش اور کچھ رستی کی مانند پانی خارج ہوتا ہے۔
 درجہ دوم اس میں سرخی دم پیشاب کے نئے وقت خون آنا اور خواش
 ہوتا ہے۔

درجہ سوم اس درجہ میں پیشاب کرنے وقت تکلیف کم ہوتی ہے۔
 نکلتی ہے۔

درجہ چہارم (فقرہ) اس میں زخم پرانا ہو جاتا ہے۔ اور پیپ خارج ہوتی
 تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مرض اس درجہ میں پہنچ جاتا ہے
 بچیا نہیں چھوڑتا جب تک مکمل علاج نہ کرایا جائے۔

بازاری عورتوں۔ حائفہ۔ لیکوریا والی عورت کے ساتھ جماع
 ات شراب خوری۔ گرم مصالح یا دیگر گرم اشیاء کے
 سے ہو جاتا ہے۔

ن
 ہ
 درد

سی
 برہ

سے
 مارا
 نہ اس
 میں

بشن مریخ
 بائے گا۔

علاج : طب جدید نے سوزاک کے علاج میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اگر مریض وقت پر آجائے تو بیماری چند گھنٹوں کے اندر رفع ہو جاتی ہے۔

حملہ ادویہ قدیم و جدید سے سلفا گروپ، انٹی بائیوٹک میڈیسن پینسلین، آریو مائی ٹسین، سٹریپٹو مائی سین سوزاک کا سب سے بہترین اور نشانی علاج ہے۔

سوزاک کی گولیاں - رسیازول یا ایم بی ۶۰ (۷۰) مقدار خوراک ۴ ٹیکہ، پھر تین گھنٹہ بعد ۲ ٹیکہ پانی کے ساتھ فوائد: برسنے والے سوزاک کا بحرب علاج ہے۔ سوزاک کے جراثیم کو مارتی ہیں۔ علاوہ ازیں نمونہ، ذات الحجب، ڈیہ اطفال، پیچش، سرسام، خون کی خرابی، کان بہنا، پھوڑے، بھنسی نکلنا، سوزش غده تدامیہ سوزش اعضائے تناسلی مردانہ و زنانہ، پیٹ کی متعدد بیماریاں، خانی انفلوئنزا و بانی، بچوں کے جسم پر چھالے نکلنا، میزوز (خسرہ) کالی، عاثنی پر سوتی بخار وغیرہ کے لئے نشانی علاج ہے، نہایت مفید بحرب ہے۔ سرانگیزی و داخلہ دوش سے دستیاب ہو سکتی ہے۔

ایم بی ۶۰ ۷۰ : ہر مقدار خوراک ایک گولی سے دو گولی دن میں تین بار ہمراہ آب تازہ۔

مرض سوزاک، نمونہ کے ہر قسم کے عوارضات کا ازالہ کرتی ہے بحرب ہے ایم بی ۶۰ ۷۰ بھی سوزاک کو دور کرتی ہے، مقدار خوراک ایک گولی دن میں چار بار ہمراہ آب۔

نوٹ: سلفو ٹیما بیڈ کے مرکبات کے دوران استعمال میں پانی کثرت سے استعمال کرنا چاہئے۔

مکسچر سوزاک : آئیل صندل منم، آئیل کوہے با، منم، پوٹاسیم پائیکارب
 ۲۰ گریں، میگزے مین ۵ گریں، مکسچر بیلڈ ڈونا ۵ منم، مکسچر پائیکارب ۵ منم،
 ایجوکیمفر ایک ادلس۔

ایسی ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں، پر اسے سے پرانا سوزاک
 ایک مہینہ کے استعمال سے دور ہو کر شفا ہو جاتی ہے۔
 اکتسیر سوزاک : علاج باکیمیا نے جہاں انسان کو دیگر تباہ کن امراض سے
 نجات دلائی ہے، وہاں انسان کے بدترین دشمن مرض سوزاک کا بھی علاج
 کر دیا ہے۔ اور عصر حاضر میں ایسی ایجادات پیش کی ہیں جن کے استعمال سے
 سوزاک کی جلد علامات رفع ہو جاتی ہیں، اور مرض ہمیشہ کے لئے قیمت و نابود
 ہو جاتا ہے۔ نسخہ یہ ہے۔

پینسلین پانچ لاکھ یونٹ، ڈسٹلڈ واٹر پانچ سی سی، انجکشن سرنج سے
 ڈسٹلڈ واٹر کو پینسلین کی ٹیوب میں داخل کریں، سلوشن تیار ہو جائے گا۔
 صبح و شام ۵ لاکھ یونٹ سلوشن کا ایک عضلاتی انجکشن کریں، ایک ہی
 دن میں تمام علامات دور، جین، پیشاب کا جلن سے آنا، سیریکٹ آنا وغیرہ
 دور ہو جائے گا، مرض سوزاک کے لئے اعجاز مسمائی ہے، تجربہ شدہ ہے۔
 تریاق سوزاک : یہ وہ نسخہ ہے، جس کے ایک دفعہ کے استعمال سے
 ہی سوزاک جیسی موزی مرض رفع ہو جاتی ہے، نہایت کم قیمت ہے، ہمارا
 صدیقی راز ہے، جو ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اس
 کو بنا کر خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں، اور مولف کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔
 نسخہ مبارک یہ ہے۔

ڈالی بائسٹروٹروپائی سین اگر ام، ڈسٹلڈ واٹر پانچ سی سی، انجکشن سرنج
 سے ڈسٹلڈ واٹر کو سٹروٹروپائی سین کی شیشی میں داخل کریں، محلول تیار ہو جائے گا۔

ایک دفعہ ہی پانچ سی سی کا عضلاتی انجکشن کر دیں، شاید ہی کسی مریض کو دوبارہ انجکشن کی ضرورت پڑے۔ ورنہ پہلے انجکشن سے ہی سوزاک کے جلد علامات پیشاب کی حین، خون اور پیرپ کا آنا، درد، تشنگی بول، سوزش وغیرہ رفع ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں دفعہ کا تجربہ شدہ اور معمول مطلب ہے۔

سوزاک کی گولسٹاں :- جراثیمی دریافت کے بعد جب یہ معلوم ہو گیا کہ سوزاک بھی جراثیمی مرض ہے، اور یہ مرض گوڈ کا کل جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، تو ندرت نے ان جراثیموں کو نسبت دنا بود کرنے کے لئے سلفا ڈرگس کی طرف رہنمائی کی چنانچہ سلفا ڈرگس سے ایک مرکب جو سوزاک کے جراثیم کو تباہ کرنے میں اہم ٹیم کی حیثیت رکھتا ہے، سلفا ڈایازین ہے۔

مقدار خوراک دو ٹکیہ سرچو پتھے گھنٹے بعد، سات بجے صبح سے گیارہ بجے رات تک پانچ دن تک جاری رکھیں، اس سے سوزاک کی جلد علامات پیشاب کی حین، درد، خون اور پیرپ کا آنا، زخم وغیرہ دو دن میں ہی موقوف ہو جاتی ہیں اور سوزاک پیرپ کرنے والے جراثیم کا قلع قمع کر دیتی ہیں۔

(نوٹ، سلفا ڈایازین کے علاوہ سبازول ایم بی ۴۰، سلفا پیراڈین ایم بی ۶۲، سلفا ٹرائیڈ، جن کی مقدار خوراک دو ٹکیہ سرچو پتھے گھنٹے بعد پانی کے ساتھ دیں، ابتدائی سوزاک جبکہ قرعہ رستر کچرا نہ ہو، اکسیر کا حکم رکھتی ہیں، دو دن میں ہی تمام علامات میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے، چار دن میں مکمل آرام آ جاتا ہے۔

سلفا ڈرگس کے دوران استعمال میں پانی خوب پلانا چاہئے، گوشت گرم گرم مصالح اور گندھک کے اجزاء سے پرہیز لازمی ہے، غذا زود مضام کھڑی چا دل، دودھ، دال مونگ، مچھلیکا سے دیں، اگر قرعہ رستر کچرا ہو، تو پھکاری دال، نسخہ استعمال کریں، اس سے قرعہ وغیرہ ختم ہو جائے گا۔

پچکاری سوزاک : رشادوناور ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو بہت پرانا
سوزاک ہوتا ہے اور پیشاب کی نالی میں سڑکھڑکھڑا قرحہ بن جاتا ہے اور سرم
کی مجرب ادویہ کے استعمال سے بھی پیپ وغیرہ بند نہیں ہوتی، اسی حالت میں
زخم کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ پچکاری کے لئے کئی ایک ادویہ
مثلاً سلور نائٹریٹ، نیڈہ حقو حقہ، پوٹاشیم پرمنگنیٹ، زنک سلفاس وغیرہ
بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ نسخہ مزار ہا دفعہ کا تجربہ شدہ ہے جس کے دو دن
کے استعمال سے پرانے سے پرانا قرحہ رفع ہو جاتا ہے، نسخہ یہ ہے۔

مردہ سنگ ۲ تولہ، پھٹکڑی بریاں ۲ تولہ، رسونت ۲ تولہ، نمبر سیاہ

۲ تولہ، نیڈہ حقو حقہ بریاں ۳ ماشہ، کھنڈ سفید ۲ تولہ، رسکپور ۴ ماشہ،

جملہ ادویہ کو نہایت باریک پس پس کر بالکل ملائم ہو جائیں۔

ترکیب استعمال : ۲ ماشہ دوائی دسی کے تازہ پانی میں ملا کر پچکاری کریں

دن میں دو تین بار یہی عمل کریں، دو تین دن کے اندر سخت سے سخت

پرانے سے پرانا سوزاک و قرحہ رفع و دفع ہو جائے گا، معمول مطلب ہے۔

شعوف قرحہ مفیدی : رگوگرد اتولہ، شورو قلمی ۲ تولہ، زرنج سرخ اتولہ،

چونہ قلمی ۸ تولہ، معدوق صادق اتولہ، سم الغار سفید اتولہ، سہاگہ چوکیا، اتولہ،

پھٹکڑی ۲ تولہ۔

سب کو نہایت باریک مثل غبار کے پس چھان کر دوسرے عرق گھیکوار

میں کھل کریں، اور گل حکمت کر کے ۵ بیر یا چک صحرائی کئی آگ میں

پھونک دیں، بعد سرد ہو جانے کے نکال کر پس کر تحفظت شیشی میں رکھیں،

مقدار خوراک : ۱۲ رتی سے ایک رتی تک ہمراہ بالائی، غذا مرغین۔

فوائد : اس دوا سے کسی قدر گرمی ضرور محسوس ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی سوزاک

کیوں نہ ہو بفضلہ تعالیٰ قطعاً جاتا رہتا ہے اور مقوی باہ بھی ہے۔

کشتہ قلعی بر قلعی ۲ تولہ، شورہ قلعی ۱۰ تولہ

کوزہ گلی میں بند کر کے بیس میراپلہ کی آج دیں کشتہ ہو جائے گا،
پیس کر محفوظ رکھیں

مقدار خوراک ۲ رتی ہمراہ کھن دن میں تین خوراک، سوزاک کیلئے سجد سفید ہے
اکسیر سوزاک بر قلعی شورہ ۲ تولہ، گندھک آملہ سارا تولہ، منتقل اتولہ،

سم الفار سفید ۳ ماشہ، سہاگہ اتولہ، بھٹکڑی ۲ تولہ کشتہ صدف اتولہ،
سب دواؤں کو عرق گھیکوار اور آب کیلہ میں باری باری کھل کر کے
ٹمکیہ بنا کر خشک کر کے ۵ سیرادیلہ کی آگ دیں،

مقدار خوراک ۳ رتی کیت شول میں کھلائیں، ادیر سے زیرہ سفید
گھوٹ کر پلائیں، مزمن سوزاک کے لئے اکسیری دوا ہے،

دو اے سوزاک یک روزہ، روغن صندل، الچی سبز، یوبان کوڑیہ ہر ایک
چھ ماشہ، تخم بھنگ ۳ ماشہ، جملہ ادویہ کوٹ کر باہم ملا لیں، یہ ایک خوراک ہے،

ترکیب استعمال بر اول مریض کو تقریباً ایک پاؤ گوشت حسن میں خوب
مرچ، مصارح اور گھی ڈال کر پکا یا گیا ہو، کھلائیں، یہاں تک کہ جسم کو گرمی کی
محسوس ہونے لگے، اور بدن میں سرطکن معلوم ہو، یہ ایک خوراک شرمین
بزوری یا پانی سے ایک ہی دفعہ کھلا دیں، انشاء اللہ ایک خوراک سے ہی آرام
ہو جائے گا، اگر کچھ کسر باقی رہ جائے، تو ایک دن کا دفعہ دے کر دوسری
خوراک دیں، (ہذا من العجب العجائب)

اکسیر سوزاک بر یہ ایک ایسا راز ہے جس کے افشا کو دل نہ چاہتا تھا،
لیکن قلعی دنیا میں بخل شکنی ہمارا طرہ انشاء ہے، یہ دوائی منہ کے ذریعہ
استعمال کی جاتی ہے، اور چند روزہ استعمال سے مرض سوزاک نیست و نابود

ہو جاتا ہے، (م ہو ہذا)

دسکپور اتولہ، مشک کا فور اصلی ۲ تولہ، دونوں کو باجم کھل کر کے یکجان کر لیں اور ایک میٹ کے پیالے میں ڈال کر دوسرے پیالے کے لب اس کے اوپر جوڑ دیں اور مضبوط سمیٹ کر کے جوٹے پر چڑھائیں، نیچے انگشت کے برابر موٹی دو لکڑیاں جلا لیں، برابر ایک گھنٹہ لکڑیاں جلتی رہیں، سرد ہونے پر کھول کر دیکھیں اگر تمام جو سر اڑ کر اوپر کے پیالے میں لگ گئے ہوں تو بہتر، ورنہ دوسری بار سمیٹ کر کے کل جو سر اڑائیں، اور احتیاط سے کھرچ لیں، پھر کھل کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں۔

مقدار خوراک : ۲ چاول سے ایک رتی تک کھن یا ملائی میں پسیت کر نکلوا دیں، دن میں دو بار صرف مرض سوزاک کو دور کرنے میں یہ دوائی اکسیر ہے سوزاک کے علاج میں ہمارا تجربہ ہے کہ جب اچھی سے اچھی خوردنی ادویہ سے فائدہ نہ ہو، تو پچکاری کے استعمال سے شفا ہوتی ہے جب سوزاک ابتدائی علامات سے بڑھ گیا ہو، تو اس وقت پچکاری مرض سوزاک کے لئے لازمی چیز ہے۔

اکسیر سوزاک : آپ زلال دی، ۱۰ تولہ لے کر دو پیالوں میں پانچ پانچ تولہ الگ الگ رکھیں، اور ایک پیالہ میں دورتی طوطیاں خام اور دوسرے میں ۳ ماشہ رسونت ڈال دیں، جب پانی ٹیلگوں ہو جائے، اور رسونت گل جائے، تو صبح کو چھان کن پچکاری خوب زور سے لینا چاہئے، تاکہ جڑ تک پہنچ جائے پھر پچکاری نکال کر سر ذکر کو فوراً پکڑ لینا چاہئے، تاکہ دوا باہر نہ نکلنے پائے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تمام ذکر کو نیچے اوپر چاروں طرف ملیں، اور دس منٹ کا مال دینے دیں، بعد نکال کر دوسری پچکاری اسی وقت پھر لیں، اور دس منٹ رکھ کر مالش کرتے رہیں، اسی طرح پھر تیسری پچکاری لیں، اور ہر مرتبہ تین تین بار ڈالا کریں، تاکہ پیشاب خوب زور سے ہوتین دن کے

بعد دو تین روز کا وقفہ دے کر پھر لیں، اسی طرح حسب ضرورت لیا کریں،
انشاء اللہ تعالیٰ دو تین دورے میں بیماری کا فوراً ہو جائے گی،
بعض مریضوں میں سوزاک کے علاج کے بعد پیشاب کرنے کے بعد جلن کی
شکایت رہتی ہے، اس کے لئے یہ نسخہ مجرب ہے۔

صندل میڈی Sandalwood (ساختمہ فرانس)
مقدار خوراک ایک کیپ شول، دن میں چار مرتبہ، جلن، قرعہ اور گلیٹ کو
مفید و مجرب ہے۔

آتشک SYPHILIS سفلس

تشخیص وجوہات و تشخص
بہرہ مرض عورت و مرد دونوں کو ہوتا ہے، اور یہ دو قسم کا
ہوتا ہے، (۱) آتشک موروئی یا (۲) آتشک حقیقی اور مزاجی،
موروئی آتشک والدین سے ہوتا ہے، اور مزاجی بازاری ناقص
عورتوں سے بد فعلی کرنے سے ہوتا ہے، یہ مرض مواد گنے سے عموماً ۲۴ گھنٹے
میں ظاہر ہو جاتا ہے، اعضاء تناسل پر خارش اور جلن ہو کر ایک آبلہ سا بن جاتا
ہے، دو تین دن بعد چھوٹ جاتا ہے، پھر کیناروں والا زخم بن جاتا ہے،
حکم پر دانے سیاہی مائل، نظر کمزور، گلے کی گلیٹیاں متورم، تالو میں سوراخ
ناک پیٹھ جانا، بخار، کان بہنا، جوڑوں کا درد وغیرہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں،
یہ مستعدی چھوٹ دار مرض ہے۔

علاج
ہر عہد قدیم اور عہد حاضر میں اس کا علاج صرف سنگھیا اور بارہ
کے مرکبات سے کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ ان سے آتشک
کے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اب پینسلین اور سمٹھ لے پے کے استعمال سے

کنز العلاج

کورہ کی وجہ سے
ٹانگوں اور پاؤں کی حالت



آتشکی والدین اولاد



بے حد کامیابی ہو رہی ہے۔
 یادداشت ہر آشک کے علاج کے سلسلے میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ مرض پیچیدہ ہونے کے سبب بڑی مدت لے کر رفع ہوتا ہے۔ مریض بار بار علاج کرتا اور منقطع کرتا ہے۔ اطباء کو چاہئے کہ مریض کو اس نامراد مریض کے نقصانات سے اچھی طرح خبردار کر دیں خون ٹسٹ کرنے کے بعد جب تک آشک مادیہ منفی نہ ہو، علاج جاری رکھا جائے۔

آتشک کی جدید بے ضرر دوا - پنسلین PENICELINE

۵ لاکھ یونٹ کوڈسٹیلڈ وارٹر ۲ سی سی میں حل کر کے ایک ہی دفعہ انجکشن لگائیں۔ اسی طرح دن میں دوبار صبح و شام لگائیں۔ تین دن کے استعمال سے آشک کی علامات رفع ہو جاتی ہیں، لیکن مکمل آرام کے لئے پورا کورس کرنا لازمی ہے۔ کورس کا تعین علامات کے رفع ہونے پر مبنی ہے۔ عام پنسلین کی بجائے پینکسین پنسلین یا پین سیلین اس آشک کے علاج میں مفید بھی جاتی ہے۔ اور بار بار مہرے تجربہ میں بھی آچکی ہے۔

این اے بی یہ ایک تیز دوا ہے جو بذریعہ دریدی انجکشن استعمال کی جاتی ہے۔ چھوٹی طاقت سے شروع کر کے بتدریج مہر بڑھانے جائیں۔ مثلاً ابتدا میں ۱۵ تا ۲۵ بتدریج استعمال کرنا چاہئے۔ خون ٹسٹ کرنے پر نتیجہ صحیح ہو۔

اس کی تجویز اور استعمال ایک ماسٹر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ آشک کا مجرب اور شافی علاج ہے۔

مکسچر آشک :- ٹیکچر اکونائٹ ۲۰۰۰، پوٹاسیم کلورائیڈ ۳۰۰۰، لائیوڈ فرائیڈ ۱۰۰۰، لائیوڈ ہائیڈروکسائیڈ ۱۰۰۰، پیرکلورہ ۵۰۰، لائیوڈ سٹرکٹینا ۲۰۰، ٹیسٹوسٹرون ۱۰۰، اونس ۱/۲

ایسی ایک ایک خوراک ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں۔

فوائد : آتشک کی وجہ سے حلق میں شدید تعفن ، بدبودار زخم وغیرہ ہوں ،
 یا آتشک میں بخار ہو رہا ہو ، تو اس کو دور کرنے میں سریع الاتر ہے۔
 اکسیر آتشک و قروح جدیدہ : پوست بیدار ۱۰ تولہ ، شکر ۶ ماشہ
 دارچینی ۳ ماشہ ، مرداسنگ ۳ ماشہ ، باریک پیس کر پانی کے ساتھ ۱۴ قرص بنائیں ،
 تزکیب استعمال : ایک قرص حقہ میں ڈال کر پلا دیں ، مگر حقہ میں پانی
 نہ ڈالیں ، عصر کے وقت پلا دیں ، محفوظ جگہ جہاں ہوا نہ لگے ، منہ سے لیسار
 رطوبت نکلے گی ، قرص ختم ہونے کے بعد گھی سے غرغره کرائیں ، اس کے
 دھوئیں سے آنکھوں کو محفوظ رکھیں ، غذا روٹی ۱۰ تولہ گھی سے چوری کوٹ
 کر دیں ، آتشک ، نزہ ، بادفرنگ ، سوراخ حلق ، وجع المفاصل ، نفیس ،
 منفرد خنازیر وغیرہ میں نہایت مجرب ہے ،
 اکسیر آتشک : رسکپور ، دارچینا ، شکر ، تخم بھنگ ہموزن لے کر
 سفوف بنا دیں ، معتد خوراک ۱۰ ماشہ بوقت شب ،
 تزکیب استعمال : گوشت بکرے کا قیمہ ایک پاؤ گھی خالص ۱۲ پاؤ
 گرم مصالح حسب ضرورت ، سرخ مرچ ۲۰ عدد ڈالیں ، اور ۱۰ ماشہ دوائے
 مذکورہ ڈال کر قیمہ پکائیں ، جب گوشت اچھی طرح پک جائے ، تو اتار کر
 نیم کر یک بارگی کھالیں ، اس کا استعمال رات کو کریں ، صبح سویرے چند
 دست سیاہ رنگ کے آجائیں گے ، اگر دوائی کھانے کے بعد کچھ گھبراہٹ
 محسوس ہو ، تو دودھ میں گھی ڈال کر پلا دیں ،
 فوائد : آتشک کا ایک روزہ علاج ہے ، ایک دو خوراک کافی ہیں
 زیادہ تعریف فضول ہے ، دیگر ڈاکٹری فارماکوپیاء میں اس مرض کا ٹیکہ اور
 نسخے درج ہیں ، وہاں سے ملاحظہ فرمائیں ،

عرق عشبہ ایک بوتل کشید کریں، اس میں پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۲ ڈرام
 ملا لیں، مقدار خوراک ۱۰ آدھ پاؤ عرق صبح آدھ پاؤ بوقت شام بعد از غذا
 دن میں دو بار دیں۔

قوائد: آتشک کے لئے مفید ہے جب کہ جسم میں درد ہو، ناک
 ابھر گیا ہو، گھٹیاں پھول گئی ہوں، زخم ہو گئے ہوں، اس حالت میں نہایت
 نفع بخش دوا ہے، اس کو متواتر ایک دو ماہ استعمال کرنا چاہئے،
 اگر گلے پر کچھ اثر ہو، تو فوراً بند کر دیں، چند دنوں کے بعد پھر شروع کر دیں،
 جو ہر سمیات اور رسپیور اتولہ، دارچینا اتولہ، شکرک اتولہ
 مردا سنگ اتولہ۔

جملہ ادویہ کو ادراک کے پانی یا شراب برانڈی میں کھل کر کے چھوٹی چھوٹی
 لکیریاں بنا لیں، دو مٹی کے پیالے لے کر ایک پیالہ میں ادویہ مذکورہ بالا
 ڈال دیں، اوپر دوسرا پیالہ رکھ کر مضبوط گٹل حکمت کریں، اوپر چھوٹے پر
 چڑھا دیں، پیالوں کے نیچے انگوٹھا کے برابر موٹی دو لکڑیوں کی آگ
 روشن کریں، تین سیر لکڑیاں ختم کر دیں، پیالہ کے اوپر کے حصہ پر کپڑا
 تڑکے رکھیں، تاکہ جو ہر اوپر جا رہے، ٹھنڈا کر کے اوپر کے پیالہ سے
 جو ہر اتار لیں۔

مقدار خوراک: ایک چاول منہی، بکھن یا حلوہ میں رکھ کر کھلائیں، لیکن جو ہر
 دانتوں کو نہ لگے، آتشک کے لئے اکسیری نسخہ ہے، علاوہ ازیں جذام، بھگندر
 اور بوا سیر کو بھی نافع ہے۔

غذا: دال مونگ، دال اربر خوفہ، کدو، پالک، ٹنڈا، توری، گھی وغیرہ دیں،
 پرہیز: رگڑ تیل، پیاز، آلو، بیکن، دال مسور وغیرہ سے پرہیز کریں،

باب یازدہم مردوں کی خاص بیماریاں

جریان SPERMATORRHOEA سپریمیٹوریا

تشخیص وجوہات و تشخیص : در جریان کے لغوی معنی جاری ہونے کے ہیں اس مرض میں معمولی خیال شہوانی، پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت بلا ارادہ نائزہ سے منی خارج ہو جاتی ہے، اگر رات کو سوتے وقت خواب میں انتشار سے یا بلا انتشار منی خارج ہو جائے، تو اس کو احتلام کہتے ہیں جب قبض یا خراش نائزہ سے یہ مرض ہو، تو بول و براز کرتے وقت منی خارج ہو جاتی ہے۔
علاج : اس مرض میں قبض لازمی طور پر ہوتی ہے، قبض کا ازالہ کریں، تسکین پیدا کرنے والی اور مغلط منی ادویہ استعمال کریں، گوشت گرم مصالح، چائے، گڑ، اجار، ترشی وغیرہ سے پرہیز کریں،
سغوف جریان : درگ برہمی بوٹی ۵ تولہ، ستادرہ ۵ تولہ، گشتہ سنگ جراح رجو برہمی بوٹی میں کیا گیا ہوم ۵ تولہ، سغوف بناویں،
خوراک : ۳ ماشہ ہمراہ شیر گاؤ یا بکری، ہر قسم کے جریان کے لئے مفید و مجرب ہے۔

کشتہ قلعی برائے جریان : قلعی ۲۰ تولہ ریزہ ریزہ کر کے سبز بھنگ
اسیر کا نگدہ بنا کر ۵ سیرادپلوں کی آگ دیں کشتہ ہوگا
کشتہ مذکور کو سات دن بھنگ سبز کے پانی میں کھل کر پیں سفوف
یا گولیاں بقدر ایک رتی بنائیں۔

خوراک ارتی ہمراہ دودھ، مسک، دافع جریان ہے۔
دو اے جریان : رتلب مصری ۱۵ تولہ، موصلی سفید ۵ تولہ، برنج سامی
۵ تولہ، سنگھاڑ خشک ۵ تولہ، کشتہ قلعی ۱۰ تولہ، سفوف بنا دیں۔
مقدار خوراک اتولہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے، جریان احتلام
سرعت انزال، منی کا پتلا ہونا وغیرہ کے لئے نہایت مفید ہے۔
اکسیر عجیب : ست سلاجیت، کشتہ فولاد، کشتہ قلعی ہر ایک
تین تین ماشہ، خلاصہ بھنگ امانشہ، پوٹا سیم بروما بیڈ ۶ ماشہ،
کھل کر کے مونگ کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک صبح و شام دو گولی
ہمراہ شیر گاؤ، جریان، احتلام، سرعت انزال کا حکمی علاج ہے۔
تزیاق جریان : مرج سفید ۱۰ تولہ، مٹھا تیلہ مدبر ۹ ماشہ، سیاب مصفی
اتولہ، قلعی ۹ ماشہ۔

ادل قلعی کو گچھلا کر پارے کو گرہ کر لیں، پھر دوسری ادویہ حقوڑی حقوڑی
ڈالتے جائیں، اور کھرن کر تے جائیں، حتیٰ کہ بالکل سفوف بن جائے پس تیار ہے۔
خوراک : ۲ چا دل تا ایک رتی ہمراہ کھن یا بالالی، جریان، احتلام
زکات حسن، سرعت انزال، منی کا پتلا ہونا وغیرہ کے لئے مفید و تجرب ہے۔
حب جریان : سنگھاڑ خشک ایک پاؤ، شیر بر گد نصف پاؤ،
سنگھاڑ اکو کوٹ کر باریک کر لیں، شیر بر گد اور حب ضرورت پانی
ملا کر حبلی پیر کے برابر گولیاں بنائیں۔

خوراک : ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ شیر گائے، جریان، احتلام
 منی کا پتلا ہونا وغیرہ کو بہت جلد دود کرتا ہے۔
 تریاق جریان : اسگند ناگوری، بیج بدھارا، دونوں ادویہ کا ہوزن سفوف
 بنا کر ملا لیں، اور اس کے برابر مصری یا کھانڈ ملا لیں، پس تیار ہے۔
 مقدار خوراک : ۳ ماشہ تا ۶ ماشہ روزانہ صبح و شام، جریان، احتلام
 کمی باہ، سرعت انزال اور درد مکر کے لئے اکسیر اعظم ہے۔
 رفیق اعظم : خصیۃ الثعلب بڑھیا پنچہ دارہ تولہ، موصلی سفید ۱۰ تولہ، تخم
 ریحان ۵ تولہ، کشتہ سدھانہ ۴ ماشہ،
 پہلی دونوں ادویہ کا سفوف بنا کر تخم ریحان سالم ملا لیں، اور محفوظ رکھیں،
 مقدار خوراک : ۶ ماشہ آدھ سیر دودھ گائے میں نرم آبیچ پر کھیر پکا کر
 ایک رتی کشتہ ملا کر کھائیں، جریان، احتلام، سرعت انزال، کمزوری باہ وغیرہ
 کو زور کرنے میں اکسیر الاثر دوا ہے۔
 سفوف معطر : سمندر سوکھ ۱۰ تولہ، بیج بند ۱۰ تولہ، تخم سریالہ ۱۰ تولہ،
 تخم بھنگ ۱۰ تولہ، کشتہ چاندی ۴ ماشہ، کشتہ قلعی ۴ ماشہ، سب کا
 سفوف بنا کر باہم ملا لیں۔
 مقدار خوراک : ۳ ماشہ صبح ۳ ماشہ شام ہمراہ دودھ یا مشرب
 سادہ ایک گھنٹہ قبل از غذا دو دفعہ تک استعمال کریں، جریان، احتلام
 سرعت انزال، مخلوق، کثرت جماع وغیرہ کے عوارضات کے لئے بہانیت
 معند، مجرب اور بے ضرر دوا ہے۔
 اکسیر جریان : رب برگد ۵ تولہ، ہوی پھلی ۵ تولہ، مغز تخم سرس، سلاجیت
 مغز تخم قرمندی ہر ایک تولہ تولہ، کشتہ قلعی ۱۰ تولہ، کشتہ چاندی ۱۰ تولہ،
 جملہ ادویہ کو ملا کر خوب گھوٹ کر گولیاں بقدر بخود تیار کریں۔

مقدار خوراک : ہر اتنا گولی دن میں تین بار ہمراہ شیر گاؤ، مرض جریان خواہ کتنی مدت کا ہو، اس کے لئے اکسیری نسخہ ہے، علاوہ ازیں سرعت انزال منی کا پتلا ہونا، عنف مثانہ کے لئے بھی مفید ہے۔

رگ برگد بنانے کا طریقہ : ہر بڑ کے زرد پتے پانچ سیر ایک بڑے ٹکے میں ڈال کر ٹکے کو پانچ سیر پانی سے بھر دیں، موسم گرما میں ایک صفیہ اور موسم سرما میں اکیس دن رہنے دیں، پھر تھوں کو مل کر صاف کر کے آگ پر پانی اتنا خشک کریں کہ گاڑھا رگ سا بن جائے۔

تقریباً قی جریان : ہر شکر ف دومی اتولہ، مغز بادام ۵ تولہ، آرد خرما ۵ تولہ، ایون خالص ۶ ماشہ، سب دواؤں کو کوٹ کر بخودی گولیاں بنائیں۔

مقدار خوراک : ہر ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ نم گرم دودھ گائے۔

جریان کے لئے بہت مفید و مجرب نسخہ ہے، سینکڑوں دفعہ کا آزمودہ ہے، ہمارے ماموں صاحب حکیم تاج الدین صاحب مرحوم تڑے دالی کا عطیہ ہے، مکسیر برائے جریان : ہر پوٹا سیم بروما ٹیڈ ۳۰ گرین، ٹنگر جیسی میم ۵ منم، ایکٹر ٹیکٹ ارگٹ ۱۰ منم، ٹنگر بیلا ڈونا ۷ منم، سیرپ حنجر ۳۰ منم، ایکوا ایک ادنس، ایسی ایک ایک خوراک تیسرے پہر اور ایک رات کو سوتے وقت دیں، جریان اور ذکاوت حس کے لئے مفید ہے۔

اکسیر جریان : ہر رگ برگد تازہ ایک من، تین چار گھڑوں میں ڈال کر پانی سے بھر دیں، موسم گرما میں آٹھ پہر اور موسم سرما میں تین روز کے بعد ہتھ کو مع پانی موجودہ کڑا ہی آہنی صاف کردہ میں ڈال کر جوش دیں، جب پتے گل جاویں نیچے اتار کر مل کر چھان لیں، اور پانی محصورہ کو کڑا ہی میں ڈال کر پھر دیکھان پر خرطہ دیں، اور نرم نرم آنچ سے پکائیں، جب ایون سے قدرے رقیق قوام ہو جائے، تو آنچ سے اتار کر محض کولوں پر

رکھ کر پکا دیں، اور کسی لکڑی سے ہلاتے رہیں، احتراق کا خیال رکھیں،
جب قوام مثل افیون کے ہو جائے، اتار کر ادویہ ذیل شامل کریں،
ہو پھلی ۵ تولہ، آرد تخم اہلی، سبوس اسبغول، ست سلاجیت
ہر ایک ۲ تولہ، ورق نعترہ ۲۰ عدد، پاکشتہ نعترہ ۲ ماشہ، ورق طلا ۱۰ عدد
مروارید نامہ صفت ۴ ماشہ۔

سحق بلع کر کے بقدر کنار دشتی گولیاں بنائیں،
مقدار خوراک: ہر ایک رتی سے ایک گولی تک بندہ بجا رکھاتے جائیں
جریان ہر قسم کے لئے اکسیر ہے،
۶ کسیر: ہر سرخ مرچ، ترش دلیخ دگرم اشیاء سے پرہیز کریں
محررہ مراہول میں بچائے ست سلاجیت، کشتہ قلعی (جو بندہ بجا رکھتا تھا)
کیا گیا ہو شامل کریں، اور ورق طلا خارج کر دیں،

اکسیر جریان: سیسہ بقدر ضرورت لے کر ایک لوسے کی کڑا ہی
میں پگھلائیں، اور سہا بخند کی لکڑی سے ہلاتے رہیں، اس دوران میں
مختوڑی سی شکر کچی چھڑ کئے رہیں، جب خاک ہو جائے نکال کر محفوظ رکھیں
مقدار خوراک: ہر ۲ رتی ایک تولہ کھن یا بالائی میں ملا کر کھائیں،
منافع: جریان کے لئے خواہ وہ کسی سبب سے ہو، مفید ہے،
اکسیر جریان: سنبل الطیب ۱ ماشہ، برگ سداب ۷ ماشہ، آملہ خشک
مقشر ۷ ماشہ، ناخواہ، ہلیدہ سیاہ، پوست ہلیدہ ہر ایک ۹ ماشہ، سعد کونی ۶ ماشہ
اسکند ناگوری ۶ ماشہ، خبث الحدید مدبر ۴ ماشہ، لبسہ محرق ۲ ماشہ، کنجد مقشر ۱ ماشہ
وانہ الاچی کھان ۱ تولہ، معزز بادام شیریں ۳ تولہ، روغن زرد میں ہلیدہ جات چرب کر کے سب
دوائیں کوٹ چھان کر شہد صاف میں جوارش بنائیں، اور ایک تولہ کسی منہ سب
عرق سے استعمال کریں، جریان کے لئے نہایت مفید ہے،

NOC TORNAL
EMISSION

کثرت احتلام

رنگ ٹرنل امیشن

تشخیص وجوہات و اس مرض میں خواب میں غیر منہ ہو کر منی خارج ہوتی ہے۔ مریض عاشقانہ فاسد خیالوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ پھپھلی راست نیم خوابی کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے۔ مشت زنی کثرت جماع، قبض، گرم استیبار کا کثرت استعمال وغیرہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علاج اس مرض میں شہوانی حیالات کو دماغ سے دور کرنا ضروری ہے۔ قوت ارادی کو مضبوط کرے۔ کھانا کم کھائے، سونے سے دو

گھنٹے پہلے پانی پیئے، زیادہ نرم بستر پر نہ سوئے، سوتے وقت جب پیشاب آیا ہو، تو فوراً کر دے، اگر قبض وغیرہ ہو، تو اس کا علاج کریں، باضمہ درست رکھیں، مندرجہ نسخوں کو حسب علامات استعمال کریں۔

اکسیر احتلام، پوٹاسیم برومائیڈ، ۳۰ گریں، ایک گھونٹ پانی میں حل کر کے پلا دیں، جب احتلام ہوتا بند ہو جائے، پھر منی پیدا کرنے والے نسخے اور مقوی باہ ادویہ استعمال کریں اس سے ذکاوت حسن و شہوت کا ذبہ، جریان، احتلام کو ناکد ہوگا۔

اکسیر احتلام، فینوباربیٹون ۱۰ گریں، کشتہ قلعی ۱۰ گریں، روزانہ تین خوراک پانی یا دودھ کے ساتھ دیں، احتلام کا اکسیری علاج ہے۔

اکسیر جو اس پر ہے۔ ٹنکچر بلا ڈونا ایک اونس، ایکٹریکٹ کسٹیکار اسگریٹ ایک اونس
ایکٹریکٹ لیکورس ۴ اونس، سپرٹ ایوینا ایرومیتیک ۴ اونس، گلیسیرین
۱۲ اونس۔ سب کو باہم ملا لیں۔

مقدار خوراک: ۹ ماشہ ہمراہ آب ۵ گولہ رات کو سوتے وقت بعد
از غذا۔ احتیاط: جریان، سرعت انزال، ذکات حس، دائمی قبض، عصبی درد
کمزوری قلب کے لئے مفید ہے۔

برومید یا ریٹیل، یہ پوٹاشیم برومائیڈ، کلورل یا یڈراس اور ہائیڈرو
سائٹس کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲ تا ایک چمچہ خورد، دن میں ایسی تین خوراکیں
احتیاط اور ذکات حس کے لئے مفید ہے۔

ٹنکچر اسٹیم: کورل ہائیڈریٹ، اگرین، پوٹاشیم برومائیڈ
اگرین، ٹنکچر بلا ڈونا ۵ منم، ٹنکچر ہائیڈرو سائٹس ۲ منم، ایکوا ایک اونس،
ایسی ایک ایک خوراک رات کو سوتے وقت دیں، کثرت احتیاط
بے خوابی، جھوٹی شہوت، معمولی سی حرکت سے منی کا خارج ہونا
دغیرہ کے لئے بہترین تجربہ شدہ دوا ہے۔

اکسیر سکشن: ہر دھنیا خشک، تھوڑا سا لوانہ، اسے خراب، اطمینان
سکشن اور خزانہ کو کوٹ کر اسے بول سالمہ ملا لیں، خوراک ۴ ماشہ ہمراہ شیر
گاو یا تازہ پانی صبح و شام، گرم مزاج آدمی جو جوانی کی حالت میں جریان
احتیاط کا شکار ہوئے ہیں، اور معمولی سی حرکت سے شہوت اگر منی
خارج ہو جاتی ہو، ان کے لئے مفید دوا ہے۔

دیگس: رسک کے تیرے بنا کر دونوں گردوں کے مقام پر باندھنا کثرت احتیاط
کو مفید ہیں، بدکشتہ قلعی بھنگ لالائی کھن یا ملائی میں ملا کر کھانا مفید و مجرب ہے۔

حسب احتلام: در سلاجیت مصفیۃ اقولہ افیون ۶ ماشہ، کافور ۳ ماشہ، ورق
لفزہ ۲۰ عدد، زعفران ۳ ماشہ، تخم دھتورہ سیاہ ۱۵ ماشہ،
جملہ ادویہ بار یک پس کر بقدر ایک رتی گولیاں بنائیں، صبح و شام ایک
ایک گولی ہمراہ دودھ و دس جویان، احتلام، سرعت انزال، امساک کی جادو اثر
دوا ہے، بارہا کی تجربہ شدہ ہے۔

قرص خاص: در آرد تر بھلہ ۳۵ ماشہ، آرد دھرکونہ ۲۰ ماشہ، کشتہ قلعی
کشتہ ابرک سفید، کشتہ منور، کشتہ پوست پیضہ مرغ، تخم دھتورہ سیاہ
ہر ایک ۵ ماشہ، پوٹاسیم برومائیڈ ۱۰ ماشہ، بذرا النج ۷ ماشہ،

جملہ ادویہ کو ملا کر قرص بمقدار ۵ گرین بنائیں، مقدار خوراک ۲ قرص دن
سب تین بار ہمراہ دودھ احتلام اور جویان کے لئے مفید و تجربہ ہے،
حسب خاص: در جوہر کافور اقولہ، ایکٹرکلیٹ بلاڈونا اقولہ، کشتہ قلعی
اقولہ، کشتہ سد دھانہ اقولہ، افیون ۶ ماشہ،

ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں، ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام
ہمراہ دودھ استعمال کریں، جویان، احتلام کے لئے مفید ہے،
کیلیسی بروشیٹ اسٹڈز، مقدار خوراک ایک کیمپ پانی میں حل کر کے
چلادیں، دن میں تین بار دیں، احتلام کا تجربہ علاج ہے،

ہدایات متعلقہ احتلام

مریض احتلام کو سونے سے پہلے پیشاب ضرور کر لینا چاہئے، اور کرویٹ کے
بل سونا چاہئے،

مشراب، قہوہ، چائے اور شرک کشیا، سے پرہیز کرنا ضروری ہے،
گوشت بغیر مہری ترکاری کے نہیں کھانا چاہئے،

رات کو سوتے وقت سرد پانی سے ہٹانا غیر شادی شدہ استخاص کے لئے
مضر ہے۔ کیونکہ اس کے رد عمل سے سہوت، ایستادگی اور احتلام کا
میلان بڑھ جاتا ہے۔

سونے سے پہلے دودھ اور پانی نہیں پینا چاہئے، اگر ضرورت ہو تو
بہت کم استعمال کریں۔

بہت زیادہ نرم بستر پر سونے سے بھی اجتناب لازمی ہے، اگر پاخانہ
کی حاجت ہو، تو قضاے حاجت کر لینی چاہئے۔

احتلام کا ہومیوپیتھی علاج

اگر رات کے وقت غیر معمولی طور پر منی خارج ہو جائے تو کالی بردیم ۳۰
۲ گرین ادد ۱۲، ڈیجی ٹیلین ۳ x ایک گرین صبح جاگنے پر دیں۔
آلات کی غیر معمولی اکساہٹ یا شکم کی اکساہٹ سے، اور
مکزوری محسوس ہو، تو چائنا ۳ مفید ہے۔

شیطانی خیالات کے ساتھ بے حد خواہش سے، سخت ترس
ایستادگیوں سے اگر احتلام ہو، اور بعد میں مکزوری محسوس ہو، تو
پچرک ایڈ ۳۰ مفید ہوگا۔

اگر سخت قبض کی وجہ سے احتلام ہو، اور پاخانہ کے وقت زور
لگانے سے بھی منی کا اخراج ہو، تو ٹیکس دامیکا ۳ دیں۔
اگر مستورات کو دیکھ کر جلد اکساہٹ ہو جائے، اور انزال ہو جائے

تو کو نیم ۳۰ دیں
نقریٹا ہرنکیس میں فاسفورک ایڈ ۳۰، ۱ قطرے گلاس پھر پانی میں
کھانا کھانے کے بعد دیں۔

PARE MATOREJA
COLOTION

سرعت انزال

پری میچورا جا کو لیشن

تشخیص وجوہات و تشخیص : یہ ایسی تکلیف دہ مرض ہے بگڑ باغ کرتے وقت آدمی عورت سے پوری طرح ہم آغوش نہ ہو سکا ہو، اور منی خارج ہو جائے، اور بچارہ غریب انسان اپنے تمام ارمان دل میں لئے اٹھ بیٹھے، یہ مرض حلق، کثرت جماع اور گرم اشیاء کے کثرت استعمال سے ہوتا ہے۔
علاج : ذکاوت جس کو دور کر کے منی کو گھاڑھا اور گرمی دور کرنے والی ادویہ استعمال کریں، گائے کا تازہ دودھ بہت مفید ہے۔

سفوف مخلط : برتا مکھانہ بریاں، تخم خشتا ش، نخودہ مقششر، مغز پستہ، مغز پنہ دانہ، تخم جرجر، مغز قرطم، بیج بند، موصلی سفید، ہمن سفید، تخم کوچ، شقاق، گوند ڈھاک، مرچ سر، تخم ادھنگن، میردالی، موصلی سنبل، نودری سرخ، نودری زرد، میدہ لکڑی، گوکھرو، تخم قنب، بہو پھلی، سورنجان، بوزیدان، طباشیر، دارچینی ہر ایک ایک تولہ، سیفہ، صمغ عربی، کیسر، دانہ الچی خورد، مقطلی، کبابہ، زنجبیل، عاقر قرحا ہر ایک چھ ماشہ۔

سب کا سفوف کر کے ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام ہمراہ شیر گاؤ نیم میر کھلا دیں، صغف باہ، سرعت انزال دجریان کو ایک ہفتہ میں دور کر دیتی ہے۔
دیکھا : دافیون، کافور، شکر، عاقر قرحا، جوز ہوا، زعفران، جند بیدستر، بیر، ہونٹ، ہر ایک ۳ ماشہ۔

سب کو پیس کو گولیاں بقدر خود مکے بنا دیں۔ ایک گولی روزانہ کھانے پر
 بہت فائدہ ہوتا ہے۔
نسفوف عجیب : در تخم اعلیٰ مقشر ۵ تولہ، چھلکا اسبغول ۵ تولہ، مال
 سفید ۵ تولہ کو باریک کر کے بڑے کے دودھ میں تڑ کریں، خشک ہونے پر دوسری
 دفعہ پھر تڑ کریں، پھر اس کو پیس کر اعلیٰ اور چھلکا کوٹ کر ملا لیں،
 مقدار خوراک : ۱ تولہ صبح، ۱ تولہ شام، ہمراہ شیر گھاؤ تازہ حسنی ۰.۲ تولہ ملا کر
 دافع جریان، استلام، سرعت انزال، معطل منی، اور منی کو قابل قطعہ بناتی ہے،
 نامرد بھی صاحب اولاد ہو۔

حب سیما : در سیما ایک تولہ لے کر سات مرتبہ پارچہ میں صاف
 کر کے عرق پان ۳ تولہ میں کھل کریں، پھر عاقرقرحہ، بذرا بنج، خولجواں،
 جوز بوا، قرفل ہر ایک ۳ ماشہ ملا کر گولیاں بقدر خود بنا دیں،
 مقدار خوراک : ایک گولی بوقت شب کھا دیں، مسک، دافع سرعت
 انزال ہے جب تک ترشی نہ کھائی جائے گی، انزال نہ ہوگا، تجربہ شدہ ہے،
 عیشش، رکشتہ شاخ مرجان بولی میں کیا ہوا مثلاً بولی زخم حیات
 دودھی، کنوار گندل یا بھٹکل بوٹیوں میں خواہ کسی میں کیا گیا ہو۔

ترکیب استعمال : رکشتہ مرجان ۴ رتی، مغز بادام ۸ دانہ، خشک ش
 ماشہ، مغز کندہ، مغز خر بوزہ، مغز کھیرہ وغیرہ اور دار حسنی سفید ملا کر چپٹی
 بنا کر صبح و شام استعمال کریں، ہر روز رکشتہ ارنی بڑھاتے جائیں، جسے کہ
 دو ماشہ تک پہنچ جائے، پھر بند کر دیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں،
 فوائد : مساک، سرعت انزال، منی کا پتلا ہونا، جریان، احتلام
 وغیرہ علامات کے لئے نادر روزگار ایجاد ہے، ایک دفعہ کے استعمال سے عرصہ
 تک قوت امساک رہتی ہے، نشہ وغیرہ کی آمیزش سے بالکل پاک ہے،

بنایت مفید و محرب ہے۔ ایک سینہ کا راز تھا۔ جو ظاہر کر دیا ہے۔
 حب امساک : ہر افیون کا فرد، جوزبوا، شکرٹ، عاقرقرحہ، زعفران
 چند بیدستر، سر، ہونٹ ہر ایک تین تین ماشہ، بخودی گولیاں تیار کریں
 مقدار خوداک : ہر ایک گولی صبح ایک گولی شام دودھ کے ساتھ کھلائیں
 مسک و مقوی عجیب الاثر دوا ہے۔

حب سیما : ہر سیما مصطفیٰ ایک تولہ عرق پان ۳ تولہ میں کھری کریں۔
 عاقرقرحہ، بذراشیج، خولجناں، جوزبوا، قرنفل ہر ایک ۳ ماشہ میں کر باہم
 ملا کر گولیاں بقدر بخود تیار کریں۔

ترکیب استعمال : ہر سوتے وقت ایک گولی دودھ کے ساتھ
 کھلائیں۔ جب تک ترشی نہ کھائی جائے گی، انزال نہ ہوگا۔

حب مسک : ہر کاغذ اماشہ اجوان خراسانی ۳ ماشہ، جوزبوا ۳ ماشہ
 سمندر سوکھ ۳ ماشہ، انبیون اماشہ۔

سب کو پس کر گولیاں بقدر بخود بنادیں، جماع سے دو گھنٹہ پہلے
 ایک گولی کھلائیں، ایک گولی سے دو گھنٹہ امساک ہوگا۔

حب مقوی و مسک : ہر افیون ۳ ماشہ، زعفران ۳ ماشہ، جوزبوا
 ۳ ماشہ، جلو تری ۳ ماشہ، لونگ ۳ ماشہ۔

سب ادویہ کو پس کر ایک انڈے کی سفیدی نکال کر جلد ادویہ انڈے
 میں ڈال دیں، منہ پر دوسرے انڈے کا خول دے دیں، ادویہ آٹے کا لپ
 کر دیں، بریاں کر کے انڈا کو توڑ کر دوائی نکال لیں، اور کوٹ کر گولیاں
 بقدر بخود بنالیں۔

ترکیب استعمال : ہر سپر کو ایک گولی آدھ سپر دودھ سے کھائیں، اس
 کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں، صرف دودھ پیتے رہیں، رات کو لطف اٹھائیں۔

لذت بخش تدابیر

فاضل جالینوس کا قول ہے کہ لذت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ صنف مقابل کی فرج میں تین اوصاف نہ پائے جائیں۔

۱۔ حرارت (گرمی) ۲۔ ضیق (تنگی) اور ۳۔ جفاف (خشکی)۔

مناخین نے ایک چوتھا صنف (خوشبو) کا بھی اضافہ کیا ہے۔ عنبر کے خواص سے ہے کہ اگر اس کو جماع کے وقت طلا کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو طرین اس قدر ملندہ ہوتے ہیں کہ دونوں میں مفارقت کا

امکان باقی نہیں رہتا۔

اکسیر امساک ہر سیلیم $\times 30$ قطرہ۔ ملک شوگر۔ اگرین۔

روزانہ چار خوراک دیں۔

کلکیر یا فاس $\times 12$ (ہاگرین) روزانہ چار خوراک۔ ایک مہینہ سرورادویہ

استعمال کرائیں۔ جن مریضوں کو جوانی کی غلط کاریوں اور منی کے کثرت اخراج سے ضعف امساک، نامردی اور کمزوری ہو گئی ہو۔ ان کے لئے اکسیری علاج ہے۔

نوٹ: ۱۔ لاہور کے حبشی امراض کے معالج حضوری ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب ایم بی بی ایس ایم ڈی لنڈن نے کشتہ قلعی مرجان، موصلی سفید کو سرعت انزال کے علاج میں تسلی بخش پایا ہے اور بروما کیڈ کے استعمال کی مذمت کی ہے۔

اور یونانی ادویہ کے استعمال کو ایلو پیتھک ادویات پر

ترجیح دی ہے۔

حبشی مسائل

ONANISM

جلبق یا مہشت زنی

رنا نیزم

تشخیص : یہ مہنی کو خارج کرنے کا غیر طبعی طریقہ ہے جس میں انسان اپنے ہاتھ سے مہنی خارج کرتا اور اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرتا ہے۔ تمام اعضائے رئیسہ دل، دماغ، گردے وغیرہ کمزور ہو کر کمزوری، کمی خون، ہستی، نامردی، جریان احتلام وغیرہ ہو جاتے ہیں یہ مرض بری صحبت، عشقیہ ناول اور دیگر کمی وجوہات سے ہو جاتا ہے۔

علاج : اس مرض میں مریض چونکہ اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ سے رگڑتا ہے جس سے اعصاب اور رگیں مر رہی ہو جاتی ہیں۔ اس لئے اول مسکن ادویہ دیں۔ بعدہ کسی طلاک کا استعمال کریں۔ تاکہ مردہ رگوں میں خون کا دوران تیز ہو۔ لیکن سب سے اس برعادت سے توبہ کریں۔ اور پھر ادویہ استعمال کریں۔

اول پوٹاسیم پرمائیگٹ، اگر بن ہمراہ آب دن میں دو بار دیں۔ اس سے دماغ میں تسکین اور شہوت کا ذب زایل ہو جائے گی۔ اور خارجی طور پر کینٹھرائیڈس پلاسٹر قنصل پر لگائیں۔ لیکن آلہ تناسل کے حشفہ، سیون اور نیچے کی طرف نہ ہو۔ بلکہ اوپر کی طرف لگا دیں۔ پھر رولی باندھ دیں۔ چند گھنٹوں کے بعد آبلہ نکل آئے گا۔ سوئی سے چھید کر پانی نکال دیں۔ پھر دو تین دن روزانہ مکھن لگاتے رہیں۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیسٹر لگانے کا عمل رات کو کرنا چاہئے۔ اس کے استعمال سے اکثر مریض تندرست ہو جاتے ہیں۔

اگر قبض، جریان، احتلام اور سرعت انزال کی شکایت ہو، تو ان امراض کے بیان میں جو نسخے تحریر ہیں، وہاں سے مریض کے حال کے مطابق استعمال کرائیں۔

انتشارہ: میرا پیگ خالص ۴ ماشہ، سیاب ۲ ماشہ، شہد خالص

۱. لؤلؤ

ترکیب تیاری: کسی عمدہ کھل میں پیگ ڈال کر کھل کریں، باریک ہونے پر سیاب شامل کر دیں، اور کھل کریں، پھر پھوڑا پھوڑا شہد ملائے اور کھل کرتے جائیں، یہاں تک کہ شہد ختم ہو جائے، زان بعد پارہ ملا کر اتنا کھل کریں کہ چمک باقی نہ رہے، پس تیار ہے۔

ترکیب استعمال: اس میں سے روزانہ دو ماشے لے کر عضو خاص کی طرف پشت پر لیپ کر کے اوپر پان کا پتہ باندھ دیا کریں، رات کو وقت فوائد: پہلی رات ہی عضو میں خیرش اور تندی پیدا کرنے والی

لاجواب دوا ہے۔

روغن اکسیری: شکر، سکیمیا، جمال گوڑ (چھلا ہوا) بڑتال طبعی گندھک، آملہ سار، ہر ایک چھ ماشہ۔

پہلے خشک ادویہ کو پیس کر جمال گوڑ کے معزز ملا کر کھل کریں، ایک بالشت سفید کپڑا لے کر اس پر جملہ ادویہ لیپ کر دیں، اور لوہے کی سیخ پر بٹی بنا کر آگ لگا دیں، اگر بتی خشک ہو، تو ادویہ میں ۶ ماشہ میٹھا تیل ملا کر کھل کریں اور بتی کے آگ لگے سرے کو نیچے کر دیں، نیچے ایک پیالی رکھ دیں، اسی طرح تین دفعہ وہ ٹپکایا ہوا تیل بتی پر ڈالتے رہیں، چوتھی دفعہ جب سب تیل ٹپک چکے، ایک شیشی میں بھر کر ۲۱ روز زمین میں دفن رکھیں، بائیسویں دن نکال کر استعمال کریں۔

ترکیب استعمال : حشفہ اور سیون چھوڑ کر قنیب پر مالش کریں ،
ادھ پان پانڈھیں ، پانی سرگز نہ لگنے دیں ، نامرد کو چند دنوں میں مرد کر دیتا
ہے ، بہت ہی مفید و مجرب روغن ہے ،

طیلائے اعظم : رسم الفار سفید اتولہ ، روغن مالگنی ۱۰ اتولہ ،

شیر مدار ۳ اتولہ میں کھل کریں ، ۵ دن تک متواتر کھل کر کے پھر تیز دھوپ یا
یا آگ پر گرم کر کے روغن علیحدہ کر لیں ، بحساب فی اتولہ روغن کستوری ۲ رتی
لو جگ ، جالفل ، جلولزی ، بیزہوٹی ، خراطین خشک ، پوست یخ کنیر سفید ہر ایک
تین رتی ڈال کر خوب زردار باحقوں سے کھل کریں ، پس تیار ہے ،

ترکیب استعمال : ۳ رتی یہ طلاء حشفہ اور سیون بچا کر مالش کریں
چند دنوں کے بعد پت کی طرح دانے ظاہر ہوں گے ، جب دانے نکل آئیں
طلاء لگانا بند کر دیں ، اور روغن چنبیلی لگا دیں ، دودن میں دانے مٹ جائیں گے
پھر طلاء لگانا شروع کر دیں ، جب پھر دانے نکل آئیں ، طلاء کی مالش بند کر دیں
دوسری دفعہ میں مکمل فائدہ ہو گا ، کمزور رگوں میں خون ڈالنے والا ، مردہ
اعصاب میں رجح ڈالنے والا جادو اثر طلاء ہے جو نہایت مفید و مجرب ہے ،
اکسیری طلاء : بارہ ، زعفران ، مشک کا فور ،

جملہ ادویہ بموزن لے کر تدریجاً ٹھکن یا دیولین میں ملا لیں ،
ترکیب استعمال : بوت ضرورت تھوڑا سا لے کر عین خاص

پر مل دیں ،
فوائد : برقی تاثیر پیدا کرتا ہے ، پہلے دن ہی اثر دکھانا شروع
کر دیتا ہے ،

نوٹ :

اس کے دوران استعمال میں کوئی ہم میز نہیں ہے ،

NCE. SEXUAL
DEBILITY

نامردی

ریکسٹونل، ڈی بی لیٹی

تشخیص وجوہات و : مردوں میں جماع کی ناقابلیت کو نامردی کہتے ہیں۔ اس مرض میں قوت جماع یا تو بالکل کم ہو جاتی ہے، یا بالکل زایل ہو جاتی ہے جماع کی طرف رغبت ہوتی ہی نہیں، یا قدرے انتشار ہو کر طبیعت رہ جاتی ہے، کم ہمتی ہو جاتی ہے، مریض کے خیالات پست ہو جاتے ہیں، خلل اعصاب، ہاضمہ میں خرابی، سر میں جگر وغیرہ ہوتے ہیں، کثرت جماع، سوزاک، مکمل جنسی اشتیاق، مدت دراز تک جماع سے پرہیز، رہبانیت بلے بچار، کوکین، چرس کے سمیاتی اثرات، عام جسمانی کمزوری، عصبی کمزوری حد سے زیادہ موٹاپا اور گردوں کی سوزش وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علاج : اول نامردی کے سبب کو دریافت کریں، جب سبب واضح ہو جائے، تو علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مرض کے اسباب بھی مختلف ہیں، اور علاج بھی مختلف، عام طور پر ان سبب عوارضات کے علاج کے واسطے تین اصول ہیں۔

۱۔ تشکین (۲) تقویت اور (۳) تحریک

۱۔ مسکنات سے مریض کے دماغ اور اعصاب کا اضطراب اور بے قراری دور کی جائے۔

۲۔ مقویات سے معدہ، جگر، اعصاب اور دماغ کو تقویت دی جائے تاکہ کثرت جماع یا جلتی سے جو کمزوری واقع ہو گئی ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔

۳، محرکات سے اعصاب کو تحریک دی جائے تاکہ ان کے اندر شہوانی لہر پھر عود کر آئے۔

معالج ان تینوں اصولوں کو مد نظر رکھ کر علاج کرے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ نیز کمزوری باہ اور نامردی کے مریضوں کو غذا مقوی گوشت، مکھن، دودھ، بالائی انڈا، دال ماش، بادام، مار اللحم وغیرہ استعمال کرنا چاہئے۔ گائے کا دودھ بہترین مقوی باہ غذا ہے۔

منجھون خاص مقوی باہ : ہر ایک سیر بلا در کلاہ پریدہ پانچ سیر شیر گاؤ میں حبش دے کر دی جمالیں، صبح کو بلو کر مکھن نکال لیں، اور چھاچھ وغیرہ کو دفن کر دیں۔ مندرجہ ذیل ادویہ کوٹ کر سفوف بنالیں۔

عاشق شرعہ، دارچینی، الچی سفید، قرنفل، جلوتری، زعفران ہر ایک ۳ تولہ، گرم محمل ۱ تولہ، زنجبیل بے ریشہ، خولنجاں، قلب ہر ایک ۶ تولہ، تخم گذر، تخم ترب، مغز حلیغوزہ، مغز اخروٹ، مغز نارچیل، مغز لہسن ہر ایک ۵ تولہ، تخم پیاز، آملہ، مغز خیار ہر ایک ۱۰ تولہ، خراطین مصفیٰ و مدیرہ ۲۰ تولہ، شہید خالص دوزن ادویہ۔

شہد و مصری کا قوام کر کے مکھن مذکور اس میں ڈال دیں، اور تمام دواؤں کو خوب ملا کر قوام میں آمیز کر کے پیچے اتار لیں۔

مشک خالص ۶ ماشہ، عنبر اشہب ۳ ماشہ، مروارید ناسفتہ ۱ تولہ، کشتہ چاندی یا ورق نقرہ ایک تولہ شامل کر کے خوب ملا لیں۔

مقدار خوراک : ہر ۳ ماشہ سے ایک تولہ تک حسب برداشت طبع استعمال کریں۔

منافع : ہر پرے درجے کی مقوی باہ و منعظ، قوت رجولیت پر اس کا خاص اور فوری اثر ہوتا ہے، چند خوراکیں حیرت انگیز تماشہ دکھاتی ہیں۔

بعض طبیعتوں میں بعض اوقات ادویات مسکنہ دینے کی ضرورت ہو جاتی ہے
مطلقاً بے ضرر اور قلیل الخوراک ہے۔

خراطین کو مضمضہ و مدبر کرنے کی ترکیب

جس قدر چاہیں خراطین لے کر انہیں مٹی وغیرہ سے صاف کریں، اگر وزن پاؤ بھر
ہو تو سہاگہ اولہ جو کھار اولہ خوب باریک پیس کر آدھ سیر شیرہ مردق زمین
قند اور آدھ سیر می شیرہ چھ ہے کئی بولی لے کر اس میں حسب ضرورت شیر
کھاؤ ملا کر اس میں خراطین کو ڈال دیں، اور خوب اچھی طرح مل کر پھوئیں، جتنے
کہ معینہ ہو جائیں، پس خوب سکھو کر باریک پیس کر تھخہ میں شامل کریں۔
مرواریدی ہر کشتہ صدف مرواریدی اولہ، رب خیمہ بکرہ جوان اپاؤ
سفوف بنا دیں

مقدار خوراک ہر ۳ ماہ تا ۶ ماہ ہمراہ آب یا دودھ وغیرہ،

مقوی باد، دافع جریان و سرعت انزال ہے۔

رب خیمہ بنانے کا طریقہ ہر خیمے سے گوشت اٹار دیں، ایکٹ و
خیمے میں ایک پاؤ کھانڈ ڈال لیں، اور زردار ہاتھوں سے ملنا شروع کریں، تاکہ
شریت کی مانند ہو جائے، صاف کر کے بچا آب پر خشک کر لیں، پس تیار ہے۔
حسب کتابہ ہر پچاس میرہ ۲۰ لہ، ہر پچاس اولہ ۲۰ لہ، ہر پچاس جلیوتہ می
۴ تولہ، خولجیاں شیریں ۶ تولہ، سوکھٹ ۲۰ تولہ، ان پچی کلاں ۵ تولہ،

کچاوں کو مدبر کرنے کے بعد خشک کرنے سے قبل ہی بنایت باریک
پیسیں، بعدہ باقی ادویہ کوٹ چھان کر ملا لیں، اور چنے کے برابر گولیاں بنا کر
رکھیں، بقدر ضرورت آب برگ پان یا آب ادک ملا سکتے ہیں، اگر کچلے خشک
ہو گئے ہوں، تو ان کو ریتی سے برادہ کر کے باقی ادویہ ملا کر آب برگ پان یا
آب ادک میں گوندھ کر گولیاں بنائیں،

طریقہ استعمال :- ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کے وقت کھائیں، لیکن ان کے کھانے سے قبل چند لقمے حلوہ یا کوئی مرغین غذا کھالیں، ترشی سے پرہیز رکھیں۔
منافع :- جلد امراض عصبانی کے لئے اکسیر کا کام دیتا ہے۔ لقوہ فاج، وجع المفاصل وغیرہ اور ضعف معدہ، قبض دائمی، قلت تولید خون، کے لئے بے نظیر دوا ہے، جو بوڑھے آدمی موسم سرما میں زیادہ نکالینف میں مبتلا رہتے ہیں، وہ ان گولیوں کو استعمال کر کے لطف شباب حاصل کر سکتے ہیں، جو عورتیں درد اعضاء میں مبتلا رہتی ہوں، اور سردی لگنے سے بہت جلد بیمار ہو جاتی ہوں، ان کو بھی بہت فائدہ بخشی میں۔

کچلہ مدتر کر کے نی کی تھکھیب : کچلہ بقدر ضرورت کے ایک چدنی
کے پیالے میں رکھیں . اور اس میں مغز گھیکوار اس قدر ڈالیں کہ تمام کچلوں کو
ڈھانک لے . ہفتہ عشرہ کے بعد جبکہ مغز گھیکوار پانی ہو کر کچلوں میں جذب
ہو جائے . اور کچلے نرم ہو جائیں . تب ان کو تھیلے اور ان کے اندر سے پتہ
نکل دیں . اور پانی سے دھو کر آب اورک میں پیدر روز تک بھگوئے رکھیں
پس کچلہ مدتر تیار ہے . پانی سے دھو کر کام میں لائیں .

اگر چه مویهای که بر مویهای خوانند و مانند مویهای سفید و مانند مویهای
 مانند مویهای سفید و مانند مویهای سفید و مانند مویهای سفید و مانند مویهای سفید
 خوب کندی که که خود می گویند بیا نرسد و مانند خوراک یک گوی شمع یک
 گوی شام همراه دود و

فواکدہ بر منقوی باد، ممسک، دافع جریان، استقام، نزلات دماغیہ،
اور قوت بدنی کو بڑھانے میں اکسیر ہے۔

کشتہ سنگہہ در سکہ مصطفیٰ کو بول ماوہ گاؤ میں سات بار گچھلا کر بچائیں
دوبارہ بختہ ایک مٹی کا برتن یعنی سبوتہ چکلاں اس طرح بنوائیں کہ اس کے ایک

پہلو میں دریچہ ایک بالشت چڑھا ہو، اور سبوجہ ایسا مضبوط ہو کہ تیز آگ سے
 ٹوٹ نہ جائے، پھر اسے تین دفعہ کپڑوں سے گل حکمت کریں کہ ایک کپڑوں سے دوسرے
 پر اس وقت ہو، جب پہلی خشک ہو جائے، حلوائیوں کی طرح کا ایک چوٹھا
 رحس کا منہ تنگ اور اندر سے کھلا ہو، بنا لیں، اس چوٹھے پر اس برتن کپڑوں سے شدہ
 کو رکھ دیں، اور گل حکمت سے چوٹھے اور اس برتن کو وصل کر دیں، کہ آگ کا شعلہ
 اس میں سے باہر نہ نکل سکے، پس اس وقت اس برتن میں سکھاندہ کورٹوال دیں
 اور نیچے آگ جلا لیں، جب سکھانچل جائے، تو گھیکوار کے پاٹھے کو کہ اس کے
 کنارے سے کانٹے چھاڑے گئے ہوں، اس دریچہ کے راستہ سے پگھلے
 ہوئے سکھ میں پھیریں، جتنے کہ وہ پاٹھا سب جل جائے، پھر اور تازہ گھیکوار
 کا پلہ لیں، اور اس میں پھیریں، اسی طرح گیارہ روز متواتر بلا انقطاع اس کے
 نیچے آگ جلاتے رہیں، اور گھیکوار حسب مذکور بالا اس میں سوختہ ہوتا رہے،
 گیارہ روز میں کئی رنگ متواتر بد لے گا، سفید، سیاہ، آسمانی، زرد، سرخ،
 اور آخر میں شکر کے رنگ کا ہو جائے گا، پس تیار ہے، اتار کہ بادیک
 پیس کر کپڑے میں چھان کر بحفاظت رکھیں۔

مقدار خوراک ایک چاؤل سے ایک رتنی تک چالیس روز
 متواتر کھائیں۔

منافع ہر اشتہائے طعم بے انتہا پیدا کرتا ہے
 اور قوت باہ اس قدر بڑھاتا ہے کہ شاید و باید، تقویت بدن اور رنگ
 کے سرخ کرنے سبب کے دایں لانے میں عجیب الاثر ہے، دیدیم
 اور اس کشتہ کے خواص اس باب میں ایک ہیں۔

چسکلہ ہر کچھن رچڑ پان، اولہ سفوف کر کے ایک گلاس زودھ سے کھلائیں
 ایک دفعہ کے استعمال سے ہی قوت ہوگی، اور فوراً انتشار ہوگا۔

جبوب مقوی :- ایک عدد ناریل لے کر اس میں سو راج کر کے افیون خالص
۶ ماشہ، زعفران، دارچینی، لونگ، جوزبوار، جلوتری، سرد احد ایک تولہ، خرما ۲ تولہ
باریک میں کر بھر دیں، اور ناریل کا منہ بند کر کے آٹے سے مٹھون کر کے
گائے کے گھٹے میں اس قدر بریاں کر دیں، کہ آٹا سرخ ہو جائے، بعدہ اتار کر
ناریل مع آٹا کے کوٹ کر گولیاں بقدر کنار دشتی بنا لیں، اور روغن کو شیشی
میں محفوظ رکھیں۔

مقدار و طریقہ استعمال :- روزانہ ایک گولی گائے کے دودھ کے
ساتھ کھائیں، اور روغن کو بطور طلاء کے استعمال کریں۔

افعال و منافع :- تقویت باہ، امساک، ناریل کے واسطے
بے نظیر چیز ہے، اس کے استعمال کے بعد فوائد کا اندازہ ہو سکتا ہے،
منہ تعریف سے مستغنی ہے۔

طاقت کی گولیاں :- افیون اتولہ، شنگون ۷ ماشہ، کستوری
۱ ماشہ، آدھ سیر آب اور کھیر میں کھل کر کے غلولہ بنا کر ماستس کا آٹا اوپر لگا
دیں، روغن زرد میں بریاں کر کے ماستس کا آٹا اوپر سے اتار دیں، اور کھیر کر کے
گولیاں بقدر بخود بنا لیں۔

مقدار خوراک :- ایک گولی بوقت شب، غذا مقوی و مرغن دیں، زرخشی
اور اجبار سے پرہیز کریں، بے حد مقوی باہ اور ممسک ہیں۔

جوہر سم الفار :- دھتورہ کے کچے پھل رجن میں دھنیت نہ بڑی ہو
لے کر ان کا نشیرہ نکالیں، سم الفار کو اس نشیرہ کے ساتھ تین یوم کھل کر کے
حب بقدر بخود بنا لیں، اور سایہ میں خشک کر لیں۔

پھر ان کو دو پیالوں میں گل حکمت کر کے جوہر اڑالیں،
فوائد :- یہ جوہر مقوی باہ اور ممسک ہیں۔

مقدار خوراک : ایک چادل مسکہ یا پتاشہ میں حسب مزاج ایک ہفتہ تک کھاتے رہیں، بغیر ترشی انزال نہ ہوگا۔ قبل از جماع ایک گولی مسک ہے۔
حب مغوی باہ : ایک ہفتہ ۶ ماشہ، فلفل سیاہ ۲ ماشہ، عنبر اماشہ، زعفران اماشہ، لونگ اماشہ، جلتوری اماشہ، جا کفل اماشہ،

کر پلا کے پانی میں کھول کر کے گولیاں بقدر خود بنا دیں، خوراک اگولی تا ۲ گولی
مراہ دودھ گائے یا بکری، کمزوری باہ کے لئے مفید و تجرب ہے۔
ششہ خراطین : خراطین زندہ ایک سیر لے کر رات کو ترش چھاچھ میں ڈال کر رکھ دیں، صبح کو نکال لیں، صاف ہو جائیں گے، پھر گائے یا بھیش کا صاف گوشت تھالی وغیرہ میں لے لیں تاکہ زمین پر گر کر اس میں مٹی وغیرہ نہ مل جائے، پھر خراطین مصفے کو اس گوشت میں ملا کر اسیلے بنا لیں، لیکن یہ احتیاط رکھیں کہ خراطین ٹوٹ نہ جائیں، ان ادویوں کو گرد و غبار سے بچا کر دھوپ میں خشک کریں، اور با احتیاط جلا کر خاکستر کو پانی سے دھو ڈالیں، جسد خراطین ریشم کی مانند باریک بالوں کی طرح پیچے سے برآمد ہوگا، اب اس کو ایک چھٹانک بنا زبوں کے نگدہ میں کل حکمت کر کے دو سیر ادویوں کی آگ دیں، شگفتہ ہوگا، باریک پس کر شیشی میں ڈال لیں۔

مقدار استعمال و فوائد : قوت باہ کے لئے بہتر ایک خض کافی ہے اس سے اتنی قوت پیدا ہوتی ہے، کہ ضبط مشکل ہے، اگر چند سے زیادہ قوت بڑھ جائے، تو دی کے پلانے سے اس کا تدارک کرنا پڑتا ہے،

قوت مردی کو بڑھانے والا نسخہ : لطیف شباب

بیج بندہ ۵ تولہ، موصلی سفید ۲ تولہ، جا کفل ۱ تولہ، جلتوری ۲ تولہ، قرنفل ۱ تولہ،

دارچینی ۱ تولہ، خولجاں ۱ تولہ، شمال پتر ۱ تولہ، زعفران کشمیری ۲ تولہ،

جملہ ادویہ علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر رکھیں،

ایک ٹیکٹ خضیوں کا تخارج ۲۰ تولہ کشتہ سم الغار کشتہ ونا وکشتہ سر دھاتا
ہر ایک ۳ ماشہ کشتہ صدف مرداریدہ ۱۰ تولہ کشتہ چاندی ۶ ماشہ ورق طلا ۱ ماشہ
شہد اس قدر ملائیں کہ معجون بن جائے۔

مقدار خوراک ہر ۲ ماشہ تا ۲ ماشہ سمراء دودھ چھ مہینات کی سرتاج
ہے ہر قسم کی کمزوری سستی نامردی وغیرہ کو دور کر کے نامرد کو مرد بنانے والی
دوا ہے جسم کو سرخ اور موٹا کرتی ہے ایک مہینہ کے استعمال سے پانی وزن
بڑھ جاتا ہے مقوی دل و دماغ ہے۔

جو ہر شباب :۔ سیاب مصفی ۱۰ تولہ معز حاکوٹ ۶ ماشہ سم الغار سفید
۶ ماشہ سب کو کھریں میں ڈال کر سمراء پانی کنوچہ سحق کریں جب ۳ تولہ پانی کنوچہ
صرف ہو جائے تو غلولہ بنا کر سایہ میں خشک کریں بعدہ ایک عدد ہیفہ مرغ کی
نصف زردی اور نصف سفیدی نکال کر غلولہ میں ڈال کر منہ بند کر دیں پھر زرخ کنوچہ
کو معراض سے باریک بڑھ ریزہ کر کے شیر مدار کے ساتھ کھریں کریں جب قابل شمار
ہو جائے ہیفہ پر شمار کریں اور سایہ میں خشک کر کے چار دفعہ کے بعد دیگرے
عمل حکمت کر کے خشک کر لیں ابھی طرح خشک کرنے پر تین میر منگی بڑ میں رکھ کر
گڑھے میں رکھ دیں جب سرد ہو جائے نکال لیں باورن بڑگ سفید کشتہ بڑگ
نوا نامہ :۔ قوت باہ کے لئے مفید ہے کیسا ہی گیا کڈرانا مرد ہو چند
جو ہر ہو جاتا ہے قوت باہ از سر نو پیدا ہو کہ جوانی کا مزایا داتا ہے کہنے سے
کہنے مریض بفضل خدا شفا پاتے ہیں بلکہ سر سن نامرد کے لئے حکم اکسر رکھتا ہے
مقدار خوراک :۔ بقدر دانہ اخروہ دل نمکھن میں رکھ کر دیں پر ہیز ترش
تیل نمک اور سرخ مرقہ کم پھیلی اور جماع سے پرہیز
غذا مرغین کھائیں تجزیہ شدہ ہے

لطیف شباب :۔ سم الغار سفید ۱۰ تولہ بشتنگ ۱۰ تولہ پکی افیون ۱۰ تولہ

زردی بیضہ مرغ ۱۶ عدد پہلی تینوں اشیاء کو زردی بیضہ مرغ میں کھول کر ہیں اور گولیاں بقدر ماسش بنا دیں۔
 مقدار خوراک : ایک گولی ہمراہ دودھ آدھ سیر استعمال کریں مقوی باہ دفع جریان واحتلام ہے۔ اعلیٰ درجہ کی ٹانک ہے۔

کشتہ شنگرف سفید : ایک پرانے درخت مدار کی جڑ میں سوراخ کر کے اس میں دو تولہ شنگرف رقی کی ڈلی رکھ کر آگے دی برادہ رکھ کر آرد ماسش کے ساتھ موٹا کپڑا چسپاں کر دیں کپڑے پر مٹی لٹا کر بدستور مٹی سے دبا دیں۔ ایک سال کامل وہ ڈولی وہاں پڑی رہے۔ پھر اس مدار کو اکھاڑ کر اس جڑ کے آگے پیچھے سے کھوڑا سا کاٹ کر بخوبی گل ٹکنت کریں خشک ہونے کے بعد دس سیر ادبوں کے درمیان ایک گڑھے میں آگ دیں۔ بزرگ سفید کشتہ پیرآمد ہوگا۔ پس کر محفوظ رکھیں۔

فوائد : نامرد کو مرد بنا نے اور مایوس کو امید دلانے نیز لقوہ، فالج کے لئے تیر بہدف اور اکسیر اعظم کا حکم رکھتا ہے۔

مقدار خوراک : زیادہ سے زیادہ ایک چاول ہمراہ مسکہ یا بالائی کے کھلا دیں جو اس نسخہ کو بنائے گا۔ اس کی تدر کرے گا۔ بارہا کا تجربہ شدہ ہے۔
 حسب مقوی باہ : رسم الفار خام ۴ رتی، ورق طلا ۴ رتی، فیرالی ناس ۴ ناس، کچید مدبرہ تولہ، کشتہ شنگرف رومی اتولہ، سفوف بنا کر شہد ملا کر رتی برابر گولیاں بنائیں۔
 مقدار خوراک : دو گولی صبح، دو گولی شام ہمراہ دودھ۔
 غذا مرغین کھائیں۔

مسک : دفع نامردی باہ، جسم عامہ و نامردی کے لئے مفید و مجرب ہے۔

روغن بزرہوٹی : بزرہوٹی، سیما، سم الفار سفید ہر ایک دو تولہ
 زردی بھند مرغ کے ساتھ ۵ روز کھل کر کے گولیاں بھر بنائیں اور پتال جستر
 میں تیل نکالیں۔

فوائد : رستی قصب کے لئے ایک خس اس روغن میں آلودہ کر کے
 طلا کریں، اور برگ پان باندھیں، قوت باہ بدرجہ کمال پیدا ہو کر نامرد بھی
 مرد بن جاتا ہے، مجرب ہے۔
 ششہ مرگائنگ : ربعی مصفیٰ اتولہ، پارہ مصفیٰ اتولہ، نوشادر اتولہ
 گندھک آملا سار مصفیٰ اتولہ۔

پیلے قلعی کو صاف کر لیں، پھر کڑھپی میں ڈال کر گھلا دیں، جب پانی
 کی مانند ہو جائے، تو آئینہ سے پارہ ملا دیں، پھر سب کو ملا کر کھل کر کریں،
 آتش شیشی میں ڈال کر سب طرف سے گل حکمت کر کے ایک مٹی کی مینڈیا
 کے درمیان رکھیں، اور مینڈیا ریت سے بھر دیں، لیکن شیشی کے منہ کے اندر
 ریت نہ پڑے، چوٹھے پر رکھ کر نیچے لکڑی کی آگ جلا دیں، بوسے کی
 سیخ سے دیکھیں، جب دوا زرد رنگ کی معلوم ہو، تو اتار لیں، مینڈیا ہونے
 پر دوائی شیشی توڑ کر نکالیں، جو دوائی شیشی کے منہ پر لگی ہو، وہ نہ لیں
 بلکہ جو سونا کے رنگ کی دوا ہو، اس کو پیس کر محفوظ رکھیں۔

مقدار خوراک : ۲ چاول تا ۴ چاول ہمراہ کھن، بالائی وغیرہ، مقوی باہ
 دافع جربان، احتلام، سرعت انزال ہے، قوت باہ کے لئے اکسیر ہے۔

جوب مرج البحرین : زردق لغزہ ۲ ماشہ، ورق طلا ۳ ماشہ، مرداریدہ
 ماشہ، یا قوت ماشہ، زبرقترہ خطائی ماشہ، عنبر ماشہ۔

عرق گلاب میں کھل کر کے سرمہ سا بنائیں، بعدہ شکرٹ اتولہ کو رز

کنجشک میں ملفوف کر کے بریاں کریں، اسی طرح دو عدد زکنجشک میں کریں

بعدہ ۲۲، انڈیز میں بریاں کریں، اس کے بعد لاجی کلاں ۲ تولہ، سم الفار ۴ ماشہ، رقر نقل ۱ تولہ، بارک سفوف کر کے سب دواؤں کو یک جا کر کے آب جوز میں ایک گھنٹہ کھل کر کے خوب بقدر مونگ تیار کریں،
 مقدار خوراک: ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ شیر گاؤ دیں، دس دن استعمال کریں، پھر قدرت خدا ملاحظہ فرمائیں،

اکسیر اعلیٰ: جو اہر جہرہ خالص، کشتہ سونا، کشتہ چاندی ہر ایک ۱۰ ماشہ، کشتہ فولاد ۳ ماشہ، کشتہ قشر بمبئیہ مرغ ۳ ماشہ، سر کلنیاہ ۴ گرین، ایڈ آر سنک ۴ گرین، ہر ایک سفوف تیار کریں،

مقدار خوراک: ہر اجادل تا ۲ اجادل تکھن یا بانائی میں رکھ کر کھلاویں، غذا مرغ، چوری، حلوا و شیر ہو، ایک خوراک صبح ایک خوراک شام کو دیں،
 اعلیٰ درجہ کی مقوی باہ، مقوی اعصاب، مقوی اعضائے رئیسہ ہے، طاقت کا ٹھکانہ، مارتا ہوا سمندر ہے،

دوائے مقوی باہ: ہر شہد بلاور، شہد خالص، روغن گادہ ہون لے کر ایک جوکشن دے کر رکھ لیں، بعد برداشت مریض کو پلا میں، یہ تقویت باہ کے لئے عجیب ہے،

جوسب اکسیر باہ: ہر شہد سم الفار، سفید، افیون، ہر سہ ہون ہر ایک میں کہ چھو ہاروں میں سے گھٹلیاں نکال کر یہ دوائی بھر کر دھاک سے باندھ کر اوپر گندم کا آٹا لپیٹ کر کے بھو بھل گرم میں سرخ کریں، پھر نکال کر آٹا دور کر کے مع چھو ہاروں کے ٹوٹ کر بخودی گویاں تیار کریں،
 مقدار خوراک: ہر گولی ہمراہ مکھن ۵ تولہ استعمال کریں، اگر مکھن نہ ملے تو دودھ سے بھی کھا سکتے ہیں،

منافع: ہر سوائے نادر زاد نامردی کے تمام قسم کی کمزوری کے لئے

لاجواب تحفہ ہے، سات یوم میں فائدہ ہوتا ہے، دوران استعمال میں اگر گرمی معلوم ہو، تو شربت بزوری استعمال کریں۔

نوٹ، یہ نسخہ چھوہاروں کے بجائے ۵ عدد زردی بیضہ مرغ میں بھی کھل کر کے تیار کیا جاسکتا ہے۔

معجون الثوم، تقریباً پانچ سیر چنے رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو ہلکی آبیج پر پکا ئیں، جب پانی سیاہ ہو جائے، تو پانی کو چھان کر صاف کریں، اس کے بعد نوم دس، نصف سیر لے کر ایک ایک دانہ کو صاف کریں، اور اس پانی میں اس قدر پکا ئیں، کہ گل کر مشل بھیجے کے ہو جائے، پھر اس پر گائے کا تازہ دودھ اس قدر ڈالیں، کہ چار انگشت اوپر چڑھ آئے، اور چراغ کی لو کی مانند ہلکی آبیج پر پکا ئیں، یہاں تک کہ دودھ خشک ہونے کے قریب ہو جائے، اس کے بعد اس پر بقدر چار انگشت روغن گائے کا تازہ ڈال کر اسی طرح ہلکی آبیج پر پکا ئیں، جب گھی بھی منجمد ہو جائے، تو کسی تانبہ کے برتن میں ڈال کر خوب اچھی طرح مخلوط کریں، اور بقدر چار انگشت شہد مصفیٰ اس پر ڈال کر پکا ئیں، جب منعقد ہو جائے، تو زردی سرخ، زردی سفید ہر ایک ساڑھے چار تولہ، قفل سیاہ ساڑھے تیرہ ماشے، پودینہ خشک، زیرہ سیاہ خولجاں، دارچینی ہر ایک پونے چار تولہ، دار قفل ساڑھے بائیس ماشے، سب کو کوٹ چھان کر ملائیں، اور سبوں کے سبز رنگ میں حفاظت سے رکھیں، اور حسب برداشت کھائیں۔

منافع، سردی اور تری کے غلبہ سے قوت جماع کا باطل ہو جانا اور بغم خام کو نافع ہے، قوت میں زیادتی پیدا کرتی ہے، رنگ کو صاف کرتی ہے کھانے والے کی ہیبت جوانوں کی سی ہو جاتی ہے، غرض ہر سرد بیماری کے لئے سرد مند ہے، بدن کو گرم کرتی ہے، مجفف معتد اور معجم طبیعت کے سرد موسم میں کھائیں

اکسیر عنانت : بر کشته سونا اچا دل کشته سم الفار اچا دل کشته
 فولاد ۴ چا دل ، یو ہمین اچا دل ، سر کینیا ۱۰ چا دل ، عقر قرچا ۲ چا دل ، عنبر
 ۱۰ چا دل ، کستوری ۲ چا دل ،

سب کو ملا کر ایک خوراک تیار کریں ، بعد از غذا دیں ، صغف انتشار
 اور نامردی میں بے حد مفید ہے ، قوت باہ بڑھاتی ہے ،

لعوق حب القطن : مغز پنہ دانہ ۳ تولہ ۴ ماشہ ، دار حینی
 قر نفل ، چلغوزہ ، تخم ادنگن ہر ایک ۰۲ تولہ ، شقائق مصری ، زنجبیل
 ہر ایک ۱ تولہ ۸ ماشہ ، کا سچل ۱۲ ماشہ ، قسط ، تخم کتان بریاں ، مصطکی
 ردی ہر ایک ۸ ماشہ ،

سب کو باریک کریں ، اور شہد خالص کف گرنہ سے چند کو ملیں آگ پر
 رکھ کر پکا لیں ، جب منعقد ہونے لگے ، تو ادویہ مذکورہ بالا ڈال کر نیچے
 اتار لیں ، اور خوب ملا کر محفوظ رکھیں ،

فوائد : شہوت باہ کے مایوس مریضوں کی قوت باہ اس کے استعمال
 سے عود کرتی ہے ، آواز کو صاف کرتی ، سددوں کو کھولتی اور مثانہ و گردہ
 کے صغف کو دور کرتی ہے ، سوزش بول ، سنگ گردہ اور مثانہ ، دشواری
 تنفس اور دمہ کو نافع ہے ، اس کی قوت تین سال تک رہتی ہے ،
 مقدار خوراک ۱۰ ماشہ سے ،

دو اسے نامردی : سم الفار ، مشک ، ورق طلا ، ہر ایک چار رتی ، زعفران
 جا نفل ، جلو تری ہر ایک دو دو ماشہ ، یکے بعد دیگرے حملہ ادویہ کو کھول کر کے باریک
 کر لیں ، مقدار خوراک ۱۰ ماشہ ، اگر سن آدھ یا دو گھن میں ملا کر دیں ، دوران
 استعمال شیر گاؤ اور روغن زرد بکثرت استعمال کریں ، گرم خشک اشیاء سے پرہیز
 لازمی ہے ، ایک ہفتہ میں اپنی تاثیر دکھاتا ہے ، نامردی کے لئے اکسیر ہے ،

روغن نخود بہ چنے کا تیل تقویت باہ کے لئے نہایت مفید ہے ۔
اگر اس کو شہد کے ساتھ جو شش دیں ، اور بڑی بڑی معجونوں میں استعمال کیا جائے
تو کسی زبان کو اس کی منفعت بیان کرنے کی قدرت حاصل نہیں ، یہ اسرار مخفیہ
میں سے ہے ، بعض اوقات چنوں کے ساتھ کلوچی بھی شامل کر لی جاتی ہے
اس سے اس کا نفع بڑھ جاتا ہے ۔

اکسیر نامرودی :۔ شکر ۵ تولہ ، سنکھیا سفید ۱ تولہ ، زردی بیضہ مرخ
۴۴ عدد ، پہلی دونوں ادویہ کو خوب باریک پیس کر زردی بیضہ مرخ ملا کر کھل کر پیس
اور کسی آہنی کڑھی میں ڈال کر کوئلوں کی تیز آگ پر رکھ دیں ، اور آہنی کھریچہ سے
جلد جلد ہلاتے رہیں ، تھوڑی دیر بعد انڈوں کا غلیظ مادہ مل کر سرخ سر ہو لی
کے رنگ کا تیل نظر آنے لگے گا ، جب تیل نکل آئے ، اور تیل سے دھواں
نکلنا معلوم ہو ، تو فوراً آگ سے اتار لیں ، اور احتیاط سے نتھار کر تیل کو شیشی
میں ڈال لیں ، بس تیار ہے ۔

فوائد :۔ نامرودی کی اکسیری دوا ہے ، چند خوراکوں سے ناقابل برداشت
وقت پیدا ہوتی ہے ، غذا دودھ ، مکھن ، ملائی خوب استعمال کریں ، یہ دوائی
خاص کر بلغمی مزاج اشخاص کے لئے ہے ۔

مقدار خوراک :۔ ۲ قطرہ تا ۲ قطرہ بعد از غذا استعمال کریں ۔

نوٹ :۔ جن نسخہ جات میں سنکھیا ، پارہ ، شکر ، ہڑتال وغیرہ ڈالی گئی ہوں ، ان کو
ہمیشہ بعد از غذا استعمال کرنا چاہئے ، اور ان کے دوران میں غذا ہمیشہ مرغن
دودھ ، گھی ، مکھن ، بالائی کھانی چاہئے ۔

صغیرادی مزاج کو احتیاط سے استعمال کرانے چاہئیں ، کثرت احتلام یا
سرعت انزال کی شکایت ہو ، تو پہلے ان کا علاج کرنا چاہئے ، بلغمی مزاج
کے لئے بے حد مفید ہیں ۔

حبوب مقوی باہ : ہر کچلہ مدبر ۵ تولہ ، کوئین سلفاس ۵ تولہ ، ست
 سلاجیت ۵ تولہ ، زعفران ۱ تولہ ، آب اورک ۵ تولہ ، آب یان سبز ۱ تولہ ،
 یکے بعد دیگرے ان رسوں میں کھل کر کے شہد خالص کی مدد سے
 حسب بقدر بخود تیار کریں ، ایک حب سرد وقت بعد از طعام کھائیں ، ہمراہ شیر گاؤ
 فوائد : در نخاع و اعضائے تناسل کو قوت دے کر خون پیدا کرنا ان
 گولہوں کا ادنیٰ کر سکتا ہے ، علاوہ ازیں یہ گولیاں مقوی معدہ و حگہ ، مستہی
 اور قبض کشا بھی ہیں ، خواہش جماع کو بڑھاتی اور نظام اعصابی کو قوی کرتی ہیں ،
 ٹانگ پلڑ : ہر ست سلاجیت اصلی ۳ تولہ ، کچلہ مدبر ۵ تولہ کشتہ
 فولاد ۴ تولہ ، مرج نیہ ۲ تولہ ، زعفران ۱ تولہ ،

سب کو بار یک میں کر شہد کی مدد سے بقدر بخود گولیاں بنائیں ،
 مفقدا ر خوراک : ہر ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام دودھ کے ساتھ دین
 کمزوری جسم ، ضعف ، مضم ، دائمی قبض ، کمی خون ، ضعف باہ ، سرعت انزال ،
 جریان ، احتلام ، سستی کے لئے اکسر ہے ،
 کشتہ شکر ف : ہر شکر ف رومی ایک ایک تولہ کی پانچ ڈلیاں
 لے کر ان پر ریشم کی تار لپیٹ دیں ، اور کڑھجی آمینی میں ابرک کا دوق رکھ کر اس پر
 شکر ف کی ڈلیاں بچھا دیں ، اور آگ پر رکھیں ، پھر آب پیاز میں کپڑا یا ردی
 زکر کے شکر ف پر پخوڑنے جائیں ، جب آب پیاز خشک ہو جائے ، دوبارہ
 زکر کے پخوڑ دیا کریں ، یہی سلسلہ جاری رکھیں ، جسے کہ ۱۸ سیر آب پیاز
 خشک ہو جائے ، ایک دن میں قریباً ڈیڑھ سیر آب پیاز خرچ ہو جاتا ہے
 اس حساب سے ۲۲ دن میں کشتہ تیار ہو جاتا ہے ،

طریق استعمال : ہر معمولی کمزور کو نصف رتی اور نامرد کو ایک رتی مکھن یا
 ملائی میں رکھ کر استعمال کرائیں ،

فوائد: ہر سستی وغیرہ کا بے خطا علاج اور چوٹی کا مقوی باہ نیز لغتوہ،
 فالج، رعشہ، استرخاؤ، وجع المفاصل کے لئے اکسیر ہے۔
 اسرار: نسخہ ہر سم الغار، پارہ، افیون مساوی الودن،
 اول سنگھیا اور پارہ کو کھل کریں جب پارہ کے چمک دار ذرات نابود ہو جائیں
 تو انسین ڈال کر مزید کھل کریں، اور سفوف تیار کریں،
 مقدار خوراک: نصف چادرل بھن یا بالائی میں بعد از غذا دیں،
 غذا مرغن ہونی چاہئے، بے حد مقوی باہ سے غصہ کی طاقت پیدا کرتا ہے،
 گولی قوت باہ: ۱۔ مشک خالص، ماشہ، کچلہ مدبر ۲۔ جو گھی میں بریاں کر لیا
 گیا ہو ۶ رتی، لونگ کلاہ دار ۲۱ عدد۔

سب دوائیں باریک کر کے کھل کر کے ملائیں، اور شہد کے ساتھ گولیاں
 بمقدار ایک ایک ماشہ بنائیں۔

طریق استعمال: ہر وقت ضرورت ایک گولی حارح سے تین گھنٹہ
 پہلے چائے یا گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، غذا اس دن بہت کم
 کھائیں، اور دودھ جس قدر پیا جاسکے، پئیں، بلکہ پیاس کے وقت بھی
 دودھ ہی پیتے رہیں۔

فوائد: اعلیٰ درجہ کی مقوی باہ اور مسک دوا ہے، تجربہ کریں،
 بے نظیر چیز ہے۔

تزیان نامردی: ۱۔ بھلاوہ ایک سیر، معز اخروٹ ۱۲ سیر، گھونگھی
 سفید ۲ تولہ، بیخ کنیر سفید ۲۰ تولہ، سفوف کچلہ مدبر ۱۰ تولہ، سفوف مٹھا تیلیم
 ۵ تولہ، سنگھیا سفید ۱ تولہ۔

اول روغن اجزاء کو خوب کوٹ کر دیگر ادویہ کا سفوف کر کے ملا لیں، تین
 انگدے تیار کریں، ایک انگدے میں شکر رومی ۵ تولہ ڈال کر ادھر کچا دھاگہ لپیٹ دیں

نگدہ کو کڑا ہی میں رکھ کر ادھر ۵ توہ تلوں کا تیل ڈال کر چھلے پر رکھ دیں۔
 نیچے آگ جلا لیں۔ حتیٰ کہ نغدہ کو آگ لگ جائے۔ اسی طرح تینوں نغدہ سے
 یکے بعد دیگرے جلا لیں۔ یاد رہے کہ ہر بار نغدہ کو توڑ کر شکر ف کی ڈلی کو احتیاط
 سے نکال لیا کریں۔ ورنہ صفوف بن جائے گا۔ تیسری بار ٹھنڈا ہونے کے بعد
 شکر ف نکال کر باریک پیس لیں۔

مقدار خوراک : نصف رتی سے ۲ رتی تک۔ ادھر سے نیم گرم دودھ

پلا لیں۔ کمزوروں اور نامردوں کے لئے اکسیری دوا ہے۔

برائے قوت باہ : پوسٹ بھلا نوہ رجوشہد کے متصل ہوا کرتا ہے۔ یا جسم
 بھلا نوہ جس میں سے شہد نکال لیا گیا ہو۔ کو اس قدر صاف کریں کہ شہد اس کے
 ساتھ مطلق نہ رہے۔ ۳ تولہ ماشہ خوب باریک کتر کر ایک پیچر کے برتن میں
 ڈال دیں۔ روغن حب الحضر (رجوبادام) روغن والی مشین کے ذریعہ نکالا گیا ہو۔ سے
 اسے خوب چرب کر لیں۔ مگر زائد نہ رہے۔ کندرا تولہ باریک پیس کر یا اس رکھ لیں
 وہ قشر بلا در والا برتن آگ پر رکھ لیوں۔ اور تھوڑا تھوڑا کنڈر ڈال کر ہلاتے
 رہیں۔ ورنہ جل جائے گا۔ جب سب دالسنہ ہو جائے۔ تو سقموننا زرد ۶ رتی
 باریک پیس کر ڈال دیں۔ آگ سے اتار کر تین تین ماشہ کی گولی باندھ لیں۔
 بوقت ضرورت ایک گولی منہ میں رکھ کر جیادیں۔ اور اس کا لعاب نکل جاوے۔
 تھوڑی دیر بعد انتشار ہو گا۔ یہ طاقت دیر تک رہے گی۔ امساک بھی ہو گا۔ ایک گولی
 دین بار کام دے سکتی ہے۔

نوٹ : اس کی تیاری میں احتیاط ضروری ہے۔ ورنہ دھوپیں سے منہ

پھول جائے گا۔

اور گولیاں بناتے وقت ہاتھوں پر گھی مل لیں۔ شاید حار مزاج

کو مضر ہو۔

اکسیر باہ : شمع خالص اتلہ ، سم الفار سفید اتلہ ، ان دونوں کو ہاون برنجی یا چوبی میں اس قدر کوٹیں کہ اس میں بڑے عنبر پیدا ہو پھر اس کی ایک ایک رتی کی گولیاں بنادیں اور ایک چھٹانک روغن گاؤ کے ساتھ ایک گولی ہر صبح کھائیں اور غذا کے شیر و مسکہ جس قدر کھادیں ، مضم ہو ، قوت باہ کے علاوہ امساک کے گٹن گادیں ، امرار صدر یہ ہے ۔

نامردی کا ہومیوپیتھی علاج

معمولی نامردی میں گنس کاسٹس ۳ x ، جس نامردی میں خستے لاغریوں ، کالی بردمٹم ۳ x ، کثرت مباشرت کی وجہ ہو ، ڈاںڈ فاسفورک مدرٹنگچر ۲ قطرے عصبی کمزوری ، چڑچڑاہٹ ، معدہ کی خرابی اور قبض کے لئے نکس دامیکا ۳ x عمر رسیدہ آدمیوں کی نامردی کے لئے لائیو پوڈیم ... یا یا سی ایم مہتہ و دہتہ بعد میں اگر ان سے فائدہ نہ ہو ، تو سیلینم ۶ x ، یوفو ۳ یا ۲۰ صبح و شام کیلڈیم ، نیرم فاس اور لائیو پوڈیم کی واحد ادھی خوراکیں بھی مفید ہیں ،

انرو PHEMOSIS (فانی موس)

یہ مرض اکثر پیدائشی یا کبھی آتشک کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے حشفہ پیچھے نہیں ہٹتا ، اس کا واحد علاج حشفہ کرا دینا ہے ۔

بہور حشفہ BALANITIS (ہیلہ ٹیس)

تعریف : اس میں حشفہ متورم ہو جاتا ہے ، وجوہات اور سوزاگ ، گندی جگہ پر بیٹھنا ، صفائی نہ کرنا ،

علاج: در دم کو صاف کرنے کے لئے پوٹاشیم پرمنگنیٹ کا سولوشن استعمال کریں۔ پانی کے پیتے پانی میں پکا کر دھوئیں۔
 سلفا گروپ کھانے کے لئے دیں، زنک اوکسائیڈ آئرنٹ یا بورک آئرنٹ زخم پر لگائیں۔ ہسپتال آئرنٹ لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

ورم غدہ ندی

PROSTATITIS

(پر اسٹے ٹائیٹس)

وجوہات: درمغلی بیماریاں، مثانہ کی پتھری وغیرہ اس کے وجوہات ہیں۔
 تشخیص: درپیشاب کی حاجت بار بار، مثانہ اور سیون میں سخت درد محسوس ہوتا ہے، مریض کو پاخانہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پاخانہ کرنے وقت سخت درد محسوس ہوتا ہے۔

علاج: دردم کو رفع کرنے کے لئے مارفین اور بیلاڈونا کی سپازمیٹری استعمال کریں۔

فیملہ مائیہ HYDRO CELE (ہائیڈروسیل)

وجوہات: درمرض آشک، درم خصیہ اور کبھی پیدائشی ہوتا ہے۔
 علامات: اگر فوطوں کے ایک طرف روشنی گردی جائے، تو دوسری طرف روشنی ظاہر ہوتی ہے۔

علاج: درخفیف حالت میں ٹیکچر آپریٹورین استعمال کریں، اگر اس سے آرام نہ آئے، تو آلہ ٹوکس کے ذریعہ پانی خارج کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات آپریٹورین کرنا ضروری ہوتا ہے۔

درد خصیہ

تعریف : اس مرض میں خصیوں میں درد ہوتا ہے۔
 وجوہات : در کثرت جماع، جلق، ریگ گردہ، وجع مفاصل، آتشک،
 سوزاک، نفرس وغیرہ اس مرض کے اسباب ہیں۔
 تشخیص : رچی منگاتا ہے، درد ہوتا ہے، اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔
 علاج : یہ مرض ریح کے بند ہو جانے اور سود و مضغ سے ہوتا ہے۔ بعض
 اوقات اس کا سبب سوزاک بھی ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں سینک کریں،
 اگر درد کی شدت ہو، تو برف باندھنا بھی فائدہ کرتا ہے، مسکنات درد دے پی پی سی
 سارپیدان یا کوڈوپائیرین وغیرہ ایک ایک ٹمبہ کھلائے سے آرام آ جاتا ہے، سخت درد
 کی صورت میں مارنن اڑوین کا جلدی انجکشن کریں، سوزاک کی وجہ ہو، تو پینسلین
 ۵ لاکھ یونٹ کا عضلاتی انجکشن کریں، بے حد مفید و تجرب ہے۔

فوطوں کی خارش

PRURIGOS CROTI

(پہ درائیگو سکرہ طانی)

تشخیص : در تیز مصالح دار چیزوں کا زیادہ استعمال، اندر سنی، اور دھند
 اور میل گٹنے سے یہ مرض پیدا ہو جاتی ہے۔
 علاج : در فوطوں کو صاف رکھیں، پوٹاسیم پرمینگنیٹ کے لوشن سے صبح شام دھوئیں
 اکسیر خارش : در باجی اولہ، اجوائن خراسانی اولہ، تخم حماض اولہ، صندل سرخ اولہ
 ہندہ حقوۃ ۶ ماشہ، گندھک اولہ سار اولہ، نفل سیاہ ۵ دانہ، باریک سفوف بناویں،
 ترکیب استعمال : ۶ ماشہ سفوف کو روغن سرشت ۲۰ تولہ میں ملا کر مالش کریں، درد گھٹنے بعد
 پانی سے دھوئیں، بہتر ہے کہ رات کو مل کر صبح کو ہنائیں۔

ورم مثانہ : CISTITIS (سٹائٹس)

وجوہات تشخیص : اس مرض میں پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے مگر تھوڑا تھوڑا آتا ہے، اگر مرض بڑھ جائے، تو مقام مثانہ پر درد ہوتا ہے، پیشاب بدبودار اس میں خون اور لغم کی آمیزش ہوتی ہے،
علاج : نسخہ ورم مثانہ : ہر یورد ۲۰ پیپ ۵ گرین، ٹیکچر ہائیوسکس ۵۰۰، سپرٹ کلورونام ۲۰۰ منم۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں، اور مثانہ پر پوست خشناس وغیرہ کی ٹیکور کریں، ورم مثانہ کے لئے مفید و مخرب ہے،
سبازول (SBAZOL) مقدار خوراک آٹا ۲ ٹکیہ دن میں تین بار ۳ گھنٹے یا دس دن تک کھلائیں، ورم مثانہ کے لئے مفید و مخرب ہے،

پائیریڈیم : PYRIDIUM
یہ دوا سفید بلک اسٹ اور گزامین سے تیار کی گئی ہے، اعصاب بول کے غشائے مخاطی پر خاص مسکن اثر رکھتی ہے، مثانہ کے سکڑنے والے عضلہ کو ڈھیلا کرتی ہے، عسر البول، مثانہ کی خراش، لفظر البول، غدہ تدامیہ کا بڑھ جانا کے لئے بے حد مفید ہے، مثانہ سے متعلق بول کو خارج کرتی ہے۔

جوان آدمی کے لئے ۲ ٹکیہ قبل از غذا، ۱۲ سال کے لئے ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں،
غذا زود ہضم دیں۔

INCONTINENCE OF URINE

سلسل البول

وجوہات تشخیص: ہر ٹنڈی اور تیز چیزوں کا بکثرت استعمال، سردی لگنا، زیادہ پیس، ضعف و نقاہت، بچنے دھڑکا ناچ، گرم امعاء، خروج مقعد وغیرہ اس کے اسباب ہیں، بلا ارادہ و بے اختیار پیشاب خارج ہو جاتا ہے اور گاہے بستر پر ہی پیشاب نکل جاتا ہے۔

علاج: دراصل سبب کو دریافت کر کے رفع کریں، کشتہ مفید مرغ اس کا کامیاب علاج ہے، مقدار خوراک اسی کے ساتھ چھوٹا سا سفید ماشہ کھلائیں، دو اے سلسل البول: رکندر، مصطکی، رومی، گل سرخ، ناگر موہنہ، خولجیاں، جفت بلوط، گھنار، ہر ایک مساوی وزن کوٹ چھان کر سفوف بنادیں، مقدار خوراک: ماشہ، همراه عرفی سولف راست کو سو۔ نو دقت دیں، زیادتی پیشاب کے لئے نہایت مفید ہے، تخریب شدہ سبب۔

اکسیر سلسل البول: چھلکا اسٹینول۔ رنی، بکریا رکندر کی جواں سورتی کشتہ طبعی آرتی، مٹری ۲ رتی، یہ ایک خوراک ہے، ایسی ایک ایک شاکہ دن میں تین بار تازہ درودھ کے ساتھ دیں، سلسل البول کثرت بول کے لئے اسے تین دن دیا ہے، ویسی نسخہ: ہر کالے تین اولہ، اگر ۲ اولہ ملا کر کورس کر کھنڈیں، دن میں دو بار کثرت بول، بول نے الغرائش کے لئے مفید ہے۔

دو اے بول بستر: ایفی ڈرین ۱۰ گرین، دن میں تین خوراک دیں، ہمراہ آب، کثرت بول اور بول فی الغرائش کے لئے مفید ہے۔

جدید دوا: ایتھیرائیڈ، مقدار خوراک ۱۰ تا ۱۵ گرین صبح و شام ایک ایک ٹیکہ پانی سے دیں، بول فی الغرائش اور سلسل البول کے لئے مفید ہے۔

باب دوازدہم عورتوں کی خاص بیماریاں

احتباس الطمث
AMENORRHOEA
(ایکے نوریا)

وجوہات تشخیص : اس مرض میں یا تو خون بالکل بند ہو جاتا ہے یا رک رک کر، بے قاعدہ، درد سے حقوڑا حقوڑا آتا ہے۔
اگر بالغ ہونے کے بعد حیض بالکل جاری نہ ہو تو اسے حقیقی بندش حیض کہتے ہیں۔ اگر جاری ہونے کے بعد بند ہو جائے، تو اسے غیر طبعی بندش حیض کہتے ہیں۔ یہ روکاؤٹ کبھی تو پیدا کئی ہوتی ہے، اور کبھی کسی مرض کے سبب ہوتی ہے۔ اگر پردہ بکارت میں سے کوئی سوراخ نہ ہو، تو خون جاری نہیں ہوتا، مگر درد، اعضا، شکنی، درد سرد وغیرہ ہوتا ہے، اور کبھی اعضائے تناسل پیدائشی نہیں ہوتے۔

غیر طبعی حیض کی بندش میں حمل کا ہو جانا، بچہ کے دودھ پلانے کے زمانہ میں بھی اکثر عورتوں کو بندش حیض ہو جاتی ہے، لیکن بعض کو جاری ہو جاتا ہے،

نیز مندرجہ ذیل اسباب سے بھی بندش حیض ہو جاتی ہے، اور یہ عام سبب
ہیں، مثلاً جسم میں خون کا بہت کم ہونا، تپ دق و سل، ذیابیطیس، دل، جگر
اور گردوں کی مراضوں کا لیف، دوران حیض میں سردی لگ جانا، موٹاپا، سوزش
خصیتہ الرحم، سیلان الرحم، استسقا ہونا، امراض عذرا اور منشی چیزوں کے استعمال
سے بھی حیض بند ہو جاتا ہے۔

علاج بر اول سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کریں، اگر پردہ بکارت
میں سوراخ نہ ہونے کی وجہ ہو، تو پردہ بکارت میں سوراخ کریں،
اگر کمی خون ہو، تو کمی خون کا علاج کریں، اور مقویات، فولاد و ٹامن
کا استعمال کریں، اگر رحم کو سردی لگ گئی ہو، تو مقام رحم پر سینک کریں، اور
مندرجہ ذیل نسخہ کو حسب علامات استعمال کریں۔

مستورانی در ست حبر سقوطی ۴ تولہ، مرکی ۴ تولہ، زعفران ۱ تولہ،
کشتہ فولاد ۱ تولہ، ہینگ ۱ تولہ، شہد ملا کر بقدر خود گویاں بنائیں۔

خوراک اگر کوئی صبح و شام قبل از یام حیض دو معینہ، یہ دوا عورتوں کے جلد
امراض کی حیض، بیقاعدگی حیض، کمی خون، درد حیض، ضعف جگر، نفخ معده
درد سر، درد کمر اور اختناق رحم وغیرہ میں مفید ہے، رحم کی جلد خرابیاں درد ہو جاتی
ہیں، رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔

مدر حیض در حب القرطم ۹ ماشہ، تخم خربوزہ ۹ ماشہ، مشکطرا مشبع ۹ ماشہ
سولف ۹ ماشہ، ہوسیر ۹ ماشہ، گلقد ۵ تولہ۔

جلد اردو کو تین پاؤ پانی میں جو شش دیں، نصف رہنے پر مل چھان کر
نصف صبح اور نصف شام کو پلا دیں، ایام ماہواری سے تین دن پہلے استعمال کریں
خون حیض کھلے اور بلا تکلیف آئے گا۔

دیس در یونہ خطائی ۹ ماشہ، چینی سفید ۹ ماشہ، سفوف بنادیں۔

بمراہ آب کھلا دیں جب حیض آنے سے پہلے نلوں میں سحنت درد ہو
اور حیض نہ آئے۔ ایک خوراک سے ہی درد رحم دور ہوگا۔ مفید و تجرب ہے۔
سفوف مدر حیض در پوند چینی، سوزہ قلمی، جو کھار، زبرہ سفید ہر ایک
تولہ تولہ بستکری ہموزن ادویہ، سب کو کٹ چھان کر سفوف بنادیں۔

مقدار خوراک ۷ ماشہ ہمراہ آب دن میں تین بار قبل از ایام حیض ایک مہینہ
شروع کریں حیض جاری کرنے کے لئے مفید ہے۔

طلم حیض کشا در تبا کو خوردنی، نوشادر، ہمبرزرد، چونہ، صدف ہموزن
باریک میں کرانی ملی بنیاں تیار کریں، بلونت ضرورت کیسٹرائیل سے چرب
کر کے فرج کے اندر رکھائیں، ایک دن میں خون جاری ہوگا۔

البضا، نوشادر، ماشہ، نمک سیاہ ۱۰ ماشہ، لوطاچی ۲ تولہ، صابن دبی
بقدر ضرورت، شافہ تیار کر کے نم رحم کے اندر رکھائیں، در تین روز استعمال
کرائیں، رحم کا منہ کھولنے اور حیض جاری کرنے کے لئے مثیل ہے مسقط جنبن ہے
مکسیر مدر حیض ۱۰ ٹنگریرالی، پورکلور، امم، ٹنگریر، بنوز، ۱۰ مہم، ٹنگریر مرہ
۲۰ مہم، ٹنگریر نکس، دامیکا، ۱۰ مہم، ایچوا ایک ایش۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں حیض جاری کرنے کے
لئے مفید ہے۔

ڈاکٹری لٹمخہ، رگینیشیا سلفاس، ڈرم، ٹنگریر ایوز، ٹنگریر جنجر، ہونڈ،
انیوژن آف، سٹا، ایسی ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد پلا دیں، عارضی احتباس
کے لئے مفید ہے، جب کہ مرلیضہ کو قبض ہو، اور جسم موٹا تازہ ہو۔

ایلی ٹریس کارڈیل (ALETRIS CORDIAL) ری اوپیکل
کمپنی امریکی تیار کردہ ہے، یہ ایک مقوی رحم دوا ہے، حیض بند ہونا یا بیقاعدگی
حیض، تشکی حیض وغیرہ کے لئے اس کا استعمال مفید ہے۔

مقدار استعمال ایک چمچ چائے دن میں تین بار ہمراہ آب
 لائیکوار سیڈنس ساختہ پارک ڈیوس
 مقدار خوراک نصف سے ایک چمچ خورد گرم پانی میں ملا کر دن میں تین
 چار بار دیں۔ عسر الطمث جھین کے تکلیف سے آنے کو مفید ہے۔

عسر الطمث کا ہومیوپیتھی علاج

اگر سردی لگ جانے سے خون حیض بند ہو گیا ہو، یا خوف کی وجہ سے بندش ہو اور
 ماضی ہی بخار ہو، تو ابتدائی اکونائٹ دینے سے خون حیض جاری ہو جاتا ہے،
 اگر شروع ہی سے خون جاری نہ ہو، یا سرد پانی میں پاؤں تر رکھنے کی وجہ سے
 بندش ہو گئی ہو، تو ایسی حالت میں پوسٹلا ۳ بہترین چیز ہے اگر شروع میں
 حیض کے آنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی ہو، سر میں پسینہ پاؤں ٹھنڈے
 رہنا، دل کی دھڑکن اور پیچھے کمر درد ہوں، تو ایسی حالت میں کاکبریاکارب ۳۰
 سے بہتر کوئی دوائی نہیں ہے۔ اگر حیض کا خون آنے کی بجائے نکسیر پھوٹے
 پیاس کی زیادتی، جوڑوں میں درد اور حرکت سے تکلیف ہو، تو برائی ادینا ۳ بہتر
 ہوگا، اگر حیض کی مقدار بہت نسیل ہو، درد، بوجھ اور حیض رکا ہوا ہو، تو
 کالونا ٹیم ۳ کے لینے سے فوراً فائدہ ہوگا، اگر درد بہت ہی ناقابل برداشت
 ہو، تشنج کے دورے پڑتے ہوں، تو گینیشیاناس شروع فائدہ کرے گا، اس
 دوائی کو ہمیشہ گرم پانی میں حل کر کے دینا چاہئے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا،
 اگر مکر سے لے کر ان تک اور کوٹھے تک سخت درد ہو، اور درد ایسا معلوم
 ہو جس طرح کہ وضع حمل کے وقت ہوتا ہے، جیسے ہوئے خون کے لوتھرے برآمد
 ہوں، کمزوری بہت ہو جائے، تو سمی سی فلوگا ۳ دیں،

کثرت حیض

MENORRHAGIA

(مینیورے جیا)

وجوہات تشخیص : اس مرض میں خون طبعی قدر سے زیادہ آتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں،،،، کبھی یکبارگی زیادہ مقدار میں آتا ہے، اور (۲)، کبھی غوطہ اٹھوڑا بہت دنوں تک خارج ہوتا رہتا ہے۔

اس مرض کے عام اسباب یہ ہیں۔ درم رحم، رسولی رحم، زخم رحم، وضع حمل کے بعد رحم کا اچھی طرح نہ سکڑنا، دائمی قبض، ہائی بلڈ پریشر، عقم، غصہ، خوشی کی زیادتی، پیری یا بخار، انفلوئنزا، تب تھرقہ، سکر دی، رحم کا ٹل جانا، جسم میں خون کا زیادہ ہونا، کثرت جماع وغیرہ۔ اور ہر ایک سبب کی تشخیص اس کی خاص علامت سے ہو سکتی ہے۔

علاج : یہ اصل سبب مرض کو معالجم کر کے رفع کریں، حسب مریضہ کو خون کثرت سے آئے لگے، تو بستر پر آرام سے لٹائیں، اور چار پانی کی پائنتی کو اور پچا رکھیں، اور کسی قسم کی حرکت نہ کرنے دیں، مندرجہ ذیل نسخوں کا استعمال کریں۔

اکسیر الدم :۔ سنگ جراح عمدہ الاول، گیر الاول، سفوف بنادیں،

مقدار خوراک :۔ ماشہ شربت، بخار یا خمیرہ خشخاش کے ساتھ دیں،

فوائد :۔ یہ دوا جاری خون مستلک لفت الدم، قے الدم، خونی اسہال، کثرت حیض و نفاس وغیرہ کے لئے معجزہ نما اثر دکھاتی ہے، معمولی اور ہر جگہ ملنے والی دوائی ہے، فوائد کے لحاظ سے بہترین ادویہ میں سے ہے۔

اکسیر ربائے کثرت حیض :۔ رال خاتم، گیر، سنگ جراح ہموزن لیکہ

باریک میں لیں۔

مقدار خوراک ۳ ماشہ دن میں دو بار کچی لسی کے ساتھ دیں، کثرت حیض کو روکنے کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

اکسیر استخوانہ: سنگ جراح ۵ تولہ، سبز دھینا ایک سیر کے نگدہ میں رکھ کر گول نمکت کر کے ۱۵ سیرادپلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں، یہ کشتہ سنگ جراح ۲ تولہ، گل ارمی ۲ تولہ، سفوف تیار کریں، مقدار خوراک ایک ماشہ دن میں تین بار شربت ابخار، نیلوفر، خشخاش یا انار کے ساتھ دیں، کثرت حیض کے لئے جادو اثر چرنی کی دوا ہے، جریان خون کو روکتی ہے۔

خون بند: بھٹکڑی، سرہ سیاه، کھنڈ مفید، سنگ جراح، سر ایک ۳ ماشہ، کبریا شمع، معدت مردارید، افاقیا ہر ایک ۱۰ ماشہ، گوند کثیرا گوند کبکیر، دم الان خون ہر ایک ۷ ماشہ، سفوف تیار کریں۔

مقدار خوراک ۳ ماشہ تا ۶ ماشہ ہمراہ شربت ابخار دن میں تین بار، کثرت حیض، نفاس، نفث الدم، بواسیری خون اور ہر قسم کے جریان خون خواہ جسم کے کسی حصہ سے آ رہا ہو، کو چند خوراکوں سے بند کر دیتا ہے، مجرب ہے مکسیر ہائے کثرت حیض، ایکٹرکٹ لیکو بیڈارکٹ ۲۰ منم، گیملک ایڈ ۱۰ گرین، ٹیکچر او پیانی ۲۰ منم، ایکوا ایک اولس۔

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں، کثرت حیض کو روکنے کے لئے نہایت مجرب ہے، غذا ساگروانہ، کھچڑی، دال مونگہ وغیرہ، ڈاکٹری نسخہ: ٹیکچر فیرائی پر کلور ۱۰ بوند، ایکٹرکٹ ارکٹ لیکو بیڈ ۱۰ بوند، ایڈنا سفورک ڈل ۱۰ بوند، پانی ایک اولس۔

سب کو ملا کر ایسی دو خوراک روزانہ دیں، کمزوری، کثرت حیض وغیرہ کے لئے بہت مفید ہے۔

و نوٹ، جو خون عورت کے اعضائے نہانی سے حیض کے علاوہ
خارج ہو، اسے استخاضہ کہتے ہیں، عام طور پر کثرت حیض کے
اسباب ہی اس کے اسباب ہوتے ہیں، اور اس کے علاج میں
وہی ادویات استعمال کی جاتی ہیں،

اکسیر جریان خون: کشتہ سنگ جراح اقولہ کشتہ سترتال گوہر نئی ایک تولہ،
برگ بالسنہ ۵ تولہ، سب کو ملا کر با ایک سفوف تیار کریں،
مقدار خوراک ایک ماشہ ہمراہ شربت ابخار ہر چھ گھنٹہ بعد ایک ایک
خوراک دیں، کثرت حیض و نفاس، اسہال و حوی، بخونی بوا سیر، جریان خون ہر قسم
نکسیر، لغت الدم کے لئے اکسیر بے نظیر ہے،

نوٹ کشتہ سنگ جراح برگ نیم اور پختل بوٹی میں کیا ہوا ہونا چاہئے،
صاحب کامل الصناعة نے لکھا ہے: اگر منہ سب تداہر اور ادویہ سے
کثرت خون حیض بند نہ ہو، تو پستان کے نیچے سینگیان لگوائیں، اور اعضا
کو پٹیوں کے ساتھ مضبوط باندھ دیں، تاکہ مادہ اوپر کی طرف متجذب ہوئے
اور خون کا سیدان منقطع ہو جائے،

کثرت حیض کا مؤثر و طبیعتی علاج

اگر خون کثرت سے آئے، اور سرخ رنگ کا ہو، کمزوری بر طبعی جائے، تو چائنا ۲۰
فاسفورس ۳۰ اگر خون سرخ اور چمکیلا ہو، تو مفید ہوا کرتی ہے،
اگر خون کے آنے سے پہلے سخت شتم کا درد ناقابل برداشت ہو، اور ایسا
معلوم ہو کہ اندام نہانی کے تمام اعضا پیچھے کی طرف گرتے ہوئے معلوم ہوتے
ہیں، تو ایسی حالت میں سیسیا ۳۰ مفید ہوگا، اگر حیض دیر تک جاری رہے
اخراج کے وقت خراش ہو، سوزش اور جلن ہو، تو سلفر ۳۰ مفید ہے،

DYSMENORRHOEA

(رڈس مینوریا)

حیض درد آنا

وجوہات و تشخیص : اس میں عورتوں کو حیض کے شروع میں شدید درد ہوتا ہے ، اور کبھی معمولی درد ہوتا ہے ، اس کے کئی ایک اسباب ہیں ، مثلاً رحم کی ساخت میں خرابی ، رطوبت خستہ الرحم کی کمی ، رحم کی گردن کا لمبا ہونا ، رحم کا پیچھے کو جھک جانا ، رحم کی تھیلی کی سوزش ، خستہ الرحم اور رحم کی رسولیاں وغیرہ۔

علاج : ہر اصل سبب مرض کو معلوم کر کے رفع کریں ، اگر قسطنجید ، تورفع کرنے کی کوشش کریں ، درد کو روکنے کے لئے سارپیڈان ، کوڈوپارین یا سیباچین کا استعمال کریں ، مقدار خوراک ایک ٹمبیہ بقدر ضرورت دوسری خوراک بھی دے سکتے ہیں ، وقتی طور پر درد رفع ہو جاتا ہے ، اور اپنی کے روزانہ استعمال سے مکمل شفا ہو جاتی ہے ، پل ایلو زامیٹ فیرائی بھی اس مرض کے لئے مفید ہے۔

منسٹورین (ساختہ ہمدرد دوا خانہ) اس مرض کے لئے تجربہ شدہ دوا ہے ، پرچہ ترکیب استعمال ہمراہ ہوتا ہے۔

عقربا با نجھین STERILITY (سٹیریلیٹی)

وجوہات و تشخیص : اس مرض میں باوجود مباحثرت کے اولاد پیدا نہیں ہوتی ، اگر ستادی کے دو یا تین سال بعد تک اولاد نہ ہو ، تو اس مرض کا شبہ کرنا چاہئے۔

سب سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس مرض کا اصل ذمہ دار
مرد ہے یا عورت، مرد کی بیماری کی صحیح تشخیص فعل جماع کی تکمیل پر منحصر
ہے، اگر مرد جماع پر قادر نہیں ہے، تو پھر یقیناً مرد ذمہ دار ہے، اگر جماع
پر قادر ہے، تو پھر منی میں اخراج کا شبہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں
منی کا امتحان ضروری ہے، اگر منی کے امتحان سے یہ معلوم ہو جائے کہ مرد
کا قصور نہیں ہے، تو پھر عورت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

عورتوں میں عام طور پر مندرجہ ذیل صورتوں میں یہ مرض ہوتی ہے،
مثلاً اعضائے نسل میں پیدائشی نقص، مثلاً رحم کا نہ ہونا یا رحم کی گردن کا
منہ بالکل بند ہونا یا رحم کا بہت چھوٹا ہونا یا حیض کی خرابیاں مثلاً بندش
حیض، قلت حیض، رحم کی رسولی، سیلان الرحم، سوزاک، آتشک،
کمی خون، عورت کا زیادہ موٹا ہونا، جماع کے وقت درد ہونا، بخصیۃ الرحم کا
التهاب، اندام بہانی کی رطوبت معمول سے زیادہ ترشش یا کھاری ہونا وغیرہ
اس کے اسباب ہیں۔

علاج: اصل سبب مرض کو معنوم کر کے رفع کریں، اگر بندش
حیض کی وجہ ہو، اور مرضیہ کو اور کوئی علامت نہ ہو، تو حیض کشاکی کا استعمال
بے حد مفید ہے۔

حیض کشاکیاں: ربنداں ڈوڈھ، لوٹہ بھی، لونگ، مصبر، اصلی، پنج حنظل،
شکرت، رومی، ہر ایک تولہ تولہ، مشک خالص، زعفران ہر ایک چھوچھو ماشہ،
سب کو خوب باریک میں کر تین دن رگڑائی کریں، بالٹش کی گول سیخیں
تیار کر کے ان کے اوپر ماحس کی تیلیوں کی طرح لگائیں، اور احتیاط سے رحم
کے اندر داخل کرائیں، حیض کو جاری کرنے اور رحم کا منہ کھولنے کے لئے بینظیر
شیاف ہے، احتیاس الطمت خواہ دس سال کا ہو، کے لئے مجرب ہے۔

حاملہ عورت استعمال نہ کرے، ورنہ اسقاط ہوگا، عورت کو دودھ، گھی خوب کھلائیں، سفوف معین حمل پر ریش پیل ۲۰ تولہ، شکر سرخ ۲۰ تولہ، سفوف تیار کریں، جس روز حیض شروع ہو، اسی دن سے یہ سفوف ایک ایک تولہ عورت مرد دونوں کو صبح شام کھلائیں گرم دودھ کے ساتھ، مرد عورت سے ہٹانے کے بعد نجامت نہ کرے، اگر رحم میں کوئی پیدائشی نقص نہ ہو، تو اس دوائی کے استعمال سے ضرور حمل ٹھہر جاتا ہے۔

حسب معین حمل از مشک خالص ۲ رتی، انسین، جوزبوا، زعفران ہر ایک ایک ماشہ، برگ بھنگ ۲ ماشہ، سیاری خوردنی ۳ عدد، لونگ ۴ عدد، قند سیاہ گوندہ ۶ ماشہ۔

تمام ادویہ کو کوٹ کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں، ختم حیض کے بعد پاک کی کے روز سے تین دن تک روزانہ ایک ایک گولی کھلائیں، حمل ٹھہرنے کے لئے مفید و مجرب ہے، اور اندرونی طور پر یہ ششیات استعمال کریں۔

جوزبوا، مانس، پھٹکڑی، پوست انار ہر ایک چار چار ماشہ، سب کو کوٹ چھان کر ششیات بنادیں، اور ٹھہر کی حالت میں استعمال کریں۔

باخچہ پن کے علاج کے لئے جدید ادویات ہارمز وغیرہ بھی استعمال کئے جاتے ہیں، جماع کے بعد بیس منٹ یا آدھ گھنٹہ تک عورت کو لیٹے رہنا استقرار حمل کے لئے مفید ہے۔

ورم رحم METRITIS (مٹرائیٹس)

وجوہات و تشخیص: اکثر جماع، سوزش شرمگاہ، اسقاط حمل، تیز ادویہ کا استعمال حیض بند ہو جانا، سردی لگنا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

لڑے سے بخار کا چڑھنا، پیڑ میں گرانی، درد اور سوزش معلوم ہوتی ہے
 انگلی داخل کرنے سے رحم متورم معلوم ہوتا ہے، بدبودار رطوبت نکلتی ہے،
 علاج، ریڑ کے اوپر گرم سینک کرنا، انٹی سپٹک لوشن سے اندام نہانی
 اور رحم کے اندر ڈوش کرائیں، اگر درد شدید ہو، تو پیڑ کے اوپر انٹی فلو جیٹین پلاسٹر
 لگائیں، اور ایک پوٹلی میں باندھ کر رحم کے اندر بھی رکھوائیں،
 بیلا ڈونا ایکھول گامبرین ۱۰ صدی طاقت والی میں روئی تر کر کے
 بطور شیاف استعمال کرنا بے حد مفید و مجرب ہے۔

کسیچر برائے ورم رحم، ہر لائیکر اراہیوینا ایسی ٹاس ۱ ڈرام، اسپرٹ
 ایٹر نائٹرسائی ۲۰ منم، ٹنگچر ہائیو سائلس ۲۰ منم، ٹنگچر بیلا ڈونا ۵ منم، ٹنگچر
 اکونائٹ ۱ منم، ایکوا ایک ادش۔

ایسی ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹے بعد دیں، ورم رحم، بخار اور درد کو مفید
 ہے۔ اندرونی طور پر "لالسول" ۲ منم آدھ سیرپانی میں حل کر کے اندام نہانی میں
 ڈوش کرائیں، اور مقام ورم پر انٹی فلو جیٹین پلاسٹر لگائیں، مفید و مجرب علاج ہے،
 اولان ہر یہ دودھ کے ٹیکے میں، ایک ٹیکے میں پانچ سی سی کے امپولز
 ہوتے ہیں، ہفتہ میں دوبار عضلاتی ٹیکہ کریں، ورم رحم کے لئے، سجد مفید ہے۔

ورم رحم کا ہومیوپیتھی علاج

شروع شروع میں اگر بخار اور بے چینی ہو، درد شکم بھی موجود ہو، بیمار سوخت
 موت سے ڈرتا ہو، تو ایکونا ٹیم ۳ مفید ہوگا، اگر رحم میں بیش زانی کے درد
 کا احساس ہو، تو ایپس میلیفیکا ۳ دیں، اگر سردی بہت زیادہ ہو، اور خون سر
 کی طرف جمع ہو رہا ہو، تو بیلا ڈونا ۳ مفید ہے۔

UTOEROIN
PRURITIS

شرمگاہ کی خارش

ریوٹرائن پرورائیسٹس

تقریباً ہر اس مرض میں فتور حقیض یا شرمگاہ کی صفائی نہ کرنے سے خارش پیدا ہو جاتی ہے۔

وجوہات ہر فتور حقیض، امراض رحم، سوزش اندام بنائی، کثافت جسمانی، قنض بواسیر، کرم امعاء، اور کبھی سن یا س میں ستورات میں یہ شکایات ہو جاتی ہیں۔ تشدد میں ہر خارش عموماً رات کے وقت ہوتی ہے۔ کبھی خارش ہوتے ہوئے سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات شدت خارش سے غشی تک نسبت آتی ہو جاتی ہے۔ زہریلے توہر میں توہر پڑنے سے بھی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ علاج ہر مرض کو سبب مرنے نہ ہر کی ہو نہیں ہوں، تو حید کو صاف رکھیں۔ اور اس کا دفعہ کریں۔ اگر فتور حقیض، سوزش اندام بنائی، بواسیر ہو تو اس کا عمل علاج کریں۔

دو لکھ خارش اندام بنائی، درست پروینہ، مگرین، پانی، ویزلین یا روئن زیتون ایک ادس ملا کر کپڑا صاف کاٹ کر تر کر کے لکھنا خارش کے لئے از بس مفید ہے۔

دیکھو ہر روئن زیتون ایک ادس، کلوروفارم، اڈرام ملا دیں، روئی تر کر کے رکھیں۔ یا ۱۰ قطرے کاربالک ایسڈ ایک ادس، پانی میں ملا کر مندرجہ بالا طریق پر استعمال کریں۔

دیکھو ہر لکھ پانی، تیس کادب، م م م، فینول، م م گرین، ایکچا، ادس ہر تیسرے گھنٹے بعد روئی کی پھر ہدی سے لگائیں۔

TUCORRHOEA

دیسکوریا

سیلان الرحم

تشخیص : در اس مرض میں عورتوں کی اندام بہانی سے سفید زردی مائل
 رطوبت خارج ہوتی ہے، مکر میں درد، طبیعت سست، پیڑوں میں گرانی، پیشاب
 بار بار آنا اس کی علامات میں، کمی خون، درم رحم، آتشک، سوزاک، استسقاء
 حمل، رحم کا ٹل جانا، گرمی کا زیادہ ہونا اس کے اسباب میں،
 علاج : اس میں قلعن اور مقوی مسکن ادویہ کے استعمال سے یقیناً
 کامیابی ہوتی ہے۔

پوست خشکاش ۶ ماشہ، پوست لکیرہ ۲ تولہ، مازداکب عدد، رسونت
 ۶ ماشہ، سب ادویہ کو دوسیر پانی میں جو کش دے کر مل چھان کر اس میں
 بورک ایٹڈ اڈرم، پچٹکڑی ۲ ماشہ حل کر کے بذریعہ پکاری یا گدائی اندام
 بہانی کو صاف کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر آگے تخریر کردہ نسخہ جات میں سے
 کوئی نسخہ استعمال کریں، سیلان الرحم کو آرام ہوگا۔

اکسیر نسوانی : در طباشیر ۴ تولہ، دانہ الاچی خورد ۲ تولہ، دم الاخوین ۴ تولہ،
 سمندر سوکھ ۲ تولہ، کشتہ فولاد اقلہ، کشتہ مرجان اقلہ، کشتہ سکک ۳ ماشہ،
 سرمد مدبر ۴ ماشہ، سفوف پتار کریں۔

مقدار خوراک : در ماشہ ہمراہ شیر گاو یا شربت مناسبہ دن میں تین مرتبہ
 دیں، عورتوں کے امراض جریان الرحم، دیسکوریا، سوزش رحم، کمی خون، ضعف جگر وغیرہ
 کو دور کر کے عورت کو خوب عودت اور سرخ بنادیتی ہے۔

دوران حمل میں استعمال کرنے سے جن کو استسقاء ہو جاتا ہو، استسقاء
 نہ ہوگا، مجرب ہے۔

ڈوشس لیکوریا : آدھ سیربانی نیم گرم میں پھٹکڑی اڈرام یا زنک کلورائیڈ یا پوٹاشیم پرمنگنیٹ ملا کر اندام ہنانی کے اندہ پھکاری کرنا لیکوریا کے لئے مفید ہے، رحم کو صاف کرتا ہے، خوردنی طور پر مرکبات فولاد، ایسٹرن سیرپ یا فینور سیرپ وغیرہ مفید و مجرب ہے،

کشتہ مرجان : در شاخ مرجان عمدہ حسب ضرورت کوزہ گلی میں ڈال کر گول حکمت کر کے ۵ سیر اپلہ صحرائی کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال کر کھول کر لیں، مقدار خوراک ۲ رتی تا ۴ رتی ہمراہ مسکہ گاؤ دن میں دوبارہ جریان الرحم لیکوریا کی خاص دوا ہے نیز جریان، احتلام، سرعت انزال اور امساک کے لئے مجرب ہے،

جوبن : در سہاری اولہ، معزز جامن، موچرس، گوند ڈھاک، مائیں خورد، گل و حاداد، گھنار، پھٹکڑی ہر ایک ایک تولہ، اتا قیاس ۳ ماشہ، کچور ۳ ماشہ، مازو ۲ تولہ، سفوف تیار کریں،

استعمال : قبل از جراح پانچ منٹ اندام ہنانی میں استعمال کریں، رحم کو سکیر کر مثل باکرہ جوان کے تنگ کر دے گی،

لیکورین : چکنی سپاری ۴ تولہ، پمیل کی لاکھ ۴ تولہ، طباشیر ۲ تولہ، گیلک ایسٹ ۹ ماشہ، کشتہ مرجان ۸ ماشہ، کشتہ بیضہ مرغ ۶ ماشہ،

جملہ ادویہ کو علیحدہ علیحدہ پیس کر سب کو ملا لیں، خوب زور دار دھتوں سے کھول کر پیس، دوائی تیار ہے،

مقدار خوراک ۳ ماشہ صبح ۲ ماشہ شام ہمراہ دودھ گائے یا بکری، حقیقی معنوں میں لیکوریا کا تریاق ہے، جن مسقورات کے چہرہ کارنگ زرد اور مردنی چھائی رہتی ہو، ہر وقت رطوبت رستی رہتی ہو، ان کے لئے بہت مفید و مجرب ہے،

اکسیر سیلان الرحم ہر چرم کہنہ سوختہ، رال سفید، کیسیم لیکٹیٹ جلد ادویہ
ہم دزن لے کر بار یک سفوف تیار کریں،

مقدار خوراک ۶ ماشہ صبح و شام استعمال کریں، سیلان الرحم
لیکوریہ کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے،

اکسیر لیکوریہ یا ہر سپاری چکنی دکنی ۱۰ تولہ کو گوٹ کر دو سرد دودھ گائے میں
ڈال کر آگ پر رکھ کر پکائیں، پھر اس میں مائیں خوردہ ۵ تولہ، مائیں کلاں ۵ تولہ
مکرکس ۵ تولہ مصری ۱۰ تولہ، سفوف کر کے ملائیں، سرد ہونے پر اتار لیں،

مقدار خوراک ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام گرم دودھ سے دیں، دو ہفتہ
کے استعمال سے سیلان الرحم بند ہو جاتا ہے،

ایسٹرس کارڈیل ہر یہ ایک پیٹنٹ دوا ہے، امراض مخصوصہ نسواں
کو بہترین علاج ہے، لیکوریہ اکثر حیض، خرابی رحم، کمی خون وغیرہ کے لئے
مفید ہے،

دوائے باکرہ ہر پھٹکڑی بریاں ۶ ماشہ، انیسون ۲ ماشہ، مازو
۱۰ تولہ، علقہ علیہ سفوف مثل عبا کر کے ملا لیں، بس تیار ہے،

ترکیب استعمال ہر حیض سے فارغ ہونے کے بعد بقدر ایک تولہ
کی پوٹلی بنا کر رحم کے اندر رکھا کریں، روزانہ ایک دفعہ، چار یا پنج دن کے استعمال
سے عورت مثل باکرہ کے ہو جائے گی، مقام خاص تنگ ہو جاتا ہے،
اور رطوبت وغیرہ بالکل خشک ہو جاتی ہے،

نوٹ،

لیکوریہ میں عام طور پر رحم کی غٹائے مخاطی متورم ہو جاتی ہے
اس لئے اس کی رعایت ضرور رکھیں،

یاد رہے، لیکوریا کی مرض میں حمل کے دوران میں چونکہ اعضا کے نسل میں خون کا اجتماع ہوتا ہے، اور رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات خارجی اشیا، مثلاً روئی اور بنیائیں وغیرہ داخل کرنے سے سوزش ہو جاتی ہے تو بھی رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔

آج کل عورتوں میں لیکوریا کا عام سبب مرض سوزاک اور کثرت جماع ہے، کیونکہ اس میں ہمل کی تمام جھلی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور پیپ کی مانند رطوبت نکلتی شروع ہو جاتی ہے۔

کثرت جماع سے ہر وقت کی عراشش سے بھی رطوبت کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے۔

سوزاک کے سبب سے ہونے والے لیکوریا کے لئے پردکین مینی سلین یا داکھلوسٹ روزانہ عضلاتی انجکشن ایک ہفتہ تک کرنا نہایت مجرب ہے۔
نوٹ: کسی عورت کے ہاتھوں میں پسینہ زیادہ آنا، اور ان کا ٹھنڈا رہنا اس کو لیکوریا ہونے کی علامت ہے۔

میسلان الرحم کا ہومیوپیتھی علاج

اگر رطوبت کا رنگ سبزی مائل ہو، تو کر بازوٹ ۳۰ اور مرکوری ایس ۳۰ عام طور پر مفید ہوگا۔
اگر زرد یا سفید رنگ کی لیس اور رطوبت خارج ہو، تو چائنا ۳۰، کلک یا کارب ۳۰، پلساٹلا ۳۰، نٹرم میور ۳۰ مفید ہوا کرتی ہیں۔
اگر بانی کی طرح پتلی رطوبت خارج ہو، اور عراشش کرنے والی ہو، تو ہرسٹیکم ایلم ۳۰، کر بازوٹ ۳۰، لائیکوپوڈیم ۳۰، سیپیا ۳۰ مفید ہیں۔
غذا زرد و کھم دین۔

اکسیر سیلان الرحم : در اجزائے ترکیبی ، کالی میوہ ، کلکیر یا فاس ، مگنیشیا فاس
کالی فاس بموزن ۔

علامات : در عورتوں میں عام کمزوری ، سیلان الرحم سفید یا زرد ، گاڑھا
اور لپیدار ، عام طور پر زبان نہ حمل اور زچگی میں زیادتی ، سیلان الرحم کے ساتھ مرگی
کے دور سے ، سرد و اور ہلکا سا بخار سے

خوراک : دو ٹکیاں سرد گھنٹہ بعد

کلکیر یا فاس : در کمزوری کے ساتھ اندھے کی سفیدی کی طرح رطوبت خارج ہو
جس کی زیادتی حیض کے بعد ہو

کالی میوہ : در زبان پر سفید میل کی تہ ، درد مکر کے ساتھ سفید رنگ کا مواد آتا ہو ،
نیشتر م میوہ ، ربانی جیسا پتلا ، چھپین پیدا کرنے والا مواد آئے ، شرمگاہ میں
بخار سن اور درد ہو

کالی فاس : در حیض کی خرابی کے ساتھ تیز سوزش اور چھپین پیدا کرنے والا بدبودار
اور سیلان ہو

کالی سلف : در سرے رنگ کا یا پانی جیسا سیلان

خروج اندام نہانی

تعریف : در کمزور عورتوں میں ولادت کے بعد اندام نہانی باہر نکل آتی ہے ،

اسباب : جسمانی کمزوری ، استرخائی امراض

تشخیص : در اندام نہانی کی پھلی دیوار اگر باہر نکل آئے ، تو ساتھ ہی معقد بھی نکل
آتی ہے ، اگر سامنے کی دیوار نکلے ، تو مثانہ بھی ساتھ ہی نکل آتا ہے مریضہ

درد کے مارے بے چین ہو جاتی ہے

علاج : در مریضہ کر آرام دینے کی کوشش کریں ، سر پانی میں کھیر اٹھکر
 کراؤ پر رکھیں ، پھیٹکڑی کے گوش سے مقام ماؤف کو دھو کر اندر داخل کریں
 مریضہ کو شکوے بند صاف دس ، اور مغزی ادویات کا استعمال کریں ،

در دوزہ LABOUR PAINS

رہے ہیں
 علامت : در دوزہ در دوزہ کی پیدائش کے پہلے شروع ہو جاتا ہے ،
 در حقیقت یہ دوزہ نہیں بلکہ بچہ کی پیدائش کی ایک علامت ہے ، سب سے
 پہلے در دوزہ صادق اور کاذب میں امتیاز کرنا ضروری ہے ،
 در دوزہ کاذب سامنے پیٹ کی طرف اور بے قاعدہ اٹھتا ہے ، اور در
 صادق کوٹھوں سے اٹھتا ہے ، اور باقاعدہ وقفہ سے اٹھتا ہے ، اور
 بتدریج بڑھتا ہے ،

علاج : در دوزہ شروع ہونے ہی حاملہ کو کمرے میں آہستہ آہستہ بٹھانا
 چاہئے ، تاکہ رحم کا منہ کشادہ ہو جائے ، اگر قبض ہو تو سوپ وارٹ کا اپنا کریں ،
 در دوزہ کو زیادہ کرنے کے لئے کوئین کا استعمال مفید ہے ،
 عام طور پر اگر کوئین کا انجکشن کرنا چاہئے ، اگر انجکشن نہ کرنا ہو ، تو
 کوئین کچھ اگر کوئین والا ایک ایک خوراک سرور گھنٹہ بعد پلا کہیں تین خوراک دس
 اس سے در دوزہ جو کہ رحم کا منہ کھل جائے گا ، جس وقت رحم کا منہ دوا لگل کھل
 جائے ، تو ایکٹرکٹ پیچورٹری ایک سی سی کا زبردست ٹیکہ کر دیں یا ریخ دس منٹ
 کے اندر بچہ پیدا ہو جائے گا ، یہ میرا معمول اور تجربہ ہے ،

نوٹ : اگر رحم کا منہ نہ کھلا ہو یا بچہ کی ساخت یا وضع میں فرق ہو ، تو پیچورٹری کے
 استعمال سے رحم کے چٹ جانے کا احتمال ہے ، اس لئے اس سے پہلے تسلی کرینی ضروری ہے ،

منشیہ تسہیل ولادت در سنگ مقناطیس کا ٹکڑا قریشاً ۵ تولہ عورت
کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ پانچ منٹ میں بچہ پیدا ہوگا۔ بالخصوص مفید ہے۔
بچہ پید ہونے کے بعد پانی میں ڈال کر عورت کے سارے رگھ دینے سے چند
منٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔

۳۰ زعفران ۵ رتی قند سیاہ میں ملا کر کھلانے سے جلد بچہ پیدا ہو جاتا ہے
اکسیر درود ۵ در شہد خالص اتولہ زعفران کشمیری ۱ ماشہ۔ درون ادویہ باقم
ملا کر درود شروع ہونے کے وقت پلا دیں۔ بچہ بہت آسانی سے پیدا ہوگا۔ اگر
خدا خواستہ ایک خوراک سے نہ ہو تو کچھ کھنڈ بعد دوسری خوراک دے دیں۔
ودائی برائے تسہیل ولادت در کونین سلفاس ۵ گرین۔ پلوامیکاٹک
۵ گرین۔ بورکس ۵ گرین۔

ایک کیپ ٹول میں بند کر کے نیم گرم پانی سے کھلائیں۔ سرد کھنڈ بعد
ایک کیپ ٹول دیں۔ اس سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جب درود
م شروع ہو تو اس وقت اس کو استعمال کرنا چاہئے۔

بعض اوقات نو ماہ پورے ہوئے سے پہلے ہی استقاط کی علامات
م شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی صورت میں کونین مسچر یا تسہیل ولادت کے نسخے
استعمال کرنے چاہئیں۔

اگر رحم کا منہ نہ کھلا ہو۔ تو سی ٹیسٹل ٹنڈس *Sesamum*
کو رحم میں چڑھانا چاہئے۔ یہ ایک کڑی ہوتی ہے جو رحم میں داخل کرنے سے پھول جاتی
ہے۔ اور رحم کا منہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد مندرجہ بالا نسخہ جات استعمال کرنے
چاہئیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ بتی چڑھانے کے بعد کونین۔ اگرین کا انجکشن لگادیا جائے
جب منہ کھل کر درود شروع ہو جائے۔ اور طبیعت خارج ہونے لگ جائے۔ اور رحم
کا منہ دراصل کھل جائے۔ نو ایکٹریٹ پچوٹری کا انجکشن کرنے سے جلد بچہ پیدا ہو جاتا ہے

درودزہ کا ہومیوپیتھی علاج

جب درود نہایت ہی ناقابل برداشت ہو، اور بخار بھی بہت تیز ہو، بے چینی اور موت کا ڈر بھی سردقت دامگیر ہو، تو اکونائٹ ۳ دین، کاونا کلیم ۳۰ سے درود باقاعدہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور رحم سے بچہ کے جلد باہر نکلنے کی سہیل پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر کالی ناس ۶ کی چند خوراکیں عین درودزہ کے وقت دی جائیں، تو بھی بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے، کلکیریا فلور ۶ کا کھلانا بھی بچہ کی ولادت میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

بچہ کی پیدائش کے بعد آرنیکا ۳۰ کی سرروز آٹھ دس خوراکیں دینا نہ صرف اندرونی زخموں کو مندمل کرتا ہے، بلکہ ولادت کے بعد جو پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، ان سب کو دور کرتا ہے۔

اختناق الرحم

HYSTERIA

(ہسٹیریا)

وجوہات ہر حیض کی خرابیاں، دائمی قبض، خوامشات لفسانی کا غلبہ، عشق و محبت میں ناکامی، بغیض و عناد کی زندگی، نگر و زرد و جلق وغیرہ اس کے اسباب ہیں، اور کبھی یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔

تشخیص ہر جسمانی اور روحانی انفصال میں فرق آجاتا ہے، پیٹ سے گولہ سا اٹھ کر منہ کو جاتا ہے جس سے دم گھٹتا ہے، اٹھ پاؤں میں تشنج ہوتا ہے، بریضہ سر کے بال زخمی سے کچھ منحنی اور کبھی روتی ہے دہرہ۔

علاج اور صحیح اسباب معلوم کر کے دفع کریں، اگر مریضہ پر تشادی شدہ ہو
تو تشادی کر دیں، مینگ کا سونگھانا اس میں کے لئے بہت مفید ہے،
اگر دورہ کی حالت ہو، تو منہ پر سرد پانی کے پھینٹے ماریں، ایوسیا
سونگھائیں، یا مینگ سونگھائیں۔

مہجوں بخاخ اور اختناق الرحم اور اس کے رومی عوارضات کے لئے
بہت مفید ہے، نسخہ تمام قرابادیوں میں درج ہے۔
ٹینکچر مسٹر یا ڈر ٹینکچر ویرین ایونی اٹھا، ابوند، ٹینکچر اسافٹیڈا، ابوند،
ٹینکچر مسک، ابوند، ایکوا منٹھاپ ایک اونس،

ایسی تین خوراک روزانہ دیں، ٹیسٹریا کے لئے مفید ہے جب دورہ
لگ جائے، تو پیل ایلو زفیرائی ایٹ مر استعمال کریں، دن میں تین گولی،
یہ گولیاں انگریزی داندروٹوں سے مل جاتی ہیں،

بیلیرینا، مسک، ایک مرکب دوا ہے جو مسٹریا اور
دیگر امراض نسوانی کے لئے تجرب ہے۔

مقدار خوراک ایک یا دو چمچ ہمراہ چائے، دن میں تین بار،
انٹیپتھیٹک ۶، مسٹریا کا دورہ دور کرنے کے لئے سریع الاثر ہے،
جب دورہ دور ہو جائے، تو موسکس مدر ٹینکچر دن میں چار خوراک دیں
جو میو پیٹک کی مفید ادویہ میں،

ٹینکچر ڈاکٹری، ڈر ٹینکچر ویرین ایونی اٹھا، ۳ منم، ٹینکچر ایسانی ٹیڈا
۵ منم، سپرٹ ایٹرس ۵ منم، ٹینکچر مسک ۲۰ منم، ایکوا اونس
ایسی ایک ایک خوراک دورہ کی حالت میں پلانے سے مرض
اختناق الرحم کا دورہ فوراً رفع ہو جاتا ہے، دورہ رفع ہونے کے بعد

بعد خوراک دیتے رہیں،

پیٹ کو خفیتہ الرتم یا فم معدہ کے مقام کو دبانے سے بھی دورہ
رفع ہو جاتا ہے۔ اگر دورہ کی حالت میں دانت تل جائیں، اور منہ نہ
کھلے، تو ایوینا یا میننگ وغیرہ کھلانے سے دانتی کھل جاتی ہے
ورنہ ایو مارٹین یا سڈرو کلورائیڈ ۱۵ گریں کا جلدی ٹیکہ کریں، اس
سے فوراً فتنے ہو کر دانتی کھل جائے گی، اور مریضہ کو پورے طور
سے ہوش آ جائے گی۔

اگر مریضہ کو نیند نہ آئے، تو یہ نسخہ مفید ہے۔
فینو بار بیٹون سو ڈیم ۱۵ گریں، ملک شوگر ۵ گریں یا ہم ملا کر کھلائیں
عمدہ خواب آور ہے۔

برومی ٹون BROMITONE

یہ ایک سفید قلندار نمک ہے، جو مسکن اعصاب اور دافع
تشج سے، اختناق الرتم، ہسٹریا، مرگی اور عصبی دوروں کو رفع کرتا
ہے۔ مقدار خوراک ۵ گریں، دن میں دو خوراک دیں۔
نسخہ: رشکر و طیرین ایونی ایتھا ۳۰ منم، سپرٹ ایوینا ایرد میٹک
۳۰ منم، ایکو امستھاپ ایک اونس

ایسی ایک ایک خوراک دن میں ۳ بار بعد غذا دیں، ہسٹریا کے لئے
مفید ہے۔ چونکہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اس لئے ادویاتی علاج کے
ساتھ ساتھ نفسیاتی علاج بھی کرنا چاہئے۔ سائیکالوجی معالجہ اہی ہمارے
ملک میں رائج نہیں ہو، یورپ اور امریکہ میں اس طریقہ علاج کے معالج ہیں
چندن بولی اور اس کے مشتقات بھی اس مرض میں مفید ہیں۔
ہسٹریا کی مریضہ کو قبضہ، بہہ ریشمی، بھکی، فتنے وغیرہ علامات ہو جاتی ہیں
ان کا حسب علامات علاج کرنا چاہئے۔

PUR PERAL FEVER

پیر پیرل فیور

پرسوتی بخار

درجہ ہات و تشنص در مادہ متعفنہ زچہ کے خون میں جذب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے۔ پچہ پیدا ہونے کے تین دن بعد بخار ہو جاتا ہے جس کا درجہ حرارت ۱۰۲ تا ۱۰۵ ہوتا ہے۔ دست، شے، نفخ، شکم، کمزوری، بزیان وغیرہ اس کی علامات ہیں۔

علاج اس مرض کے علاج میں صفائی نہایت ضروری ہے، اندام ہنائی اور رحم کو پر منگیٹ لوشن سے ڈوش کر اتے رہیں، مقام رحم پر ٹکڑ کر دیں۔
اکسیر بخار پرسوتی، اسٹریٹو مائی سین، ہائیڈرو کلورائیڈ، اڈرم کا عضلاتی انجکشن کریں، زچہ کے پرسوتی عوارضات خصوصاً بخار کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے، ایک دو انجکشنوں سے نائدہ ہو جاتا ہے۔

تزیاق بخار پرسوتی، پینلین ۵ لاکھ یونٹ، ڈسٹیلڈ واٹر ۵ سی سی ملا کر عضلاتی ٹیکہ کریں، صبح و شام، دو انجکشن ہی کافی ہیں۔

یہ دوا نہایت سرعت کے ساتھ پرسوتی بخار کے متعدی جراثیم کو ہلاک کر کے مریضہ کو تندرست کر دیتی ہے، اس سے اعلیٰ درجہ کی دو طبی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے استعمال سے تمام علامات بخار وغیرہ میں فوراً کمی ہوتی شروع ہو جاتی ہے، دو دن کے اندر ہی مریضہ تندرست ہو جاتی ہے۔

سیٹا سلیم، مقدار خوراک ۲ تا ۳ ٹکیہ ہر چوتھے گھنٹے بعد دیں۔
پرسوتی بخار کا خاص علاج ہے۔

سبب از دل اور سلفا ڈایازین بھی اس مرض کے لئے مفید و مجرب

دوبہ میں۔
 مقدار خوراک پہلی خوراک ۱۲ گولیاں پھر سر تین گھنٹہ بعد دو گولیاں
 بخار رفع ہونے تک دیں، بعد میں ایک گولی تین دن تک دیں،
 گولیاں بخار پر سوتی ہر مصلہ اولہ، فیرائی سلفاس، اولہ، دونوں کو
 یک کر کے کوئین سلفاس ۳ ماشہ میں ملا لیں۔
 مقدار خوراک ۴ رتی صبح ۴ رتی شام ہمراہ دودھ، عرق مولف وغیرہ
 میں، تب پر سوتی کو دور اور نفاس کو جاری کرتی ہیں،
 (نوٹ، مقام درد پر سینک کر آئیں، غذا نرم اور زود ہضم دیں،

سقاط حمل

ABORTION

(امارشن)

ہات، ہر کمی خون، وزنی چیز اٹھانا، شیز مسہل لینا، تفکرات، بعض کو
 ناط حمل بلا کسی سبب کے بھی ہو جاتا ہے،
 سقاط حمل کے آثار و علامات ظاہر ہوتے ہیں،

تحیض

علاج: جب حمل ساقط ہونے کی علامات شروع ہوں، اندھنہ
 تو مر لیضہ کو مکمل آرام کرنا چاہئے، انسیون اگر بن کھلا دیں، اس سے
 خون بند ہو جاتا ہے،

بعض اوقات مارینن ہائیڈروکلورل کم گزین کا انجکشن بھی کیا جاتا ہے
 بین حاملہ کو جسے توسیع نہیں دینا چاہئے،

ٹرون ۱۰ ملی گرام سفتہ میں دوبار عضلاتی انجکشن کریں، ابتدائے
 پوتے چھینے تک ۲۰ ملی گرام کھلائی جادے،

نکھ
 کا
 مائل
 ہیں

جن عورتوں کو استسقاء حمل کی عادت ہو ان کے لئے سجد مفید علاج ہے
 دامن ای جس کا نام "ویٹ جرم آیل" ہے، دو کیپ شول دن میں تین بار
 دس، چار پانچ دن تک، اس کے بعد صرف دو کیپ شول روزانہ دیں، ایک
 ماہ تک، یہ دوا حمل کو قائم رکھتی ہے اور محافظ جنتین ہے،
 تریاتی استسقاء بہرہ کار پس نو سم ہارمون جس کا تجارتی نام لیوٹوسا مکلین
 ہے، مقدار ایک سی سی روزانہ عضلاتی انجکشن کریں جن عورتوں کو بار بار استسقاء
 ہو جاتا ہو ان کے لئے یہ دوا از حد مفید و مجرب ہے، اگر استسقاء کی علامات
 شروع ہو رہی ہوں، تو اس کو فوری طور پر استعمال کرنا چاہئے، ایک دو
 انجکشن کرنے سے استسقاء کی علامات موقوف ہو جاتی ہیں، ایک مریضہ کے
 لئے سات انجکشن کافی ہیں،

نوٹ، جس وقت جریان خون شدید ہو اور رحم کا منہ بھی کھل چکا ہو،
 تو حمل کو روکنا فضول ہے، اس وقت حمل کے اخراج کی کوشش
 کرنی چاہئے، اور مسقط حمل ادویہ استعمال کرنی ضروری ہیں،
 جب حمل نو ماہ سے پہلے گر جائے، تو اس کو روکنے کے لئے شروع میں
 تین ماہ اکسیرنسوانی استعمال کرانی چاہئے، مریضہ کو چلنے، پھرنے اور سخت کام
 کرنے سے روک دینا چاہئے،

کنز عورتوں کو استسقاء کی عادت ہو جاتی ہے، ہمارے زیر علاج ایسی
 عورتیں بھی آئی ہیں جن کا سات سات دفعہ استسقاء ہو چکا تھا، اور لطف
 یہ کہ جس ماہ استسقاء ہوتا تھا، اسی ماہ حمل ٹھہر جاتا تھا، ایسے مریضوں کو
 جماع سے پرہیز کرانا ضروری ہے، اور پہلے عورت اور مرد دونوں کی صحت
 کو بحال کرنا ضروری ہے،

جب استسقاء کی علامات شروع ہو جائیں، تو یہ نسخہ بہت مفید ہے،

لنسخہ ہر ایک ٹریکیٹ دوائی برغم لیکوئیڈ ۲۰ منم، ایک ٹریکیٹ میس میس ۵ منم
ایک ٹریکیٹ سیسی سیڈ می ٹی لیکوئیڈ ۵ منم، ایک اکھوہ و فارم ایک ادنس،
ایسی ایک خوراک دن میں دو بار دیں، ایک ماہ کا استعمال اندیشہ حمل کو
روک دیتا ہے۔

تفسیر استغاط اور استغاط کو روکنے کے لئے بے نظیر دوائی ہے، اس کے
استعمال سے ہمیشہ کے لئے استغاط حمل کی عادت رفع ہو جاتی ہے، نہایت
مفید و تجرب ہے۔

سولف ۸ تولہ، الچی کلاں ۲ تولہ، سنگ جراثیمت ۲ تولہ، گل بول
۸ تولہ، کوئلہ پتھر ۲ تولہ، کھانڈ ۸ تولہ، مردار بدنا سفیدہ اماشہ،
ادل مردار بد کو لیموں کے رس میں کھل کر دیں، بعد میں جلد ادویہ کا سفوف
تیار کر کے یک جا ملا کر کھل کر دیں، تیار ہے۔

مقدار خوراک ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام دن میں دو بار دودھ کے
ساتھ جب حمل شروع ہو، تو یہ سفوف شروع کر دیں، پندرہ دن استعمال
کر کے چھٹے یا ساتویں ماہ پھر پندرہ روز استعمال کرادیں۔

استغاط حمل کا ہومیوپیتھی علاج

جب حمل کے تیسرے مہینے میں استغاط کا ڈر ہو، اور خون کا داغ لگنے لگے،
کر کا درد بھی ہو، خون چمک دار اور سرخ رنگ کا جاری ہو، تو سبائٹا x۱ کا
استعمال عموماً حمل کے گرنے کو روک دیتا ہے، اگر خون کا رنگ سیاہی مائل
تو خواہ استغاط حمل کا ڈر شروع کے مہینوں میں ہو، اور خواہ پچھلے مہینوں میں
تو سکیل کار ۲ دیں، ایسی حالت میں دوائی سردس مینٹ کے بعد دیں،

مریضہ کو بستر پر لیٹائے رکھیں۔ حرکت کرنے سے بالکل پرہیز کرانیں۔
 جن مستورات کو استسقاء حمل کی عادت ہو گئی ہو۔ انہیں دوائی برقم آپو نس
 در پھر دیں۔ اس دوائی کے پانچ پانچ قطرے گھنٹہ گھنٹہ کے وقفہ سے
 دیتے رہیں۔ اگر استسقاء حمل نہ ہو سکے تو اس کے بعد ایسی ہی احتیاط ضروری ہے
 جیسی کہ طبی طور پر وضع حمل کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اور خون کے روکنے کے
 لئے کالونا سیم ۳، سبائنا ۳، سکیل کار ۳ وغیرہ دیں۔

درد بعد وضع حمل

AFTER PAINS

د آفر پینس

علامات اور یہ درد بالعموم بچہ کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ فی الحقیقت
 یہ درد انقباضی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔
 علاج اور دافع درد اور مسکنات ادویہ کا استعمال کرنا چاہئے۔
 اکسیر دافع درد اور کوئین ہارگین، ایسٹ سلفیورک، امٹم، ایکٹریکٹ ارگٹ
 امٹم، ایکوا ایک اولس،
 ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار صبح و شام دیں۔ اس کے استعمال
 سے رحم بہت جلد اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے۔ درد رفع ہو جاتا ہے اور
 دیگر کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔
 اگر درد شدید ہو تو وقتی طور پر درد رفع کرنے کے لئے کوڈ پاٹرین
 سارڈین یا سبائین ایک ٹمکیہ گرم دودھ یا چائے کے ساتھ دینے سے درد
 رک جاتا ہے۔
 نیز یہ نسخہ بھی درد رفع کرنے میں مفید ہے۔

نسخہ برکیفین ۲ گریں ، ڈورس پوڈر ۵ گریں ، ایسپرین ۵ گریں ، دن میں دو خوراک دیں ، دافع درد ہے ۔

سبالمین اتنا ۲ مکعبہ دن میں دو مرتبہ بار دینا فوری اثر کرتا ہے ، نیز شدت درد میں سبالمین سی سی کا عضل ٹیکہ کریں ، جینے کے بعد کے درد اور بے خوابی کے لئے از حد مفید ہے ۔

تریاق ہومیوپیتھی

آرنیکا مانٹ ۳۰ ہر اگر وضع حمل کے بعد اس دوا کی چند خوراکیں دے دی جائیں تو زچہ کو وضع حمل کے بعد درد نہیں رہتا اور نہ ہی نفاس کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ، بلکہ آئول جی فارچ ہو جاتی ہے ، اور اندرونی زخم بہت جلد مندمل ہو جاتے ہیں ، زچہ پر سوتی بخار سے محفوظ رہتی ہے ، گویا وضع حمل کے بعد اس دوا کا استعمال زچہ کو تمام بد علامتوں سے بچاتا ہے ، ہر ایک میڈیکل پریکٹیشنر خواہ وہ کسی طب کا عامل ہو ، اس کو چاہئے کہ وہ زچہ کو یہ دوائی ضرور دے ، یہ دوائی زچہ کی بہترین ہمدرد اور محافظ ہے ۔

زچہ کی ٹانگ کا سفید ورم

علامات : زچہ کی پیدائش کے بعد بعض عورتوں کی ایک ٹانگ کو شدید ورم ہو جاتا ہے جس سے مریضہ کو بے حد تکلیف ہوتی ہے ۔

علاج : مریضہ کو آرام سے لیٹائے رکھیں ، پینلین ۵ لاکھ پونٹ کا عضلاتی ٹیکہ صبح و شام کریں ، اس مرض کا شافی علاج ہے ۔

پوٹاسیم پرسنگنیٹ ۱۰ گریں . ۲۰ اونس پانی نیم گرم میں ملا کر ڈروش کرائیں
 سلفا ٹھایا زول . سلفا ڈایازین . سپٹا نیلم ہر سہ ادویہ میں سے کوئی ایک دوا
 استعمال کرنا بھی اس مرض کے لئے مفید ہے .
 مقدار خوراک ۲ گولی ہر چار گھنٹہ بعد دیں ، اور پانی خوب پلائیں .

MENOPAUSAL
 SYNDROME

سن یاس

ریمینو پاسنڈورم

تغریف : ہر چوبک حیف کے بند ہونے پر عورت اراد سے محروم رہ جاتی ہے
 اس لئے اسے سن یاس کے نام سے پکارا جاتا ہے .
 وجوہات : حیف کا پورا نہ آنا اس کا اصل سبب ہے .
 تشخیص : حیف کے بند ہوجانے کی وجہ سے کئی قسم کی بد علامات پیدا
 ہو جاتی ہیں . مثلاً بے خوابی ، دوران سر ، اختلاج القلب ، موٹاپا ، توجش
 اور بے چینی وغیرہ . اس لئے اس زمانہ کو سن یاس کہتے ہیں .
 علاج : اس مرض کے علاج میں علاماتی علاج کے علاوہ ہارمونز
 کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوا ہے .

مکسوجن MISCOBEN (ساختہ آرگےن)

یہ ہارمون کا مرکب ٹکیہ کی شکل میں ملتی ہے . یہ سن یاس کی جلد ذہنی
 تکالیف اور جسمانی عوارضات کے لئے بے حد مفید ہے .
 مقدار خوراک ایک دو ٹکیہ روزانہ پانی سے کھلائیں .

ادوسایکلین ساختہ سیپا

مقدار خوراک ایک تا پانچ ملی گرام کا انجکشن ہفتہ میں ایک بار
سن یا س کی علامات کے لئے مفید ہے
تھقی لین THEE LIN (ساختہ پارک ڈیوس)
یہ اسٹرون کاروغنی محلول ہے

مقدار استعمال ایک سی سی عضلاتی یا جلدی انجکشن کریں
سن یا س کی وجہ سے حیض کی رکاوٹ میں بہت مفید سمجھا جاتا ہے
ہارمون لوٹ لی (ساختہ جی ڈبلیو کاک)
اس میں خفیہ الرحم اور غدہ درقہ کا جو ہر شامل ہوتا ہے، عورتوں کے
زمانہ انحطاط اور ایام یا س کے بیشتر عوارض مثلاً چڑچڑاہٹ
عصبی المزاجی، بے خوابی، کم خوابی، اختلاج، الغلب، انسدادگی
اور دیگر ذہنی و دماغی علامات میں بہت مفید ہے
بیز بندش، کمی حیض، یا تکلیف وہ حیض میں یہ درد بہت
فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے

مقدار خوراک ایک یا دو ٹمبیہ دن میں تین مرتبہ
اگر بندش حیض قلت خون کا سبب ہو تو خون پیدا کرنے والی
ادویات کھلائیں

اگر ایام حیض کے وقت درد ہو اور مہینہ جاری نہ ہو تو ادار
حیض کی ادویات استعمال کریں
اصل سبب مرض کا علاج کرنے کے بعد مندرجہ بالا ادویات
کا استعمال کرنا مفید ہے

DISPLACEMENT
OF UTERUS

رحم کا مل جانا

ڈسپلیس آف یوٹرس

تشخیص : اس مرض میں رحم اپنی جگہ سے سامنے یا پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے۔ رحم پر چوٹ لگنا، ایام حیض میں سردی لگنا، کثرت جماع، استغایط تل، بار بار حمل کا ہونا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔ مریضہ کے پیڑ اور کمر میں درد ہوتا ہے، چلتے پھرنے میں تکلیف غلیظ لیسیدار طوبت خارج ہوتی ہے، جماع کے وقت تکلیف ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، کبھی دست آتے ہیں، پیٹ میں نفخ شکم اور درد ہوتا ہے۔ رحم میں زخم بھی ہو جاتے ہیں۔

علاج : مریضہ کو آرام سے بستر پر لٹائیں، چلتے پھرنے اور حرکت سے منع رکھیں، نیم گرم گھی کی پیٹ پر آہستہ آہستہ مالش کریں، اور تشکین درد کے لئے مقام ناف پر ٹکوک کریں، اگر قبض ہو، تو قبض رفع کریں، عام دوائیاں پیٹ کو مل کر رحم کو درست کر دیتی ہیں، لیکن اگر مریضہ کمزور ہو، تو معویات کا استعمال کریں۔

ہومیوپیتھی علاج

اگر مریض کو یہ احساس ہو کہ ہر ایک چیز نیچے کی طرف نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے، تو ایسی حالت میں سیسیا ۳ مفید دوائی ہے اس کے علاوہ میلوئیس عدد چکر سے ۲، سیلا ڈونا ۲ وغیرہ بھی مفید ادویہ ہیں۔

SPRU

سپرو

وجوہات تشخص : یہ مرض عام طور پر عورتوں کو بچہ کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں منہ کے اندر چھالے نکل آتے ہیں۔ اور کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی دست اور کبھی قبض ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں ہر وقت نفخ رہتا ہے۔

علاج : در دما من لی ۱۲ ریٹا مین ۲۵۰ مائیکر و گرام کا ہر تیسرے دن عضلاتی انجکشن کریں۔ پہلے انجکشن سے ہی علامات میں کمی ہو جاتی ہے۔ مکمل آرام کے لئے سات انجکشن کریں۔ اس مرض کا اکسیری علاج ہے۔

حاملہ کی قے

حمل کے شروع میں ہی حاملہ کو قے متلی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر معمولی ہو تو اس کے روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر زیادہ آتی ہو تو اس کا بند کرنا ضروری ہے۔ سنگترہ یا اور کوئی ترش پھل کھلانا مفید ہوتا ہے۔ یہ نسخہ بھی مفید ہے۔
 نسخہ : بر سولف ہاشہ ۵۰ گرام ۵ دانہ۔ عرق کا دزبان ۲ اونس میں پیس کر حقوڑا
 حقوڑا پلائیں۔ حاملہ کی قے متلی روکنے کے لئے بچہ مفید و مجرب ہے۔
 ہو میو پیختی دوا ایکاک اس مرض کے لئے اکسیر ہے۔ دن میں چار خوراک دیں۔

عورتوں کی تمام امراض کا مکمل بیان اور
 سٹانی علاج معلوم کرنے کیلئے اس کتاب

ایکینہ امراض مستورات

کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ بے نظیر کتاب ہے۔ قیمت چار روپے صرف۔
 (دکتر خانہ رہنمائے زندگی ٹو بک سٹور) ر مغربی پاکستان

GALACTORRHEA

دودھ کی زیادتی

د گے لکٹوریام

تغیر لیف اس مرض میں دودھ کثرت پیدا ہوتا ہے جو بچہ کے پینے سے بچ رہتا ہے، ایسی حالت میں پستانوں کے اندر تناؤ کم کر سحت درد ہوتا ہے جو دم کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔

وجوہات در خون کا پتلا ہو جانا، بلغم کا کثرت سے ہونا، بدن میں گرمی کا زیادہ ہونا، پستانوں کی توت جاذبہ کا بڑھ جانا، زیادتی خون، دودھ دھلی کا زیادہ استعمال اس کے وجوہات ہیں۔

تشخیص پستانوں میں درد اور تناؤ کا ہونا، درد اور تناؤ کے باعث دم کا ہو جانا، مریضہ کمزور ہو جاتی ہے، بعض اوقات پستانوں سے دودھ کثرت ہوتا ہے۔

علاج از مریضہ کا بریٹ پیپ سے دودھ نکلوا دیں، اگر خون کے جوش سے ہو تو خون کو تسکین دینے والی ادویات استعمال کریں۔

نشیہ در آکو بخار ۴ دانہ، زرشک ۴ ماشہ، تخم کاہوس ۳ ماشہ، ان تمام ادویہ کو پانی میں بھگو دیں، تین گھنٹہ بعد صبح کر شیر و نکال لیں، اور شربت صندل ملا کر مریضہ کو پلا لیں، اس سے خون کا جوش کم پڑ جائے گا، اور لاکھ مردہ سنگ ایک ایک ٹولہ لے کر روغن گل ملا کر علا کر دیں۔

نشیہ در پوٹاسیم برومائیڈ، گرین ٹیکچر بلا ڈونا، ۱۰ منہ، ایکوا ایک ادس سب ادویہ کو ملا کر ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

پیلٹ سٹیل بیٹرول ڈالی پروپیونٹ ایلی گرام روزانہ صبح و شام کھلائیں

جب مرض میں تخفیف ہو جائے، تو کھلانا بند کر دیں، غذا میں دودھ، گوشت بالکل بند کر دیں،

ہرمیو پیٹھتی دوا بلا ڈونا ۳۰، دودھ کم کرنے کے لئے مفید ہے،

دودھ کی کمی

GALACTOSIS

(گیلکٹوسس کے کس)

تعریف: اس مرض میں عورت کے دودھ میں کمی ہو جاتی ہے، جو ہاتھ ہو، کی خون میں پستانوں کی قوت جاذبہ کا بہت کم ہونا، عضد رخی دھڑکنا، ہر وقت رستا، موٹم گرنا میں زیادہ دیر آگے کے پاس رہنا، طبی بیماری میں مبتلا ہونا، اس مرض کے وجوہات ہیں،

بچہ کو دودھ کی کمی سے ہر وقت بھوک سنانا ہے، جو بہت روتا، تشویش ہے، دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، ماں کے لئے وبال جان بن جاتا ہے،

علاج: مزید کو عمدہ غذا دودھ، کھن، بالائی دھیرہ خوب کھلائیں، اگر مرض میں مریضہ میں کمی خون نہ ہو، اس لئے ذرا کم پیدا کرنے والی ادویات استعمال کرائیں، مریضہ کو مرض غذا دیں، تاکہ جسم میں طاقت ہو کر، دودھ پیدا ہو، اگر رخی دھڑکے سے دودھ خشک ہو گیا ہو، اس کا تدارک کریں، مریضہ کو خوش رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں،

خون کی کمی کے باعث ہو، تو ڈاکٹر بی ۱۲ کا استعمال کرائیں، جو خون پیدا کرنے میں نہایت مفید ہے،

خون سے ہو، تو یہ نسخہ عمل میں لائیں۔

نسخہ: در تخم خرد سیاہ ۶ ماشہ، تخم کامو ۶ ماشہ، عناب اولہ عرق گلابان
ایک پاؤ، ان سب ادویہ کا پشیرہ نکال کر شربت عناب ملا کر صبح و شام پلائیں،
کیسٹر اکل چھاتیوں پر ملنا نہایت مفید ہے،
برگت ارند کو پانی میں پکا کر نیم گرم پستانوں پر باندھیں،
زیرہ سفید میں ہمرزن چینی ملا کر اولہ کھلانا دودھ کو پیدا کرتا ہے،
پرویکٹین مقدار استعمال ۶۰ تا ۱۰۰ ایونٹ بذریعہ انجکشن استعمال کریں
دودھ برطعانی کے لئے مفید ہے،
کٹے گول: مقدار ایک ڈرام دودھ میں ملا کر پلائیں،

پستانوں میں دودھ کا جم جانا

FREEZING
OF MILK

فریزنگ آف ملک

تعریف: اس مرض میں پستانوں میں دودھ جم جاتا ہے،

وجوہات: دودھ کی نالیوں میں طغیم جمع ہونا اور سکہ جم جانا، پستانوں
کے گوشت کا رگوں پر دباؤ پڑنا اور دودھ کی رکاوٹ کا باعث بننا، دودھ
کا زیادہ دیر تک پستانوں میں رہنا،

تشخیص: پستانوں کے اندر دودھ جم جانے سے تناؤ ہونا جس سے شدت
تشنیص کا درد ہوتا اور زہریلی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جو درم میں
تبدیل ہو جاتی ہے، اور مریضہ کو ہلکا ہلکا بخار آتا ہے،

علاج: شروع میں مریضہ کے پستانوں سے دودھ نکالنے کی
کوشش کرنی چاہئے، تاکہ درد اور تناؤ رفع ہو جائے، اس مطلب کے
لئے بریٹ پیپ کو استعمال میں لائیں،

خرابین صاف کئے ہوئے باؤیک سفوف کردہ کے کردے پانی ملا کر روغن زنگس ملا کر طلا کر سں ، یہ طلا دودھ کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے ، اور اندر کی رسیوں کو منڈل کر دیتا ہے ۔

پستانوں کا ورم

INFLAMMATION OF MIMA

دالفلامیشن آف میما

تعریف : اس مرض میں مریضہ کے پستانوں میں زرم ہو جاتا ہے ۔
 وجوہات : مریضہ کو شروع میں خارش ہوتی ہے ، اگر یہ مرض زیادہ دیر تک قائم رہے ، تو زرم کی صورت اختیار کر جاتی ہے ، کبھی ابتداً سن بلوغ میں حدت خون کے سبب یہ مرض ہو جاتا ہے ، کبھی خرابی عکبر پستانوں پر چوٹ لگنا بھی اس مرض کا باعث بنتا ہے ۔
 تشخیص : مریضہ کو میٹھی میٹھی خارش ہوتی رہتی ہے ، کبھی ختم ہو جاتی اور کبھی تشخصیں پھر مرنے لگ جاتی ہے ، زرم شدہ مقام پر سرخی اور سوزش ہوتی ہے ، درد اور تیز بخار ہو جاتا ہے ، درد کی شدت کے باعث مریضہ بے چین ہوتی ہے ۔

علاج : ابتداً میں برسیٹ لمب سے دودھ نکال لینا چاہئے ، متورم شدہ پستان سے بچہ کو دودھ نہیں پلانا چاہئے ، پستان پر بلا ڈونا گلیسرین لگائیں ، اور ادھر پر پی یا مذہ دیں ، یا اسی کی پیسٹ لگائیں ، مریضہ کی قبض رفع کرنے کے لئے گینٹیا لصف ادس پانی میں حل کر کے پلائیں ، اگر زرم میں پیپ پڑ جائے ، تو تشنگان دے کر پیپ کو خارج کر دینا چاہئے ۔

لشخہ دار برگ سبھاو، برگ نیم، اکاس سلی ہموزن لے کر پانی میں گرم کر کے
پستان پر باندھیں، یا اس کے پانی کو نیم گرم پستان پر ڈالیں، تاکہ پستان
کی تھادٹ دور ہو جائے۔

پستانوں کا بڑا ہو جانا HIGHTERTROMY OF THE MAMARE

رہائی پر یونی آف دی نمیری

تشریف: بعض عورتوں کے پستان اس قدر بڑھ جاتے ہیں، کہ جسم کی خوبصورتی
ضائع ہو جاتی ہے، اور دودھ کی پیداوار بھی بہت تھوڑی ہو جاتی ہے۔

وجوہات: ہر چربی دار مادہ زیادہ ہو کر ایسی مرض پیدا کر دیتا ہے، کہ بدن کا ضرب
ہو جانا، پستانوں کو زیادہ مسند، یا پستان بھاری ہونے کے سبب ہلکے
رہنے سے یا کسی روغن کی مالش کرنا، بعض عورتوں میں موردی بھی ہوتا ہے۔

اس مرض میں دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، دودھ کی
تشخیص نالیوں پر بوجھ پڑنے سے دودھ کا نکلنا بہت کم ہو جاتا ہے
اگر خرابی ٹون سے ہو، تو پستانوں پر سرخی پائی جاتی ہے،
اگر ماہ بلغم سے ہو، اور جسم کا موٹاپا سبب ہو، تو بلغم کی کثرت
پائی جائے گی۔

علاج: مریضہ کے پستانوں کو ایسا لباس پہنانا چاہئے
جس سے پستان ہلکے نہ رہیں۔

RELATION
OF MAMA

پستانوں کا ڈھیلا ہو جانا

(ریلیکشن آف میما)

تعریف :- اس مرض میں عورت کے پستان ڈھیلے پڑ جاتے ہیں،
وجوہات :- کئی خون، بچہ کو عرصہ تک دودھ پلانا، حیم کا استعمال کرنا
پستانوں کی رگوں کا خون سے خالی ہو جانا،
شخص :- ایسی عورتیں سست مزاج ہوتی، بدن موٹا اور ڈھیلا
ہو جاتا ہے،

علاج :- جب یہ مرض عورت کو ہو جائے، تو فوراً بچہ کا دودھ
چھڑا دینا چاہئے، اور پستانوں پر ایسا کپڑا چڑھانا چاہئے جس سے پستان
پچھے نہ لٹکنے رہیں، اور مندرجہ ذیل نسخہ استعمال میں لادیں،
نسخہ :- انار کا چھلکا اتولہ، مازو اتولہ، اٹا قیہ ۶ ماشہ، مائیں اتولہ
سب ادویہ کو ملا کر خوب باریک کریں، اور بوقت ضرورت سرکہ میں ملا کر
پستانوں پر طلاء کریں،

فائدہ :- اس سے پستانوں میں سختی آکر نیچے لٹکنے اور ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے،
نسخہ :- رگنار اتولہ، چھلکا انار اتولہ، چھلکا کیکر اتولہ، چھلکا جامن اتولہ
تمام ادویہ کو رات بھر پانی میں ہلکے رکھیں، صبح کو روغن زرد
ملا کر آگ پر رکھیں، جب پانی خشک ہو جائے، تو روغن کو ٹھنڈا
کر کے محفوظ رکھیں،

بوقت ضرورت پستانوں پر ملیں، اس سے پستان سخت
ہو کر اصلی حالت پر آجائیں گے،

پستانوں کا چھوٹا ہونا ATROPHY OF THY MAMMATEGLANDS

داڑونی آف دی میمری گلینڈز

تقریباً : بعض عورتوں کے پستان بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں، جو دودھ کی کمی ہونے کے سبب اولاد کی پرورش پوری طرح نہیں کر سکتے، جو ہات و تشخص میں ان رگوں میں سڈے پڑ جانا، جن سے پستانوں کو پرورش خون آتا ہے، پستانوں کی قوت جاذب کمزور ہو کر اس قابل نہ رہتا کہ کافی مقدار میں جذب ہو کر پرورش کر سکے، جسمانی کمزوری اعضائے تولید میں نقص واقع ہو جانا، جس سے پستان چھوٹے رہ جاتے ہیں اور کافی دودھ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔

علاج : اگر قوت جاذبہ کی کمی ہو، تو کچھ خشک اٹولہ جو تک خشک اٹولہ، روغن تل سیاہ ۴ اٹولہ،

کچھ سے اور جو تک کو باریک پیس کر تیل میں ڈال کر آگ پر رکھیں، جب تمام حل ہو جائیں، تو تیل کو ٹھنڈا کر کے پستانوں پر ملیں، فائدہ : اس تیل سے پستانوں میں قوت جاذبہ پیدا ہو کر خوب صورت اور دودھ آور بنائے گی، اور پستانوں کا چھوٹا پن دور ہو جائے گا۔

اگر جسمانی کمزوری ہو، تو دودھ، گھی اور قوت دہ غذاؤں کا استعمال کریں،

اگر پیداواری اعضائے تولید میں نقص ہو، تو بیرونی علاج تصور کی جاتی ہے۔

باب سیزدہم

بخاروں کا بیان

MALARIA
FEVER

سپ لرزہ یا طیر یا بخار

د طیر علی فبیور

وجوہات و تشخیص : یہ ایک متعدی مرض ہے جو ٹیڈوں کے ذریعہ پھیلتا ہے۔ برسات کے موسم میں اور برسات کے بعد یہ خاص طور پر دبا کے طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ملک کا سب سے زیادہ ہونے والا بخار ہے۔ یہ بخار کبھی فوبتی اور کبھی لازمی ہوتا ہے۔ بلحاظ ذہبت اس کی چار بڑی اقسام ہیں۔

- ۱، روزانہ بخار، جس کا دورہ سر روز ہوتا ہے۔
- ۲، تیبہ بخار، اس کا حملہ ہر تیسرے دن یعنی ۴۸ گھنٹے بعد ہوتا ہے۔
- ۳، چوتھیہ بخار، اس میں بخار ہر چوتھے دن یعنی ۷۲ گھنٹے بعد

ہو جاتا ہے۔

۴، لازمی صفراوی طیر یا بخار اور اس میں بخار کی پہلی ذبت ابھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوسری شروع ہو جاتی یعنی چڑھے بخار پر بخار چڑھ جاتا ہے۔ طیر یا بخار کی علامات کے تین درجے ہیں۔

ابتدائی درجہ جسے سردی کا درجہ کہنا چاہئے۔ اس درجہ میں سستی کاہلی، سرد درد ہونا، قے آنا، انگریزیاں اور جلیاں آنا، اعضا کا ٹھنڈا ہونا، کھٹے کھڑے ہونا، کپکپی ہو کر سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے جس سے جسم کا پٹنا ہے۔ اور اتنی سردی لگتی ہے کہ کھل، رضائی، انگلیٹی کی گرمی اور کوئی چیز اسے کم نہیں کر سکتی۔

یہ درجہ ایک گھنٹہ سے چار گھنٹہ تک رہتا ہے۔

دوسرا درجہ اسے گرمی کا درجہ کہنا چاہئے۔ اس درجہ میں گرمی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں نبض تیز اور پیاس لگتی ہے۔ اور مریض ٹھنڈا پانی طلب کرتا ہے۔ کھل، رضائی وغیرہ کو اتار پھینکتا ہے اور درجہ حرارت ایک تلو سے ایک سو چار درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حالت دو تین گھنٹہ تک رہتی ہے۔ بعض اوقات ۱۲ گھنٹے تک بھی رہتی ہے۔

کئی مریضوں میں بعض اوقات درجہ حرارت کے زیادہ بڑھ جانے سے دماغی عوارضات ہڈیاں، بے ہودہ گفتگو کرنا اور بے حسنی بڑھ جاتی ہے۔ اور آنکھیں پتھر اجاتی ہیں۔

بچوں میں درجہ حرارت کی زیادتی سے دماغی علامات کے علاوہ تشنج کے دورے شروع ہو جاتے ہیں۔

تیسرا درجہ یہ پسینہ آنے اور بخار اتارنے کا درجہ ہے۔ اس میں

مریض کو پسینہ آکر بخار اتر جاتا ہے۔
 طیر یا بخار میں درد سر، اعضا شکنی، سردی کا لگنا، قے متلی یا
 دست آنا، پیچش یا قبض ہو جانا عام علامات ہیں۔
 تشخیص علامات اگر بخار ہر روز یا ایک دن چھوڑ کر مقررہ وقت
 پر ہو اور پسینہ آکر اتر جائے، تو اس کے

طیر یا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔

پر لے طیر یا بخار میں تلی کا بڑھے ہوئے ہونا اور مریض کا رنگ پھیکا
 زرد ہونا طیر یا کی خاص علامت ہے، کیونکہ طیر یا ہمیشہ تلی اور جگر کی خرابی
 سے مزمن ہو جاتا ہے۔

مسلسل طیر یا بخار اگر کوئین کے استعمال سے نہ اترے، تو ٹائیفاؤڈ
 سمجھنا چاہیے۔

جب ایک دفعہ طیر یا بخار ہو جائے، تو پھر مریض میں بار بار اس
 میں مبتلا ہونے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج ہر یہ بخار تبدیلی موسم کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔
 اس لئے آلات انتظام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قبض، بد ہضمی وغیرہ نہ
 ہونے دیں۔ چھروں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ جراثیم طیر یا چھروں کے کاٹے
 سے اندر داخل ہو کر طیر یا بخار پیدا کر دیتے ہیں۔ رات کو چھروں کی
 استعمال یا آئل بوکلیش ہاتھ، پاؤں، منہ وغیرہ پر رکھ لیں، کیونکہ اس
 کے ملنے سے چھر نزدیک نہیں آتے۔ اگر بخار چڑھ جائے، لٹیاں وغیرہ
 شروع ہو گئی ہوں۔ اور زہریلا مواد خارج ہو جائے، تو ایک دو خوراک
 فیورکسیچر کی استعمال کریں۔ بخار اتر جائے گا۔ اگر بخار بہت تیز ہو جائے، تو
 سر پر برف کا استعمال کریں۔ یا جسم پر سرد پانی کا اسفنج کریں۔

پیشاب، پسینہ، دست لائے والی ادویہ استعمال کریں جب بخار نہ ہو
تو دورہ بخار روکنے کے لئے کوہین کا استعمال سب دوائیوں سے بڑھ کر مفید

اور مجرب ہے۔
کوہین مکسچر: کوہین سلفاس ۱۰، گرین، ایسڈ سلفیورک ڈائیسیوٹ ۱۲،
گینشیا سلفاس ۲ ڈرام، ایچوا ایک ادس۔

یہ ایک خوراک ہے، ایسی ایک ایک خوراک قبل از بخار ہر تین گھنٹہ بعد
دیں، طبر یا بخار، قبض وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

فیور مکسچر: لائیوڈ ایوٹا ایسی ٹاس ڈائیسیوٹ ۲ ڈرام، سپرٹ
ایچتر ٹاکٹر اس ۳۰ منم، پوٹاسیم سائٹریس ۱۰، گرین، پانی ایک ادس۔

یہ ایک خوراک ہے، دن میں ایسی چار خوراک دے سکتے ہیں، یہ
نسخہ ہر قسم کے چڑھے بخار میں بخار رفع کرنے کے لئے اور حرارت کو کم کرنے
کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، طبر یا بخاروں کی حرارت دہن خوراکوں سے
کم ہو جاتی ہے، میعادی بخار میں بھی روزانہ دہن خوراکوں کا پلانا حرارت کو
گھٹاتا ہے، اگر بخار کی حالت میں جسم میں دردیں ہوں، تو اگرین نی خوراک سوڈا
سیلی سلاس ملا لیں، اگر قبض ہو، تو ایک ڈرام گینشیا سلفاس ملا لیں، اس
سے بخار بھی اتر جاتا ہے اور قبض بھی رفع ہو جاتی ہے۔

نوٹ: اگر میعادی بخار میں اس کو استعمال کرنا ہو، تو اگرین نی خوراک
ہگز امین ملانا از حد مفید ہے، اس سے دماغی حالت بھی درست رہتی ہے
اور انتڑیوں کی حالت بھی ٹھیک رہتی ہے، جلد ڈاکٹر کی معمولی مطلب نسخہ ہے،
اکسیبر طبر یا: کوہین سلفاس ۵، گرین، ایسڈ سلفیورک ڈائیسیوٹ
۱۰، منم، میگ سلفاس ۱ ڈرام، لائیوڈ آر سنک ہائیڈروکلورائیڈ ۲ منم، مکسچر
کارڈیم کو ۳۰ منم، پانی ایک ادس۔

کو بن کر کو ایسٹ سلفیورک میں حل کر کے جلد ادویہ کو باہم ملا لیں یہ ایک
 خوراک ہے۔ دن میں ایسی تین خوراک دیں۔
 ترکیب استعمال در یہ دوائی مریض کو اس وقت دیں جب کہ بخار کی
 حالت نہ ہو اور سرد گھٹنے بعد ایک ایک خوراک دیں اور جس وقت بخار ہو جائے
 دوائی بند کر دیں۔ ورنہ تینوں خوراک پوری کریں۔ دوائی کی خوراک پلانے سے
 مریض کو کچھ کھلانا نہایت ضروری ہے۔
 غذا چا دل، دودھ، دودن کے استعمال سے پیریا بخار خواہ روزانہ
 تیرہ یا چوبیس ہو، رفع دفع ہوگا۔ یہ نسخہ ہمارا دس سال سے تجربہ شدہ ہے۔
 اور ہزاروں مریضوں پر آزمایا جا چکا ہے۔ پیریا بخار کے لئے اکسیر ترین
 پیر بے خط نسخہ ہے۔ ہمارا معمول مطلب ہے۔
 (نوٹ) قبض اور بخار کی حالت میں اس کو استعمال نہ کرنا چاہیے۔
 پیریا بخار میں قبض کا رفع کرنا ضروری ہے۔ اگر حمل کی صورت ہو تو فی خوراک
 ۵ اگرین پوٹاشیم برومائیڈ ملا کر دے سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو تو فوسفور کچھ
 استعمال کریں۔ قبض کی صورت میں بیوٹیل یا ٹینٹیا ۴ ڈرام پلائیں۔ اس نسخہ
 کو معمول مطلب بنانا اپنی پریکٹس کی ترقی کا باعث ہے۔
 اکسیر مسکن ۵ اگرین فوسفین ۳ اگرین کیفین ۲ اگرین
 جلد ادویہ باہم ملا لیں یہ ایک خوراک ہے۔ دن میں ایسی تین خوراک حسب
 ضرورت دے سکتے ہیں۔
 ترکیب استعمال در ایسی ایک خوراک نیم گرم دودھ چائے یا گرم پانی
 سے استعمال کریں۔

نوٹ: در یہ دوا دفع درد مسکن اور پیمینہ آور ہے۔ در دوسرے قسم شقیقہ
 عصابہ، درد کان، آنکھ، داڑھ درد، درد اعصاب، درد عضلات خواہ

جسم کے گھسی حصہ میں درد ہو، عارضی طور پر فوری اثر کرتی ہے جسم کے ہر حصہ کے درد کی تشخیص کر کے درد کو عارضی سکون دینے کے لئے ہنا بیت مفید ہے لیکن مستقل مرض کا علاج اصل سبب رفع کرنے سے ہوگا۔

نیز اس کے استعمال سے امینٹ کے اندر پسینہ آکر بخار اتر جاتا ہے لیکن میسادی بخار میں اس کو نہ دینا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ بخار اترنے سے دوبارہ بہت زور کا بخار ہو جائے گا۔ یہ نسخہ تمام ایلو پیتھک ڈاکٹروں کا لئے۔ پی سی کے نام سے معمول مطب سے۔

نوٹ، کیفی اسپرین کے نام سے اس نسخہ کی بنی بنائیاں

بھی مل جاتی ہیں جو یہی فوائد رکھتی ہیں۔

ایسپرین یا رکیپی جرمن کی تیار شدہ جس کی ہر ٹکیہ پر BYR لکھا ہوتا ہے، ہر خراب گھنٹہ بعد ایک گولی دینا پیریا بخار، تھوڑے وقت کے لئے مفید ہے علاوہ ازیں یہ گولیاں حاملہ کو بھی بلا خوف و خطر استعمال کرائی جاسکتی ہیں کونا کرشن بخار کی پہلی گولیاں پیریا بخار کے علاج میں استعمال کی جاتی ہیں ایک گولی ہر چار گھنٹہ بعد تھوڑے دودھ یا پانی دیں۔

آج کل کی نئی پیریا کی دوا "پیسکو ڈرین" جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، پیریا کے لئے مفید بتائی جاتی ہے۔ پیریا کی روک تھام کے لئے مستعمل ہے مقدار ۱۰ خوراک ایک گولی دن میں چار بار قبل از بخار دیں۔

تجربہ : پیریا بخار میں عمر نامی بڑھ جاتی ہے اس لئے کوین کے ساتھ فولاد ملا کر دینا چاہئے، کیونکہ اس طرح کوین کا اثر فوری ہو جاتا ہے۔

پیریا بخار کے مریض ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کو کوین کی معمولی مقدار کھلانے سے جسم میں سرخی، خارش، تپ، مثلی، چھبساکی، دل گھٹن وغیرہ علامات شروع ہو جاتی ہیں جس سے مریض کو بہت

ہوتی ہے۔ اس لئے دوزمرہ کے مریضوں کے علاوہ ہر نئے مریض سے دریافت کر لینا ضروری ہے کہ آیا ملیریا بخار میں خون کی خرابی اور چھپاکی کی علامات تو پیدا نہیں ہوئیں؟

کونین سے پیدا ہونے والی علامات کے لئے پوٹاسیم پروہائیڈرٹ، اگرین فی خوراک کے حساب سے ہر دو گھنٹہ بعد چار خوراک پلانے سے علامات رفع ہو جاتی ہیں۔

ہوٹو پیٹھی ادویات اسپیکاک ۳۰، نیٹرم میور ۱۲ کو مین کے بد اثرات اور کونین سے نہ رفع ہونے والے ملیریا بخار کے لئے اکسیری ادویات ہیں۔ ملیریا بخار کا اکسیری ٹیکہ ہر کونین بائی ہائیڈرو کلورائیڈ، اگرین پیسپوزل دوسری ملیریا بخار کو فوری طور پر روکنے کے لئے ایک انجکشن ہی کافی ہے۔

ترکیب استعمال: ملیریا بخار کی صحیح تشخیص کر کے جس وقت مریض کو بخار نہ ہو، کونین بائی ہائیڈرو کلورائیڈ، اگرین کا عضلاتی ٹیکہ کریں، انشاء اللہ پہلے ہی دن بخار نہ ہوگا، اگر ٹیکہ لگانے کے بعد کونین ٹیکہ کی چھ خوراکیں دو دن کے لئے مریض کو استعمال کرائیں، تو پر اسے سے پرانا ملیریا بخار، روزانہ، تیرہ چوتھیا غصیکہ سر قسم کا فوٹی بخار ہمیشہ کے لئے رفع ہو جاتا ہے، معمول مطلب ہے۔

نوٹ: ملیریا بخار، بعض اوقات کونین کے علاوہ گائیشیا سلفا سوسپنشن قبض کشاد دالی ہے۔ حاملہ عورت کو کونین کا ٹیکہ نہ لگائیں، ورنہ اسقاط حمل کا اندیشہ ہے۔ اگر حاملہ کو ملیریا بخار ہو، تو اٹمیرین دوسری سی کا ٹیکہ لگائیں اور خوردنی طور پر اٹمیرین ایک ٹیکہ ہر دو گھنٹہ بعد دن میں تین بار پانی سے کھلائیں حاملہ عورت کے بخار کے لئے مجرب ہے۔

بعض ادویات ملیریا بخار کا درجہ حرارت ۱۰۶ یا ۱۰۷ تک پہنچ جاتا ہے

کوئین کا انجکشن ایسی حالت میں درجہ حرارت کو فوراً کم کر دیتا ہے، اور بخار بھی
رفع ہو جاتا ہے،

ملیریا بخار کی پیسینٹ ادویات

ریسوشین RESOCHIN (باڑ)

مقدار خوراک پہلی خوراک ۱۰ گرین، دوسری خوراک ۵ گرین چھ گھنٹہ بعد
دیں، پھر ۵ گرین روزانہ صرف دو دن تک دیں،
ملیریا بخار، تیرہ، چوتھیا، روزانہ کے لئے اکسیر ہے، دم جگر کے لئے
بھی مفید ہے،

یہ دوا کالورڈکوشن اور فوڈاکوشن کے نام سے بھی ملتی ہے،

ڈیرا پرم DARAPRIM (بارو پیکم)

مقدار خوراک ۲۵ ملی گرام کی ایک ٹمکیہ ہفتہ میں ایک بار، اس کی
ایک خوراک سے ملیریا بخار اتر جاتا ہے،

فاضل جالینوس کہتا ہے، جس طرح چوتھیا بخار تلی کی کسی بیماری کے بغیر
پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح فوہتی یعنی یعنی بخار معدہ کے کسی مرض کے بغیر بھی
نہیں ہو سکتا، یعنی ملیریا بخار کی خواہ کوئی قسم ہو، معدہ، جگر اور تلی کی خرابی
سے ہوتے ہیں،

اور ناخواہ یعنی اجوائن دہی برائے یعنی بخاروں کے نفع بخش دوا ہے
اسے کبھی نہیں بھولنا چاہئے،

اکسیر تپ ملتی، اجزاء، گلو خشک، کو خشک ہر ایک ۳ ماشہ، گل
سرخ، رینخ سولف، بیج کاسنی، گل بنفشہ، نیلوفر ہر ایک ۱ ماشہ،

طریق استعمال ہر رات کو آدھ سیر یا ڈیڑھ پاؤ پانی میں کھجور رکھیں
صبح غوطہ اسما مل کر اس کا پانی نکال کر شربت بنفشہ یا شربت نیلوفر یا شربت
دینار یا مصری تین تولہ ملا کر پلائیں پھر اسی میں پانی ڈال کر رکھ دیں، شام
کو مل کر پھر شربت وغیرہ ملا کر پلائیں، موسم سرما میں گرم کر لینا چاہئے، اگر
کھانسی ہو، تو نفعی ۶ ماشہ اعنابہ کریں، شطر العنب میں آلو بخارا ۴ دانہ
اور شامترہ تین ماشہ بڑھائیں،

فوائد ہر تب یعنی خالص و تب مرکب کبذہ و شطر العنب کا ترکیب ہے،
جو تب ملغم و صغرا سے مرکب ہوں، یا جگر اور معده کی خرابی سے پیدا
ہوئے ہوں، ان کے لئے نہایت مفید ہے، تمام یعنی امراض کا منفعی ہے،
اس کو معمولی تصور نہ کریں، اس کے استعمال کے بعد مسہل کی بھی ضرورت
نہیں رہتی، تب خود بخود اتر جاتا ہے،

ترکیب یا ہر گودنتی بڑتال، اتولہ کنوار گندل کے ساٹھ کھڑے ۳ عدد
بڑتال کے ٹکڑے کر کے پھڑوں کو چیر کر بڑتال کو اندر داخل کر دیں، کچھ منٹ
کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں، پس کر محفوظ رکھیں،
مقدار خوراک ۳ رتی تا ۴ رتی پھر بدلتہ مناسبتہ و زمانہ میں خوراک
بلیر یا بخار کو دور کرنے کے لئے کوہن کے مفت بلہ کی دوا ہے، عنب دسی کا
مایہ ناز نسخہ ہے، اول درجہ کا تب شکن ہے، یہ چو قیاس سورادی، یعنی بخار
اور کھانسی وغیرہ کے لئے مفید ہے،

اکسیر تب صغرا دی ہر اجزاء، عناب دہانتی ۱۱ دانہ، اسوڑیاں ۱۱ دانہ،
گاوڑبان، خطمی، بہشت دانہ ہر ایک تین ماشہ، بنفشہ ۶ ماشہ، نیلوفر ۶ ماشہ،
طریق استعمال ہر رات کو آدھ سیر یا ڈیڑھ پاؤ پانی میں کھجور رکھیں،
صبح غوطہ اسما مل کر اس کا پانی نکال کر کپڑے میں چھان کر شربت

نبضتہ یا شربت زوقا یا مصری تین تولہ ملا کر پلائیں ، اور دو بارہ پانی ڈال کر رکھ دیں ۔ شام کو پھر مل چھان کر شربت یا مصری ملا کر پلا دیں ، اگر کھانسی ، نزلہ یا زکام ہو ، تو ملٹھی ، زوقا ہر ایک ۶ ماشہ بڑھا دیں ، موسم سرما میں گرم کر کے پلا دیں ۔

منافع : ہر تپ عسرا دی ورموی ، کھانسی ، نزلہ ، زکام ، حار اور نفع عسرا زدم (خون) کے لئے سب سے مفید ہے ۔

حسب سفید : ہر طباشیر ، سیت گلہ ، رائہ الاچی خود ، زہر مہرہ خضائی ہر ایک دو در تولہ ، کافور ۲ ماشہ ، کوہن اولہ ،

جملہ ادویہ کو ہر ایک پیس کر اس بنول کے شیرے سے گولیاں بقدر خود بنا دیں ۔

مغذ از خوراک : ہر ۲ گولی دن میں تین بار ، موسمی بخار ، تہہ ، چوتھیا

عیر یا دغیرہ کے لئے مفید ہے ۔

تھنہ : زمیں شرماتے ہیں کہ سکجین بخاروں کے لئے بہت مفید ہے ، کیونکہ یہ پیاس کو بھاتی ہے ، اور سکون پیدا کرتی ہے ، اور ملین ہے ،

ورمی بخاروں میں پانی کی نسبت کم نقصان پہنچاتی ہے ۔

نوبی بخاروں کے مسہلات میں شربت اعلیٰ ، زنجبین اور شیر خشک بہت مفید ہیں ۔

رہم : جو زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچی اور زمین پر پھین دار ہوتی ہے ، اس کے پتے پتلے ، شے اور پتوں پر سفید روئی کسی موٹی ہے ، پھول زرد ہوتے ہیں ، مزا کھٹا ، قدرے خوشبودار

منجور پورہ ، لاہور اور لائل پور کے علاقے میں ملتی ہے ۔

عیر یا تہہ : چوتھیا بخار دور کرنے کے لئے اکسیر الاثر بولتی ہے ،

قبل از بخار ۶ ماشہ گھوٹ کر پلانا مجرب ہے، دن میں تین بار دیں،
 نسخہ دسویں البیسیرین: برکشتہ پڑتال گودنتی ۵ تولہ کو جو شاندہ پلا مول
 ۵ تولہ جو شاندہ پودست خشتاش ۵ تولہ، بھنگ کے پتوں کا پانی ۵ تولہ
 میں یکے بعد دیگرے کھل کر کے خشک کر لیں، پھر اس میں نوشادر ۶ ماشہ
 زنجبیل ۶ ماشہ، کافور ۳ ماشہ باریک میں کر ملا لیں،

مقدار خوراک ۱/۲ تا ۱ ماشہ ہمراہ گرم پانی چائے یا دودھ گرم
 کھلائیں، یہ دوا البیسیرین کا بدل ہے، پسینہ لاکر بخار کو رفع کرتی ہے، سردی
 کو بھی نافع ہے،

تریاق بلیریا: سنگھیا سفید ۱ تولہ، نوشادر ۲۰ تولہ، کشتہ پڑتال گودنتی ۲ سیر
 ترکیب ساخت: اول سنگھیا ۱ تولہ کو بکری کے دودھ میں ۲۲ گھنٹے کھل
 کریں، پھر اس میں نوشادر ۲۰ تولہ اور کشتہ پڑتال گودنتی ۲ سیر ملا لیں، جلد ادویہ
 کو باقیم ملا کر کھل کریں، پس تیار ہے،

مقدار خوراک ۱ تا ۲ رتی ہمراہ شربت کھانڈ یا پانی دن میں چار خوراک
 قبل از بخار، بلیریا بخار کی حکمی دوا ہے، اس کے دودن کے استعمال سے
 بنا پرانا بلیریا بخار رفع ہو جاتا ہے،

اکسیری نسخہ برائے بلیریا: برکشتہ پڑتال گودنتی درنیم ۱۰ تولہ، کشتہ سنگھ
 ۵ تولہ، کشتہ ابرک سفید ۲۰ تولہ، کشتہ پڑتال درنیم درونڈا پیل ۱ تولہ، باقیم ملا لیں
 مقدار خوراک ۳ رتی ہمراہ شربت بنفشہ دن میں تین بار قبل از بخار دینے
 سے بخار کو روکنا ہے، بخار کی حالت میں دینے سے بخار کو اتارتی ہے،
 مریض کو ہر حالت میں دی جا سکتی ہے، ہر قسم کے بلیریائی بخاروں کا تریاق ہے،
 تریاق بلیریا: پشکڑی سفید بریاں ۲ تولہ، نوشادر ۲ تولہ، گبر ۲ تولہ،
 مغز کزنجوہ ۲ تولہ، تخم و صندل ۲ تولہ، مسک کا بنا بہت باریک سفوف کریں،

مقدار خوراک ۲ تا ۴ رتی ہمراہ پانی یا مشربہ منقشہ یا مشربہ انار سے
پہلے ہی دن بلیر یا بخار رک جائے گا، سزاروں مرتبہ کی آزمودہ دوا ہے، اگر پہلے
دن بخار نہ رکے، تو دوسرے دن یعنی طور پر رک جاتا ہے۔

سفوف طباشیر: طباشیر اصلی، اولہ، ست گلو اولہ، دانہ الچی خورد
اولہ، کھانڈ ۳ اولہ، بارک سفوف تیار کریں۔

خوراک ۶ ماشہ صبح، دوپہر، شام، ہمراہ مشربہ بزوری پرانے
لازمی بخار جو دن کی مانند ہر وقت رہتے ہیں، اور نئے بلیر یا بخاروں کے
لئے اکسیر ہے۔

آٹھ پھری اجوائن: اجوائن دیسی اولہ کورے کوزے میں ڈبڑھ پاد
پانی ڈال کر بھگو دیں، گھوٹ چھان کر قدرے نمک ملا کر پلا دیں، روزانہ
ایک دفعہ پرانے سے پرانا بلغمی بخار دور ہو جائے گا۔

عرق اکسیر بخار: یہ طب یونانی کا معجز اثر نسخہ ہے، جو بلیر یا بخار کے
لئے اکسیر ہے، جب کبھی بیر دنی ادویہ نہیں ملتی، تو ایلو پیتھک ڈاکٹروں کا
بھی یہی سہارا ہے۔

اجوائن دیسی ۲، اولہ، منڈاری بوٹی ۲، اولہ، جراثیمہ ۲، اولہ، شامترہ
۲، اولہ، چاروں ادویہ کو ۲ سیر پانی میں تمام رات تانسی دار دیگی میں بھگو رکھیں
صبح آگ پر پکا دیں، جب پانی تین پاد رہ جائے، تو اتار کر نوشادر، اولہ
پیس کر ملا دیں، اور کپڑے سے چھان کر ۲۵ بوند تیزاب گندھک بھی ملا لیں
مقدار خوراک ۲ اولہ دن میں تین خوراک، چھڑھے بخار میں ہر تین گھنٹہ
بعد ایک خوراک دیں، انشاء اللہ ایک ہی دن میں بخار رفع ہوگا۔

اگر بخار باری سے آتا ہو، تو نوبت سے پہلے گھنٹہ گھنٹہ کے وقفہ
سے تین خوراک پلائیں، پہلے ہی دن بخار کی باری رک جائے گی، لیکن

احتساباً دو تین دن تک پلانا چاہئے۔ بلیریائی بخاروں میں کوہن سے
بڑھ کر مفید ثابت ہوا ہے۔

نوٹ، اگر دوران بخار میں قبض شدید ہو جائے تو اسے رفع کر لینا چاہئے

(۲) بلیریائی بخار کا علاج ہسپتالوں میں بھی گلوچر اسٹ سے ہی ہوتا ہے

ضروری یادداشتیں

بخار کی نوبت سے پہلے مریض کو غذا سے روک دیں، ورنہ بخار کا حملہ

شدت سے ہوگا۔

سراور لازمی بخاروں کی شدت میں بھی مریض کا معدہ غذا سے قطعی

خالی ہونا چاہئے، ورنہ بخار زیادہ ہو جائے گا۔

بخار میں جلاب اس وقت دینا چاہئے جب کہ بخار اتر جائے نیز جس

دن بخار کی نوبت ہو، اس دن جلاب ہرگز نہیں دینا چاہئے۔

بخار کی تیزی میں سرد پانی کے استعمال سے مریض کو روکنا چاہئے۔

ورنہ عظم حمل اور عظم جگر کا خطرہ ہے۔

بلیریائی بخار کا ہومیوپیتھک علاج

اگر سردی لگ کر بخار ہو، بے حسنی بہت ہو، پیاس لگے، اور تپ بھی ساکت ہو،

تو اکثر حالتوں میں اکونائٹ ۳ سے ہی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے

تکلیف رفع نہ ہو، اور کمر کا درد ہو، جسم کی تمام ہڈیوں اور عضلات میں بھی درد

ہو، سردی اور پیاس زیادہ ہو، پانی پینے سے بے حسنی زیادہ بڑھے،

اور تپ آجائے، تو ایسی حالت میں یونیٹورم پر فوئم ۳۰ مفید ہوگا۔ اگر

بخار لگاتار رہے، بے قراری زیادہ ہو، اور پسینہ بار بار آئے، تو اسپیکاک ۳

فائدہ کرے گا۔ بخار کی تیزی میں اگر بیمار منہ اور جسم سے کپڑا نہ اتارے،

اور اگر اتر جائے، تو سردی زیادہ محسوس کرے، تو ایسی حالت میں نکس دامیکا ۶
 دیں، اگر سردی بہت دیر تک لگتی رہے، اور ماسکھے پر سرد سینہ کثرت سے
 آئے، کمزوری انتہا کو پہنچ جائے، تو دیراظم الیم ۶ دیں، اگر دوران بخار
 کالوں میں شاخیں شاخیں بہت کثرت سے ہوں، تو چائنا ۳۰ مفید ہوگا،
 بچوں کے بخار میں بھی یہی ادویہ حسب علامات دی جاتی ہیں، البتہ دانت
 نکلانے کے زمانہ میں کلکیر یا فاس ۶۵ اور کمپو میلا ۳، سیلا ڈونا ۳، مرکبوری
 ایس سالو ۳۰ زیادہ مفید ہیں۔

ان بخاروں میں جن کے اتارنے کے لئے کوئین کا کثرت استعمال
 ہو چکا ہو، اور بخار پھر بھی نہ اترے، تو نیٹر میور ۳۰ دیں،

اگر بخار میں پیاس زیادہ لگے، اور پانی بھی ہر بار زیادہ پیا جائے، تو
 برائی آدینا ۳ مفید ہوگا، اگر بخار میں پیاس نہ لگے اور سردی بھی ہو، پاؤں
 ٹھنڈے ہوں، تو سیلا ڈونا ۳۰ بہتر ہوگا،

اگر بخار کے دوران میں سینہ آئے، مگر بخار نہ اترے، تو مرکبوری ایس
 ۳۰ دیں، بخار کی تیزی میں جلد جلد دوائی دیں، ورنہ دود گھنٹہ کے بعد دیتے
 جائیں، اگر مریض کو جو تھے دن بخار ہوتا ہو، اور پیاس صرف سردی لگنے کے
 دوران میں ہو، تو اگنیشتیا ۳۰ دیں،

نیٹر میور سلفٹ، پیریا بخار میں یہ دوا خاص کو صفراوی کیفیٹوں کے لئے
 بہت اکتیر ہے، بخار نتر ہو، اور جاڑا لگے، صفرا کی تفت،
 نیٹر میور فاس، تمام قسم کے پیریا بخار میں جب کہ بخار تیز ہو اور غیر منہضم
 غذا کی تفت ہو،

نیٹر میور پیاس کی زیادتی، ہونٹوں کے گرد دانے ہوں، درد سر، کوئین
 کے غلط استعمال سے بخار ہو، دن کے گیارہ بجے جاڑے کے ساتھ قبض اور دست،

میعادی بخار TYPHOID FEVER

رٹا میفا ٹیڈ فیور

یہ ایک متواتر مسلسل اور متعدی بخار ہے۔ اور سٹڈ اس کی میعاد تین ہفتے ہے۔ بعض اوقات میعاد تین ہفتے سے بڑھ کر چھ اور بارہ ہفتے تک بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) تب محرقة

(۲) تب لوزکی

(۳) تب محرقة دماغی

تب محرقة معویہ یا رٹا میفا ٹیڈ فیور TYPHOID FEVER

وجوہات و تشخیص در اس مرض کا سبب ایک مہابیت تھوڑا سا خوردبینی جراثیم ہے جسے نیسی لائی ٹائی ڈرکس کہتے ہیں اور یہ مریض کے بول و براز میں پائے جاتے ہیں لکھیاں بول و براز پر بیچھ کر ان جراثیم کو غذا تک پہنچا دیتی ہیں اور ایسی غذا کے کھانے سے تندرست آدمی کو مبتلا کرے مریض ہو جاتے ہیں اور یہ بخار چھرت گگنے کے پانچ دن سے چودہ دن تک لرزہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔

اس بخار میں انتڑیاں مثلاً سے پیش ہوتی ہیں بخار آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے مثلاً پہلے دن صبح کو ۹۹ ڈگری اور شام کو ۱۰۰ درجہ دوسرے دن ۹۹ ۱/۲ اور شام کو ۱۰۱۔ اسی طرح چار پانچ دن میں حرارت ۱۰۳ اور ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرے ہفتے کے اخیر تک اس طرح صبح کی نسبت شام کو بخار ایک یا دو درجہ نیز ہو جاتا ہے۔ نیز شروع بخار میں دوسرے نکسیر کا پھوٹنا معمولی کھانسی زبان میلی سفیدی بائل ہوئی ہے۔

لیکن اس کی نوک اور کنارے سرخ ہوتے ہیں، پیٹ میں درد اور ہوا کا جمع ہونا ایک عام علامتیں ہیں، بعض مریضوں کو دست بھی شروع ہو جاتے ہیں، پہلے ہفتے کے اخیر میں مریض رات کو بڑ بڑاتا ہے، اور ہڈیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور کئی مریضوں کے جسم یعنی سینہ، پیٹ اور پشت پر چھوٹے چھوٹے سرخ نشان بھی ظاہر ہو جاتے ہیں،

دوسرے ہفتے میں تمام علامات میں ترقی ہو جاتی ہے، پیٹ میں نفخ آئنتوں میں زخم، بدبودار خون سے دست آتے ہیں، نبض کی رفتار درجہ حرارت کی نسبت کم ہوتی ہے، چنانچہ اگر حرارت ۱۰۳ ہو، تو نبض بجائے ۱۲۰ کے ممکن ہے ۱۰۰ ہو، اگر دوسرے ہفتہ بخار معمولی ہو، اور علامات کی شدت نہ ہو، تو چودھویں دن بخار اتر جاتا ہے، ورنہ اکثر مریضوں کی حالت جریان خون کی کثرت سے خراب ہو جاتی ہے، اگر جریان خون نہ ہو، تو تیسرے ہفتے میں حرارت بخار میں کمی ہونے لگتی ہے، اور ایک درجہ روزانہ بخار کم ہوتا جاتا ہے اور اگر خونی اسہال جاری رہے، تو مریض کی حالت خراب ہوتی ہے، کیونکہ اس بخار میں عموماً وہی مریض زیادہ تلف ہوتے ہیں جن کی انٹریوں سے کثرت سے جریان خون ہو چکا ہوتا ہے،

تیسرے ہفتے میں رفت رنض بالعموم تیز ہو جاتی ہے، اور یہ ضعف قلب کے سبب ہوتی ہے،

چوتھے ہفتے میں اکثر آرام شروع ہو جاتا ہے، اور تمام علامات میں کمی ہونے لگتی ہے، اور مریض تندرست ہو جاتا ہے،

اگر مذکورہ بالا علامات شدید ہو جائیں، تو مریض پر غشی، بے ہوشی، اور بول و برا نہ بے ارادہ خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ علامات بھی خطرناک ہیں، یا بخوبی اور چھٹے ہفتے میں بخار کبھی ہوتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا،

مریض بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔

تشنجی علامات
بخار کا مسلسل اور متواتر رہنا، اور حرارت کا تیز ہونا
رشتہ رقبہ میں کمی، جلد پر کلابی رنگ کے سرخ

نشان ظاہر ہونا اس کی خاص علامات ہیں۔

اس بخار کو نمونہ، تب دق، ملیریا بخار سے تشخیص کرنا ضروری ہے
نمونہ ہر اس مرض میں تسبیہ میں درد، سانس کی رفتار تیز، بخار اور
کھانسی، بلغم میں خون ملا ہوا ہوتا ہے، ٹائیفائیڈ میں یہ علامات نہیں ہوتیں
دق ہر اس میں کھانسی، مریض کا زیادہ کمزور ہونا، بخار کا مسلسل رہنا
رات کو پسینہ آنا، پھیپھڑوں میں دق نشانے، سانس کا تیز ہونا علامات
پائی جاتی ہیں نیز اس میں درد سر، نکسیر، نفخ شکم وغیرہ نہیں ہوتا۔
ملیریا بخار ہر یہ لرزہ سے ہوتا ہے، اور پسینہ آکر اترتا ہے، ٹائیفائیڈ
میں پسینہ نہیں آتا، اور لرزہ نہیں ہوتا۔

اس مرض کی کامل تشخیص مرض کے دسویں دن ریڈ ال لٹ کرنے
سے ہی ہوتی ہے۔

علامات رو بہ شروع مرض میں علامات کا شدید ہونا، درجہ
حرارت ۱۰۵ یا اس سے بڑھ جانا، رشتہ رقبہ ۱۳۰ تا ۱۴۰ ہو جانا،
دست بہت زیادہ آنا، انتڑیوں سے خون جاری ہونا، دماغ یا پھیپھڑے
مبتلائے مرض ہو جانا، دالوں کا اچھی طرح نہ نکلنا یا نکل کر غائب ہو جانا
بار بار لرزہ آنا، ضعف بڑھ جانا، ناک منہ سے خون آنار دہی علامات
میں۔

علامات محمودہ ہر شروع مرض میں علامات کا زیادہ شدید
نہ ہونا، درجہ حرارت بتدریج صبح و شام کم و بیش ہوتے رہنا رقبہ کا رہنا

گردن، شکم اور سینے پر تور کی کے خشخاشی دانے لگانا نہایت عمدہ اور اچھی علامات ہیں۔

تپ تور کی یا پیرامایٹیفائڈ

PARA TYPHOID

یہ بخار بھی مسلسل اور متواتر چرط اختیار کرتا ہے، اور ٹائیفائڈ کے بہت مشابہ ہے۔ محرقة بخار کی نسبت اس کی علامات بہت جلد تیز ہو کر کم ہوتی شروع ہو جاتی ہیں، اس بخار میں اکثر قبض رہتی ہے، سینہ زیادہ آتا ہے، عموماً گردن، چھاتی اور شکم پر خشخاش یا مروارید کی طرح کے دانے نکل آتے ہیں جس کو مہسار کی کہتے ہیں، اس کی مہیاد بالعموم دو ہفتہ ہوتی ہے، اگر تین ہفتے تک پہنچے بھی، تو تیسرے ہفتے کی ابتدا سے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس بخار کا انجام بہتر ہوتا ہے۔

محرقة ہذیانی

یہ دراصل ٹائیفائڈ فیوری ہوتا ہے، لیکن اس میں تپ محرقة کا حملہ ہونے کے ساتھ ہی دماغ بھی مبتلا کے مرعش ہو جاتا ہے، اس میں نہایت کمزوری اور ہذیان ہوتا ہے، اس کا حملہ اچانک ہوتا ہے، ہاضمہ، پاؤں اور سر میں شدت کا درد ہوتا ہے، درجہ حرارت ۱۰۴ یا ۱۰۵ ہو جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ہذیان ہوتا ہے، اگر علامات میں کمی ہو گئی، تو دو ہفتہ تک بخار اتر جاتا ہے، ورنہ علامات شدید ہو کر زبان خشک، سیاہ، منہ سے بدبو، غنودگی، جسم کا پٹنا ہے، آنکھیں اندر کودھنس کر نیم وا کھلی رہتی ہیں اس بخار کا انجام اکثر خراب ہوتا ہے۔

نوٹ، مہیادی بخار میں بالعموم جوان آدمی ۲۰-۳۰ سال کی عمر کے

درمیان کے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، شیرخوار بچوں، بوڑھوں اور حاملہ عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے، اگر حاملہ عورت کو ہو جائے، تو حمل ساقط ہو جاتا ہے، اگر بوڑھے کو ہو جائے، تو چھوڑتا ہی نہیں،

یہ بخار گرم ممالک اور موسم گرما اور خصوصاً موسم خزاں میں زیادہ ہوتا ہے، کھکاوٹ، زیادہ کام کرنا، تفکرات، کمزوری، خراب غذا، گندی سڑی اور باسی چیزوں کا استعمال کرنا اس کے اسباب ہیں، حفظ ما تقدم، اس مرض کے لئے بطور حفظ ما تقدم ٹی، اے بی یکسین لگانا نہایت مفید اور مؤثر تدریس ہے،

جوانوں کو نصف سی سی زیر جلد انجکشن کریں، اس کے لگانے سے اسی دن مصنوعی طور پر بخار ہو جاتا ہے، اس کے ۷ یا ۱۰ دن بعد ایک سی سی کا زیر جلد انجکشن کریں، ۳ سے ۱۰ سال کی عمر کے بچوں کو اس سے آدھی مقدار استعمال کرنی چاہئے، اس سے چھ ماہ کے لئے کامل حفاظت ہو جاتی ہے، اگر بخار کا حملہ ہو بھی جائے، تو انجام بخیر ہوتا ہے،

علاج: مبعادی بخار کے علاج میں جدید کیمیائی انٹی بائیوٹکس اور دیات نے حیرت انگیز مسیحائی اثرات دکھا کر اس مرض کی ہیبت اور وحشت کو کسر ختم کر دیا ہے، اور ان کی بدولت یہ مرض زیادہ سہل العلاج سمجھی جانے لگی ہے، اور اس مرض کی ہفتوں کی مبعاد کو کئی فیکورنی انداز میں ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور بجائے کے طول طول راستوں کو کم کر دیا ہے،

اس مرض کے علاج میں طورم فینی کول جلد ادویات سے مؤثر اور کارگر دوا لی ہے، یہ کئی ناموں سے دستیاب ہوتی ہے، مثلاً، اکلورومانی سٹین، ۱۲، سٹیو مانی سٹین ۳، سفھو مانی سٹین ۴، آیز مانی سٹین ۵، کادرم فینی کال، یہ دوا کی تین طرح کی تیار شدہ ملتی ہے،

ایک بڑوں کے لئے جو کیپ شولز کی شکل میں ہے۔ سیاہی موری اور ایک بچوں کے لئے جو خوش ذائقہ پالمی ٹیٹ مشربت کی صورت میں ہے۔ اس کی مقدار خوراک دو کیپ شول ہر چھ گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ درجہ حرارت نارمل ہو جائے۔ عام طور پر ۴۸ گھنٹے کے درمیان ہی درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے۔ اور اس موذی مرض سے مریض کو نجات ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب درجہ حرارت نارمل ہو جائے، تو ایک کیپ شول ہر آٹھ گھنٹہ بعد چار یا پانچ دن تک دیتے رہیں۔ بچوں کو مشربت کی شکل میں ایک چھ دوالی جو شیشی کے ہمراہ ہی ہوتا ہے۔ ہر چھ گھنٹہ بعد دیتے رہیں۔ یہ دوا تپ محرقہ، تپ لوز کی، تپ محرقہ بدبانی کے لئے اکسیری دوا ہے اس کے ہوتے ہوئے تپ محرقہ کے مریض کا علاج کسی اور دوا سے کرنا مریض پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ شروع میں یہ دوا بہت گراں مہتی، اب کافی سستی ہو چکی ہے۔

اگر یہ دوا بخار کا حملہ ہونے پر ۱۰ روز کے اندر شروع کی جائے، تو مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ زیادہ دنوں کے بعد اس دوا سے علاج شروع کیا جائے، تو دوا کی زیادہ مقدار میں کھلانی پڑتی ہے۔ ہم نے اس دوا کی کو بارہا آزمایا ہے۔ روزانہ مریضوں پر استعمال کی جاتی ہے اور سو فی صدی مجرب ثابت ہوتی ہے۔

بعض اوقات بخار کے اترتے ہی درجہ حرارت ۹۵ ڈگری تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو، تو کوراہین اسی سی کا عضلاتی انجکشن کریں۔ یا خوردنی طور پر کوراہین کے ۱۰-۱۰ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد پانی میں ملا کر پلائیں۔ یہ دوا تقویت قلب اور تنفس کی خرابی کو دور کرتی ہے۔ اور درجہ حرارت کو بھی برصاتی ہے۔

بعض اوقات جب تب محرقہ کے مریض کو منہ کے راستے دوائی کھلانے میں سہولت نہ ہو، تو ہر تیسرے گھنٹے بعد ایک سپازٹری بذریعہ حقنہ داخل کرنی چاہئے۔ شہر خوار بچوں کو ہر چھ گھنٹہ اور بڑے بچوں کو ہر چار گھنٹہ بعد سپازٹری کے دوران علاج میں ہر روز صبح کے وقت سادہ پانی کا اینٹا کر کے انٹریڈوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔

بارک ڈیوس کمپنی نے ایک جدید مرکب کلوروسٹرمب یعنی کلورومائی سٹین اور مسٹریٹائی سین کا مخلوط مرکب تیار کیا ہے، جو ٹائیفائیڈ کے لئے بے حد مفید ہے۔ ٹائیفائیڈ میں اسہال اور پیچش کو روکنے میں بے حد مجرب ہے۔ دو کیپ سٹول ہر چھ گھنٹہ بعد کھلا میں۔

آر یو مائی سین

ARYO MY CIN HYD

مقدار خوراک ۲۵ تا ۱۰۰ ملی گرام جسمانی وزن کے حساب ہر چھ گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں۔

یہ دوائی تب محرقہ، تب تیز کی، تب محرقہ ہذیبانی، ملونہ، کالی کھانسی وغیرہ عفونی امراض کے لئے اکسیر ہے، خصوصاً بچوں کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

میں کلورومائی سٹین پائی پیٹ کی بجائے آر یو مائی سین کے ایک کپ سٹول میں ملک شوگر ملا کر آٹھ خوراک بنا کر دے دیتا ہوں۔ اور چھ گھنٹہ بعد کھلانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایک کپ سٹول کے استعمال سے بخار اتر جاتا ہے۔ اور احتیاطاً ایک اور پیڑیہ بنا کر کھلا دی جاتی ہے۔ بخار بھی رفع ہو جاتا ہے اور تیز کی بھی خوب اچھی طرح باہر نکل آتی ہے۔ بچوں کے تب تیز کی کے لئے بے نظیر اور مجرب نسخہ ہے۔

اگرچہ جدید ادویات کی دریافت نے اس مرض کے علاج میں نمایاں

کا مہیا حاصل کر لی ہے، لیکن پھر بھی یہ موزی مرض جس کو ہو جاتا ہے مرض کی تشخیص کے مکمل ہوتے تک کسی ایک عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا خیال رکھنا اور علاج کرنا ضروری ہے۔

اس لئے جس وقت کسی مریض پر ٹائیفائیڈ کا شبہ ہو، تو اس کے بخار کے علاج میں بخار کو فوراً زایل کر دینے کی کوشش کرنا فضول ہی نہیں بلکہ مریض کے لئے باعث ہلاکت ہے، البتہ اس بات کی کوشش کرنی چاہئے، کہ مرض شدید نہ ہو جائے، اور اس کے بد عوارضات کو روک کے رکھنا چاہئے، تاکہ مرض کی زیادتی کا باعث نہ ہوں، اور صحیح تشخیص ہونے پر کلورم فینی کول کا استعمال کریں، اور مندرجہ عوارضات جو اس مرض میں پائے جاتے ہیں، ان کا علاج کریں، مثلاً زیادتی حرارت، قبض یا نفخ شکم، دست یا خون آنا، درد سر، ہڈیاں، بے خوابی، ضعف قلب،

دافع بخار ادویہ اس بخار میں دینی مضر ہیں، بلکہ آج کل بخار کی شدت حرارت کو اسفنج آبی سے کم کیا جاتا ہے، سرد پانی کا پندرہ بیس منٹ تک اسفنج کرنا مفید ہے۔

مندرجہ ذیل شدت حرارت کے لئے مفید اور بالکل بے ضرر ہے، لائیکوار ایوینا ایسی ٹاس ۲ ڈرام، سپرٹ ایٹھرتا ٹرڈ سالی ۲۰ منم، پوٹاشیم سائٹراس ۱۰ گرین، سپرٹ ایوینا ایرڈم ۵ منم، ایچوا ایک اولس،

ایسی تین خوراک دن میں دینی چاہئیں، اس سے حرارت بخار زیادہ نہیں ہوتی، اگر ساتھ کھانسی ہو، تو اسی نسخہ میں سیرپ سلا ۱۶ ڈرام فی خوراک کے حساب سے ملا دیں، کلورین کوئین کچھر کا استعمال بھی حرارت بخار کو کم کرتا ہے۔

بارہ اولس کی خالی بوتل میں ۳۰ گرین پوٹاشیم کلوراس سفوف کر کے

ڈال دیں۔ اور اس کے اوپر ۴۰ منم سٹرانگ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈال کر بوتل کے منہ پر مضبوط ڈاٹ لگا دیں۔ پھر بوتل کو دو چار منٹ ہلاتے رہیں۔ جب اس میں سبزی مائل زرد رنگ کی گیس سے بوتل بھر جائے، تب اس میں کھوڑا کھوڑا پانی ملا کر ہلاتے جائیں۔ تاکہ گیس پانی میں جذب ہوئی رہے جب بوتل پانی سے بھر جائے، تب اس میں ۲۴ گرین کوہین سلفاس اور ایک اونس مشریت لیمو ملا دیں۔

مقدار خوراک ایک ایک اونس ہر تین چار گھنٹہ بعد دیں۔ ایک ہفتہ بعد یہ دوا چھ چھ گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں۔ شروع سے آخر تک اسی دوا کے دینے سے بخار سے آرام آ جاتا ہے۔ جب پیاس لگے، تو صرف عرق کا دزبان اور گلاب ملا کر دیں۔ یا جوش دے کر پلا دیں۔

قبض :- اگر قبض زیادہ ہو، تو صرف خالی پانی نیم گرم کا دینا بہت مفید ہے۔ یا ۵ تولہ گلاب ایک پاؤدودھ میں جوش دے کر صاف کر کے پلا دیں۔ یا اگرین کیسول ایک ڈرام گلیسرین یا سزا ملا کر رات کو کھلا دیں۔ صبح کو کھل کر اجابت ہوگی۔ اگر پیٹ میں نفخ اور اچھارہ ہو جائے، تو پیٹ پر ٹکور کرنی چاہئے۔ اور اندرونی طور پر کارنیٹو مسچر کی ایک خوراک پلا دیں۔

اسہال :- اگر اسہال معمولی آتے ہوں، تو بند نہ کریں۔ اگر شدید ہو گئے ہوں، تو ایچ بی ۶۹۳ کیسٹرائیل امیٹیشن دیں، یا سبازول گولیاں فی خوراک اگولی دن میں چار بار دیں، یا اور کوئی رستہ بند کرنے کا نسخہ دے دیں۔

نوٹ :- اس بخار میں اسہال کا زیادہ آنا ہلاکت کا باعث ہے۔ اس لئے اس سے بچنے کے لئے غلط ہو جاتے ہیں اگر دستوں کے ہمراہ خون آتا ہو تو ایچ بی ۶۹۳ کیسٹرائیل امیٹیشن سے بند ہو جائے گا۔ اگر زیادہ خون آ رہا ہو، تو لایکوارا پڑھنے لیں، یا بوند عرق یا سوڈا واٹر میں ملا کر دن میں تین بار دیں یا سفوف برقی کا فر کی ایک خوراک دیں، خون بند ہو جائے گا۔

درد سر، ہذیان وغیرہ : دردمر میں سر پر روغن خشخاش کی مالش کرنا
بہت مفید ہے۔ صندل، گلاب، کافور میں کریشانی پر لپیٹ کر دیں۔

یا ڈورس پوڈرا گرین یا سفوف برش کافور کی ایک خوراک دیں، رفع بے خوابی
کے لئے بھی مفید ہے۔ اسفنج سے حرارت بخار کو کم کرنے سے ہذیان بھی کم
ہو جاتا ہے۔ یا ہر سہ بروم، اگرین کی خوراک دیں، یا شربت خشخاش پلا دیں۔

ضعف قلب کی صورت میں دوا المسک عنبری ۳ ماشہ سمراہ عرق
گاوزبان دو تین دفعہ دن میں دیں، یا تخیرہ مرداریدی یا کمفران آکیل کا ٹیکہ
کرنا مفید ہے۔ ٹینکچر مسک ۵ اونس، سپرٹ ایوینا ایرو میٹک ۲۰ اونس کا استعمال
بھی مفید ہے۔ روح بیدمشک، روح گلاب، عرق گاوزبان میں ملا کر دینا
عنفع قلب بلکہ غشی تک کو دور کرنے میں مفید و مجرب ہے۔

یادداشت : اس بخار میں تین چیزیں قابل غور ہیں، اول مریض کو
شدت حرارت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ جس سے مریض کے تلف ہونے کا خطرہ
ہو، اس کے لئے فیور ٹیکچر یا اور مناسب دوا دیتے رہیں۔

دوسرے دست آنے کا بھی خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ ان کی کثرت
بھی باعث ہلاکت ہے۔

تیسرے نمونہ کا خیال رکھیں، کیونکہ اکثر مایفائد میں نمونہ کا خطرہ پیدا
ہو جاتا ہے۔ اس لئے بطور حفظ والتقدم ایم بی ۶۹۳ یا سبازول کا فیور ٹیکچر
کے ساتھ استعمال جاری رکھیں، اس سے کھانسی کی شدت، بخار، پیٹ
کی تکلیفوں کو آرام رہتا ہے۔

دیگر مریض کے سر پر بادام روغن لگانے رہنا چاہئے، چونکہ یہ مرض
چھوٹا دار ہے، اس لئے بیمار کو بھی مریض کے بول و براز متحرک وغیرہ
سے احتیاط رکھنی چاہئے۔

اکسیر تپ مبیعادی : ہر منقۃ ۵ عدد ، ابخیر دلایتی ۲ عدد ، خوب کلاں

۳ ماشہ ، پانی آدھہ سیر

تمام چیزوں کو پانی میں جوشش دیں ، نصف پانی بہنے پر اتار لیں ،
خوب مل چھان کر صاف کر کے دن میں تین بار مصری ملا کر دیں ،

اس کے تین چار روز کے استعمال سے مبارکی کے دانے باہر نکلنے

شروع ہو جاتے ہیں ، جب مبارکی کے دانے نکلنے شروع ہو جائیں ، تو اس
لشخہ کے ہمراہ مندرجہ ذیل گولیاں دیں ، اس کے استعمال سے مبارکی کھل
کر نکل آتی ہے ، اور بخار بھی جلد رفع ہو جاتا ہے ،

لشخہ : ہر شکر ف ردی ۲ تولہ ، مرج سیاہ ۱ تولہ ، سہاگہ سفید بریاں ۱ تولہ
مٹھا تیلیہ مصفۃ ۱ تولہ ، گندھک مصفۃ ۱ تولہ ،

اول گندھک اور پارہ کو ملا کر باہم کھل کر دیں ، جب کاجل بن جائے ،

باقی ادویہ نہایت باریک پیس کر اس میں شامل کر کے ادراک کے رس کے ہمراہ
بارہ گھنٹے کھل کر دیں ،

مقدار خوراک : ہر گولی تا ۲ گولی دن میں چار بار طرق سولف کے ساتھ

دیں ، لیکن صبح اور شام کی خوراک مندرجہ بالا جو شانہ کے ساتھ دیں ، اس
کے استعمال سے پہلے بخار بڑھے گا ، لیکن دو دن کے بعد مبارکی یعنی تور کی
خوب نکل آئے گی ، بعد میں بخار ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا ، اور چند دنوں
میں بالکل اتر جائے گا ،

نوٹ : اگر تپ زیادہ ہو ، تو سر پر پرف کی ٹکڑ کر دیں ، یا سرد پانی کی
پٹی رکھیں ،

اکسیر مبارکی : ہر منقۃ ۷ دانہ ، خوب کلاں ۱ تولہ ، ایک سیر پانی میں جوش

دے کر انکباب دھپارہ کر دیں ، پھر اس میں مصری ملا کر پلاتے رہیں ،

فوائد: مبارکی اور خسرہ نکالنے کے لئے اکسیر ہے۔
 غذا مرلیض اور بخار میں چونکہ رطوبات کم ہو جاتی ہیں۔ اور پانی کی خواہش
 مرلیض کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے مرلیض کو سرد پانی جو شش دیا ہو اعرق گاؤنیا
 یا عرق گلاب دینا چاہئے۔

دودھ بہترین غذا ہے۔ لیکن گرم کر کے سرد کر کے پلانا چاہئے۔
 اگر نفخ ہو جائے۔ تو اس میں سوڈا وارٹ ملا کر دیں۔
 پتلا آش جو۔ حریرہ۔ شوربہ مرغ۔ پتلا ساگو دانہ بھی دے
 سکتے ہیں۔ بخار رفع ہونے کے بعد غذا زود متھم۔ سادہ اور معمولی دینی
 چاہئے۔ سخت غذا سے پرہیز کریں۔

تپ محرقہ کا ہومیوپیتھی علاج

اگر بخار دو چار دن متواتر چڑھتا رہے۔ کسی وقت بھی نہ اترے۔ تو
 پیٹیشیا ۳ دیں۔ اگر بے حمی بہت ہو۔ اور بیمار سرد وقت کو دھیس
 بدلتا رہے۔ تو رسٹاکس ۶ مفید ہوگا۔ اگر پانی زیادہ مقدار میں بار بار
 پیا جائے۔ تو برائی ادینا ۳۔ اور پیٹیشیا ۳ دیں۔ اگر بیمار بہت
 کمزور ہو جائے۔ اور بیماری بھاری صورت اختیار کرتی جائے۔ بیمار پانی
 ایک ایک گھونٹ بار بار پیئے۔ اور بدبودار اسہال آئیں۔ تو آرسینکیم ایلم ۶
 بہتر ہوگا۔

اگر بیمار کے منہ میں آبلے ہو جائیں۔ اور بیمار بے حد کمزور ہو۔
 اسہال پانی کی طرح آئیں۔ تو ایسی حالت میں ایڈمیور ۳۰
 بہتر ہوگا۔

TUBER CULOSIS

دق وسل

(ٹیو برکیو لوسس)

دجوبات و تشخص : یہ ایک متعدی مرض ہے، اس مرض کا سبب ایک جراثیم ہے، جس کو مائیکو بیکٹیریا ٹیو برکیو لوسس کہتے ہیں، یہ انسان کے جسم کے ہر حصے میں سرایت کر سکتا ہے، اور جسم کی کسی ساخت میں جم کر چھوٹے چھوٹے دانے بنا دیتا ہے، جب یہ جسم میں داخل ہوتا ہے، تو خون کے سفید ذراتے ان جراثیموں کا مقابلہ کرنے کے لئے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے گرد ایک قسم کا خول بنا لیتے ہیں، اور جراثیموں کو نقصان پہنچانے سے روک دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس خول کی شکل و صورت گانٹھ کی مانند ہو جاتی ہے، اس گانٹھ کو ٹیو برکل یا دانہ کہتے ہیں، اگر جسم میں حملہ آور جراثیم زیادہ تعداد میں داخل ہو جائیں، تو قوت مدافعت حملہ آور جراثیموں کو خول میں قید نہیں کر سکتی، اور جراثیم غالب آ جاتے ہیں، پھر یہ مرض شروع ہو جاتی ہے، اگر قوت مدافعت حملہ آور جراثیموں کو خول میں قید کر دے، تو اس خول کی ساخت چونا میں بدل جاتی ہے، اور اس مرض سے کامل صحت ہو جاتی ہے۔

دق وسل ایک عام مرض ہے، جو تمام جسم پر حمادی ہوتی ہے، لیکن اعضا میں جراثیمی سرایت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ عمل کرتی ہے، عام اقسام درج ذیل ہیں۔

۱۔ سل عامہ (ملر می ٹیو برکیو لوسس)

اس میں جراثیم سل جسم کے تمام حصوں میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر ایک اعضا کو مادف کرتے ہیں۔

۱۲، سِل ریدی ر پو موری ٹو برکیو کسرس

اس میں پھیپھڑے مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

۱۳، سِل بطنی

اس میں پیٹ کے غدود میں جراثیم سِل سرایت کر جاتے ہیں۔

۱۴، سِل مفصلی عظمی

اس میں جوڑوں اور ہڈیوں میں جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔

۱۵، سِل تحری

اس میں جراثیم سِل خجرہ میں جا کر رہتے ہیں۔

۱۶، سِل غدوی

گردن کے غدود مرض سِل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسے کنکھ مالا یا خنازیر بھی کہتے ہیں۔

۱۷، سِل دماغی ر پو برکیو ر سجا سٹس

اس میں پردہ ہائے دماغ میں بثور سلیہ ہو جاتے ہیں۔

جراثیم سِل دوق کی چھوت لگنے کا طریقہ۔

سِل دوق کے جراثیم مریض سِل کے عضو کے ہوئے بلغم میں پیشہ
لغداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ کپڑے خشک شدہ بلغم میں بھی زندہ
رہتے ہیں۔ گرد و غبار میں اڑ کر کسی نہ کسی ذریعے مثلاً غذا میں مل کر
اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی مریض کے کھانسنے، گھٹیکو کرنے اور
سانس لینے سے بھی تندرست آدمی تک پہنچ کر مرض کا باعث ہوتے
ہیں۔

عام طور پر یہ جراثیم سب سے پہلے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتے ہیں
اور پھیپھڑوں پر اپنا مسکن بناتے ہیں۔ کبھی انشڑیوں پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ دق کی تمام قسموں میں سے پھیپھڑوں کی دق عام ہے۔
 دوسرے درجہ پر انٹریٹوں کی دق سے اور دوسری قسمیں مثلاً ذیابیطس اور
 ہاں ایسے مریض جو کسی لمبی مرض مثلاً مزمن طبع یا پیرسوتی بخار اور کھانسی
 کھانسی خسروہ، نزلہ دہائی اور نمونہ یا نقص تغذیہ یا کسی ایسی بداعتدالی
 سے جس سے عام جسمانی حالت بالکل کمزور ہو چکی ہو۔ ایسے مریضوں کو
 دق و سل کے جراثیم نہایت آسانی سے شکست دے کر فتح کر لیتے ہیں اور
 اور تھوڑے عرصہ میں ابدی نمیدر سلا دیتے ہیں، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے
 ان کی قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔

علامات ہر شروع مرض میں مریض کو بھوک کا نہ لگنا، وزن کا
 کم ہونا اور بندرتیج کھٹے جانا، شام کے وقت اعضا شکنجی بستی اور کمزوری
 نمید کے بعد اٹھنے پر تھکاوٹ محسوس ہونا معمولی محنت سے تھک جانا
 اور دل کی رنستار کا تیز ہو جانا، بائق پاؤں کے تلوے جلنا، گیلے میں
 دائمی طور پر نزلہ کا گرنا اور خراش ہونا، زکام کا بار بار ہونا، مرغن غذاؤں سے
 نفرت ہو جانا، صبح کے وقت خالی معدہ نے آنا اور ہلکی ہلکی کھانسی اس
 کی ابتدائی علامتیں ہیں اور یہ اس مرض کا پہلا درجہ ہے۔

ایسی علامات کی موجودگی میں سینہ کا اکھیرے اور بلغم کا احتسان
 کرانے سے اگر دق کی تشخیص ہو جائے، تو یہ درجہ تامل علاج ہے اور مریض
 ہمیشہ کے لئے بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔

پھر رفتہ رفتہ ان میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور حرارت اعضا کے اصلہ
 میں سرایت کر جاتی ہے، جیسا پھر بخار، وزانہ وقت معترہ پر لازمی طور پر ہونا
 شروع ہو جاتا ہے، اور آدھی رات یا اس کے بعد بہت زیادہ پسینہ
 آنے کے بعد اتر جاتا ہے، اور کھانسی کے ساتھ بلغم آنی شروع ہو جاتی ہے

جسم کی چربی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، وزن میں کمی آنے لگتی ہے، سینہ میں درد ہوتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، عورٹوں میں خون حبض رک جاتا ہے، اور جس پھیپھڑے پر مرض کا حملہ ہو، اس کے اوپر کا گوشت کم ہو جاتا ہے، آلہ ایسٹمکوپ سے آوازیں سننے میں زائد آوازیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ اس مرض کا دوسرا درجہ ہے، یہ درجہ بھی قابل علاج ہے،

پھر درجہ دوم کی تمام علامات تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں، کھانسی میں ملغم بہت زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر پھیپھڑے کے اندر کوئی شریان حق دسل کے جراثیموں کے گھیرے کی زد میں آجائے، تو اس سے خون بھی خارج ہونے لگتا ہے، جس سے کھانسی کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی کے ساتھ جھاگ دار ملغم، خون، پیپ اور پھیپھڑوں کے باریک ٹکڑے خارج ہوتے ہیں، اور یہ سل ربوی کی خاص علامت ہے،

اس درجہ میں چربی بالکل ختم ہو جاتی ہے، گوشت، ہڈیاں اور جلد بھی تحلیل ہونے لگتی ہے، مریض کے مرض کی تصویر اس کی شکل و صورت اور جسم پر بالکل نمایاں ہوتی ہے، جس کی تشخیص اکثر من الشمس ہوتی ہے، اس درجہ میں مرض کی سرایت انٹریوں تک بھی پہنچ چکی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، مریض کو دست شروع ہو جاتے ہیں، جو مریض کو زندگی کے خاتمہ کے ساتھ ہی ختم ہوتے ہیں، اور یہ اس مرض کا تیسرا درجہ ہے،

اس درجہ میں مریض کا علاج بالکل ناممکن اور محال ہے، مرض جسم کو بالکل تباہ کر چکی ہوتی ہے، انسان کے جسم کے تمام نظاموں کو اس طرح درہم برہم اور برباد کیا ہوا ہوتا ہے، کہ ان کو دوبارہ بحال نہیں کیا جاسکتا، اور آج تک کوئی ایسی دوائی دریافت نہیں ہو سکی جو ایسی حالت میں کام آسکے، اللهم حفظنی

آج کل اس مرض کی صحیح تشخیص کے لئے اکیسریے سے بھی بددلی جا سکتی ہے۔ اور مریضوں کی اکثر تعداد میں اکیسریے کے بغیر یقینی اور صحیح تشخیص کا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور معیض کا خوردبینی امتحان کرنے سے بھی جراثیم سلیب کا پتہ چل جاتا ہے۔

علاج ہر دن کا مرض جس طرح پہلے لا علاج سمجھا جاتا تھا اب وہ بات نہیں رہی۔ اب اس کی تکالیف کا بڑی آسانی سے ازالہ کیا جاسکتا ہے اور مرض کے ابتدائی مراحل میں تشخیص مکمل ہونے پر تمام امراض سے زیادہ قابل علاج سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ علامات کے زیادہ بڑھ جانے کے بعد یہ مرض بالکل لا علاج ہے، لیکن یہ بات تقریباً ہر مرض میں مزمن ہونے کی صورت میں پیش آ سکتی ہے۔

جدید ادویات اس مرض کے علاج میں نمایاں اثر رکھتی ہیں، اور آج کل ان کی بدولت یہ بیماری مزمن بیماریوں میں زیادہ قابل علاج سمجھی جاتی ہے۔

اس مرض کے علاج میں مکمل آرام کرنا سب سے ضروری ہے۔ مریض کو کسی قسم کی جسمانی یا دماغی محنت نہیں کرنی چاہئے، اور غذا خوب معوی جس میں دودھ، انڈے، گوشت، مگھی، مکھن، دالیں اور سبزیاں تازہ پھل دینے چاہئیں۔ مریض کو کھلی جگہ، کھلی ہوا اور روشنی میں رکھنا چاہئے۔ اور جب تک بخار بالکل رفع نہ ہو جائے، مریض کو تمام دن لیٹر پر لیٹے رہنا چاہئے۔ حقہ، سگریٹ، گر و غبار، سردی اور نمی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

اس مرض کے علاج میں بے شمار قدیم و جدید ادویات استعمال ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ان ادویات کو تحریر کیا جاتا ہے۔

جن سے میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا ہے۔ اور میں نے اس علاج کو دیگر ماہرین سل دوق ڈاکٹروں کے نسخہ جات کی روشنی میں مرتب کیا ہے اور ابتدائی تشخیص کے مکمل ہونے پر اس علاج کو بہت مفید و تجربہ پایا ہے۔ نسخہ: دو ڈالی ہائیڈروکسائیڈ مائی سین اگرام، ڈسٹلڈ واٹر ۵ سی سی، معروف طریقے پر سرخ کے ذریعہ ڈسٹلڈ واٹر کو دوالی کی شیشی میں داخل کریں۔ جب دوالی اچھی طرح حل ہو جائے، تو ایک ہی دفعہ تمام دوالی کا عضلاتی انجکشن کریں۔ اور کم از کم دس دن تک اتنی مقدار میں روزانہ انجکشن کرنا چاہئے۔ اس کے استعمال سے تب دق و سل کی علامات میں بہت حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر پانچ دن کے اندر اندر درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے۔

یاد رہے کہ ریونی فون ۲ ملکیہ دن میں تین بار روزانہ مسٹر پو مائی سین کے دوران استعمال میں دی جانی چاہئیں، کیونکہ یہ اس کی مدد و معاون ہے اگر کھانسی زیادہ ہو، تو سیرپ کو ڈین ناس ناس ایک ایک چمچ تقریباً ڈیڑھ ڈرام دن میں تین بار دیں، گریمالٹ سیرپ بھی اس مطلب کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

جب درجہ حرارت نارمل ہو جائے، تو جسمانی تقویت کے لئے وراکسٹریکٹ ۲ سی سی روزانہ عضلاتی انجکشن کریں، لیکن تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کہ مریض تب دق کو فوری تقویت پہنچانے کے لئے وٹامن بی ۱۲ جو سیٹامین، ڈسٹاوت، سائینو کو بلا مین وغیرہ ناموں سے دستیاب ہوتی ہے، بہت مفید و تجربہ ثابت ہوتی ہے۔ سیٹامین ایک ہزار مائیکرو گرام روزانہ عضلاتی انجکشن کریں۔ اس کے استعمال سے جسم میں خون کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے،

اور جسم کو بے حد تقویت پہنچتی ہے۔ اور میں عام طور پر سیٹامین کو سٹرپٹامائی سین کی ٹیوب میں داخل کر کے دونوں کا مخلوط انجکشن ہی کر دیا کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک تو مریض دودھ سوئی چھیننے کی تکلیف سے بچ جاتا ہے، اور دوسرے دونوں ایک دوسرے کے مدد معاون ثابت ہوتے ہیں۔ سٹرپٹامائی سین جراثیم تب دن کے لئے مؤثر ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ اور سیٹامین جسم کو تقویت پہنچا دیتی ہے۔

وٹامن بی کمپلیکس جو کئی ناموں سے دستیاب ہوتی ہیں، مثلاً بیگا ڈیکس، ملٹی وٹامنز وغیرہ، روزانہ تین ٹمکیہ کھلائیں، یہ بھی تقویت کے لئے استعمال کرائی جاتی ہیں۔

اگر خون آتا ہو، تو کینٹیم اسٹین دوسری سی روزانہ عضلاتی انجکشن کریں جسے کہ خون کا اخراج رک جائے، کا ڈیور آئل یا سکالس امیلشن دن میں تین بار غذا کے بعد دیں، پیپرٹوں کی تقویت اور کھانسی کے لئے مفید ہے ایک ماہ بعد پھر یہی کورس کرنا چاہئے۔

نوٹ، ڈالی ہائیڈرو سٹرپٹامائی سین کی بجائے آج کل سٹرپٹامائی سین سلفیٹ اور سٹرپٹامائی سین ہائیڈروکلورائیڈ کے مخلوط انجکشن ڈیپو مائی سین کے نام سے تیار ملتے ہیں، جو زیادہ مفید ثابتے جاتے ہیں۔

بعض ڈاکٹروں نے سٹرپٹامائی سین ہر تیسرے دن استعمال کرنے کی سفارش کی ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ میں ایک بار انجکشن لگانا چاہئے لیکن میرا تجربہ یہ ہے، کہ جب مریض کو تب دن دسل کی اکیوٹ انفکشن یعنی تازہ سرایت ہو، تو روزانہ انجکشن کرنا لازمی ہے، تاکہ جراثیم تریپ دن کا مکمل طور پر قلع قمع ہو جائے، اور جب تک درجہ حرارت نارمل نہ ہو جائے، اور بلغم کا اخراج مکمل طور پر نہ رک جائے، اس وقت تک اس کا استعمال

جاری رکھنا چاہئے۔ اور اس کے بعد جسم کو تقویت دینے کے لئے مقویات کا خوب استعمال کرنا چاہئے۔ طاقت کے لئے دودھ، انڈے، فرسٹ اور گوشت بے حد مفید ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ جسم میں خوب توانائی اور طاقت آجاتی ہے، تو پھر اس میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جو مرض کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور تب دق کے جراثیم کو پھیلنے پھوٹنے کا موقع نہیں دیتی، کافی غذا نہ ملنے کی صورت میں میں نے بہت سے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں، جو دوبارہ اس جان لیوا مرض میں گرفتار ہو گئے، اور آخر کار موت کا شکار ہو گئے، لیکن جن مریضوں کو تندرست ہونے کے بعد کافی مقدار میں دودھ، گھی، مکھن، گوشت اور انڈے ملتے رہے، اور مقوی ادویات استعمال کرائی گئیں، وہ سالہا سال سے بالکل تندرست ہیں۔

مختصر الفاظ میں اس مرض کے علاج میں ہمارا معمول مطلب سٹریٹ مائی سین، سیٹامین، ہائیڈرازاٹید، مکمل آرام اور کافی غذا ہے، اسی علاج سے سینکڑوں مریضیں ستفایاب ہوئے ہیں۔ علاج کے بعد کھیرے کرانا ضروری ہے، تاکہ مرض کا شک و شبہ نہ رہے۔

آج کل دق و سل کے ادویاتی علاج کے ساتھ فرنیک کرش یعنی دیا فرغی پیٹے کو کاٹ دینے کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ادویات کے استعمال کے بغیر اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے اور دیگر تدابیر کے ہمراہ اور باقی علاج ہی کارگر اور کامیاب ثابت ہوتا ہے اس مرض میں شدت حرارت، پسینہ آنا، پیغم یا غٹوک کے ساتھ خون کا خارج ہونا، کھانسی آنا، بے خوابی، درد سر ہونا اور عام جسمانی کمزوری ہونا عام علامتیں ہیں۔

۱۱۔ شدت حرارت سٹریٹ مائی سین کے استعمال سے رفع ہو جاتی ہے

لیکن اگر شدید حرارت ہو، تو سرد پانی کا اسفنج استعمال کریں، یا بروک کی
ڈلی سر پر رکھیں، اسپرین ۵ گرین دن میں دو تین بار دینے سے حرارت میں
کمی ہو جاتی ہے۔

۲، پسینہ روکنے کے لئے سٹرپٹوکا استعمال کافی ہے۔

اکسیر وق و سل: یہ ایک عجیب و غریب کم خرچ نسخہ ہے، جس سے ہمارے
زیر علاج کئی مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، اور ہمارا معمول مطلب ہے جو نادار
اور غریب لوگ قیمتی علاج کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لئے یہ علاج نہایت
مفید ہے۔

نسخہ: براتیس عمدہ ۵ تولہ، قلعی شورہ ۵ تولہ، کچورہ ۵ تولہ، دانہ الاجی خورد
۵ تولہ، طب شیر لقرہ ۵ تولہ، مصری کوزہ ۵ ۲ تولہ، بارکب سفوف تیار کریں،
مقدار خوراک ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام ہمراہ عرق گاوزبان ۱۰ تولہ،
اس دوا کا خاتمہ ہے، کہ سوائے تب و دن کے ہر قسم کے پرانے بخار کو ایک
مہینہ کے اندر بالکل رفع کر دے گی، اگر ایک مہینہ تک بخار رفع نہ ہو، تو
یقیناً تب و دن ہے، اگرچہ تب و دن کے بخار میں بھی کمی ہو جائے گی، لیکن
تب و دن کے بخار کی صورت میں مندرجہ ذیل نسخہ بھی ہمراہ استعمال کرائیں،
نسخہ: بر و حنیا، آملہ، شاترہ، ریح بالنسہ، مویزہ منقہ ہر ایک ۶ ماشہ
رات کو ایک پاؤ پختہ پانی میں بھگو دیں، صبح مل چھان لیں، نصف حصہ
میں چھ ماشہ شہد اور دو تولہ کوزہ مصری ڈال کر مندرجہ بالا نسخہ کے ہمراہ
استعمال کرائیں، دن میں تین بار۔

اس کے استعمال سے بخار، کھانسی اور خون کا آنا ایک مہینہ کے
اندر ہی رفع ہو جاتا ہے، کم خرچ، سہل الحصول اور کثیر المنفعت شاید
کوئی نسخہ ہی اس کے مقابلہ کا ہوگا۔

اگر خون زیادہ آتا ہو، تو کھار برگ بانسہ ۲ رتی دن میں دو بار اسی جوشاندہ کے ساتھ دیں، نفث الدم کے لئے اکسیر ہے۔

اکسیر کھانسی دق و سہل در کندیاری خورد پانچوں انگ ۲۰ تولہ، برگ بانسہ ۲۰ تولہ، کونیل بیول ۲۰ تولہ، ریش برگد ۲۰ تولہ،

چاروں اشیاء کو جو کو ب کر کے سولہ گنا پانی میں جوشش دیں، جب پانی دو حصہ رہ جائے، تو آگ پر سے اتار لیں، خوب مل چھان کر صاف کر کے دوسرے عمدہ چینی ملا کر لعوق کی شکل کی پختہ چائشنی کر لیں، اتار کر اس میں نصف سیر شہار اور مندرجہ ذیل ادویہ کو بار یک پیس کر ملا لیں، بس تیار ہے۔

اجزاء ۱۔ طباشیر نقرہ ۲ تولہ، دانہ الاچی خورد ۱ تولہ، غلغلہ راز ۶ ماشہ دارچینی ۳ ماشہ، گوند بیول ۲ تولہ، گوند کمیرا ۲ تولہ، یہ اجزاء بار یک پیس کر لعوق میں ملا لیں۔

مقدار خوراک ۱ تولہ تا ۲ تولہ دن میں چار بار، تب دق کی کھانسی کیلئے نہایت فائدہ مند بلکہ اکسیر ہے۔

کیسیم اسٹلین، دھامن کے ادوی اور کیسیم کا استعمال جریان خون کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

سیرب کوٹین اڈرام دن میں تین مرتبہ پلائیں، کھانسی کیلئے مفید ہے، پوٹاسیم برومائیڈ، اگرین، رات کو سوتے وقت ایک خوراک پلائیں، خواب آور ہے، رفع بے خوابی کے لئے مفید ہے۔

مندرجہ ذیل ادویات بھی دق و سہل کے لئے عام استعمال ہوتی ہیں، جی۔ اسٹیلین، بعض کمینوں نے اس درائی کو سٹرپٹومیائی سین کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے، جو سٹرپٹومیاس کے نام سے ملتی ہے۔

مقدار استعمال در ۱۶ گرام روزانہ عضلاتی انجکشن کے ذریعہ استعمال کریں

اور یہ مخلوط مرکب پانی، لے لیں، منہ کے ذریعہ کھلاسنے سے زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔

بعض دوا ساز فرموں نے سٹرپٹومیسیس کے ساتھ پینی سی لین کے مخلوط انجکشن تیار کئے ہیں، مثلاً آسٹریائی سین، سائیکلومیائی سین (ٹیکسو) ایس، آر ڈی رپارک ڈیوس)۔ پیسے مائی سین وغیرہ جو دق و سل کے علاوہ انفلوئنزا، زکام، کھانسی، نمونہ کے لئے بھی مفید ہیں۔

تریاق و ق و سل: ہر ایک سیاہ آدھ سیر، مغز جو سفید دو سیر۔

اول ایک کو ایک علیحدہ علیحدہ درق کر دیں، پھر دونوں استیہ کو ایک کپڑے کی تھیلی میں ڈال دیں، تھیلی ایسی ہو کہ جس میں ذرا خلا باقی نہ رہے، اس کا منہ باندھ دیں، ایک بڑا دنگیدان جس میں بارہ سیر پانی ہو، اس میں یہ تھیلی ڈال دیں، تین دن کے بعد تھیلی کو دن میں دو تین بار ہاتھ سے مل دیا کریں، تاکہ نشاستہ سا نکل کر پانی میں حل ہو جائے، پھر تھیلی کو نکال دیں، اور پانی مختار کر اتار دیں باقی ماندہ نشاستہ کو سکھا لیں، اگر ایک دو دفعہ تازہ پانی میں حل کر کے مختار کریں، تو نشاستہ اور بھی کم ہو جائے گا، سکھا کر محفوظ رکھیں۔

یہ کشتہ ایک سیاہ ۲ تولہ، الچی خود ۲ تولہ، طب مشیر ۲ تولہ، کوزہ مصری ۲ تولہ، تمام ادویہ کو خوب زور دار ہاتھوں سے کھل کریں، دو گھنٹہ تک، پس یہی تریاق و ق ہے۔

خوراک ۳ ماشہ ہمراہ شیر بکری جو ان، تندرست، سل و ق، کھانسی، نفث الدم، خون متوکنہ وغیرہ کے لئے واقعی بے نظیر تریاق ہے۔

یہ ایک صدی راز مختار جو بخل کے صندوق کو توڑ کر زبردستی نکال لگیا ہے جو صاحب بنائیں گے، ہماری بخل شکنی کی داد دیں گے، اور دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے۔

سل دق کا ہومیوپیتھی علاج

جب خشک کھانسی ہو، اور کھانسنے کے بعد خون نکلے، تو اکلینفا انڈیکا ۳ ضرور دیں، پھیپھڑوں سے خون کے آنے کی تکلیف کے لئے لاجواب دوائی ہے، اس کی چھوٹی طاقت یا درٹشجر کے ۱۰، ۱۵ قطرے ایک پاد پانی میں ڈالیں، پھر ایک ایک گھنٹہ کے بعد ایک یا دو چمچے دے جائیں، اس سے نمایاں افادہ ہوگا۔

مزدوع مزدوع میں اگر ایلیم سٹیکوا ۳ سے ۶ دیں، تو اکثر مفید ہوتا ہے اس میں مریض کے سینے میں کھانسنے وقت طعم کی موجودگی پائی جاتی ہے، صبح کے وقت تکلیف عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، اور طعم بھی کافی تکلیف سے نکلتی ہے، اگر مرض کافی ترقی کر گیا ہو، شانوں کے بیچ اور سینہ میں جلن پائی جائے، اور رات کو سوتے وقت پسینہ بھی آئے، تو فاسفورس ۲۰ مفید ہے۔

جو اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ بڑھ گئے ہوں، مریض خنازیری مزاج رکھتا ہو، اور بدن موٹا پے کی طرف مایل ہو، اور کھلی ہوا میں مرض میں شدت محسوس کرتا ہو، تو ایسی حالت میں کلکیریا کارب ۳۰ زیادہ مفید ہے، اگر اس دوائی کے ساتھ رات کو ایک خوراک آرسنک آیوڈائیڈ ۳ کی بھی دی جائے تو عام طور پر ان دونوں دوائیوں کے متواتر دینے سے بہت سے مریضوں کی دوبارہ زندگی ہو گئی ہے، دوائی کے دوران میں سلفر ۳ یا ۲۰ کی ایک خوراک ضرور دینی چاہئے، تاکہ بیمار کو صحت جلدی ہو، اور مادہ سورا بھی آہستہ آہستہ رفع ہوتا رہے۔

اس کے علاوہ آیوڈ ٹیم ۳۰، برائی ادینا ۳، چائنا ۳، کلکیریا ٹاس

کالی کارب ۳۰ ، لائیو پوڈیم ۳۰ ، سٹیم ۳۰ ، ڈرومرا ۳۰ سے ۳۰ ، ٹیور کیو لینم ۲۰۰ ، بیسی لینم ۲۰۰ ، ہیر سلفر ۳۰ بھی مفید ادویہ ہیں جو علامات کے تحت دی جاسکتی ہیں۔ ٹیور کیو لینم اور بیسی لینم ہفتہ میں صرف ایک بار دینا چاہئے۔ اور ان دواؤں کو بہت احتیاط سے دینا چاہئے۔
غذا: دودھ، چاول، وال مونگ، بھلکا، کھن، بالائی، گوشت
انڈے، بخنی وغیرہ

پچھلے مہینہ جماع، دماغی محنت، جسمانی محنت اور گرم اغذیہ سے پرہیز لازمی ہے۔ خصوصاً پھیپھڑے کی سل کے مریض کو حقہ نوشی اور سگریٹ سے مکمل پرہیز کرنا چاہئے۔

زیادہ کھانسنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے۔ مریض کو ہدایت کریں کہ وہ بلغم کو اندر نہ نکلے، بلکہ اگالڈان جس میں فینائل یا چونا پڑا ہو، اس میں بلغم پھینکنا چاہئے۔

مریض کے استعمال کے برتن علیحدہ ہونے چاہئیں، اور اس کے کپڑے ابال کر دھونے چاہئیں۔

مریض کھانسنے وقت اپنے منہ کے سامنے رومال وغیرہ رکھے تاکہ کھوک کے ذرات کے ساتھ جراثیم تب دق دوسروں تک نہ پہنچیں۔
مریض کے کمرہ میں صفائی کرنے وقت جھاڑو گیلہ کر کے استعمال کرنا چاہئے۔ کیونکہ تب دق کے جراثیم مٹی میں مل جاتے ہیں، اور گرد و غبار کے ساتھ اڑ کر دوسرے تندرست اشخاص تک پہنچ جاتے ہیں۔
اس مرض میں سرد اشیا کا استعمال اور سرد ملکوں میں رہنا نہایت مفید ہے۔

باب چہارم

اعصاب اور مفاصل کی بیماریاں

گنٹھیا

RHEUMATISM

(رہیو مائیٹزم)

وجوہات و تشخیص اس مرض میں جوڑوں کے اندر باہر باطات کے اندر سخت درد ہوتا ہے جوڑوں کے اندر سختی اور ارد گرد دم ہو جاتا ہے حرکت کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے اکثر سردی میں درد زیادہ ہوتا ہے یہ سرد اور مرطوب موسم میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔

علاج : اس مرض میں قبض رفع کریں ، غذا لطیف اور مقوی دیں ، اور مقام ماؤف پر ٹکڑے وغیرہ کریں نیز سنگھیا اور کچھ کے مرکبات خصوصیت سے مفید ہیں۔

حب براع الساعۃ : ر سورنجاں ۲ تولہ ، سنائی ۲ تولہ ، مصطکی رومی ۲ تولہ ، مصبر زرد ۲ تولہ ، پوست ہلبہ ۲ تولہ ،

سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر روغن بادام میں چرب کریں ، اور عرق سولف کی مدد سے گولیاں بخوری بنادیں۔

مقدار خوراک ۲ گولیاں روزانہ ہمراہ عرق سولف رات کو سوتے وقت
 دیں، نفرس، وجع المفاصل اور گنٹھیا کے لئے اکسیر ہے،
 اکسیر درد مفاصل: درخما ۳ عدد، سہاگہ سیاہ ۲ تولہ، سنہری گول
 ۲ تولہ، عاقرقرا ۱ تولہ، سورنجاں شیریں ۱ تولہ، اسگند ناگوری ۱ تولہ، سلاجیت
 ۴ ماشہ، پرانا گڑ ۲ تولہ، تل سفید ۱ تولہ، ختم گوڑا ۲ تولہ، بنیر و نڈا ختموہر
 ۵ تولہ، شند حسب ضرورت (جس میں گولیاں بن سکیں)
 گولیاں بقدر کنار جنگلی بنادیں

مقدار خوراک ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ دودھ نیم گرم، وجع مفاصل
 رنگین درد، نفرس وغیرہ سرریجی و بلغمی امراض کے لئے تیرہدف ہے،
 دھوٹ، ختم ایک تو نیچے گنڈھا ہوتا ہے، دوسرے جو اس کے اوپر
 ڈنٹھل ہوتا ہے، اس کے درمیان چند دانے ختم کے ہوتے ہیں، وہ دانے
 شامل نسخہ کو ہیں۔

اکسیر مفاصل: درخما ۳ عدد، سورنجاں شیریں، سوٹھ
 ہموزن کے کہار ایک سنوف تیار کریں، تمام ادویات کے ہموزن چینی سفید
 ملا لیں۔

مقدار خوراک ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ دودھ نیم گرم، گنٹھیا
 درد، جسمانی دردوں، جریبان، احتلام، کی باہ کے لئے مفید ہے،
 اکسیر میٹیل: درخما ایک پاؤ، برگ دستورہ نصف پاؤ، امرت
 ایک پاؤ، اسگند ناگوری یا جڑ آکسن ایک پاؤ، مولی گنڈیا ری ہونی یا
 حریل ایک پاؤ۔

ان سب کو صاف کر کے پانچ سپریانی میں ڈال کر ابال لیں، جب
 پانی آدھا رہ جائے، ادویہ نکال کر باقی ماندہ پانی کو صاف کر کے تیل کھجور

تین پاؤ میں ملا کر آگ پر رکھیں جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے
توصات کر کے محفوظ رکھیں۔ مقام ماؤف پر مالش کریں۔ یہ تیل ہر قسم کے
دردوں کے لئے مفید ہے۔

دجج المفاصل۔ اوسرنگ۔ لفظہ۔ نفرس۔ محرقة بخار کی وجہ سے
کسی حصہ جسم کا کمزور و بے حس ہو جانا وغیرہ کے لئے نہایت اعلیٰ اتیل ہے
حب بیستی :- مٹھا تیلیہ مدبرہ۔ مرچ سیاہ۔ خرما سوختہ۔ مقصیر
نخم اسپند۔ سوربجاں تلخ ہر ایک تولہ تولہ۔ باریک پیس کر آب اورک کی
مدد سے گولیاں بقدر خود تیار کریں۔

خوراک گولی ہمراہ مناسب اشربہ دن میں دو بار گنٹھیا نفرس۔
جوڑوں کا درد، غرضیکہ سرریجی، بلغمی بیماریوں کا مکمل علاج ہے۔
نسخہ عجیب :- سوڈا بایکارب ۲ ڈرام، ٹینکچر اوپیم ۱ ڈرام، گلیسرین
دو ادنس، پانی گرم کھولتا ہوا ۹ ادنس

لوشن بنا کر کپڑا بھگو کر ٹکڑ کر لیں۔ جوڑوں کے درد کے لئے بہترین
بیرونی علاج ہے۔

گنٹھے کی گولیاں :- جلد تری، لونگ، جائفل، فلفل دراز۔
مرچ سیاہ، سونٹھ، عطر قرحا ہر ایک پانچ پانچ تولہ، زعفران خالص ۲ تولہ،
کچلہ مدبرہ ۳ تولہ، مٹھا تیلیہ مدبرہ ۴ تولہ، کشتہ شکر ف ۴ تولہ، افیم ۴ تولہ،
تمام ادویہ کو نمہ کے پانی سے متواتر دو روز کھول کر کے ۲-۲ رتی
کی گولیاں بنائیں۔

خوراک گولی تا ۲ گولی ہمراہ دودھ نیم گرم بوقت صبح و شام۔
گنٹھیا کی مرض کا اکسیری علاج ہے، ایک خوراک ہی اپنا اثر دکھاتی ہے چند
دن کے استعمال سے گئے گئے مریض بھی تندرست ہو جاتے ہیں۔

حب گنٹھیا: شکر رومی اتولہ، سونٹھ اتولہ، فلفل گرد ۲ اتولہ،
 فلفل دراز ۲ اتولہ، گندھک آملا سار ۹ ماشہ، لونگ ۷ ماشہ، کرمنش ۷ ماشہ،
 سہاگہ سفید ۷ ماشہ، سورنجاں شیریں ۱۰ ماشہ، عطر قرحا اتولہ، مٹھا تیلیہ مدبر
 اتولہ، تخم دھتورہ ۹ ماشہ، سب کو ادراک کے پانی میں کھل کر کے گولیاں
 بقدر بخود تیار کریں۔

خوراک ایک ایک گولی صبح، دوپہر، شام ۵ اتولہ گھی چائے میں ملا کر دیں
 وجع المفاصل، گنٹھیا، درد کمر، درد پشت اور یہاں جی دردوں کے لئے اکسیر
 ہے، پرانی تکالیف میں بے حد مفید و مجرب ہے۔

اکسیر اوجاج: مٹھا تیلیہ مدبر ۶ ماشہ، شکر رومی مدبر ۶ ماشہ
 مرج سیاہ ۶ ماشہ، اٹیون ۳ ماشہ، پارہ مصطفیٰ ۴ ماشہ، گندھک ۴ ماشہ
 پہلے پارہ اور گندھک کو کھل کر کے کھلی تیار کریں، پھر باقی ادویہ کو الگ
 الگ پس کر اس میں ملا لیں، اور آب ادراک سے کھل کر کے بقدر دانہ مرج سیاہ
 گولیاں تیار کریں۔

مقدار خوراک: کوئی دن میں تین بار پانی کے ساتھ دیں، تمام جوڑوں کے درد
 درد کمر، گنٹھے کا درد، درد رتخ، نفرس وغیرہ پر آب حیات کا اثر رکھتی ہے۔
 علامہ ازب دمہ اور کھانسی کے لئے بھی اکسیر ہے۔

حب ہمیشہ: سیاب مصطفیٰ، کبریت مصطفیٰ، ابرا کشتہ ہر ایک ایک دانگ
 فلفل تین دانگ، حلزون کشتہ چار دانگ، آسن کشتہ پانچ دانگ، خاکستر
 پاچک صحرائی آٹھ دانگ، مٹھا تیلیہ مدبر سولہ دانگ۔

سیاب ادراک پیت کو کھلی بنا کر باقی ادویہ کے ساتھ آب ادراک، آب بسکھیرہ
 آب اڑوسہ ہر ایک میں تین بار کھل کر کے خشک کر لیں، اور گولیاں بقدر
 دانہ کھنڈر بنا لیں۔

فوائد۔ ان گولیوں کو زتاب کہتے ہیں تمام امراض بارودہ عصبیہ مثل فالج لغوہ، وجع مفاصل اور پرست زناں کے لئے رساکن ہیں، ایک گولی تا دو گولی آب اورک کے ساتھ کہ اس کا مصلح ہے رکھائیں۔

اکسیر مفاصل۔ اسگند ناگوری، زرخ بدھارا، سورنجاں شیریں، سونمٹہ ہر ایک ہونڈن، سفوف تیار کریں تمام ادویات کے ہم وزن چینی سفید ملا لیں، مقدار خوراک ایک تولہ صبح ایک تولہ شام دودھ کے ساتھ کھلائیں، جریان، احتلام، کمی باہ، جسمانی دردوں خاص کر درد کمر، گنٹھیا، عنبرہ کے لئے اکسیر بے نظیر ہے۔

اکسیر عجیب۔ آدھ پاؤ کچلہ کو ایک سفینہ پانی میں رکھیں، پانی ہر روز بدل دیا کریں، بعدہ نکال کر ایک سیر دودھ میں جو کشش دیں، جب دودھ خشک ہو جائے تو کچلہ کو دھو کر مقلشر کر لیں، اور پینچی سے کتر کر دغمن زرد میں بریاں کریں، جب سرخ ہو جائے نکال کر ہم وزن ناریل کے باریک کر کے رکھ لیں، خوراک نصف رات کھائیں، وجع المفاصل مزمن کے لئے مجرب ہے

علاج الادجاء جدید

بیرن ایک سی سی، سیبا لجن ۲ سی سی، یہ ایک دنہ کے استعمال کے لئے ہے دونوں کو ملا کر عضلاتی جگہ کریں، سفینہ میں دوبارہ اور خوردنی طور پر دھامنی یعنی بیرن ۲۵ ملی گرام کی ۶ گولیاں روزانہ کھلائیں

فوائد۔ عضلاتی اور ریاحی دردوں کے لئے اکسیر ہے، نیز اعصابی کمزوری کو رفع کر کے اعصاب کو سکون بخشی ہے اور تقویت دیتی ہے، معمول دجرب ہے، **نکسیر گنٹھیا**۔ سوڈا بالی کارب، ۱۰ گرین، سوڈا سیلی سلاس، ۱۰ گرین، پانی ایک ہونڈن، ہر دو گھنٹہ بعد ایسی ایک خوراک دن میں ۶ دفعہ دیں،

یہ کمسچو بخار کی زیادتی اور جوڑوں کے درد کی شدت کو فوری طور پر دور کرتا ہے

کم از کم ایک مہینہ استغمال کرنی چاہئے۔ جوڑوں اور عضلات کے دردوں، درم اور بخار میں بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔
 ٹوشن برائے گورہ، ٹنگر اوپیم ۴ ڈرام، گلیسرین ۲ اونس، سوڈا بائیکارب
 ایک اونس، پانی ۲ اونس۔
 مقامی طور پر اس ٹوشن کو استغمال کریں، یعنی مقام درد پر ٹوشن کو لگائیں،
 فوری طور پر درد کو سکون دیتا ہے۔

اکسیر گنٹھیا، ایٹوفون ATOPHON ساختہ شیرنگ (جرمنی)
 مقدار خوراک ۲ گولی، سوڈا بائیکارب، اگرین پانی کے ساتھ دس دن میں ۳ خوراک
 چار دن تک ایسی خوراک دے کر دودن دوائی کا استغمال بند کر کے پھر شروع
 کر دیں، درد اور جوڑوں کی سوجن کو دور کرنے میں شفا کی اثرات کی حامل ہے
 بلکہ اکسیر ہے، ایک مہینہ میں جڑے ہوئے مریض بھی اٹھ کر چلنے لگتے ہیں،
 تریاق گنٹھیا، سوڈیم سیلی سیلیٹ، اگرین، درد صحت آئیوڈائیڈ ۲ اگرین
 ۲ سی سی ایکسپیرینٹ۔

مقدار استغمال ایک ایکسپیرینٹ کا دریدی ٹیکہ کریں، مہینہ میں دوبارہ اور
 خوردنی طور پر سوڈا سیلی سلس ۲۰ اگرین، مریض کے گھٹنے بعد دس یہاں تک
 کہ ۶ خوراک پوری ہو جائیں، جب علامات میں کمی ہو جائے، تو سوڈا سیلی
 سلس کا استغمال کم کر دیں۔

فوائدہ: گنٹھیا، ونجع المفاصل، جوڑوں کا درد، درم اور سوجن،
 ریاحی اور عضلاتی دردوں کے لئے مفید ہے۔
 علاوہ ازیں گنٹھیا بخار کے لئے اکسیر الائر ہے، گنٹھیا کی بخاروں
 کو دور کرتا ہے، معمولی مطلب ہے۔

وجع المفاصل کا ہومیوپیتھی علاج

اگر خشک اور سرد ہوا کے یک لحظہ لگ جانے سے تکلیف ہو جائے، تو اکونائٹ ۲ دیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہو، اور پاؤں کے ٹوے بہت درد کر رہے ہوں اور ذکی الحس ہوں، یعنی ذرا سا چھوئے سے بھی تکلیف ہو، تو آئی موئم کر دو ۶ بہتر ہوگا، درد کے ناقابل برداشت ہونے کی صورت میں کمپو میڈا ۳ کا خیال رکھیں، خصوصیت سے رات کو زیادہ تکلیف کی وجہ سے مریض لیٹر پر سو نہیں سکتا، چل پھر کر گزر رہا کرتا ہے۔ اگر سارے جسم میں جلی کی رو کی طرح درد میں ہوں اور بیمار کو بہت بے چین کر دیں تو سی سی فیوگما ۳ یا ۳ بہتر ہوگا، اگر درد میں کبھی کسی حصہ جسم میں اور کبھی کسی جگہ اور گہری سے زیادہ تکلیف ہو، تو کالی سلف ۶ بہتر ہوگا، ٹھنڈک یا مرطوب موسم میں اگر دردی شدت کی صورت اختیار کر لیں، تو ڈکمار ۳ بہتر ہوگا، پاؤں میں دردوں کے شروع ہونے کی صورت میں ایسڈم ۳ بہتر ہے، اگر ٹھنڈے اور چھپے پسینے رات کے وقت زیادہ آئیں، درد کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو، اور پسینہ بھی بدبودار ہو، منہ سے پانی یا بار بار آئے، ایسی صورت میں مرکوری ایس ۳۰ دیں، اگر مریض درد کے مارے کر دہیں لے، اور اسی طرح پہلو بدلنے سے اسے کسی قدر آفانہ ہو، اور شروع میں سرد ہوا کے لگنے سے یہ تکلیف ہو، اور جوڑوں پر درم ہو، تو بربائیوینا ۳ دیں، کلائی میں درد ہونے کی صورت میں سہائنا ۳ یا ۳۰ دیں، اور کندھوں میں درد ہونے کی صورت میں فیرم میٹلیکم ۶ دیں، خوراک عموماً سرد و گھٹنے کے بعد جب تک صحت نہ ہو، دینے میں۔

امراض گھٹنے کی صورت میں ہر آٹھویں روز صرف سلفز ۳ کی ایک خوراک ضرور دیں، اس سے مریض جلد صحت یاب ہوگا۔

کالچیکم ۳ تا ۳۰ اور جوڑوں کے درد اور گھٹنیا کے بخار کے لئے مخصوص دوا ہے۔ اس دوائی کے استعمال سے جوڑوں کی سوجن، درد، بخار فوراً کم ہونے

گتے ہیں۔ اس دوائی کی علامات اکثر رات کو زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ درد بخار اکثر رات کو ہوتا ہے جوڑوں کے دردوں کی سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

پلسٹلا ۳ تا ۳۰۔ جبکہ گھٹنے، ٹخنے، پاؤں اور ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں درد اور بخار بھی ہو۔ تو ایسی علامات کے لئے اسیر کا حکم رکھتی ہے۔

سوزاک کی وجہ سے جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اس کے لئے بھی مفید ہے ہر روز دو خوراک دیں۔

براہیوینا ۶ تا ۱۲۔ منہ، زبان خشک، سخت پیاس، پرانی قبض، پانی کی زیادہ خواہش، حرکت کرنے سے مریض کو سخت تکلیف ہو۔ تو ایسی علامات کے لئے اسیر ہے۔

رٹاکس ۴ تا ۲۰۰۔ مقام ماذف سرخ، درم شدہ، اس میں جلن اور کھنچاؤ کے ساتھ درد ہو۔ حرکت کرنے سے آرام معلوم ہو۔ اور آرام کرنے سے تکلیف ہو وغیرہ علامات کے لئے از حد مجرب ہے۔

گاؤٹ

GOUT

نقرس

وجوہات و تشخیص: اس مرض میں چھوٹے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے اور مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ماذف جوڑ درد ناک اور مستدم ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں میں پورٹ آف سوڈا قلموں کی شکل میں جمع ہو کر اس مرض کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی گتھے کی قسم ہے۔ اپنی اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج: رفتی طور پر رفیع درد کے لئے نوکلین، سولنجین، دیجاہین دیں۔ یہ کچھوں کی شکل میں ملتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ مکعبہ دن میں تین بار دیں۔

مسکوفین ۱۲ گزین ٹکیہ بمقدار خوراک ایک ٹکیہ دن میں ایسی ایک ایک خوراک
دن میں تین مرتبہ دیں، تین چار دن کھلانے کے بعد ایک ہفتہ کا ناغہ کریں، اور اسی طرح
دو تین مرتبہ کورس کریں،

نقرس، وجع المفاصل کے لئے بے حد مفید و مجرب دوا ہے، یہ دوا
ایٹونان کے نام سے بھی ملتی ہے۔

رفع درد کے لئے اسپرین ۲ گزین یا ڈورس پوڈر ۱۰ گزین کھلائیں، ماؤف جوڑ
پر ٹکیہ کریں۔

یعنی منٹ کوٹناٹ، یعنی منٹ بیلٹوٹنا، یعنی منٹ کلورڈ نام مسادی الودن
ملا دیں، دو گنا دسی تیل ملا کر مقام ماؤف پر مالش کریں، رفع درد کے لئے مفید ہے
ٹیکچر بکس دامیکا ۱۰ منم، سوڈا بائیکارب ۲۰ گزین، ایسی ایک ایک خوراک
ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

مگ سلف ۲ ڈرام، سوڈا سلفاس ۲ ڈرام، آب نیم گرم میں حل کر کچے صبح
نہل استعمال کریں، عرق النساء رنگڑی کے درد کا بہترین علاج ہے۔
اکسیر الاوجاع، رحم الفار ۵ تولہ، نمک خوردنی ۵ تولہ، شیر مارہ ۵ تولہ میں
اچھی طرح کھل کریں، اس کے بعد عرق لیموں ۵ تولہ میں کھل کر کے گل حکمت
کر کے ۲۵ سپراپوں کی آگ دیں، کشتہ ہوگا۔

یہ کشتہ سم الفار ۵ تولہ، اجوائن خراسانی، اجوائن دیسی، عطر قرعہ، بیخ
کنڈیاری ہر ایک پانچ پانچ تولہ کو عرق لیموں میں کھل کر کے گولی بقدر مائش بنا دیں،
مقدار استعمال ایک گولی ہمراہ درودھ یا بالائی بعد از غذا، صبح و
شام، درد مکر، عرق النساء، وجع المفاصل، بعضی درد، ضعف، منقہ، کمزوری معدہ
کے لئے مفید و مجرب ہے۔

گاؤٹ ٹیکچر، ٹیکچر کالجی سائٹم، ۱۰ منم، پوٹاشیم سائٹراس ۲۰ گزین۔

گنیش یا سلفاس پ ڈرام ، اچھا ایک اونٹ
ایسی ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیتے ہیں ، شد بد گادٹ نفترس
میں مفید و مجرب ہے ،

سغوف سورنجاں ، سورنجاں شیریں ۲ تولہ ، گل سرخ ۱ تولہ ، سنا کی ۱ تولہ
پوست حبید زرد ۱ تولہ ، تڑبد مجوف ۱ تولہ ، معز بادام ۱ تولہ ، مصطکی روحی ۱ ماشہ ،
زعفران ۵ تولہ ، قند سفید ۳ تولہ ،

سب ادویہ کو کوٹ چھان کر سفوف بنا دیں ، مقدار خوراک ۱ ماشہ تا ۱ تولہ
بمراہ آب دیں ، نفترس ، وجع امفاصل کے لئے مفید و مجرب ہے ،
اکسیر نفترس ، نارمل سیلان ، اسی سی ، پلانولین اسی سی ملا کر سرس کے مقام
پر عصب متاثر جس میں درد ہوتا ہو ، معلوم کر کے گہرا انجکشن کر دیں ، اکثر ایک
انجکشن سے ہی آرام ہو جاتا ہے ،

عصب معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مقام کو دبائے سے درد
کی انگلیوں تک جاتا ہے ،

نوٹ ، یہ انجکشن لگانا ایک ماہر اور ہوشیار ڈاکٹر کا کام ہے ،
وٹامن بی جس کا تجارتی نام پیرن ہے ، اس مطلب کے لئے مفید ہے
سکن اگر سیبا جین کے ساتھ مل کر انجکشن لگایا جائے ، ٹوہنت نامزد ہوتا ہے
شدت درد میں مارٹین چم گرین کا عضلاتی انجکشن کرنے سے دقتی
طور پر درد کو افاقہ ہو جاتا ہے ،

ایوٹان بھی نفترس کے لئے بے حد مفید ہے ،

ہدایات ،

اس مرض میں مقام درد پر ٹکڑ کرنا ، مالش کرنا اور گرمی پہنچانا
بہت مفید ہے ،

جڑوں کا پتھر اجانا

ARTHRITIS

(ارتھرائٹس)

تعریف :- اس مرض میں جوڑوں کی جھلیاں اور کڑیاں متاثر ہو جاتی ہیں، ان کی بجائے بڑیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، وجوہات :- گردن توڑ بخار، نمونیا، سوزاک، نفرس، وجع المفاصل، سن یاس اور خرابی رحم سے یہ مرض پیدا ہو جاتی ہے۔

تشخیص :- اس مرض میں معمولی بخار ہوتا ہے، لیکن پسینہ نہیں آتا جب جاتے ہیں، اس کی ابتدا انگلیوں سے ہوتی ہے، ایک جوڑ کو سوجن ہو کر درد ہوتا ہے، اس کو آرام آنے پر دوسرا جوڑ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح تمام جوڑ باری باری درد میں مبتلا ہو کر ناقص ہو جاتے ہیں۔

علاج :- مریض کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، درد کو رفع کرنے والی ادویات استعمال کریں، سونا کے مرکبات کھلائیں، شہد کی مکھی کا زہر بھی اس مرض کے علاج کے لئے مفید ہے، گنٹھیا کے علاج کی ادویہ فیرو لائی سین وغیرہ مفید ہیں، **ارگاکاسرین** یہ ایک جدید دوا ہے، خوردنی طور پر اور بذریعہ انجکشن بھی استعمال ہوتی ہے۔

یہ دوا دفع درد، مسکن الم ہے، عرق النساء، گنٹھیا، وجع المفاصل، تھج المفاصل کے لئے اکسیر ہے، مقدار استعمال ایک ٹمپہ دن میں تین مرتبہ دیں، اگر تکلیف زیادہ ہو، تو ہر تیسرے دن ایک میسپیول کا گہرا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

SIATICA

(سیاٹیکا)

عرق النساء

تعریف : عرق النساء کو لنگڑی کا درد اور ٹنگن کا درد بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جو جسم کے سب سے بڑے پھٹے میں ہوتا ہے، پیڑوں کے سب سے بڑے پھٹے سے شروع ہو کر ٹانگ میں پھر جاتا ہے۔ یہ درد زیادہ تر ایک ٹانگ میں ہوتا ہے، جب مرض غلبہ کرتا ہے، تو ٹانگ سے ہو کر انگلیوں تک پہنچ جاتا ہے، یہ مرض عموماً ادھیڑ عمر کے جوانوں کو ہوتا ہے عموماً بچوں کو نہیں ہوتا، عورتوں کی بہ نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔

وجوہات : شدید قبض، گیلی جگہ پر بیٹھنا، چوٹ لگنا، نفرس، آتشک، وجع مفاصل اور بعض اوقات مرادہ کی پھری اور زیادہ مٹیس میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

تشخیص : مریض درد کے مارے بے چین ہوتا ہے، درد کی ٹیسس اٹھتی ہیں یہ درد پہلے خفیف ہو کر بتدریج زیادہ ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی آری سے

بڑی کو کاٹ رہا ہے، اگر یہ مرض زیادہ عرصہ سے، تو ٹانگ کمزور ہو جاتی ہے، وجع المفاصل اور عرق النساء میں فرق یہ ہے کہ عرق النساء کا درد ٹانگ میں ہوتا ہے، اور وجع المفاصل جوڑوں میں، اگر جوڑوں کو ہلانے سے درد نہ ہو، تو عرق النساء جاننا چاہئے، مریض کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں، اور ایک ٹانگ کو سامنے کی طرف مہیدھی کریں، اگر سیدھی ہو جائے، تو عرق النساء تسلیم نہیں کرنا چاہئے، اگر نہ ہو، تو وجع المفاصل ہی سمجھنا چاہئے۔

علاج : مسکنات کا استعمال کریں، وٹامن بی جس کا تجارتی نام بیرین ہے، اس مرض کے لئے مفید ہے، ۱۰۰ ملی گرام روزانہ عضلاتی انجکشن کریں۔

اگر سیالچین ۲ سی ملا کر انجکشن کیا جائے، تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے
شدت درد میں مارٹین ۱/۲ گرن کا عضلاتی یا جلدی انجکشن کرنے سے وقتی
طور پر درد کو افاقہ ہو جاتا ہے۔

اکسیر عرق النساء و ہارل سیدکن ۱۰ سی سی، پلازمین یا پریکسین پھیول
ایک سی سی ملا کر سرین کے مقام پر عصب مقام جس میں درد ہوتا ہو، انجکشن کریں
عصب معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو آٹا لٹا کر سرین کے مقام
کو دھکیں، اور درد والے پٹھے میں دبائے سے درد ہوگا، درد کی پٹھیں پاؤں
کی انگلیوں تک جاتی ہیں، اس پٹھے میں انجکشن لگایا جاتا ہے۔

اگر صحیح طور پر انجکشن لگ جائے، تو اکثر ایک انجکشن سے ہی آرام
ہو جاتا ہے۔ یہ انجکشن لگانا ایک ناسر اور ہوشیار ڈاکٹر کا کام ہے۔
اس مرض میں مقام درد پر ٹیچور کرنا، مالش کرنا اور مقام ماساژ پر گرمی
پہنچانا مفید ثابت ہوتا ہے۔

رفع درد کے لئے ڈیپرول ہائیڈروکلورائیڈ، میٹھے ڈون ہائیڈرو
کلورائیڈ، سوئلیچین، سارپیڈان، کوڈوین، نوڈلین، دیسائین کوئی سی
ایک دوٹی، ایک ایک ٹکیہ ہر چار گھنٹے بعد کھلائیں۔

یاد رہے اس مرض میں مریض کو بستری پر لٹے رکھنا چاہئے، اور
جب شدت مرض کا دورہ ختم ہو جائے، تو پھر مالش کرنا چاہئے، نیز چلتے
اور پیچھے وقت جسم کی وضع کو درست رکھنے کی ہدایت کرنی چاہئے۔
ورنہ پٹھوں کے تناؤ کی وجہ سے انسانی ساخت میں فرق آ جاتا ہے، اور
انسان چلتے وقت ٹیڑھا چلتا ہے، اور جسم بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات سرین کے سرطان کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے۔

اور بالکل عرق النساء کی مانند درد محسوس کرتا ہے۔

ہمائے بڑے بھائی حکیم حاجی مولوی علی محمد صاحب کو یہ مرض سفر ج کے دوران میں ہو گیا تھا۔ سفر ج کے دوران اور کمرہ مدینہ شریف اور یہاں آ کر ہر طرح کے علاج کرنے باوجود معمولی فائدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور تمام علاج معالجہ اعصابی درودوں کے ماتحت کیا جاتا رہا۔ جب خون لٹٹ کر آیا گیا، تو خون کے اندر پیپ پائی گئی، اور اکسیرے لینے پر سرطان کا مقام عاف ظاہر ہو گیا۔ پھر مکمل پور ہوئی ہسپتال میں میری موجودگی میں ڈاکٹر چوہدری عبدالعزیز صاحب سول سرجن لائل پور نے آپریشن کیا۔ چیرا رہے پر گوشت کی اندونی ساخت بالکل سیاہ ہو کر مردار ہو چکی تھی، رٹ

گینٹیا سلفاس زخم میں بھر کر، کیری فلیوین پیپیٹی جاتی رہی، اور خبنا خوب گوشت علیحدہ ہو جاتا، وہ نکال دیا جاتا، اور پروکین پیپی سی لین اور انسٹ گیس گسٹرین کے انجکشن لگنے سے، ماہ ڈیڑھ ماہ کے علاج سے بالکل تندرست ہو گئے، اور ایک مہینہ اکبرہ مائی سین کے ریڈیو انجکشن لگنے سے۔ باور ہے کہ تمام بڑے بڑے ڈاکٹر جتنے کہ خود ڈاکٹر چوہدری عبدالعزیز صاحب، ڈاکٹر سید امتیاز حسین صاحب بخاری ایم بی بی ایس، بی، ایچ ایس ڈاکٹر محمد اواحد صاحب، ڈاکٹر سول سرجن سب اعصابی درر تشخیص کرنے گئے اور یہی علاج ہوتا رہا، آخر جب کوئی اناڈ کی صورت نظر نہ آئی، تو خون لٹٹ کر لے اور اکسیرے لینے پر صحیح تشخیص ہوئی۔

اس لئے بعض اوقات ایسے مریض بھی زیر علاج آتے ہیں جو اعصابی علاج سے تندرست نہیں ہوتے، ایسی صورت میں خون لٹٹ کرانا اور اکسیرے لینا ضروری ہے

درودوں کے تشخیصی نشانات دیکھنے کے لئے جسم انسانی کے پچھلے حصے میں درودوں کے مقامات کی تصویر ملاحظہ فرمادیں۔

باب پانزدہم

جلد کی بیماریاں

السرسز

ULEE SIRS

زخم

وجوہات و تشخیص : یہ تیز دھار آ لے یا دم وغیرہ سے بھی ہو جاتے ہیں اس میں تفرق الفصال ہو کر زخم ہو جاتا ہے اور اس سے خون بہتا ہے اور مقام زخم پتہ درو بھی ہوتا ہے۔

ہر قسم کے زخموں کا اصول علاج

- ۱۔ تازہ زخموں کے اصول علاج میں صفائی رکھنا اور انٹی سپٹک ادویہ کا استعمال بنابیت ضروری ہے اور زخم سے نرم رکھنا تاکہ زخم جلد از جلد مندمل ہو جائے۔
- ۲۔ زخم کو پٹی لگانے سے پہلے ہر روز کانیٹوشن یا کاربالک لوشن وغیرہ سے دھو کر پٹی لگانی چاہئے۔
- ۳۔ اگر زخم کا انچور بڑھنے سے ٹھہر جائے اور اس کے کنارے سخت ہو سکے ہوں تو اس کو کاربالک ایسڈ یا کاسٹک سے چلدا اور کناروں کو چلدا دے تاکہ زخم بنا ہو کر ملنا شروع ہو جائے۔
- ۴۔ اگر دم انکی جگہ درد ہو اور دم ابھی ظاہر نہ ہوا ہو تو اس کو محلی ادم ادویہ کے

استعمال سے تھیل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر تھیل نہ ہوں تو اس کو بلس وغیرہ باندھ کر پکائیں۔

۵۔ جب دم اچھی طرح پک جائے تو پھر نشتر سے ننگا ف دینا سی اچھا ہے بہ نسبت دم کے اپنے آپ پھوٹنے سے پھوڑے کے زخم کو مواد سے اچھی طرح صاف کرنا چاہئے۔

۶۔ پھوڑے یا زخم کو صاف کرنے کے بعد انٹی سپٹک دافع لعفن ادویہ کا استعمال کرنا چاہئے۔

۷۔ بعض دم ایسے ہوتے ہیں جو بہت پرانے ہوتے ہیں انہیں نا عمور کہتے ہیں۔ دوائی ان کے اوپر لگانے کی نسبت ان کے سوراخ کے اندر ہی کے ذریعے یا بذریعہ ڈراپر پہنچانی چاہئے تاکہ دوائی کا اثر ان کے اندر پہنچ جائے۔

۸۔ زخموں اور پھوڑوں کے علاج میں بیرونی طور پر مرہموں کا استعمال اور اندر دینی طور پر مصفی خون ادویہ کا استعمال کامیاب علاج ہے۔

علاج دار سپرٹ ایگری فلیوین ۴ گرین، سپرٹ ۴ ڈرام، ایکوا ۴ ڈرام باہم ملائیں جنرل انٹی سپٹک ہے ہر قسم کے زخموں کے لئے مستعمل ہے۔
نسخہ: ملا کار باک آیل، اسڈ کار باک ۱ ڈرام، روغن کھنڈ ایک اونس، باہم ملائیں رگندے زخموں کو صاف اور اندمال کرنے کے لئے بہت مفید ہے غارش، درد، کان بہنا، پیپ بہنا، داد، دھدر وغیرہ کے لئے اور زخموں کے لئے بہترین دوا ہے۔

مرکزی لوشن: ہائیڈرو جرائی پر کلورلے گرین، پانی ملا جو ایک اونس کے حساب سے حسب ضرورت بناویں، ہر قسم کے زخموں پر اسے پیپ دار اس سے دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں۔

اکتھیول گلیسرین، ایگریٹیکٹ بیلا ڈونا ۲ ڈرام، کمیفر ۳ گرین

اکتھیول ۲ ڈرام، گلیسرین ۴ ڈرام، شیشی میں جلد چیزیں حل کر کے رکھیں، مقام
 ماؤف پر لپیپ کر دیں، گلیٹرز و گلیٹوں کا سوچ جانا، خصبوں کا ورم، زہر باد
 بوجہ تشنگ، ورم رحم، ورم جگر وغیرہ جتنے کہ ہر قسم کے اور ام کیلئے مفید ہے
 ہر، ہم ناصور، ہر رسپیور اولہ، کا فور، تشنگت ہر ایک ۲-۲ تولہ،
 سفیدہ کا شغری ۳ تولہ، کھنڈ ۳ تولہ، مردہ سنگ ۲ تولہ، سندھور ۳ تولہ
 بورک ایسٹ ۳ تولہ، آبیو ڈو فارم اولہ، پوست یخ مدار اولہ، کشتہ پڑتال گوندی
 ۱۵ تولہ، حمہ ادویہ کو بار یک پس کر دو چند ویزلین ملا لیں، پس تیار ہے،
 زخم پر لگا دیں، ہر قسم کے زخم، ناصور، گھبیر، بھگند ہر قسم کے عسر البر
 قروح خبیثہ، پرانے زخم جو بہت عرصہ کے ہوں، اس سے تندرست ہو جاتے
 میں، نہایت مفید و مجرب مرہم ہے، اور اندردنی طور پر اکسیر بھگندہ رفدہم رقی
 ہمزہ لکھن استعمال کریں، اکسیر بھگندہ کا نسخہ امراض مفید میں مذکور ہے،
 انٹی سپٹک مرہم، ہر بورک ایسٹ ۱ ڈرام، سلفا ٹنائیڈ پوڈر ۱ ڈرام، ویزلین
 ایک انس، سلیٹ پر رگڑ کر مرہم بنا دیں، جلدی امراض میں ہر قسم کے نئے و پرانے
 زخموں کے لئے مفید و مجرب ہے، معمول اطباء ہے،
 پیچر آئیو ڈوین، آئیو ڈوین ۲، ماشہ، پوٹاسیم آئیو ڈوین ۸، ماشہ، سپرٹ پیچلیڈ
 ایلوڈ، پہلی دونوں دواؤں کو قدرے پانی میں حل کر کے سپرٹ ملا لیں، ضرورت کے
 وقت مقام ماؤف پر پھریری سے لگائیں، خربہ، سقطہ، جوت لگنا، رگڑ آنا، سوزش
 وغیرہ زخموں کے لئے خارجی طور پر مستعمل ہے،
 سٹاؤلون (آئی سی آئی)، یہ پوڈر ہے جو پانی اور الکحل میں حل ہو جاتا
 ہے، تازہ زخموں اور جل بہانے میں بہت مفید ہے، یہ سولہ ستن ملنے یا رگڑنے
 کے بغیر جلد کو صاف کر دیتا ہے، اور جلدی امراض میں کھرنڈ اور پپرٹیاں اتارنے
 میں مستعمل ہے،

پھولے، کھینسی APSCCESS

وجوہات و تشخیص : ارشاد خون، کمزوری، ذیابیطس، خوابی غذا،
میوم برسات وغیرہ میں کسی حصہ جسم پر جلن ہو کر سرخ پھینسی نکل آتی ہے، کبھی
بال توڑ یا پھینسی میں دم اور درد کی شدت سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔
علاج : شروع دم میں محلول اور ام ادویہ کا استعمال کریں، اگر
تخلیل نہ ہو، تو پھر عمل جراحی یا دبا کر جو مواد ہو، خارج کرنے کی کوشش
کریں، اور اندرونی طور پر مصطفیٰ خون ادویہ استعمال میں لادیں۔
اکسیر مصطفیٰ : رب نیم ۲ تولہ، رب سناہ ۲ تولہ، رب چائمتہ ۲ تولہ
رب بندق ۲ تولہ، خوب بخودی بنائیں۔

مقدار خوراک : صاحب صبح، دوپہر و شام ہمراہ عرق شامیزہ سے آتش
۲ تولہ و شربت عناب ۱ تولہ، امراض شاد خون میں مفید ہے۔
نوٹ : مذکورہ بالا ربوب کا حسب ذیل طریق پر شربت بھی بنا سکتے
ہیں، ربوب کو عرق شامیزہ ۲۰ تولہ میں حل کر کے مصری تین پاؤں میں قوام بنائیں۔
مقدار خوراک : صبح و شام ۱ تولہ ہمراہ آب
نسیجہ : اگر دغن بابونہ میں بقدر مناسبت گل بابونہ جو کش دے کر صاف کر لیں،
تو یہ اور ام کو بہت جلد زایل کر دیتا ہے، تجرب ہے۔
خاکستر جلدون بغیر نمک ملی ہوئی پرانی چربی میں ملا کر لگانا اس مرض کی خاص
اور بے مثل دوا ہے۔

مرہم سیاہ : مرہم صومر ۴ تولہ، روغن کنجد ۱۰ تولہ، نیلا کھنکھنا ۱ ماشہ
ترکیب ساختہ، اریٹل کو گڑھی میں ڈال کر آگ پر خوب گرم کریں۔

جب خوب گرم ہو جائے۔ تو سندھو ڈال دیں۔ بار بار جو کش اٹھے گا۔ جو دوا
 باہر کو نکلنے لگے۔ فوراً کڑھچھی کو آگ سے اتار لیا کریں۔ جب جو کش سرد ہو جائے
 تو پھر آگ پر رکھ دیا کریں۔ جب تیل کا رنگ سیاہ ہو جائے۔ تو نیلا تھوٹھا سفوف
 کیا ہوا ملا دیں۔ کڑھچھی کو آگ سے اتار کر سرد جگہ پر رکھیں۔ اور لوہے کی سیخ
 سے کچھ دبیر ملائے رہیں۔ سرد ہونے پر سیاہ رنگ کی مرہم تیار ہوگی۔
 پھوڑے پھینسی پر لگا دیں۔ نہایت مفید مرہم ہے۔ ہر قسم کے پھوڑے
 پھینسی۔ بال توڑ۔ زخم وغیرہ کے لئے تجربہ شدہ مرہم ہے۔

محلول اعظم۔ ہر تخم مولی ۴ تولہ۔ گوگل ۱۲ تولہ۔ زرداند مدحرج ۴ تولہ
 ۱ شق ۶ تولہ۔ ریح اکبر۔ ۱ تولہ۔ رائی ۴ تولہ۔ سرکہ انگوری خالص حسب ضرورت
 سب کو علیحدہ علیحدہ سفوف بنا کر سرکہ میں کھل کر دیں کہ قوام جبڑی بن
 جائے۔ روغن زرد گاد و قدرے شامل کر کے کھل کریں۔ کہ روغنیت زایل
 ہو جائے۔ پس تیار ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ ماشہ خوردنی طور پر اور پلا ستر بیرونی طور پر لگا دیں۔
 ہر قسم کے دمل۔ پھوڑے پھینسی۔ سرطان۔ خنازیر۔ رسولی۔ بال توڑ۔ اندرونی و
 بیرونی۔ جگر۔ تلی اور رحم کا دہم۔ ذات الجنب۔ مزینا وغیرہ پر بیرونی طور پر ضماد کریں
 اس کے استعمال سے سرد کش۔ درد۔ سوجن وغیرہ رفع ہو جاتے ہیں۔
 انی نفع حبشین کا نعم البدل ہے۔

اکسیر مصفی۔ ۱۰ شذرہ قلمی ۸ تولہ۔ گندھک موصلی مصفی ۸ تولہ۔ گبرہ
 ۸ تولہ۔ پارہ ۶ ماشہ۔

پہلی تین اشیاء کو علیحدہ علیحدہ باریک پس پس عصارہ کڑا ہی کو گھی سے
 چھڑ کر گندھک ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب گندھک تیل کی طرح ہو جائے۔ تو پارہ
 اس کے اندر ڈال دیں۔ پھر قلمی شذرہ ڈال دیں۔ جب شذرہ حل ہو جائے۔

ڈگری بھی ڈال دیں، سرد ہونے پر کھل میں باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔
خوراک ۳ ماشہ تا ۶ ماشہ ہمراہ آب سرد، اول درجہ کی مصفیٰ خون دوا ہے
 پھوڑے، پھینسی، خارش کے لئے اندرونی طور پر مستعمل ہے۔
دیس ہر نیم کاتیل بھی بہترین مصفیٰ خون ہے، مقدار خوراک ۱ بوند تا

۲ بوند ہمراہ دودھ۔
سلفو کینا پینڈز پھوڑے، پھینسی، رنبل، بال توڑ کے نکلنے کو بے حد مفید
 و مجرب ہے، اس کے استعمال سے پھوڑے پھینسیاں نکلنا بند ہو جاتی ہیں،
 مقدار خوراک ۲ گولی ہر چار گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ دیں، تین دن تک۔
دیسی ملٹش ہر آٹا گندم ۳ تولہ، ہلدی ۱ تولہ، سہاگہ سیاہ ۱ ۶ ماشہ، تیل
 سرسوں ۱ تولہ، پانی اس قدر ڈالیں جس میں جملہ ادویہ حل ہو جائیں، آگ پر پکائیں
 جب حلہ کے کی مانند پک جائے، مقام ماذف پر باندھیں، اور پٹکوں کو رگڑیں، درم
 کو پکانے اور نرم کرنے کے لئے معمول و مجرب ہے۔

پینسلین پھوڑے، پھینسی کو روکنے کے لئے بحد مفید و مجرب ہے،
 ایک دو انجکشنوں سے ہی آرام آ جاتا ہے، ۵ لاکھ یونٹ کا عضلی شیکہ کریں،
 ہر دوسرے دن۔

اکسیری مرہم کچھ سفید ۵ تولہ، رال ۵ تولہ، بھٹکڑی ۱ تولہ،
 سیدھو تھا ۱ تولہ، میٹھا تیل ۵ تولہ، پانی ۵ تولہ۔

اول الذکر دواؤں کو نہایت باریک پیس کر مہدہ کی مانند ملائم کر لیں، تیل
 اور پانی کو ملا کر انگلی سے خوب ملائیں، کہ وہی کی مانند گاڑھا ہو جائے، پھر پسی، تولی
 ادویہ متا مل کے یک جان کر لیں، بس تیار ہے۔

ترکیب استعمال کپڑے کے بھاپ پر لگا کر پھوڑے پر چپکا دیں،
 یہ مرہم اپنی ہی پھوڑے کو پکانے اور پھوڑے کا کام دیتی ہے، ہر قسم کے پھوڑے

پھنسیوں اور ڈنٹوں کے لئے اکسیر ہے، ہر مطلب میں تیار رکھنی چاہئے۔
 مرہم اکسیر اور یہ مرہم ان پھنسیوں کے لئے جادو کا اثر رکھتی ہے، جو
 چھرت دار ہوں۔ یعنی جو چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہاتھوں پر یا بچوں کے سروں پر
 ہوتی ہیں، اور جن پھنسیوں سے پانی لگ لگ کر آگے بڑھتی جاتی ہیں، ان کے لئے
 یہ مرہم بے خطا ہے۔

نسخہ: رگڑور کالی زیری، رکیہ، مرد اسنگ ہر ایک ذلہ ذلہ، نیلہ کھوٹھا
 امانتہ، تمام ادویہ کو باریک پس کر کھوڑا کھوڑا سرسوں کا تیل شامل کر کے کھول
 کرتے جائیں، جب مرہم کی طرح ہو جائے، تو ڈبہ میں حفاظت سے رکھیں
 ضرورت کے وقت پھنسیوں پر لگائیں، بے نظیر نسخہ ہے، تجربہ کے بعد ہی
 اس کے صحیح اثرات کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔

پھوڑوں کا ہومیو پیتھی علاج

اگر پھوڑے میں درد کی وجہ سے ٹیس پائی جائے، اور جگہ بھی سرخ ہو، تو بلا ڈنٹا
 دیں پیپ بننے کے بعد ہیر سلفر ۶ اور ۳ مفید ہوگا، اگر دانٹوں کی جڑوں میں
 پھوڑا ہو، یا گردن کی گٹھیاں متورم ہوں، تو مرکبوری ایس ۳۰ بہتر ہے، اگر
 بہت دیر تک پیپ آتی ہے، تو سلشیا ۳ دیں، مرکبوری ایس کے بعد
 سلشیا سرگز نہ دیں، ورنہ ناندہ کی بجائے نقصان ہوگا، درمیان میں ایک دو خفاک
 سلفر ۳ کی دے کر سلشیا کی خوراکیں کھلائیں، اگر جسم کمزور اور خشک ہو،
 اور پھنسیوں کے منہ سیاہی پائل ہوں، تو سلفر ۳ دیں، بچوں کے بدن پر اگر
 پھنسیاں ہوں، تو کابو دینج ۳ بہتر ہوگا۔

اگر عورتوں کے جسم پر چین کی تکلیف یا بے قاعدگی کی وجہ سے پھیپار
 نکلیں، تو سینکو نیر یا ۳ ناندہ کرے گا۔

اکسیر پھوڑے پھنسی، جب یکے بعد دیگرے پھوڑے نکلتے رہیں، تو
یہ نسخہ بے حد مفید و مجرب ہے۔

کلیئر یا کارب ۱۰۰۰ مہینہ میں ایک خوراک دیں پھوڑوں کے نکلنے کو
روک دیتا ہے۔

اکسیر مصفی خون، اجڑے ترکیبی، کلیئر یا فاس، نیرٹرم میور، کلیئر یا فلور،
کالی فاس تم وزن۔

علاقات، در گرمیوں میں پھوڑے پھنسیوں کی شکایت، گہرے زخم جن
میں پیپ پڑ گئی ہو اور گوشت کھایا جا رہا ہو،
خوراک دو ٹکیاں ہر دو گھنٹہ بعد۔

خارش SCABIES سکے سیر

وجوہات و تشخیص: اس مرض کا سبب ایک ننھا سا گول حیوانی کرم (جسے
اکسیرس پیکس) کہتے ہیں، اور یہ ایک متعدی مرض ہے، ایک آدمی سے دوسرے
کو منتقل جاتی ہے، اس مرض میں جسم پر خارش ہوتی ہے، یہ خارش کبھی تیز اور کبھی
خشک ہوتی ہے، زیادہ تر انگلیوں کے درمیانی حصہ، کلائی، رانوں کی اندرونی سطح اور
خصیوں پر ہوتی ہے، اکثر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، خارش کرنے سے
جلد سرخ، آسے اور کبھی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں۔

علاج: خارش کے علاج کے لئے گندھک اور بنزینیل تیز و میٹھائی
اثرات رکھتی ہیں۔

اکسیر خارش، گندھک، آملہ سار، تولہ، پارہ، تولہ، باجی، تولہ،
کبیلہ، تولہ، مردہ سنگ، تولہ، نیلہ قحوظ، تولہ، مرجع، مہابہ، ماشہ۔

پہلے بارہ اور گندھک کو ملا کر کجلی تیار کریں، پھر دوسری ادویات بارہ ایک
پیس لیں، نکھن گاؤ ایک پاؤ لے کر اس کو پانی سے ہمیں بار دھوئیں، پھر تمام
ادویات کو نکھن میں ملائیں، مرہم کی بن جائے گی۔

ترکیب استعمال رات کو خارش کے مقام پر مل کر سو جائیں، صبح
کو گرم پانی سے ہنالیں، اسی طرح تین چار دن کرنے سے مکمل آرام ہو جائے گا۔
خارش کے لئے بے نظیر دوا ہے۔

مرہم خارش : در سندھور، مرج سیاہ، نیدہ غوثہ، کبیدہ، بابچی، سہاگہ
سب ادویہ ہم وزن۔

بارہ اور گندھک کی کجلی بنا کر باقی تمام ادویہ علیحدہ علیحدہ پیس کر جلد ادویہ
کو ملا کر چار، پانچ گھنٹہ کھل کریں، بوقت ضرورت دھوئے ہوئے نکھن یا دیزلین
میں ملا کر مالش کریں، دن میں دوبارہ، تین چار دن کی مالش سے ہر قسم کی خارش
دور ہو جاتی ہے۔

سلفر اسٹیمینٹ : مقام خارش پر ملنے سے خشک خارش کو آرام آ جاتا
ہے، اور خوردنی طور پر ۵ گریں کی گولی، سلفر پلز، دن میں چار مرتبہ کھلائیں۔

ایضاً : ایسڈ کرائی سوفینک اڈرم، دیزلین ایک اونس، مرہم بنا دیں،
خارش کے لئے عجیب و غریب دوا ہے۔

اکسیر خارش : بابچی اتور، اجوائن خراسانی اتور، تخم حاض ایک توڑ
صندل سرخ اتور، طوطیائے سبز ۶ ماشہ، گندھک آملہ سار اتور، نفل سیاہ ۵ ماشہ

سب کو کوٹ کر ہنایت بارہ ایک سفوف بنائیں، اور روغن سرشت میں ملا لیں
ترکیب استعمال : رات کو زودہ اعصاب پر خوب مالش کریں، اور کم از کم
دو گھنٹہ بعد ہنائیں، بہتر یہ ہے کہ رات کو ملیں اور صبح ہنائیں۔

فائدہ : رات کو خارش کے لئے عظیم المنفع ہے۔

سفوف غفّارہ : ہر سنگ جراح ۲ ٹولہ ، گندھک آملہ سارہ ۵ ٹولہ ہر داسنگ

۵ ٹولہ ، کمبیدہ ۵ ٹولہ ، مازد ۲ ٹولہ ، زنگ اڑکسا بیٹہ ۲ ٹولہ ، سندھور ۱ ٹولہ

جلد ادویہ کو بار یک پس پس لیں ، اور کڑوے تیل میں ملا لیں ،

ترکیب استعمال : یہ مقاماً مائوف پر مالش کریں ، خارش ، واد ، چنسل

دھند ، پھوڑے ، بھینسی کے لئے بے حد مفید ہے ، پرانی سے پرانی نکالیف کو دور کرنے میں از حد مجرب ہے ،

بنزل نبرو بیٹ ایلیشن : یہ دو کئی کمپنیوں نے مختلف تجارتی

ناموں کے ساتھ مشہور کر رکھی ہیں ، لیکن حقیقتاً چیز ایک ہی ہے ، مثلاً

اسکے بول (می اینڈ بیکر) ، ٹیمو سول (آئی ، سی ، آئی) وغیرہ ،

ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے ، کہ اول مریض کو گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد

تویہ سے جسم خشک کر کے یہ ایلیشن جسم پر لگائیں ، اور اسے خشک ہونے دیں

اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں ، دوسرے دن گرم پانی سے غسل

کر کے کپڑے تبدیل کر لیں ، معمولی حالتوں میں صرف اتنے علاج سے ہی آرام

ہو جاتا ہے ، ورنہ دو تین دن تک یہ علاج جاری رکھنے کے بعد کپڑے

تبدیل کریں ، چھوت دار کھجلی کا جدید اکسیری علاج ہے ،

دو اسے خارش : ہر توتیا بریاں ۳ ماشہ ، پارہ ، رال سفید ، کمبیدہ

ہر داسنگ ، سندھور ، کالی مرچ ، برگ مہندی ہر ایک ۶ ماشہ ،

جلد ادویہ کو بار یک پس پس کر دھن زرد میں ملا کر بدن پر مالش کریں ، تین

گھنٹہ بعد گرم پانی سے نہالیں ، زخارش کے لئے خاص بھر دوسرے چیز ہے ،

اکسیر خارش : ہر گندھک آملہ سارہ ، کافی زیری ، گیر و ہر ایک ۶ ماشہ

سب دواؤں کو بار یک پس کر برابر وزن تین پڑیہ بنا دیں ،

مقدار خوراک : ایک پڑیہ صبح ایک تیسرے پہر دی کے ساتھ کھلا لیں

تیسری پڑیہ میں ۳ ماشہ نیلا تھوٹھا مسفوف ملا کر تیل سرسوں میں ملا کر جسم پر ملیں ، اور دو گھنٹہ بعد نیم گرم پانی سے نہالیں ، خارش کا ایک روزہ علاج ہے ، تین دن کا استعمال کافی ہے ،

دو اے خارش : جدید تحقیقات سے خارش کو جلدی مرض قرار دیا گیا ہے اور اس کے پیدا کرنے والے جراثیم معلوم ہو چکے ہیں ، یہ دوا ان جراثیموں کا قلع قمع کرنے کے لئے اکسیر ہے ،

جو کھارہ تولہ ، قلعی ستورہ ۵ تولہ ، نیلہ تھوٹھا ۵ تولہ ، ڈوڈہ خام دھتورہ بقدر ضرورت ، پہلی دواؤں کو باریک میں کر دھتورے کے ڈوڈوں کو خالی کر کے ان میں دوائی مذکور بھر کر اوپر تاگہ لپیٹ دیں ، پھر ایک بڑی ہانڈی میں یہ ڈوڈے ڈال کر ہانڈی کو پانی سے بھر دیں ، اور نیچے آگ جلا میں ، جب پانی خشک ہو جائے ، ڈوڈوں سے دوائی نکال کر خوب باریک میں لیں ،
طریق استعمال : یہ دوا تیل یا کھن میں ملا کر مریض خارش کو دن میں ایک بار مالش کرائیں ، اور ایک گھنٹہ بعد گرم پانی سے نہالیں ، خارش خواہ کسی ہی کیوں نہ ہو ، تین دن کے استعمال سے حکمی طور پر دور ہو جاتی ہے ،
جرب الجرب نسخہ ہے ،

د د RING WORM رنگ ورم

تشخیص : اس مرض میں جسم پر مدور گول گول نشانات پڑ جاتے ہیں ، اور ان پر خارش ہوتی ہے ، دراصل یہ ایک قسم خستہ کھردرا پن ہوتی ہے ، جو جلد پر پیدا ہو جاتا ہے ، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی پھینسیاں ہو کر ان پر خارش ہوتی اور رطوبت بہنے لگتی ہے ،

یہ زیادہ تر بالوں کا مرض ہے۔ عام طور پر سر میں ہوتا ہے، اور کبھی
 داڑھی اور دیگر مقامات پر بھی ہو سکتا ہے۔
علاج اس مرض کے علاج میں مرکری کے مرکبات مفید
 ثابت ہوتے ہیں۔

اکسیر داد ہر ایوٹیڈ مرکری، اگرین، مریم سادہ ایک ادس،
 مقام داد کو گرم پانی اور صابن سے دھو کر خشک کر کے یہ مریم دن میں دوبارہ
 مالش کریں، داد، دھدر کے کرم یعنی طور پر ہلاک ہو جائے ہیں،
 طینکے آئیوڈین مقام ماؤف پر روزانہ دن میں دو تین مرتبہ لگائیں معمولی
 حالتوں میں جسم کی داد پر لگانا بے حد مفید ہے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے
 استعمال سے بالکل آرام آجاتا ہے۔

اکسیر داد ہر نیدھرتھاقا ماشہ، گواپوڈر اماشہ، کیلومل اماشہ
 ایڈونام اماشہ، ایڈکاربالک ۲ قطرے، روزین ۲، لولہ، ملائیں بس تیار ہے
ترکیب استعمال، بجائے ماؤف کو کھدر کے کپڑے سے رگڑ کر
 صاف کر کے اوپر مریم لگادیں، دن میں دو دفعہ، ہر قسم کے داد چپٹل، گزیا
 کا تجربہ علاج ہے۔

اکسیر داد اربسی لنیم ۲۰۰ ہفتہ میں ایک بار دیں، کھوپری اور بال کے
 حصوں کے داد کے لئے بے حد مفید و تجربہ ہے۔
 داد کے متعلق ہمارا تجربہ ہر امیری بیوی کو عرصہ ۲ سال سے دونوں
 ہاتھوں پر سخت قسم کی داد، دھدر ہو گئی تھی، جس کو عام ادویات استعمال
 کرنے سے آرام آجاتا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر نوزدار ہو جاتی تھی، خصوصاً
 دلوز سے نائدہ ہو جاتا، لیکن بعد میں پھر تکلیف بدستور ہوتی، آخر یہ نسخہ
 استعمال کیا، تو اس سے مکمل نائدہ ہو گیا۔

سیریم سلفا ایڈ ۲ تولہ ، پانی ۲ تولہ ملا کر دھو کر کی جگہ لپیپ کر دیا گیا ، پانچ
چھ منٹ کے بعد پانی سے دھو دیا گیا ، اور جہاں داد کے جراثیم تھے ، وہاں
ذرا گہرے سوراخ ہو گئے ، اور تندرست جگہ پر کوئی اثر نہ ہوا ، اس کے بعد
معمولی مکھن یا پنسلین آکٹمنٹ لگانے سے زخم درست ہو گئے ، ایک ماہ
بعد پھر یہی عمل کیا ،

اب ۲ سال ہو گئے ہیں ، ابھی تک تو دوبارہ پیدا نہیں ہوئی ، اگرچہ دوبارہ
لگانے کے بعد معمولی مہلن اور دوسری ہوئی ہے جو قابل برداشت ہوئی ہے ،

پسریل PSORIASIS (سوراس)

وجوہات و تشخیص اس مرض میں جلد پر سرخ داغ پیدا ہو جاتے
عموماً یہ داغ گول دائرے کی شکل اور ان داغوں پر سفید چمک دار چھلکے پیدا
ہو جاتے ہیں ، یہ مرض عموماً ان مقامات پر ہوتا ہے ، جو کپڑے سے ڈھکے
رہتے ہوں ، مثلاً سر ، کہنیاں ، گھٹنے ، ٹخنے اور کبھی سارے جسم پر پھیلا
ہوا ہوتا ہے ، اور اس میں جلد کی سطح کھردری ہو جاتی ہے ، جلد پر سے مچھلی
کے چالون کی طرح کے چھلکے اترتے ہیں ، جب یہ مرض پھیل رہا ہو ، تو اس
پر خارش ہوتی ہے ، در نہ نہیں ہوتی ، خارش سے چھلکے اتر کر خون نکلنے لگتا ہے ،
علاج : اس مرض کے علاج میں ایڈ سیل سلک اور کرائی سارو
بین بہت مفید ہیں ،

اکسیریٹیل اور پوست شیشم ۱۰ تولہ ، پوست نارجیل ۱۰ تولہ ،
گندم ۲۵ تولہ ، نوشادر ۱۰ تولہ ،

جملہ ادویہ کا بطریق پتال جستر تیل نکالیں ، روئی کے پھایہ سے

مقام ماؤف پر لگایا کریں، خشک ہونے تک دھوپ میں بیٹھیں، دواو چنبیل رو دہر کو دور کرنے میں لاثانی اور مشہور و معروف دوا ہے۔

مرہم چنبیل، بریلی سلک ایسٹ و گرین، زنگ پیسٹ ایک اونس دیزلین ۳ اونس، مرہم بنا کر چنبیل پر لگادیں، مجرب ہے۔

اک زردار دار چینا، ہڑتال درقی، شنگرف، گندھک آملہ سار ہر ایک تولہ، تولہ، گائے کا گھی ایک پاؤ، عرق عشبہ ۶ سپر۔

ہر ایک دوا کو الگ الگ پیس کر باعم ملا لیں، گھی کو دیچی میں ڈال کر آگ پر گرم کریں، جب سرخ ہو جائے، تو کھل مل شدہ سفوف کو یک بارگی دیچی میں ڈال دیں اور آگ پر گرم کریں اور لکڑی سے خوب ملائیں،

عرق کو پہلے ہی ایک بڑی دیچی میں ڈال رکھیں، اور گھی گرم گرم عرق میں

ڈال دیں، اور برتن مذکور کو اوپر سے ڈھانپ دیں، رات بھر بڑا رہنے دیں تاکہ گھی اور پختہ ہو جائے، صبح گھی کو اتار کر شیشی میں رکھ لیں، عرق کو موٹے کپڑے سے چھان کر بوتلوں میں بھر لیں، پچھٹ کو گھی میں ملا کر رکھ لیں، یہ گھی بیرونی طور پر خنازیری گلیٹیوں کے لئے مفید ہے۔

مقدار خوراک، عرق مذکور ۶ ماشہ تا ۹ ماشہ پاؤ بھر دودھ میں

ملا کر صبح و شام ملائیں، اعلیٰ درجہ کا مصطفیٰ خون نسخہ ہے، خنازیر، برص، پرانی چنبیل، خارشش کہنہ، بواسیر، سوزاک، آتشک وغیرہ جلد امراض خبیثہ کے لئے بے مثل ہے، لطف یہ کہ آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، اور عرصہ تک خواب نہیں ہوتا۔

عرق اکسیر شفا، عشبہ ۴ تولہ، چراکتہ ۸ تولہ، گنیشیا ۵ تولہ، پہلی دونوں دوائیں باریک کر کے ۳ سپر پانی میں ۱۲ پہر تک تر رکھیں، پھر جوش دیویں، جب نصف رہ جائے، تو مل چھان کر دو بوتلوں میں

بھریں، پھر گنیشیا نصف نصف ملا کر رکھ دیویں۔

طریق استعمال : درتین تین تولہ صبح و شام بوتل ہلا کر استعمال

کرائیں، غذا میں دال مونگ، پھوٹی وغیرہ، دودھ بھی زیادہ استعمال کرائیں۔

منافع : ہر قسم کے فساد خون مثلاً چنبل، خارش، جھدام،

آتشک، بھوڑے پھنی کے لئے ایک مخصوص چیز ہے تجرباً تجرباً ہے۔

دوائے چنبل : کرائی سارو میں ۲۰ گرین، دیزلین ایک اونس،

مریم بنا کر مقام ماؤف پر صبح و شام مالش کریں، دوران علاج میں صرف دوسرے

دن غسل کرنا چاہئے، سات دن کے بعد مقام ماؤف سرخ ہو جانے کے بعد

اس کو موقوف کر کے زنک آکسائیڈ لگا دیں، چنبل کے لئے نہایت تجرباً دوا ہے

چنبل کا ٹیکہ : اے اولان (A. OLAN) یہ خالص دودھ کے

ٹیکے ہیں، ۱۰ سی سی کا ہفتہ میں ایک بار عضلاتی انجکشن کرنا مرض چنبل کے لئے

بے حد مفید ہے، خاص کر جب مرض بہت پھیل چکا ہو۔

داد، دھدر، چنبل کا سوپیو پیچنی علاج

سلفر ۳۰ کی ایک خوراک صبح اور ایک شام کو مثلاً ان کی روز تک کھلائی جائے۔

اس سے داد اور دھدر کو بالکل افاقہ ہو جائے گا، اگر اس سے آرام نہ ہو۔

تو سپیا ۳ اسی طریق سے کھلائی جائے، ضرورتاً مدہ کرے گا۔

مرکبوری ایس سالو ۳۰، آر سنیکم ایلم ۳۰، گریفا ٹیش ۳۰ چنبل کے لئے

بہترین ادویہ ہیں، اگر ہفتہ میں ایک دفعہ بیسی لینم ۲۰۰ یا آر سنیکم ایلم ۲۰۰ اور سورنم

۲۰۰ کی ایک خوراک باری باری کھلائی جائے، تو زیادہ نائدہ کرتی ہے، ہانڈروکٹائیل

مدہ پھر کے ۵ سے ۱۰ قطرے صبح اور شام کو تازہ پانی کے دو چار گھونٹ میں ملا کر پینا

خصوصیت سے مفید ہے، ماؤف جگہ کو صاف بھرا رکھیں۔

نفاطات یا آلے PEMPLIGUS BIEDS

وجوہات تشخیص : در یہ جلد کے سرورنی پر رے میں رطوبت جمع ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں ، اور کبھی خرابی خون یعنی جراثیمی سمیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کبھی حل جانے یا تیزاب لگنے یا بجلی کے کرنٹ سے نکل آتے ہیں ، علاج : مصفے خون ادویات اور دنی طور پر استعمال کریں ، اور محض رطوبات سرورنی طور پر لگائیں ،

سلفو کسٹا ٹیڈ گولیاں - یہ گولیاں نفاطات کے لئے بے حد مفید ہیں ، گولی پانی کے ساتھ دیں ، دن میں تین دفعہ اور چھالوں پر سلفو کسٹا ٹیڈ پوڈر لگائیں ، سبازول جس کا دوسرا تجارتی نام ایم بی ۶۰ ہے ، مقدار خوراک ۲ گولی دن میں تین دفعہ پانی کے ساتھ دیں ، اور سرورنی طور پر سبازول ڈسٹنگ پوڈر چھالوں پر لگائیں ،

پمپلین ۲ لاکھ یونٹ ، ڈوسٹڈ وارڈ ۵ سی سی ملا کر عضلاتی انجکشن کریں ، صبح اور شام ، ایک دو انجکشنوں سے ہی تمام چھالے ، پھنسیاں ، آبلے خشک ہو جائیں گے ، اور آئندہ نکلنے سے رک جائیں گے ، معمول و تجرب ہے ،

عرق عیشہ بہترین مصفے خون دوا ہے ، مقدار خوراک ۲ تولہ دن میں ۴ بار ، بچوں کو حسبِ مردی ، شربت سارپہر بلا بھی عیشہ کی کام کریں ہے ، بہترین مصفے خون دوا ہے ، اکسیر نفاطات اور سکپور اتولہ ، سہاگہ مضمیہ ریاں ۵ تولہ ، کافور اتولہ ،

بارکب صغوف تیار کریں ، ۶ ماشہ دوائی ۳ تولہ تیل سرسوں میں حل کر کے پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں ، بچوں کے جسم کے سفید اور سرخ چھالوں ، پھوڑے پھنسیوں کے لئے اکسیری دوا ہے ، معمول و تجرب ہے ،

چھپاکی

ARTE CARIA

ادنی کیریا

وجوہات و تشخيص: در اس مرض میں جلد کی تمام سطح پر سرخ ابھرے ہوئے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مختلف شکل و صورت کے دھبے جو عام طور پر چند منٹ یا چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کئی کئی دن تک رہتے ہیں۔ ان میں شدید کھجلی ہوتی ہے، اور گاہے بخار بھی ہو جاتا ہے۔

اکثر یہ مضمی، غذا زیادہ کھانا، گرم چیزوں کا بکثرت استعمال، بچوں میں دانت نکلنے کا زمانہ وغیرہ اس کے اسباب میں، اور کبھی تنے کے رک جانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ شاؤد نار آدمیوں کو کوہین کے استعمال سے بھی یہ علامات رونما ہو جاتی ہیں۔

علاج: ار چھپاکی کے علاج میں انٹی سان رساختہ میسکر، بذریعہ انجکشن استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ انجکشن لگانے کے بعد طبی دبر بعد تمام علامات میں کمی ہو جاتی ہے۔ دوتین انجکشنوں سے مکمل آرام آ جاتا ہے، اور یہ میرا معمول و تجرب ہے۔

عسل منسکن: سوڈا یا بیکارب ۲ اونس، پانی شیر گرم ۲۰ سیر میں ملا کر غسل کرائیں۔ چھپاکی کی خارش کو تشکین دینے کے لئے بچہ مفید و تجرب ہے۔ دوائے چھپاکی: ار گلفند، محل مدار تم وزن بقدر ۳ ماشہ، سرد و گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ دیں۔ ایک دو خوراکوں سے چھپاکی دور ہوگی، متواتر کھانے سے برائی سے برائی چھپاکی زایل ہو جاتی ہے۔

دیگر شہد میں گیر و ملا کر بقدر اولہ دن میں دو چار دفعہ کھانے سے چھپاکی نہ مدہ ہوتا ہے، مریمین چھپاکی کو ہر اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔

انجکشن چھپا کی : لائیکوار ایڈرینے لین مقدار ۱۰ بوند جلدی ٹیکہ کرنے سے ہر قسم کی چھپا کی رارٹی کیریام فی الفور دفع ہو جاتی ہے۔

کلیسم سندوز دس فی صدی والا ۱۰ سی سی کا وریدی انجکشن کریں، لیکن انجکشن تھبت آہستہ آہستہ کرنا چاہئے۔ کم از کم دو یا تین منٹ کا وقفہ گزر جائے، چھپا کی کے لئے بے حد مفید مجرب ہے۔ خاص کر جب پرانی موچکی ہو۔
نوٹ، لائیکوار ایڈرینے لین کا انجکشن در سال سے کم کے بچے کیلئے خطرناک ہے،
اکسیر چھپا کی : در جل نیم بوتلی ۴ تولہ، مرچ سیاہ ۸ تولہ، دونوں کو گھوٹ کر یک جان کر کے کابلی بخود کے برابر گولیاں تیار کریں۔

مقدار خوراک : اگر لی ہمراہ پانی دن میں تین بار، یہ دوا اعلیٰ درجہ کی مصنفے خون ہے، مثری یعنی چھپا کی کے لئے اکسیر ہے، خارش خشک و تر پھوڑے پھنسیوں کو رفع کرتی ہے۔

اکسیر شفا : کشتہ حلزون ۳ تولہ، فوئل بریاں ۹ ماشہ، طوطیا سبز ۳ ماشہ، مرزا سنگ ۹ ماشہ، دارچینا ۱ ماشہ، کشتہ سفید ۹ ماشہ، زنگار خالص ۹ ماشہ، رسونت ۹ ماشہ، ریوند چینی ۷ ماشہ، کبیدہ ۳ ماشہ، عرق گلاب ایک بوتل، جلد ادویہ کو باریک میس کر ایک بوتل عرق گلاب میں کھل کر پیں، یہاں تک کہ دوا مثل عیار باریک اور خشک ہو جائے۔

مقدار خوراک : نصف رتی ہمراہ مسکہ یا بالائی صبح و شام، اعلیٰ درجہ کی مصنفے خون، حالبس الدم، تقابض، مجفف رطوبات اور مدلل فردحات و جروحات ہے۔

دوائے ارلی کیریام : کاربوئیٹ سوڈا، مگنیشیا کارب کیلیم کلورائیڈ کیلیم بیکائیٹ چاروں مساوی وزن ملا کر کھل کر کے رکھیں۔

مقدار خوراک : دگرین صبح، دوپہر، شام پانی سے کھلا دیں۔

فوائد :- یہ دوا چھپا کی کو ذری دور کرنے کے لئے بے ضرر اکسیر بنے نظر ہے۔
نوٹ :- اس مرض میں انٹی ہسٹامین ادویہ استعمال کی جاتی ہیں جن میں مندرجہ ذیل
ادویہ اس مطلب کے لئے مفید ہیں۔

ایلفی ڈرین ہائڈرو کلورائیڈ ۲۰ گریں ہر چار گھنٹہ بعد کھلا دیں۔
بعض مریضوں میں دورہ مرض رفع کرنے کے لئے کامیاب دوا ہے۔

سٹاڈیل کیپسول ایک ایک دن میں تین مرتبہ بعد از غذا کھلا دیں۔
اینٹی سان رمے اینڈ بکرم ۱۰۰ تا ۲۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دیں۔

اینٹاسٹین (سیبا) ایک ٹکیہ ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔ یہ ادویہ چھپا کی
دارائی کیریاء کے لئے مفید ہیں۔

نوٹ :- اگر مرض پرانا ہو چکا ہو، تو اس کا اصلی سبب تلاش
کر کے علاج کرنا چاہئے۔ ورنہ ان ادویہ سے وقتی طور پر دوران خون تیز ہو کر
و پیٹر وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔

مندرجہ ذیل پیٹنٹ ادویات مرض چھپا کی کیلئے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔
فینر جن PHENERGAN ۲۵ ملی گرام کی ایک ایک ٹکیہ دن
میں دو بار دیں۔

ایمو ڈرل (پارک ڈیوس) یہ پتی اچھلنے، چھپا کی وغیرہ کے لئے مفید
و تجرب ہے۔ ایک کیپسول صبح و شام دیں۔
چھپا کی کا مومیو چیمٹی علاج

خواہ کسی طرح کی چھپا کی نکل آئے۔ ایس مہینفیکا ۳۰ بہترین دوائی ہے، اس دوائی میں
گھنٹک سے آرام ہوتا ہے۔ اور جسم پر ڈبک چھپنے کا سا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایس
سے افاقہ نہ ہو، تو نمبرم ۳۰ مفید ہے۔ اگر حلن ہو، اور کسی دوائی سے افاقہ
نہ ہو، تو آر سینکم ایم ۶ مفید دوائی ہے۔

سرخبادہ ERYSIPELAS اری سیپلس

تشخیص : وجوہات و تشخیص : یہ جلد کا ایک شدید انتہائی مرض ہے۔ اکثر منہ پر ہوتا ہے۔ ماؤٹ جلد متورم، سرخ، چمک دار اور ابھری ہوئی ہوتی ہے، بخار ہمراہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب ایک خوردبینی کیڑا ہے، جسے سٹرپٹوکوکس اری سیپلس کہتے ہیں۔

علاج : درمقام ماؤٹ پر اکھیل مرہم لگائیں، نیچر آئیوڈین بھی لگایا جاسکتا ہے، اگر مرض چہرہ پر ہو، تو آنکھوں میں آبر حیردوں یا پردٹار گولوشن ڈالنے میں۔

اگر بے خوابی کی شکایت ہو، تو ڈورس پوٹر ۵ گرین چائے کے ساتھ کھلائیں۔

ترقیاتی سرخبادہ اری سیپلس ۵ گھنٹہ ڈسٹنٹ، ڈسٹنٹ وارٹر ۱۰ سی سی، ڈسٹنٹ وارٹر کو پینلین کی ٹیوب میں داخل کر کے صبح و شام دو انجکشن کریں، تین دن تک متواتر کریں، بعض مریضوں کو ایک ہی دن میں چھ لکائیوں سے آرام ہو جاتا ہے، در نہ تین دن کے استعمال سے جلد علامات بالکل رفع ہو جاتی ہیں۔

پینلین کے دوران استعمال میں سلفا ڈایازین ۳ گم کیہ سرجو تھے گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کرانا بہت جلد بہترین نتائج پیدا کرتا ہے، نیز اگر پینلین نہ مل سکے، تو سلفا ڈایازین پہلی خوراک چار گم کیہ پھر سرجو تھے گھنٹہ بعد دو گم کیہ دو تین دن تک، اس کے بعد ایک گم کیہ ہر چوتھے گھنٹہ بعد دیں، مریض کو پانی کافی پلانا چاہئے، اور ساتھ ہی سوڈا بائیکارب ۲ گرین فی خوراک پانی میں ملا کر پلائیں، سرخبادہ کا شافی علاج ہے۔

حسب سرخبادہ : در سونت خالص ازلہ ، مغز غولی نیم ازلہ ، صندل
 سرخ ، چوانترہ ، شاتہترہ ، مغز چاکسو ، زکچود ، برگ نیم ، برگ بکائن ، گل
 نیم ، برگ حنا ، کھنڈ سفید ، فلفل سیاہ ، زرد چوبہ ہر ایک ۳-۳ ماشہ
 تمام ادویات کو باریک پس کر شہد کی مدد سے بخود گیہاں تیار کریں ،
 مقدار خوراک ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ دیں ، بچوں کو حسب عمر کم
 خوراک دیں ، سرخبادہ ، مشادخون ، پھوڑے پھینسی کے لئے اکسیری دوا ہے
 چند دنوں کے استعمال سے خون کی خرابیاں رفع ہو جاتی ہیں ،

سرخبادہ کا ہومیوپیتھی علاج

اگر متدم حصوں میں جلن پائی جائے اور جلد سرخ ہو ، سرور دی اور بے چینی
 بہت پائی جائے ، اور یہ نکالیف زیادہ تر دائیں طرف ہوں ، تو بیلڈ ڈونا ۳
 دیں ، اگر ایسی ہی علامات بغیر پیاس اور بغیر جلد کی سرخی کے پائی جائیں ، پھر
 ایس ۳۰ زیادہ مفید ہوگا ، اگر جسم پر آبلے نکل آئیں ، اور جسم کے مادف
 حصے چمک دار اور سرخ ہو جائیں ، اور بے چینی بھی بہت ہو ، اور چہرہ کے
 بائیں طرف نکالیف میں شدت ہو ، تو رسٹاکس ۳۰ دیں ، ۲-۲ گھنٹہ کے بعد
 دوائی کا جاری رکھنا بہتر ہوگا ،

اکسیر سرخبادہ

نیرم فاس ۴۰ حسب علامات دن میں چار یا چھ مرتبہ دیں ،

سرخبادہ کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے ،

کالی سلف : اس پر دوا جلد کو گہرے زخم سے محفوظ رکھتی ہے ، اور سرخبادہ

کے جھلکوں کو جلد تار و پتی ہے ، پیپ پڑنے ، جلد کے سخت اور سرخ ہونے

کے لئے نیرم فاس مفید ہے ،

BURN
SCALD

آگ یا گرم پانی جل جانا

ر برن اینڈ سسکالڈ

تشخیص : درگرم پانی یا آگ سے جل جانے سے معمولی حالتوں میں مقام سوختہ پر سطحی سرخی اور جلیں ہوتی ہے، مگر آبلہ نہیں پڑتا، زیادہ جل جانے سے آبلہ بھی پڑ جاتا ہے۔

علاج : اگر معمولی تکلیف ہو، تو خود بخود بھی رفع ہو جاتی ہے، زیادہ

حصہ جل جائے، تو اس کے تین درجے ہوتے ہیں،

درجہ اول کی میعاد ۴۸ گھنٹے تک، دوسرے درجہ کی میعاد ۲ دن سے

۱۲ دن تک اور تیسرے درجہ میں پیپ پڑ جاتی ہے،

جب جسم کا بہت حصہ نہ جلا ہو، تو تازہ سطحی زخموں اور آبلوں کو

مندرجہ ذیل روشنی سے صاف کر کے مندرجہ مرعم لگائیں،

توشن : ہر ایکری فیوین اگرین، ایکوا ۲ اونس میں محلول تیار کریں،

مرعم : پنسلین آکٹ مینٹ بنی بنائی مل جاتی ہے، مقام سوختہ کو محلول سے صاف کر کے پنسلین کریم لگادیں اور ۴۸ گھنٹے تک دیکھ رہے ہیں،

رفع درد کے لئے مسکنات مثلاً اسپیرین، امیڈوپارکین، مسارپڈان،

کوڈ پارکین وغیرہ استعمال کریں، شدت درد میں مارفین کا استعمال کریں،

ضعف قلب کی صورت میں کورائین لسیکونیڈ، اقترے پر دو گھنٹہ

بعد پلائیں، یا ایک سی سی کا انجکشن کریں،

چھلکے : ہر سرکہ آگ سے جلنے کی تکلیف کو رفع کرنے میں تمام پیازوں سے

زیادہ نفع پہنچاتا ہے، اور دھلا ہوا چھنا زخموں کو بھرتا اور آگ سے جلنے کو نفع ہے

شیخ رئیس فرماتے ہیں کہ ہنگ سے جلنے کے علاج کی دو غرضیں ہوتی ہیں
 ایک تو جلے ہوئے مقام پر آبلہ نہ پڑے ، اور دوسرے جو اجزاء جل گئے ہوں ان
 کی اصلاح ہو جائے ، پہلی غرض کے لئے گل ارمی سرکہ میں ملا کر لگانا بے حد مفید
 اور مجرب علاج ہے ، اور دوسری غرض کے لئے چونہ کی مرہم نہایت مجرب ہے
 نسخہ : چونہ کو سات مرتبہ پانی میں دھوئیں تاکہ اس کی تیزی بالکل
 زایل ہو جائے ، پھر ایک تولہ چونہ معنولہ میں گل روغن ۰۲ تولہ ، روغن دہن ۰۲ تولہ
 موسم اولہ ملا کر حسب دستور مرہم تیار کریں ، اور کبھی اس میں کھڑیا مٹی ، سفیدی
 بیضہ مرہم اور قدرے سرکہ انگوری کا اضافہ کر لیا جاتا ہے ، جل جانے کی تمام
 تکالیف کے لئے بے حد مفید و مجرب مرہم ہے ،

سائیکلو فام آکٹمنٹ (بائو) یہ مرہم جلے ہوئے مقام پر لگانے سے درد
 کو فائدہ کرتی ہے ، اور زخموں کو خشک کر دیتی ہے ،

نور کینالی مرہم (ساختہ سیباکینی) جلے ہوئے مقام پر لگانے سے تمام
 علامات کو ذری سکون بخشتی ہے ، درد ، جلن ، خارش وغیرہ کے لئے مفید ہے
 نیز امرین (ٹی) ، ٹینا فیکس (بار) ، ٹینا فلیوین جیلی (بی ، ڈی ، ایچ) ،
 پرو پامی ڈین (سکر) ، پیٹنٹ ادویات جل جانے کی تمام علامات کو روکنے
 کے لئے مفید و مؤثر ہیں ،

شدید جل جانے کی حالتوں میں پروکین مینی سلین ۴ لاکھ یونٹ کا عضلی
 ٹینک ہر چوبیس گھنٹہ بعد کریں ، علامات کو بڑھنے سے اور نقصان کے لئے
 بے حد مفید ہے ، نیز سٹرپٹوماٹ سین اگر ام کا انجکشن روزانہ کرنا بھی مفید ہوتا ہے
 جلے ہوئے مقام کو ایگری فلیوین بیٹ طاقت کے سلوشن سے صاف کریں ،
 اس کے بعد مینی سلین آکٹ مینٹ یا سلفا فٹایازول آکٹ مینٹ
 لگانا فائدہ کرتا ہے ،

اگر بجلی سے جل گیا ہو، اور مرکز تنفس مفلوج ہو چکا ہو، تو مصنوعی تنفس جاری کریں۔ اور مندرجہ بالا ادویات استعمال کریں۔
 مرہم اکسیپر۔ لائم وارڈ ۱۰ تولہ، میٹھا پیں ۳۰ تولہ، دونوں کو باہم ملا لیں۔
 سفید مرہم سی بن جائے گی، جسے ہوتے مقام پر لگانے کے لئے حد تغیر ہے۔
 دوائے سوختگی اس لٹش، ارمنیک کا فورہ ۶ ماشہ، سفیدی تینہ ترغابین، ملا کر مریض کا دف پر لگائیں، آگ گرم پانی گرم تیل اور بجلی وغیرہ سے جلنے سے پیدا شدہ تکلیف، سوزش اور جھلن کو فوراً رفع کرتا ہے۔
 اور آبلہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتا۔

جل جانے کا ہو موبہ چھتی علاج

گرم پانی یا آگ سے اگر کوئی حصہ جسم جل گیا ہو، دکھانے کے واسطے کنٹیکٹس ۲ دکھلا دیں، اور خارجی طور پر ایک، دس ۳ سٹڈ وارڈ ہیں، ۲ قطرے ٹینکچر کنٹیکٹس کے ملا دیں، اور اس ٹینکچر میں تھیں کا کثیر جھگوڑا پانی بولی جاگہ پر رکھیں، اگر بخار بھی ساتھ ہو، تو انجوناٹ بھی دکھلا دیں، کنٹیکٹس کا، ٹینکچر کی مرہم بھی لگائی جاسکتی ہے۔

اگر جلد زیادہ جل گئی ہو، اور زخم بہت گہرے نہ ہوں، جلی زنی ٹیڈ پر غارش اور جھلن ہو، تو ریح اس ۳۰ لکھانے کے لئے دیں، اور خارجی طور پر اس کا لوشن یا مرہم لگائیں۔

اس کا لوشن کنٹیکٹس کے لوشن کی طرح بنائیں، یا دیزلین میں ۲ قطرے مد ٹینکچر اور ایک اوٹس دیزلین ملا کر زخم پر لگائیں۔

گھبیر، موہری، ناصور

وجو با ست و تشخیص اس یہ بڑی کا پھوڑا ہوتا ہے جس میں بڑی منورم ہو کر
پیپ دار ہو جاتی ہے۔ اس کے شروع میں درد شدید ہوتا ہے اور درم
کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ اس کا مقام گہرا ہوتا ہے اس لئے یہ
خور بخور کم پھوڑتا ہے۔ شکاف دے کر ہی پیپ خارج کرنی پڑتی ہے۔
علاج :- سمٹھ سب ناسٹراس ۲ ڈرام، آیوڈوفام ۲ ڈرام
سلفر ٹائیٹ پوڈر ۲ ڈرام، لیکوئٹڈ پیرافین ۱۲ اونس
شنگ ادویہ کو پیرافین میں کھنسل کر کے مرہم بن جائے گی محفوظ رکھیں
پر اسے پیپ دار زخم جو بڑی تک پہنچ چکے ہوں، ناصور، جوڑ، بڑی کے
گہرے زخم، شروع جنبہ کے لئے مجرب ہے۔ مل کی ٹما کی مرہم میں ذکر
کے مقام مادت میں داخل کر دیں اور اوپر بھی لگا دیں۔
مرہم ناصور :- رسکیور اولہ، کافور، شنگٹ سرائیک دود اولہ،
سفیدہ کا شغری ۳ اولہ، کھٹھ ۳ اولہ، مرداسنگ ۲ اولہ، سندھور ۳ اولہ
برک ایسٹ ۲ اولہ، آیوڈوفام اولہ، پوست پتخ مدار اولہ، کشتہ طرنال گورنی
۵ اولہ۔

جملہ ادویہ کو باریک پیس کر دو چند دیزلین میں ملا لیں پس تیار ہے۔
زخم پر لگا دیں۔
ناصور، گھبیر، ہر قسم کے عسرا لبر فروح جنبہ، پر اسے زخم
جو بہت عرصہ کے ہوں، اس سے تندرست ہو گئے ہیں، ہنایت
مفید و مجرب مرہم ہے۔

جدید علاج :- پسین ۵ لاکھ بونٹ صوم و شام عضلی مکہ کریں۔ گھبیر کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔ اس کے استعمال سے پیپ آئی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زخم کے اندر ہڈی اور گوشت خراب ہو، تو پہلے عمل جراحی سے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ ورنہ پیپ بند ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور عارضی آرام ہوگا۔ نا صواب کا بہترین علاج یہی ہے کہ اول خراب شدہ ہڈی کو نکال دیں، یا سکریپ کر کے دوائی لگادیں۔

ہومیوپیتھی علاج

جب کوئی ہڈی اندر سے گل مٹ رہی ہو، اور اس کے اوپر گھٹی سی بن رہی ہو۔ تو اس کے لئے آرم میڈیکم بہترین دوائی ہے۔ اگر ہڈی پر رسولی نکل آئے اور وہ پتھر کی طرح سخت ہو، تو اس وقت کلکیہ یا فلور ۶ دیں۔

اگر سیم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اور اس کے سرے پورے طور پر نہ جوڑیں، تو سیم پچا میٹم مدد پتھر کے استعمال سے ٹوٹے ہوئے سرے جلدی جوڑ جائے۔

اگر بچوں کی ہڈیاں مضبوط نہ ہوں، تو کلکیہ یا فاس بہترین دوائی ہے۔ اگر ناک کی ہڈی میں زخم ہو جائے، یا کسی گلے سرے دانت کی وجہ سے عصبی درد شروع ہو جائے، یا جھڑے کی ہڈی بڑھ جائے، یا گردوں کی غددیں بڑھ کر سخت ہو جائیں، تو ہیکلا لادا چھوٹی طاقت کا سفوف بہتر دوائی ہے۔

شب چراغ

CAR BUNCLE

(کار بونکل)

تشخیص : یہ وہ پھوڑا ہے جو جلد کے علاوہ اس کے نیچے کی ہاتھوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس مرض میں مقام مادف کی جلد سیاہی مائل سرخ، دردناک اور تڑاوش پانے والا درم ہو کر سات سے دس دن تک بڑھتا رہتا ہے۔ پھر مادف سطح کئی مقامات سے نرم ہو کر پھلنی کی طرح سوراخ دار ہو جاتی ہے جس سے پیپ نکلنے لگتی ہے۔ اور سیاہی مائل چھوڑے نکلنے میں یہ پھوڑا اکثر گودن کی پشت یا کمر پر ہوتا ہے۔ ذیابیطس، کثرت شراب نوشی اور سیلاکچیا رہنا اس کا سبب ہے۔

علاج : اصل سبب مرض کو رفع کریں۔ مریض کو ہوادار کمرے میں بستر پر لٹائے رکھیں۔

پیشی می لین : اس مرض کا شافی علاج سے ۵ لاکھ یونٹ صبح و شام عضل طریقہ کریں، صبح و شام، اور پھوڑے کے اوپر پنسلین آئمنٹنٹ لگائیں۔

اگر ذیابیطس کا شبہ ہو، تو تارورے کا امتحان کرانا ضروری ہے۔ اگر شک موجود ہو، تو ذیابیطس کا علاج کرنا چاہئے۔

مرہم لوکل سوڈ : ۱۰ ایسڈ بربنسک ۵ اکرین، آئیل یوکیٹس ۱۰ ڈرام، دیزلین ایک اونس، مرہم بنادیں۔ زخم کو سوڈاوشن سے دھو کر دن میں دو مرتبہ لگادیں۔ کار بونکل پھوڑے کے لئے ہنایت مفید و مجرب ہے۔

پرہیزی و کیس (سے بیکر) : یہ مرہم اس پھوڑے کے لئے ہنایت مفید و مجرب ہے۔

امراض جلد کی بالو کیمک ادویات

فیرم فاس اور ہر قسم کے جلدی امراض کی ابتدائی حالت میں جبکہ دم، درد، بخار یا اجتماع خون ہو، جھوٹ، مویج یا کٹے زخم میں مواد نہ پڑا ہو،

کالی مہیورہ اور دم کے دوسرے درجہ میں پھنسی یا زخم سے گاڑھا سفید مواد خارج ہو، جلدی امراض کے ساتھ ہاضمہ خراب ہو، زبان کا رنگ سفید یا سلیمیٹ یا بل سفید ہو، بچوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے اور ان میں خارش، پیچک کے دانے، اکوتہ، سوزاک یا سلی پھوڑے وغیرہ۔

نیرٹم مہیورہ اور ہر قسم کے امراض جلد جن سے پانی جیسی پتلی رطوبت خارج ہو، اکوتہ، خارش، سفید رنگ کی پھنسیاں جن سے پانی جیسا مواد خارج ہو کپڑے، کھوڑے کے کاٹنے پر اس درد کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے استعمال کرنا چاہئے۔

کالی سلف اور ہر قسم کے دانے، خارش، اکوتہ وغیرہ سے پتلا، زرد اور لیسیدار مواد خارج ہو، جلد پھٹتے ہوئے یا پھیل گئے ہوں۔

نیرٹم سلف :- تمام اقسام کے امراض جلد یا دانے جن سے زرد پانی کا اخراج ہو، تمام جسم پر سرخ دانے، کپڑے اتارنے سے خارش میں زیادتی نیرٹم سلف دینا سہی بھی عمدہ دوا ہے۔

کلکیر یا سلف :- تمام جلدی امراض یا زخم جن سے زردی یا بل گاڑھا مواد نکلے، امراض جلد میں جلن اور خارش ہو، ہاضمہ، پاؤں یا جسم کے دوسرے حصوں کا پھٹنا خاص کر جاڑے کے موسم میں، زخم میں ٹپک اور جلن ہو، زخم جلد نہ بھرتا ہو، آسبے، اکوتہ، چنہ بل، خارش وغیرہ میں خشکی اور جلن۔

سلیسٹیا :- تمام ذیل، گومرٹ، خارش، کوڑھ، ناک کے زخم، کارنگی وغیرہ سے گاڑھا، خون آمیز، بدبودار مواد خارج ہو، زخم میں سوئیاں چھٹنے جیسا یا ڈنک مارنے جیسا جلن وارد ہو، سلیسٹیا پھوڑوں کو پکا کر ہلکے اور پرانے زخموں کی عمدہ دوا ہے۔

نیرم فاس :- ہر قسم کے جلدی زخم یا پھوڑے سے منہرے زرد رنگ کا گاڑھا، شہد کے مانند مواد خارج ہو، خشک، جلن دار آبلے، پھوڑے یا زراے جس میں سرسراہٹ اور کھجلا نے سے آرام ہو، بستر کی گرمی سے کھجلاہٹ یا تکلیف بڑھے۔

کلکیر یا فانس :- خون کی کمی کی وجہ سے امراض جلد ہوں، اکوتہ، چہرہ کے دانے، رستی پھوڑے وغیرہ سے البیومن کی طرح زردی یا لیل مواد آئے، بڑھاپے کی کھجلی میں یہ دوا بہت مفید ہے۔

کلکیر یا فلوریکا :- یہ دوا ہاتھ پاؤں کے پھٹنے کے لئے مفید ہے رسولی، گومرٹ یا پستان کے اندر کا ٹھٹھیا یا سختی پیدا ہو جائے، یا وہ درم یا زخم جس کے کنارے کارنگ بینگنی ہو، اور متورم اور سخت ہو۔

کالی فاس :- جلدی امراض یا دانے سے خون آمیز یا پانی جیسا پتلا بدبودار مواد خارج ہو، پھوڑے میں خارش وارد ہو، خارش کے دانوں میں سرسراہٹ

ایکینی

ACNE

مہاسے

تعریف :- چکنائی پیدا کرنے والی رطوبتوں کے بند ہو جانے پر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

اسباب :- یہ مرض خون کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے، مرغن غذا، کباب

مشراب، عورتوں میں ایام ماہواری میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، قبض کے رہنے اور ایام حمل میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

تشخیص : عموماً پہرہ، درجسم پر چھوٹے چھوٹے رائے مثل چنوں کے دانوں کے نکل آتے ہیں، جو آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، اگر یہ دانے یک جہاں، تو ان سے تھوڑی سی سخت رطوبت نکلتی ہے۔

علاج : اگر خون کا غلبہ ہو، تو نمکین مہل دینا نائدہ کرتا ہے اگر قبض یا خرابی حیض ہو، تو اس کا تدارک کریں، مرغن غذا اور شراب سے پرہیز کریں۔

اگر مسے کی جڑ پٹلی ہو، تو گھوڑے کے بال سے مسے کی جڑ کو باندھ دیں دو تین دن میں مرجھا کر خود بخود گر جائے گا، چھوٹے چھوٹے مسوں کو پیچھی سے کاٹ دینا چاہئے، کیونکہ ان سے جریان خون بند ہونا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے اوپر ٹائٹرک ایسڈ لگائیں، یا ٹرائی کلور ایسی ٹمک ایسڈ لگانا مسوں کو ختم کر دیتا ہے۔

مسوں کے کاٹنے اور جلانے سے ان کی پیدائش رکتی نہیں، ان کی پیدائش کو روکنے کے لئے اندرونی طور پر ادویات استعمال کرنی چاہئیں۔

اکسیر مہا سے، بربرس اکوئی فولیئم کیل مہا سوں کے لئے ایک اکسیر دیتا ہے، در ٹیکچر تین قطرے دن میں تین بار دیجئے، اور خارجی طور پر اس ردا کا مرہم لگائیں۔

گرینا ٹیکس ای، ایم کی واحد خوراکیں بہت مفید ہیں، مہا سوں اور کیلوں کی پیدائش رک جاتی ہے، بیرونی طور پر بربرس اکوئی فولیئم کا مرہم لگانی چاہئے۔

کنج FAVUS (انفوس)

تعریف : اکثر یہ مرض سر پر ہوتی ہے، یہ ایک چھوت دار بیماری ہے، کبھی کندھوں، عضلاتنا سل اور بالوں پر بھی ہو جاتی ہے، یہ ایک خاص قسم کے جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں،

وجہ پاست : غلطی میں رہنا، گھنے مریض کی کچھڑی یا لٹلی پہنا وغیرہ

تشخیص : جب یہ مرض پیدا ہوتا ہے، تو سوزشیں ہر کو کھڑکھڑاتے

ان بالوں سے چرموں کی سی بو آتی ہے، اگر یہ مرض سر پر ہو جائے، تو سر میں جو نہیں پڑ جاتی ہیں، علاج نہ ہونے پر یہ مرض عمر بھر بچھا نہیں چھوڑتی،

علاج : بالوں کو کتر کر دیس لگا میں، جب پھلکے دور ہو جائیں، تو کسی مرغن چیز سے چرب کریں، اور بالوں کو موچنے سے اکھاڑ دیں، غنڈا

مقوی اور زور مضم دیں،

سلفر آئزٹ مینٹ لگانا بھی مفید ثابت ہوتی ہے،

اکسیر کنج : کچھڑ ر کچھو ام کی بڑی سوختہ، ناشن اسب سوختہ،

پریم گربہ سوختہ، سائب کی پچھلی ہر ایک تولہ، پینال گس ۳ ماشہ

روغن زیتون ۱۲ تولہ، عطر حنار اصلی ۲ ماشہ، سب کو تانبے کے برتن میں

ڈال کر تانبے کے دستہ سے اس قدر رگڑیں کہ حل ہو جائے،

ترکیب استعمال : ہر مقام ماؤٹ کو کھر درے کپڑے سے رگڑ کر یہ روغن

لگا یا کریں، اور ۱۲ گھنٹے بعد برگ نیم اور صابن سے دھو دیا کریں، کنج اور باچر

میں نہایت مفید ہے، بالوں کو از سر نو آگاتا ہے۔

ناروا GUINEA WORM گنی ورم

تعریف : ناروا ایک دوفٹ لمبا سفید کرم ہے، جو جوڑوں اور جھیلوں کے گندے پانی میں ہوتا ہے، یہ مرض مریض کے پانی پینے کے ایک سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔

تشخیص : مریض کو تپ اور دست آئے شروع ہو جاتے ہیں، جسم پر سرخ دھبے اور خارش ہوتی ہے، اس کے ٹھوڑے عرصہ بعد جسم کے نچلے حصہ میں آبلہ پڑ کر پھوٹ جاتا ہے، جس سے سفید رنگ کے کرم نکالے سر نظر آتا ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے، تو اس سے کپڑے کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔

علاج : ناروا کے جھالا کو پھوڑنے کے لئے مصبر کا بیب کریں جب کرم نکلے، تو آہستہ سے ریشم کے دھاگہ سے باندھ کر ٹکڑی پر لپیٹ لیں، تاکہ تمام کرم باہر نکل آئے۔

انجکشن پین سی لین اور سلفا گروپ اس کے لئے کسیر کا حکم رکھتے ہیں۔

PEDICULOSIS

جوئیں پرنا

ریشمی کولوسس

وجوہات و تشخیص : یہ ایک چھوٹا دار مرض ہے، جو ایک شخص سے دوسروں کو لگ جاتی ہے، بدن کی صفائی نہ کرنا، مرض آلودہ شخص کے کپڑے پہننا یا اس کے ساتھ سونا جوئیں جس حصہ میں ہوں، وہاں خارش ہوتی ہے۔

علاج :- جسم اور کپڑوں کی صفائی رکھیں، گرم پانی اور صابن سے غسل کریں، ڈی ڈی ٹی امیٹن اس قدر لگائیں کہ جسم کے تمام بال نر ہو جائیں، بارہ گھنٹہ کے بعد کاربالک سوپ سے دھو ڈالیں، تمام جوڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بارہ کے مرکبات سر میں لگانے سے تمام جوڑیں مرجاتی ہیں، یہ نسخہ جوڑوں کو مارنے کے لئے اکسیر ہے۔

ڈی ڈی ٹی سفوف ایک حصہ، عام تیل ۲۰ حصے، دونوں کو ملا کر گرم کریں، یہاں تک کہ سفوف حل ہو جائے، پس تیار ہے۔
روزانہ ۴ ماشہ دوائی مذکور لے کر بالوں کو لگائیں، دو تین دن کے اندر جوڑیں اور ان کے انڈے اور نیچے بالکل مرجائیں گے۔

بفار بھوسی | SEBORRHEA

رکی بوریا

تعریف :- اس مرض میں سر سے بھوسی کی طرح چھلکے جھڑتے ہیں، اور کبھی جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اور ان سے رطوبت نکلتی ہے جو خشک ہو کر دھس جاتی ہے، کبھی زیادہ پھنسیاں ہو جاتی ہیں، اور ان میں خارش ہوتی ہے۔

وجوہات :- اس مرض کی وجہ کمی خون، دماغی کمزوری اور جسمانی کمزوری ہے، یہ چھوٹا مرض ہے۔

علاج :- سر کے بال منڈا کر روغن بادام ملیں، یا گائے کا گھی گرم کر کے سر پر ملیں، اس کے بعد نمکین لوشن بنا کر سر کو دھو ڈالیں، کچھ عرصہ ایسا کرنے سے بفار بالکل ختم ہو جاتی ہے، سر کو یہ ۷ سوپ سے ہفتہ میں ایک بار دھوئے رہیں

مندرجہ ذیل روشنی اس مرض کے لئے بے حد مفید ہے۔
ایسڈ سیلی سلک ۲۰ گرین، ہائیڈروکارب پرکلور ۱۰ گرین، کیسٹرائل ۵ منم،
آیل لونڈر ۵ منم، سپرٹ میٹھی لیٹڈ ایک اونس،
تھوڑا سا روشنی لے کر بالوں پر چھڑک بالوں پر برش کریں، دس
پندرہ دن کے استمال سے یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔

ضربہ و منقطہ BRUISE بر دمنز

وجوہات و تشخيص : جلد پر چوٹ لگنے سے اگر جلد نہ پھٹے، تو نیچے
خون جم جاتا ہے، جو یا تو جذب ہو جاتا ہے یا اس میں پیپ پڑ جاتی ہے،
اگر جلد کے نیچے جما ہوا خون نیلے رنگ کا نظر آئے، تو اسے پھوڑنا نہیں
چاہئے، کیونکہ ایسے خون کی جلد میں جذب ہونے کی توقع ہوتی ہے۔
علاج : مقام ماؤٹ پر سینک کریں، ہلدی، آم گندم، سہاگہ
کو ملا کر پانی میں ملا کر آگ پر پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے، تو ضرب کی
جگہ پر نیم گرم باندھیں، مقام مضروب پر ٹیکچر آئیوڈین اور سپرٹ میٹھی لیٹڈ
لگانا بھی نہایت مفید ہے۔

اکسیر ضربہ و منقطہ : چٹکڑی سفید ۲ تولہ، شکر رومی اتولہ
کو آب گھیکوڑ میں ایک پیر سحق کریں، اور ٹکیہ بنا کر آہنی کڑھی میں ڈال کر
آگ پر رکھیں، اور تھوڑی دھیرہ سے ہلاتے رہیں، جب دونوں چھوٹ کر خشک
ہوئے ہوں، اتار کر ست سلا جیت اتولہ اصلی ملا کر پیس لیں۔

مقدار خوراک : ۲ سرخ گرم دودھ یا چائے کے ساٹھ صبح و شام
بغیر ست سلا جیت کے بھی اچھا کام کرتی ہے۔

فوائد: ہر ضربہ دستقلہ کا درد الم خواہ اندردنی ہو یا بیرونی، ہر دوا شام کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔
اکسیر ضربہ دستقلہ ہر سرکہ ۲ تولہ، پانی ۱۵ تولہ، باعم ملائیں، اس میں پیڑ کر کے چوٹ کی جگہ پر رکھیں، درد اور سوزش کے لئے مفید ہے۔

چوٹ آجانے کا ہومیو پیتھی علاج

چوٹ لگنے کی صورت میں خارجی طور پر آرنیکا لوشن میں کپڑا بھگو کر چوٹ کے مقام پر رکھیں، ایک حصہ آرنیکا ٹینکچر کو ۱۰ حصہ سرد پانی میں ملا کر لوشن تیار کیا جائے، اور اندردنی طور پر آرنیکا ۳۰ کی خوراکیں دن میں تین دفعہ دیں، مروج آنے کی صورت میں میا میس کا لوشن مذکورہ بالا طریق سے تیار کریں، اور مروج کے مقام پر لوشن میں کپڑا بھگو کر رکھیں، اندردنی طور پر کھانے کے لئے ریشا کس ۳۰ دن میں تین یا چار دفعہ دیں۔

بھاجن ECZEMA ایکزیما

تعریف: اس مرض میں سخت سوزش ہوتی ہے۔
وجوہات: ضعف اعصاب، دبح المفاصل، قبض، جسمانی کمزوری،
مرض لنتیس، گرم، پیپ اس مرض کے وجوہات ہیں، یہ مرض دوشتم کا ہوتا ہے، شدید اور مزمن۔

اس مرض میں جلد بعض مقامات پر متورم ہو جاتی ہے، اور
تشخیص: چھوٹی چھوٹی بھینیاں نکل آتی ہیں، جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں جن میں شدت کا درد، جہن اند غارشش ہوا کرتی ہے۔

دوسرے تفسیرے دن ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ پیپ کے نکلنے پر کھرنڈ بن جاتے ہیں۔ اگر مرض شدت اختیار کر جائے، تو بخار بھی ہونے لگتا ہے۔ یہ مرض ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ اور کبھی سر، بغل، ران اور ٹانگوں تک پھیل جاتا ہے۔

علاج۔ چونکہ یہ مرض نہایت تکلیف دہ اور عسر العلاج ہوتا ہے اس لئے اس کا علاج دیر تک اور صبر کے ساتھ کرنا چاہئے۔ قبض کو دور کریں کبڈل ۵ گرین، سوڈا بایکارب ۵ گرین میں ملا کر رات کو کھلا میں صبح کو گنیشیا کا قہقل دیں۔

ہر قسم کی گرم چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں، مرغن غذا استعمال کریں۔ کدور، گنیشیا، پالک وغیرہ کا ساں کھانے کے لئے اوسے سکتے ہیں۔ نسخہ: رٹینک ایڈاڈرام، سپرٹ ریچی ٹائڈ ۲ اونس، مقطر پانی دو اونس، سب ادویہ کو ملا کر لوشن بنا کر مقام ماؤنڈ پر لگائیں۔

جاواریہ گرمی والے

SUDA MINA

رسوڈامینا

تعریف۔ جب پسینہ جلد کے نیچے رک جاتا ہے، تو پھر جلد پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس کو عام طور پر لوگ مبارکی کہتے ہیں۔

وجوہات۔ ترتیب حررتہ ہذیانی یا اسہالی، گنیشیا، جسم پر عموماً چھاتی پر دانے نکل آتے ہیں، چھوٹے بچوں میں دانٹ نکالنے کے وقت بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ عمل جراحی کے بعد جب جسم میں گرمی بہت بڑھ جاتی ہے، تب بھی یہ مرض ہو جاتی ہے۔

تشریف فرما مرضی میں یہ دوائے چھاتی پر دکھائی دیتے ہیں، یہ دوائے
 ایک دن کے نکلے ہوئے دوسرے دن مر جاتا ہے،
 دوسرے دن اور نکل آتے ہیں، درمیان دن میں تمام دوائے نکلنے کے بعد
 مر جاتا ہے۔

علاج :۔ عمرنا یہ مرض خود ہی رفع ہو جاتی ہے، اگر ضرورت پڑے
 تو بونٹ، سیٹ، زنگ، اوکسائیڈ، مہیدہ، تینوں کو ملا کر زخموں پر چھڑک لیں،
 اگر مر جاتا ہو، تو مقوی غذا دیں، اگر تب محرقہ ہو، تو آریو مائی سین
 اس کا تریاق ہے۔

LECO DERAMA

(لکودرما)

پیشہ ہر کی

تشریف فرما اس مرض میں مر جاتی جا ہی سفید ہو جاتا ہے،
 وچو بارستہ، یہ مرض چھاتی کھا کر دودھ پینے سے اور دودھ پی کر زکشت
 چیزوں کے استعمال سے ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ مرض موردی ہوتی ہے،
 تشریف فرما جسم پر جا بجا سفید داغ دکھائی دیتے ہیں، جو آہستہ آہستہ بڑھتے
 جاتے ہیں، یہ عام طور پر ہاتھ، پاؤں اور چہرہ پر دکھائی دیتے
 ہیں، اگر یہ داغ چھوئے ہوں، تو جلدی شفا ہونے کی توقع ہوتی ہے،
 اگر بڑھے ہو جائیں، تو ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔

اس مرض کے علاج میں تمام ادویات سے بڑھ کر باجی کی تشریف کی
 گئی ہے، اس سے مکمل شفا ہو جاتی ہے، اور کئی ایک کمپنیوں نے باجی کے
 مرکبات تیار کئے ہیں جن کو اس کا مجرب علاج قرار دیا ہے، لیکن یہ مرض
 عسر و ہر ہے، اور اس کا دیر پا علاج جاری رکھنا پڑتا ہے۔

لشخہ: ہر باہی ایک سیرے کہ کوڑہ لگی ہیں ڈال کر پٹال جنٹرن کے ذریعہ تیل کشید کریں، خوش رنگ، سنہری مائل تیل پر آم ہوگا، روزانہ برش سے داغوں دن میں دو تین بار لگائیں، اور خوردنی طور پر چار قطرے دودھ میں ملا کر صبح و شام بعد از غذا کھلائیں

بسمۃ کمبہنی کلکتہ نے بھی باہی آکل تیار کیا ہے جو داغوں پر لگایا جاتا ہے
لشخہ: ہر ہڑتال و رقبہ ۲۰ حصہ، باہی ۱۲ حصہ، ہار یک پیس کر سفوف تیار کریں، پانی میں رگڑ کر سفید داغوں پر لگائیں، دو ہفتہ کے استعمال سے داغوں کی رنگت تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی مفید لشخہ ہے،
ہومیو پیتھی کی دوا ہائیڈرو کوٹائل مدر ٹیکچر اس مرض کا تجرب اور شافی علاج ہے۔ لیکن یہ دوا مسلسل تین چار ماہ استعمال کرنی پڑتی ہے روزانہ ۴ قطرے پانی میں ملا کر صبح و شام کھلائیں
لائیکو آر آر سنگ ۳ قطرے پانی میں ملا کر بعد غذا پلانا بھی مفید ہے۔

لاہور سور رمفلائی بھوڑا

لشخصیات و وجوہات: ہر یہ ایک متعدی جراثیمی مرض ہے، اس مرض کی ابتدا ایک پھنسی سی ہوتی ہے، کچھ عرصہ بعد پھنسی زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور زخم کے کنارے سخت ہو جاتے ہیں، یہ زخم جلد کی عام سطح سے اونچا بیجا ہوتا ہے زخم آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھیلنا جاتا ہے، بعض اوقات خود بخود رفع ہو جاتا ہے، ابتدا یہ پھنسی اکثر چہرہ اور بازوؤں پر پیدا ہوتی ہے۔

علاج: ہر مزروع مرض میں انٹی سپٹک پولس لگانی چاہیے،

اگر درد اور تناؤ ہو، تو شکاف دے کر مواد کو کھرج کر دیا کریں، اور مرہم لگائیں۔

کاربالک گلیسرین یا آکل کاربالک میں گاذر کر کے زخم پر رکھیں۔
پروکین پینی سلین ۴ لاکھ یونٹ ہر چوبیس گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن لگائیں، نہایت مفید و تجرب ہے۔

چونکہ یہ مرض عام طور پر ذیابیطس اور کثرت شراب خوردی سے ہوتی ہے، اس لئے قارورہ کا امتحان کرنا ضروری ہے۔

نشوہ مرہم، برشتنگٹ، فلفل سیاہ، کھنکھنہ سفید، زرد چوب ہر ایک ۳ ماشہ، ہلیہ، ہلیہ، آملہ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔

سب کو علیحدہ علیحدہ پیس لیں، سو ۴ ماشہ لے کر روغن گاؤ اتولہ میں گرم کر کے پگھلا لیں، ۴ ماشہ پارہ ملا کر تمام دواؤں کو باہم ملا کر خوب حل کریں، مرہم تیار ہے۔

بعد ضرورت تپڑے پر لگا کر مقام ماذف پر لگائیں، لاہور سور کے لئے مفید ہے۔

دینی سی لین ایس ہارر ساختہ پانک ڈیوس (یہ اعلیٰ قسم کی پینی سی لین ہے، جس میں پروکین پنسلین اور کریسٹالین پنسلین مناسب مقدار میں شامل ہوتی ہیں، ایک ٹیکے کا اثر ۲۴ گھنٹے رہتا ہے، متعدد قسم کے جراثیم ہلاک کرنے اور ان کی نشوونما روکنے کے لئے عمدہ موثر ہے۔ خاص کر لاہور سور، سوڈاک، نمونیا، سرسہم اور اسی قسم کی دیگر بیماریوں میں سریع التاثر دوا ہے۔

مقدار استعمال: ہر ۲۴ گھنٹہ پانک ڈیوس کا عضلاتی ٹیکہ ۲۴ گھنٹہ بعد شدت حالات میں صبح و شام بھی لگائے جاسکتے ہیں۔

باب شانزدہم

بچوں کی بیماریاں

CHILDREN DISEASES

ر چلڈرن ڈیزیز

بچوں کی بیماریوں کے علاج سے ہر ایک معالج کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے
بچوں کی عام بیماریوں کی تشخیص اور علاج کو تفصیل سے تحریر کیا جاتا ہے۔
بچوں کی قسمیں بچے مرنے کے لحاظ سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔
(۱) صرف دودھ پینے والے بچے (۲) دودھ کے ساتھ

انا ج کھانے والے (۳) صرف اناج کھانے والے۔

پہلی قسم کے بچوں کو عام طور پر والدہ یا دودھ پلانے والی دایہ کی خرابی
سے اکثر بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ سردی اسباب کے علاوہ خراب دودھ
والدہ کا بھاری، نقتیل اور تالین غذا میں اور گلی سرطی باسی اشیاء کا کھانا
بچے کے لئے مرض کا سبب ہوتا ہے۔

تیسری قسم کے بچے سردی اسباب کے علاوہ اکثر زیادہ کھانے سے
بیمار ہوتے ہیں۔ اور پچاس فی صدی بچے قنض اور بد معنی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔

بچوں کی اکثر بیماریاں بڑے آدمیوں کی مانند ہوتی ہیں۔ لیکن بعض بیماریاں بچوں سے مخصوص ہیں جن کا جاننا ہر ایک معالج کو ضروری ہوتا ہے۔
 بیمار بچے کا معائنہ کرنا اور بچہ اپنی تکالیف خود بیان نہیں کر سکتا۔ اس لئے بیمار بچے کا معائنہ کرنے سے پہلے اس کی والدہ سے دریافت کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر تکالیف والدہ سے معلوم کر کے مرض کی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اور ایک تجربہ کار معالج بچوں کی اکثر بیماریاں صرف نگاہ ہی سے جان لیتا ہے۔ مثلاً چہرے اور جسم سے رنگت، مختلف نشانات، سانس کی تیزی، آنکھوں کی کیفیت، ہوش و حواس اور جسمانی ساخت وغیرہ اور بعض بیماریاں ندرے تحسین اور آلات تشخیص کی مدد سے معلوم کرنی پڑتی ہیں مثلاً بخار، منہ، حلق، ناک، کان، معدہ، امعاء، گردہ، مثانہ اور سینہ کی بیماریاں وغیرہ۔

یاد رہے۔ نئے کا معائنہ کرتے وقت بچے کو چلے، بہانے اور کھلونے وغیرہ سے مشغول رکھیں، کیونکہ بچے کے رونے اور دیگر حرکات سے تشخیص میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

اب ہم اپنے تجربہ کی بنا پر بچوں کی اکثر بیماریوں کی تشخیص بیان کرتے ہیں۔
 ۱۔ ایک بیماریاں بچے کے چہرہ سے نمایاں ہوتی ہیں۔

۱۔ تنگی تنفس کی وجہ سے نھنھوں کا چلنا۔ یہ خجھرہ کا خناق و بالی، مونہ قصبۃ الاریہ میں کسی خارجی چیز کا داخل ہونے کے سبب سے ہوتا ہے۔

۲۔ چہرے پر سرخ نشانات پڑ جانا۔ یہ خسرہ کی علامت ہے۔

۳۔ آنکھوں کا اندر دھنس جانا اور چہرے کی بے رونقی۔ جو شدید

اسہال، تھوہ، پیچش کی علامت ہے۔

۴۔ چہرے پر دم آ جانا اور رنگ کا پھیکا پڑ جانا۔ دم گردہ کی علامت ہے۔

آنکھوں کی نکالیف بھی چہرے سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

۱۵، چہرہ کی سرخی بخار اور درد کی علامت ہے۔

۱۶، لبوں کی گلابی رنگت صحت کی علامت ہے۔ رنگت کی کمی سرخائی

کی پردہ لست کرتی ہے۔ لبوں کا بیلا ہونا غویہ اور اعراضی تذبذب کی علامت

ہے۔ بخاروں میں لب خشک ہو جاتے ہیں۔

بچہ کے جسم میں درد

۱۷، اگر بچہ کے کسی حصہ جسم یا کسی عضو میں درد ہو۔ تو درد اسے تشدد کرتا ہے۔

بچہ ہاتھ کرتا اور اس کو چھوتا ہے۔

۱۸، اگر بچہ کے سر درد ہو۔ تو سر کا چمڑا سخت ہوتا ہے۔ آنکھیں پٹی ہو جاتی

اور سر کو اڑتا ہے۔ رونا ہے اور چہرہ پر سرخائی ہوتی ہے۔

۱۹، اگر بچہ تھکا ہوا ہو۔ اور بہت بے چین ہو۔ تو کان کا درد ہوتا ہے۔

بہت کان کو آہ، سر کو پ سے دیکھنا چاہئے۔ تمام طور پر بچہ کے کان کو دیکھیں

کان کا پردہ تھم ہوتا ہے جس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ اور بند رہتا ہے۔

بہت سے بہنے لگتا ہے۔ اور کبھی کان کی نالی میں شیشی کی وجہ سے بھی درد

ہوتا ہے۔ اور بچہ ہاتھ کان کی طرف ہاتھ سے جاتا ہے۔ کان کا

لگانے سے رونا ہے۔

۲۰، اگر بچہ چٹا کر روئے اور مہٹ کی طرف ہاتھ لے جائے اور پشیمانی

پر پڑے۔ تو درد شکم کا خیال کرنا چاہئے۔

۲۱، ہاضمے کی خرابی، قبض، ورم، بوزقین، بوسیدہ دانست اور منہ میں

چھالے ہونے کی وجہ سے سانس بدبودار ہو جاتا ہے۔

۲۲، اگر بچے کی زبان پر مہیل تہی ہوئی ہو۔ تو اسے قبض اور بد معنی ہوئی

ہے۔ شدید اسہال میں زبان خشک ہوتی ہے۔ اور بچہ پیاس کی زیادتی کی

وجہ سے زبان بار بار باہر نکالتا ہے۔

(۱۳) بخاروں میں بھی زبان پر میل جمع ہو جاتی ہے اور خشک ہوتی ہے
میعادی بخار میں زبان کے درمیان میل ہوتی ہے اور زبان کے کنارے اور سرا
بالکل سرخ ہوتا ہے۔ اور اس پر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔

(۱۴) تلی اور جگر کے بڑھ جانے سے پیچھے کی پسلیاں باہر کو پھیل جاتی
ہیں۔ اور پسلیوں کے پیچھے ہاتھ کے ساتھ دبانے سے تلی اور جگر بڑھتا ہوا
معلوم ہوتا ہے۔

(۱۵) اگر پیٹ بڑھ گیا ہو۔ اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہو۔ تو بچہ کو مٹی
کھانے کی عادت ہے۔

(۱۶) اگر آنکھیں زرد ہو گئی ہوں۔ تو مرض یرقان سمجھنا چاہیے۔

(۱۷) اگر بچہ پیشاب کرتے وقت اپنی آلت کو پکڑے اور رونا شروع

کر دے اور قطرہ قطرہ پیشاب کرے۔ تو مثلاً یا گردہ کی بیماری سمجھنا چاہیے۔

(۱۸) اگر بچہ کو نزلہ زکام ہو اور چہرہ کی رنگت سرخ ہو۔ اور بخار کی حالت

میں بار بار چھینکے مارے۔ تو خسرو یا جھک ظا سر ہونے کی علامت ہے۔

(۱۹) بچہ کو مسلسل دست، پیچش آنا، جسم کی جلد نرم ہو جانا، سینہ

میں ملغم کی کھڑکھڑاہٹ، کھانسی، ہلکا ہلکا بخار، چوڑوں پر جھریاں پڑنا،

جسم کا دن بدن کمزور ہوتے جانا، پیٹ کا بڑھ جانا، ٹانگوں کا سوکھ جانا

بچوں کی تب دق اور سوکڑاکی علامت ہے۔

(۲۰) اگر بچہ کو بخار اور کھانسی ہو۔ سانس جلد جلد لیتا ہو اور سانس تنگی سے

آئے۔ سانس لیتے وقت نتھنے پھولتے ہوں۔ اور سانس لینے سے پسلی کے

نیچے گڑھا پڑتا ہو۔ اور بے چینی بھی زیادہ ہو۔ تو یہ مونیہ اور ذات الجنب

کی علامت ہے۔

(۲۱) اگر بچہ کا پیٹ بڑھا ہوا ہو، تو بطن شکم، قبض شدید، کساح، مادیق، باریطون کی شکایت ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔

(۲۲) اگر نطوں میں سوزش ہو، تو پاخانہ کا رنگ سبز ہوگا، جس میں پانی اور بطن زیادہ مقدار میں خارج ہوں گے، اور چوڑا سرخ ہو جائیں گے۔

تجربہ اور مشاہدہ سے بچوں کی تمام بیماریوں کی تشخیص میں کوئی مشکل نہیں رہتی، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، کہ معالج غور و فکر کرنے سے مرض کی تہ تک نہ پہنچے، جلد بازی سے بچوں کی مرض کی غلط تشخیص ہو کر علاج میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔

یاد رکھنے کی چند باتیں

بچوں کی پرورش اور نگہداشت والدین پر فرض ہوتی ہے، اور بچے کی بیماری کی حالت میں بھی تمام تکالیف اور اخراجات علاج وغیرہ بھی والدین کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، بعض اوقات جب بیماری آخری درجات پر ہوتی ہے، اور بچہ قریب المرگ ہوتا ہے، تو اکثر والدین سے یہ سنا گیا ہے، کہ اس بچے کی بجائے ہمیں یہ بیماری آجائے اور یہ زندہ رہے، لیکن جب اس کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ اس سے بچنا امر محال ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت نہ آئے، پھر آخر میں بچہ کی موت کا صدمہ بھی سہنا پڑتا ہے، اور اس مصیبت اور جدائی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اس میں مبتلا ہو۔

لہذا والدین کو مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

۱۔ بچے کو موسم کے لحاظ کے مطابق لباس پہنانا چاہیے، اور گرمیوں میں گرمی سے اور سردیوں میں سردی سے بچہ کو محفوظ رکھنا ہے۔

۱۲۔ اگر بچہ کی حالت میں کسی قسم کا فرق آنے لگے، اور بچہ حسب سابق نہ ہو، تو فوراً کسی لائق حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ملا خطہ کرانا چاہئے، اور مندرجہ ذیل بیماریوں کا خاص خیال رکھیں۔
 ۱۳۔ قنص اور بد تنفسی کا خاص خیال رکھنا چاہئے، یہ مرض بچوں کو اکثر ہوجاتا ہے۔

۱۴۔ دست پیش پیش بچے کی جان لیوا بیماریاں ہیں، ان سے بچہ بہت جلد کمزور ہوجاتا ہے، ان کا فوراً علاج کرانا چاہئے۔
 ۱۵۔ نزلہ، زکام، بھونچوں کے لئے بہت بڑی مرض ہے، کیونکہ کھانسی، نوبہ، خنجر، چیچک وغیرہ اس کی وجہ سے ہوجاتی ہیں۔
 ۱۶۔ بچوں میں گلے، سرفہ، اور کان کی تکالیف عام ہوتی ہیں، گاہے گاہے کسی عصبانیت کو رکھتا ہے رہنا چاہئے۔
 ۱۷۔ ہمارے بچے کو تندرست بچوں سے غلطیہ رکھنا چاہئے، اگر غلطیہ مکرے ہیں نہ رکھ سکیں، تو کم از کم بیمار نہ بچے کے ساتھ تندرست بچے کو نہ ملائیں۔

۱۸۔ بچہ کی والدہ کو ہر وقت کوئی چیز دینے کو افسوس ہونا یا کوئی اور نشہ آور دوا سرگز نہ کھلائے، کیونکہ اکثر مائیں کام کاج کی خاطر یا بچے کو سلاسنے کے لئے افیون وغیرہ کھلاتی ہیں، یہ بچے کے لئے بہت مضر ہے۔
 ۱۹۔ دودھ کو غذا صاف ستھری اور ہوا تازہ ہونی چاہئے، اگر ہو سکے تو دودھ، گھسن زیادہ استعمال کریں۔

۲۰۔ اگر والدہ کو کوئی مٹی اور گندی شیا کھانے کی عادت ہو، تو اسے ترک کر دینا چاہئے، بچے کے ہاتھ میں دیا سلائی سرگز نہ دینی چاہئے، بچے اکثر اپنے ہاتھوں خود آگ لگا بیٹے ہیں، دیگر ہر قسم کی احتیاط رکھنی چاہئے۔

بچوں کے معالج کو چند مبادیات

ہر ایک معالج کے لئے ضروری ہے کہ جب تک بچے کی مرض کی اچھی طرح صحیح تشخیص نہ کر لے، بچے کو ہرگز دوائی نہ دے، کیونکہ بچے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، جو معمولی اثر کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور دوائی کا تو بہت جلد اثر ہو جاتا ہے اس لئے اگر صحیح تشخیص کے بغیر دوائی دی گئی، تو بچے پر فوراً اُلٹا اثر ہو جائے گا، جس سے بچے کی صحت اور خراب ہو جائے گی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری معالج پر عائد ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس غلط تشخیص کا خیارہ دنیا میں نہ کھلتا پڑے، لیکن آخرت میں ضرور اس کا جواب ذہ ہونا پڑے گا، بعض اوقات معالج کی غلط تشخیص سے بچے کو صحیح دوا نہ ملنے پر زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لئے بچے کی تشخیص کرتے وقت جسمانی ساخت، چہرہ، زبان، پاخانہ، پیشاب، بھوک، پیاس، ترافت، نیند، بیداری اور نا اور دیگر علامات کو بہت غور و کھینچنا چاہئے۔

بچہ کو زیادہ نشہ آور اور تیز ادویہ نہیں دینی چاہئیں، بلکہ معمولی دوا میں دینی چاہئیں، اور مقدار خوراک عمر کے مطابق ہونی چاہئے۔

بچوں کے علاج میں دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہئے، بعض اوقات دوائی کی نسبت پرہیز زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اکثر دفعہ بچے کو دوائی دینے کی نسبت بچے کی والدہ کو دوائی دینا زیادہ مفید اور موثر ہوتا ہے، کیونکہ بچہ والدہ کا دودھ پیتا ہے، اور اس کا اثر بچہ کو پہنچتا ہے۔

اس باب میں بچوں کی مخصوص اور عام ہونے والی بیماریوں کا علاج تحریر کیا جاتا ہے اور عام بیماریاں مثلاً درد سر، نزلہ، زکام، آنکھ دکھنا، گھرے، سفیدی چشم، کان درد، کان بہنا، گلے آنا اور دوسری بیماریوں کا علاج ان امراض کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔ بچوں کی بیماریوں اور ان کے علاج کے متعلق میری تصنیف آئینہ امراض اطفال ملاحظہ فرمائیں۔

ام الصبیان

INFANTILE CONVULSION

(ان فتیائل کنولشنز)

تشخیص

وجوہات و تشخیص : اس مرض میں بچوں کے ہاتھ پیروں میں ٹیچ واقع ہوتا ہے
آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں۔ شدید حالتوں میں بے ہوشی بھی ہو
جاتی ہے عصبی والدین کی اولاد میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ ناقابل معصم غذا
کرم حکم، دانت نکالنا، رکش اور بخار بھی اس کے اسباب ہیں۔
علاج : اس عصاب کو تسکین دیں، اور اصلی سبب کو رفع کریں، تشنج
کی طرح دوسے کو رفع کریں۔

حب جندہ : ہر جندہ دار، عود صلیب، جندہ بیدستر، مشک جوڑوا،
دارچینی ہر ایک عم وزن، عرق سولف کے ساتھ کالی مرچ کے برابر گولیاں تیار کریں،
خوراک ایک گولی صبح و شام ماں کے دودھ یا عرق سولف سے دیں،
ام الصبیان کے لئے بے حد مفید ہے۔

نسخہ : ہر سہ ہر دو ماہ ۶ گرین، ایکو ۲ ڈرام، یہ ایک خوراک ہے۔
تین سال کے بچہ کو ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین دفعہ دیں۔ ام الصبیان کیلئے مفید ہے
دولے ام الصبیان : ہر عود صلیب اٹلہ، آرد جو اٹلہ، ہار ایک سولف
تیار کریں، ایک ایک رتی کے برابر گولیاں تیار کریں، بوقت ضرورت ایک گولی عرق
گلاب میں گھسی کر کھلائیں، ہر دو گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں، ام الصبیان کے لئے
بے حد مفید و مجرب ہے۔

حب ام الصبیان : ہر مغز کر بخوہ، نفل سیاه، سوخہ، مغز حمالگوٹہ
مدہ ہر ایک ایک اٹلہ، ہر ایک پس کر عرق سولف میں بقدرمانہ مونگ گولیاں بنائیں

مقدار خوراک ایک ایک گولی دن میں دو بار عرق سولف سے دیں۔
اس کے استعمال سے ایک دو جلاب ہو کر ام الصبیان کے دورے اور دیگر
علامات رفع ہو جاتی ہیں نیز یہ دوا ذہن اطفال کے لئے بھی مجرب ہے۔
اکسیرام الصبیان : درجہ اولیٰ، جلوڑی، ہینگ، صبر سفوفی ہر
ایک ۶ ماشہ، زعفران ۳ ماشہ۔

تذکیب : در سب کو بار یک پس کر دانہ رانی کے برابر گولیاں بنا لیں۔
اور ایک گولی صبح ایک شام ماں کے دودھ یا پانی میں گھس کر دیں، مرض ام الصبیان
کے لئے بے حد مفید ہے۔

یادداشت : در ایک مہینہ میں مرض بالکل رفع ہو جاتا ہے لیکن اس
کے بعد بھی روزانہ ایک مرتبہ کچھ عرصہ تک کھلانا تمام عمر اس مرض سے محفوظ رکھنا
قبض کی صورت میں بچہ کو حقن کرنا چاہئے۔

تشخیص

وجوہات و تشخیص : اس میں بچوں کے بعض یا کل اختیاری علامات ہیں
انفیشن شروع ہو جاتی ہے، دراصل یہ دوسری بیماریوں کی ایک علامت ہے
مثلاً طبع، بخار، مزہ، دانست نکالنا، آنٹوں کے کپڑے، قبض، کزاز وغیرہ
غذا کی خرابی، دماغی تھلیوں کے امراض وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔
بچہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پیر سے ہو جاتے ہیں، منہ کا رنگ زرد
یا سرخ ہو جاتا ہے۔

علاج : در اصل سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کرنی
چاہئے، عام علاج یہ ہے کہ ادل، بچہ کو پلشت کے بل لٹائیں، مرندہ

اونچا رکھیں۔ قبض رفع کرنے کے لئے گلیسرین سپازمیٹری یا اینا کریں۔ اگر درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہو، تو سر پر سرد پانی کی دھار ڈالیں، یا برف کی ٹکڑیاں رکھیں۔ اگر بخار کی حرارت نہ ہو، تو گرم پانی میں رانی ڈال کر اس سے ہینڈ لیوں کو سوتھیں اور پھر خشک کر کے گرم تولیے یا کمیل میں لپیٹ دیں۔

اکسیسین ٹینج، مشک خالص، مینگ ایک ایک رتی، شہد، ماشہ میں ملا کر پیٹھیں۔ ٹینج رفع ہوگا۔

دوائے ٹینج: کلورل ہائیڈریٹ ۲ ڈرام، شربت سادہ ۴ اونس میں ملا لیں، ایک چھوٹا چمچہ کی مقدار بچہ کو پلائیں، چند خوراکیوں سے ٹینج رفع ہوگا۔ لیکن ایک دن میں تین چار دفعہ سے زائد نہ دیں۔

ٹینج کے علاج میں ہمارا معمول

اول مریض کی قبض بند رہے اینا یا تیز جلاب رفع کر دی جاتی ہے۔ اگر طیر یا بخار کی وجہ سے ہو، تو سر پر پانی سر پر ڈالنے سے مریض کو سوش آجاتی ہے۔ اور ٹینج رفع ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت کم ہونے کے بعد گرین کوئین کا ٹیکہ کیا جاتا ہے۔ اگر دماغی علامات سرسام کی مانند ہوں، تو ایک لاکھ یونٹ پینسلین کا ٹیکہ عضلی کیا جاتا ہے۔ اگر صرف اعصابی خلل ہو، تو مشک خالص اور مینگ دلائشہ کافی ہے۔ اگر ذکاوت حس تیز ہو، تو برومائیڈ اور کلورل ہائیڈریٹ اس کا استعمال ہے حد مفید ہے۔

دانت نکالنا TEETHING کی ٹھنک

دوا کا بچہ دودھ کے دانت نکالنا شروع کرتا ہے اور تین سال تک غرضی دانت نکل آتے ہیں۔

مستقل دانت ۶ سال کے بعد نکلنے شروع ہوتے ہیں، بارہویں سال تک عقل دانت کے سوائے سب دانت نکل آتے ہیں، دانت نکالنے کے زمانہ میں بچہ کو طرح طرح کی تکالیف، بے چینی، دست، قبض، کان بہنا، بخار وغیرہ ہو جاتی ہیں، اکثر تشیخ بھی ہو جاتا ہے۔

علاج ۱۔ معالج کو ایسی کوشش کرنی چاہیے جس سے دانت آسانی سے نکل آئیں، اور عارضی علامات بخار، دست وغیرہ کا علاج کرے۔
دانت نکالنے کے زمانہ میں بچے کو کوئی ٹھیک دار بڑھ کی چیز ہاتھ میں دینی چاہیے، تاکہ نہ میں ڈال کر دباتا رہے، نیم بریاں گوشت کا ٹکڑا، مریخ مسالیم سے دھو کر دیا بھی اچھا ہے، اس کو چبانے سے دانتوں کے اوپر کا گوشت کم ہو کر دانت آسانی سے نکال لیتا ہے۔

فیضنگ پوٹور ۲۔ مرکب دودھ چاک پیگڑین، کمپونڈ روڈرب پوٹور ۲ گرین، ایسی ایک ایک خوراک صبح و شام پائیں، یہ مقدار خوراک ایک سال کے بچہ کے لئے ہے، اس کے استعمال سے بچہ دانت آسانی سے نکال لیتا ہے۔

کیلسی مل ۳۔ ایک ٹمبیہ دودھ میں حل کر کے دس دن میں تین ٹمبیہ، دس دن میں دو ڈی، اٹیج، ایک ٹمبیہ دودھ میں حل کر کے دس دن میں تین ٹمبیہ دس دن میں دو ڈی دوا میں دانت نکالنے میں مدد دیتی ہیں، دانتوں کو کبڑا لگنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔

اکسپیر دانت نکالنا ۴۔ کیریافاس ۵، ۳ گرین دن میں چھ مرتبہ دس پانی کے ساتھ کھلائیں، بچہ کے دانت نکالنے کی تمام تکالیف سے دست، اسہال، نفخ، شکم، کمزوری وغیرہ کے لئے مفید و تجربہ روا ہے، اس کے استعمال سے بچہ دانت آسانی نکال لیتا ہے، دانتوں کے سوراخوں میں بھی مفید ہے۔

کیموسیلا ۶ . اگر دانت تکلیف سے نکلیں ، پھر کاہانہ خراب ہو ۔
 پیٹ میں درد اور سبز رنگ کے دست آتے ہوں ، ہر چار گھنٹہ بعد دوائی دیں ،
 سب کے پی سیسرب : ہر برگ اڑوسہ ایک سیر ، گاؤ زبان ۲۰ تولہ ،
 گل نیلوفر ۲۰ تولہ ، خوب کلاں ۱۰ تولہ ، طعنی ۱۰ تولہ ، سرطان نہری ۳ تولہ ،
 تمام ادویات کو صاف کر کے آٹھ سیر پانی میں بھگو دیں پھر جس گھنٹہ کے
 بعد قرع انہیق کے ذریعہ ۶ بوتل عرق کشید کریں ،
 کشید شدہ عرق میں ۶ تولہ چونا آب نارسیدہ ڈال دیں ، اور ۶ گھنٹہ
 بعد عرق کو منتقل کریں ، اب اس مصفا عرق میں ۱۲ ادنیس سپرٹ کیموسیلا لیں ،
 پھر اس میں ۶ سیر چینی سفید ملا کر بطریق معروف شربت تیار کر لیں ، پھر تیار
 شدہ شربت میں روز کلر ملا کر شربت کا رنگ سرخ کر لیں ، پس تیار ہے ،
 مقدار : خوراک ۱ ماشہ تا ۴ ماشہ تا ایک تولہ ٹمر کے لحاظ سے پانی میں
 ملا کر دیں ، یہ شربت بچوں کی اکثر امراض دست ، پیچش ، کھانسی ، بخار
 بد معنی ، دودھ آ لٹنا اور سوکڑا یعنی وق الاطفال کے لئے اکسیر ہے ،
 اس کے استعمال سے بچے موٹے تازے ہو جاتے ہیں ، اور دانت باسانی
 نکال لیتے ہیں ،

حب آزی ستفاخانہ میں یہ شربت اسی نام سے تیار ہوتا ہے ،

عطاس یا ہیضہ اطفال CHOLERA

ر کالرا

تشخیص

وجوہات و تشخیص : موسم گرما میں شیرخوار بچوں میں پیاس کی شدت ایک
 مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے ، بے چینی ، ہونٹ خشک ، پانی کو دیکھ کر

بے اختیار ہو جانا، تیز بخار، دماغی جھلیوں میں دم، سر کو اِدھر اُدھر مارنا،
بے خوابی، خوف کے مارے اِدھر اُدھر دیکھنا، تپتے اور دست کی شدت،
بعض اوقات ہاتھ پاؤں میں بھی تسخ ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا بڑا سبب
موسم کی گرمی ہے، گرمی میں محنت، مشقت اور آگ کے پاس بیٹھ کر کام
کرنے والی عورتوں کے بچے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جماع کرنے کے
ماں کا بچہ کو دودھ پلانا بھی اس کا بڑا سبب ہے، اگر بردقت علاج نہ کیا
جائے، تو بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

علاج: گرمی رفع کرنے کی کوشش کریں، بچے کو برف سے
سر دیکھا ہوا پانی کھوڑا کھوڑا ملائیں، دو تین گھنٹہ سے پہلے دودھ نہ پلانا
جائے، اگر گائے بھینس کا دودھ پلانا ہو، تو اس میں نیم دھوا پانی ملا کر
قلبی شدہ برتن میں ابال کر ٹھنڈا کر کے دینا چاہئے، سر پر گل روغن، سرکہ
اور گلاب میں پیڑی تر کر کے رکھیں، برف سے سرد کر کے گلو کو زواڑ پلانا
پیا س رفع کرنے کے لئے مفید ہے۔

دوائے عطاس: زہر مرہ، طباشیر، انار دانہ، سماق، نار جیل
الچی خورد ہر ایک بم دزن، ہر ایک میں لیس، دو تین رتی عمر کے مطابق دیں،
سہاں، تپتے، شدت کی پیا س اور گرمی کے امراض میں بے حد مفید ہے۔
سپینٹن آف سلفا گٹ ڈین مقدار خوراک، ڈوین دین میں چار
خوراک دیں، پھر ڈاکریا، اسہاں گومائی، عطاس مکے لئے بے حد مفید ہے

روح کیوڑو، روح بے مشک پانی میں ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔
کاغذی گھنڈی: دراز، اسپال، اقلہ، گوند، کیکر، تولہ، زعفران
دماشہ، انیسون، رتی، سب کو باریک کر کے کپڑ چھان کر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک کاغذ کا گول ٹکڑہ، اس میں کپڑ چھان کر لیں

سورخ بنا کر ذرا سی دوائی لے کر پانی میں حل کر کے کاغذی پر لگا میں، تالو
سے بال اتار کر کاغذی لگا دیں، تین دن متواتر لگی رہنے دیں، چوتھے دن
اس کے اوپر تیل سرسوں لگا دیں، کاغذی خود بخود اتر جائے گی۔
بچوں کے مرض عطاس، بے قراری، بے چینی، تالو کا نہ چلنا
دم دماغ، دست، اسہال وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے۔
ضماد عطاس :- صندل سرخ ۳ ماشہ، کافور ۱ ماشہ، عرق گلاب
۱ تولہ، تمام ادریک کو باجم رگڑ کر سر پر ضماد کریں، نہایت مفید ہے۔
اکسیر عطاس :- کافور ۱ ماشہ، کشیز ۳ ماشہ، طباشیر ۳ ماشہ
نہر مہرہ ۱ ماشہ، عرق گلاب ۲ تولہ میں پیس کر بقدر وہ نہ مونگ گویاں بنا لیں،
مقدار خوراک انگوٹھی بھرا عرق بید مشک، کیوڑہ و کاسنی ۲ تولہ ملا کر
دیں۔ دن میں چار یا پنج مرتبہ، عطاس کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

کف

کھانسی
COUGH

وجوہات و تشخیص :- یہ مرض بچوں کو عام ہوتا ہے، اکثر گلے کی خرابی
زکام، مونہ، حشرہ، سر دی گھنا وغیرہ سے ہو جاتی ہے۔
علاج :- اصل سبب کو رفع کریں، سندھ جہ ذیل نسخہ جانتے استعمال کریں
جوشندانہ کھانسی :- گل بنفشہ ۱ ماشہ، عناب ۱ عدد، لسوڑیاں
۴ عدد، رقم خٹمی ۱ ماشہ، گاوزبان ۱ ماشہ، اصل السوس ۱ ماشہ۔
ایک چھٹانک پانی میں، اباں کر چھان کر قند سفید ملا کر دن میں
چار دفعہ پلائیں۔

خواتین کے لئے بے حد مفید و مجرب ہے۔

لعوق کھانسی، کارڈاسینگی، ناگرموختہ، آتیس، ہم وزن پسین، شہد
میں ملا کر نیچے کو چٹائیں، بچوں کی کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے لئے مفید و مجرب ہے
اکسیر کھانسی، بچوں کی ہر قسم کی کھانسی کے لئے از حد مفید ہے، سینے
کے امراض میں اس کا نسخہ درج ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں،

کرشنا آدی چورن، برفل دراز، آتیس، ناگرموختہ، کارڈاسینگی
ان چاروں ادویات کو برابر وزن میں باریک پس کر ملا لیں،

مقدار خوراک آٹا ۲ رتی شہد میں ملا کر چٹائیں، یا شربت منقشہ سے
کھلائیں، بچوں کے بخار، اسہال، کھانسی، دمہ اور سرفے کے لئے اکسیر ہے،
بدھنی اور دورہ کی اُلٹی تھے کا مجرب علاج ہے،
۳ منم، کسچر کھانسی، ابوینا کارب ۲ گرین، وائیم اپیکاک ۳ منم، سیرپ سٹلا
۳ منم، ٹنگر ٹسینگا اڈرام، ایجو ۲ اونس،

اس میں سے ایک چمچ بھر جائے دن میں چار بار دیں، ایک سال کے بچے
کے لئے مفید ہے، کھانسی کے لئے بہترین دوا ہے،

جب ہوائی نالیوں میں ملغمہ بکثرت جمع ہو، تو ایسی حالت میں تھے اور ملغمہ خارج
کہ نوالی دوائیں استعمال کرنی چاہئیں، ایون اور اس کے مرکبات سرگز نہ دیں،
کسچر کھانسی، اسوڈم سائٹر اس ۵ گرین، ٹنگر اپیکاک ۵ منم، ٹنگر کیمفیر کو
۵ منم، سیرپ ۵ منم، ایجو اکورونام ۶ منم،

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں، کھانسی کے لئے مفید ہے،
بعض اوقات بچوں کو پھیپھڑوں کی باریک نالیوں کی سوزش کی وجہ سے شدید
کھانسی ہوتی ہے، جس میں نہ تو ایون کے مرکبات دے جاسکتے ہیں، اور
نہ ہی مخرج ملغمہ ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں، ایسی حالت میں یہ نسخہ
بے حد مفید ہے،

آریو مانی مسین ایک کیپ شول، گلوکوز اڈرام، باہم ملا کر ۸ خوراک
 تیار کریں، دن میں ۴ خوراک دیں، ردودن کے استعمال سے سجد افاقہ ہو جاتا ہے
 ہو مویو پیچھی علاج بچوں کی کھانسی کے لئے اکونائٹ، سیلا ڈونا
 برالی دینا، آرسنک، ہیر سلفر، سپر نجیب
 مفید ادویات ہیں۔

کالی کھانسی (HOPEING COUGH) ہو پنگ کف

وجوہات و تشخیص :- یہ بچوں کا مستعدی مرض ہے، چھوت لگنے کے بعد
 ایک ہفتہ سے دو ہفتہ تک ظاہر ہو جاتا ہے، شروع میں سخت کھانسی، زکام
 بخار پھر صرف کھانسی کے شدید دور سے ہوتے ہیں، جس میں اکثر بچے کو
 مٹی آجاتی ہے۔

علاج :- اس مرض کا شافی علاج معلوم ہو چکا ہے، اب اس کے
 علاج میں کوئی وقت نہیں رہی۔

دوا سے کالی کھانسی :- رگندم، اتورہ، قند سیاہ ۰۲، تولہ، نمک لاہوری
 اتورہ، کا کڑا سہنگی اتورہ، گل حکمت کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں، سرد
 ہونے پر باریک میں کر محفوظ رکھیں۔

مقدار خوراک :- ماشہ شہد میں ملا کر چٹائیں، کالی کھانسی کی جھرب دوا ہے
 تریاق کالی کھانسی :- رنفل دراز ۴ عدد وے کر کاے کرے کی تلی میں گاڑ دیں
 کوزہ گلی میں بند کر کے ۱۰ سیراپوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال کر سفوف تیار کریں
 مقدار خوراک ۲ رتی شہد میں ملا کر دن میں دو بار دیں، بچوں کی کالی
 کھانسی کو چار پانچ دن میں بالکل رفع کر دیتی ہے، عجیب و غریب نسخہ ہے۔

اکسیر کالی کھانسی :- سہاگہ سفید ۵ تولہ ، مشکبیا سفید اتولہ ، دونوں کو
کنوار گندل کے رس میں تین دن تک کھول کر کے ٹکیہ بنالیں ، خشک کر کے مٹی کے
کوزے میں بند کر کے گل حکمت کر کے ایک من اپوں کی آنچ دیں ، سرد ہونے
پر نکال کر اچھی طرح کھول کر دیں ، اور اس میں ۲۰ تولہ مصری کوزہ ملا لیں ،
مقدار خوراک ۲ رتی تا ۴ رتی ہمراہ شہد ، شربت یا پانی دیں
کالی کھانسی کے لئے اکسیر ہے ۔

دو لئے کالی کھانسی :- نیلا گھوٹا بریاں ۴ رتی ، سہاگہ سفید ۴ تولہ
برابر تین گھنٹہ کھول کر دیں ، پس تیار ہے ۔

مقدار استعمال ۳ تا ۴ رتی دن میں دو تین مرتبہ استعمال کر دیں
بچوں کی کالی کھانسی کے لئے لاثانی دوا ہے ۔

نسخہ :- سہاگہ سفید بریاں اتولہ ، ملٹھی منتشر ۲ تولہ ، لشف سیر پانی
میں جوش دے کر ایک بوتلی شربت تیار کر دیں ۔

مقدار استعمال ۵ تا ۱۰ ابوند دن میں چار بار دیں ، بچوں کی ہر قسم
کی کھانسی کے لئے اکسیر ہے ۔

اکسیر کالی کھانسی :- آریو مائی سین ایک کیپ سٹول ، گلوکوز ۱ ڈرام ،
آریو مائی سین کو کیپ سٹول سے نکال کر گلوکوز میں ملا لیں ، اور اس کی ۸ خوراک
بنالیں ، یہ دو سال کے بچہ کی خوراک میں ، سر جا گھنٹہ بعد ایک خوراک پانی
سے دیں ، ایک دن میں ہی کالی کھانسی کو ناکارہ شروع ہو جاتا ہے ، ۴ دن
کے استعمال سے بالکل آرام ہو جاتا ہے ، دیسے پانچ سات دن استعمال
کرنا چاہئے ، علاوہ ازیں زکام ، منو نہ مینا دی بخار کیلئے بھی اکسیر ہے ،
معمول و تجرب ہے ۔

نوٹ ، کالی کھانسی میں آریو مائی سین ۲ پونڈ جسمانی وزن کے مقابلہ میں

۵. لی گرام دی جاسکتی ہے۔

تزیاتی کالی کھانسی :- کلوروما لی سیٹن یا لی ٹیٹ ایک میڈٹ دراز
بارک ڈیوس کبھی کی تیار کردہ ہے۔ تین سال کے بچے کو ایک چمچہ سرچھہ گھنٹہ بعد
دیں۔ کالی کھانسی، مبعادی بخار، زکام، نمونہ کے لئے اکسیر سے معمول و تجربہ
کالی کھانسی کا نسخہ :- ٹینکچر ہیلڈ ڈونا ۳۳ میٹم، سیرپ ٹوٹو ۱۰ میٹم،
گلیسرین اڈرام۔ ملا کر لعوق بنا دیں، چھوٹے بچوں کو دن میں تین دفعہ چٹائیں
کالی کھانسی کے لئے مفید اور تجربہ ہے۔

کالی کھانسی کا ہومیو پیتھی علاج

اگر بچے میں کافی سکت ہے اور کھانسی وقت منہ سرخ ہو جاتا ہے، اور بہت دیر
تک کھانسی آتی رہتی ہے، اور آخر میں تے ہو جاتی ہے مگر طعم کچھ بھی نہیں نکلتی
ایسی حالت میں ہیلڈ ڈونا ۳ دیں، اگر تھجانی طعم سے بھری ہوئی ہو، اور کھانسی
ہوئے بھی بہت کم مقدار میں نکلے، تو انٹی مونیم ٹارٹ ۶ سے ۳۰ دیں جب
کھانسی کے دورہ میں گلے کے گھسنے کا احساس پایا جائے اور شیخ تک ٹوٹ
پہنچے۔ تو کیورٹم میٹیکم ۳ دیں۔ اگر ہر وقت تے کی طرف طبیعت کا میلان ہو
اور بے چینی بھی بہت ہو، تو ایکاک ۳ زیادہ مفید ہوگا، جب کھانسی کی
تکلیف کو شروع ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہو اور بیمار بھی کمزور ہو چکا ہو۔
اور ہر ایک دورہ کا خاتمہ تے کے آنے پر ہو، تو ڈوڈسرا ۱۰ زیادہ مفید
ہے۔

بطور حفظ یا تقدم ڈوڈسرا ۶ x تندرست بچوں کو صبح و شام کھلایا
جائے، تو دوسرے بچے اس تکلیف سے محفوظ رہیں گے، اگر ڈوڈسرا ۱۰ x
ہر ایک دورہ کے بعد اور کھانسی کے دوران دی جائے، تو زیادہ مفید ہوگا۔

دمہ اطفال (الاستھما) ASTHMA

وجوہات و تشخیص در اس مرض میں بچہ کو سانس مشکل سے آتا ہے۔
چھاتی میں کھرکھراہٹ ہوتی ہے، اور مریض دمہ کی طرح جلد نلاماست ہوتی
ہے۔ کمزور بچوں کو اکثر یہ مرض ہوتی ہے۔
علاج: در بچے کا من سبب علاج کو سننے سے باطل صحت ہو جاتی

ہے۔ دور درفع کرنے کے بعد مقوات کا استعمال بہت مفید ہے۔
یعنی ڈرین سلیم گربن، ایسی بک بخورک بنیں دو بار جمع دشام دیں۔
۵ سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے ہے۔ دمہ کے لئے مفید ہے۔
سکانش ایٹس، واٹر بریز کمپنڈ، کپسل کوڈ لیور، ٹیبلٹ پیچھڑوں کو
تقویت دینے کے لئے بہت مفید ادویہ ہیں۔

دمہ اطفال کا ہومیوپیتھک علاج

اگر ات کو دم گھٹنے کا احساس ہو اور چھاتی میں کئی دفعہ کی موجودگی پائی جائے،
اور کھانسنے وقت بار بار آئے، تو ایک ایک ۲۰ دیں، اگر صبح جا سب
بیٹے رہنے سے مرض میں افاقہ ہو، تو براتی کو دینا ۲ بہتر ہوگا، اگر گھٹنے
کے ساتھ اگر سرد سہیہ آئے اور تنہا بھی بوجہ کمزوری کے نہایت مدہم ہو
تو آرمینک ایل ۶ بہترین چیز ہے۔ اگر اہستہ کے لی بیٹنے یا آگے کی طرف
تھکنے سے تکلیف میں افاقہ محسوس ہو، تو نکس دایلیکا ۶ مفید ہوگا۔
اگر پیچھڑوں میں گرد و غبار کی موجودگی کا احساس پایا جیسے، تو مضر ۳
مفید ہوگا۔ دورہ کے وقت ہر ۱۵ منٹ کے بعد دوا لی رکی جائے، اس
کے بعد ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

ذات الریه دہ اطفال PNEUMONIA نمونیا

وجوہات وخصائص در یہ مرض بچوں کا نمونیا ہے۔ سانس لیتے وقت بچہ کی دونوں پسلیوں کے نیچے گڑھا سا پڑتا ہے۔ اور سانس کھینچ کر لیتا ہے۔ اور جلد جلد لپٹا ہے۔ بخار، کھانسی وغیرہ اس مرض کے ہمراہ ہوتے ہیں۔

علاج :- ایسی علامات شروع ہوتے وقت بچہ کی چھاتی پر میسٹر اینٹی فلو جیٹین یا روغن تارپین کی سانس کر کے روئی کا گرم مندرہ باندھ دیں۔ اور گرم انبا میں بیٹائیں۔ سردی سے محفوظ رکھیں۔ حقنہ، پچکاری یا دوائی سے قبض رفع کریں۔ مرض نمونیا میں جو نسخے لکھے گئے ہیں استعمال کریں۔

ایم ایچ ۶۹۳ حسب عمر ہمراہ سوڈا بائیکا رب استعمال کرنا نمونیا کا شافی علاج ہے۔ یا کسچر وغیرہ استعمال کریں۔

ڈیہ کا تجربہ نسخہ :- سہاگ نیم بریاں ازلہ، لونگ ۶ ماشہ، ابلو ۲ ماشہ، باریک میں کرغذی گولیاں بنا لیں۔ وقت ضرورت ایک گولی ماں کے دودھ میں گھس کر پلا دیں۔ اور نیچے کی ماں آدھ گھنٹہ تک گرم رضائی میں لیٹی رہے۔ تاکہ بچہ کو گرمی آجائے۔ ایک گولی سے آرام ہو گا۔ اگر کچھ کسر رہ جائے۔

لڑ ایک دو گولیاں اور دے دیں۔ ڈیہ اطفال کا تجربہ نسخہ ہے۔

دیسنگس سباز دل گولیاں بھی بلحاظ عمر استعمال کرانے سے ڈیہ اطفال کو آرام ہو جاتا ہے۔

چھٹکلہ :- عصارہ ریونڈارنی تا ۳ رتی گرم پانی میں گھس کر پلا دیں۔ اسی وقت ایک دو دست ہو کر اور فٹے ہو کر آرام آجائے گا۔ نہایت اچھا نسخہ ہے۔

دوائے ڈوبہ اطفال : در معزز کر بخود ۲ عدد . نبدہ مخرقہ مصفا رقی
 خوب کھول کر کے گولیاں بقدر سہ رقی بنا دیں ، ڈوبہ اطفال کے لئے اکسیر ہے ،
 گولی پانی میں گھس کر پلا دیں . فوراً تے ہو کر آرام ہو گا .

اکسیر ڈوبہ اطفال : در معزز جاگلوٹ پتہ دود کر وہ . پرانا نارجیل
 (گری کھوپہ) سڑا ہوا ہر ایک ۱۰ ماشہ ، معزز بادام ۳ ماشہ
 خوب باریک پس کر خوب بقدر دانہ باجرہ تیار کریں .

طریق استعمال : در وقت ضرورت ایک گولی پانی میں گھس کر پلا دیں ،
 دست ادرتے ہو کر خراب سے خواب حالت میں بھی آرام ہو جاتا ہے .

بچہ فوراً آنکھیں کھول کر ہوش میں آ جاتا ہے . ناامیدی امید سے بدل جاتی ہے
 ڈوبہ اطفال جدید علاج : در پشبین ۲ لاکھ پونٹ ، ڈسٹلڈ واٹر ۳ سی سی

صبح و شام ۲ سی سی کا عضلاتی ٹیکہ کریں . سینے پر یعنی منٹ ٹرین ٹائسن کی مالش
 کریں . اگر قبض ہو تو گلیسرین سپازمٹری یا گلیسرین کا انما کریں . اگر چھاتی
 میں زیادہ کھرکھراہٹ ہو اور سانس کی دقت ہو اور معمم کا اخراج نہ ہو ،
 تو تے کر دائیں جس کے لئے عصارہ ریلوند نہایت مفید دوا ہے . مقدار

۲ رقی نیم گرم پانی میں حل کر کنبے کو پلا دیں . پندرہ بیس منٹ میں دست ادر
 تے آ جا میں گے . اس کے بعد سپازمٹری یا سلفا ڈایازین سہ ٹکیہ ، گلوکوز
 ۳۰ گرین ، گم اکیشیا ۱۰ گرین ، سوڈا بائیکارب ۲ گرین ، ایجو ۳ ڈرام

کاسچر بنا کر دیں ، دن میں ایسی چار خوراک دیں ، ایک ہی دن میں بچوں کے
 مٹونہ کی تمام علامات بخار ، تنگی تنفس ، معمم وغیرہ رفع ہو جاتی ہیں .
 ہزاروں بچوں کو اس علاج سے شفا ہو چکی ہے . ہمارا معمول مطلب ہے .

نوٹ : کھانسی کو روکنے کے لئے افینون یا اس کے مرکبات کا
 استعمال اچھا نہیں .

آریو مالہ سین ایک کیپ شول ۲۵ ملی گرام نوٹ کر اڈرم گلو کوڑ میں ملا لیں اور آٹھ خوراک دو تیار کریں۔ دن میں چار خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں، اور سینے پر گرم ٹکڑ کر دیں۔ یعنی منٹ ٹرین ٹائن کی ماس کر دیں، مونیہ کے لئے پینسلین کی طرح مفید و تجرب ہے۔ بلکہ ٹیکہ کرنے کی تکلیف سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے۔

یاور ہے: بچوں کے سانس میں بیجا عددگی بڑی عام چیز ہے، سانس کی تنگی اور نھنوں کا چھاننا مونیہ کی سب سے بڑی علامت ہے لیکن اس کے علاوہ خناق دہائی، قصبتہ الریہ میں کسی خارجی چیز کے داخل ہو جانے سے بھی سانس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے پھیپھڑوں کا آلہ اسے نھن کوپ سے امتحان کرنے کے بعد گلے کا امتحان کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ ورنہ علاج میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔

بچوں کے مونیہ کے علاج میں پینسلین سوڈیم جی اور پروکین پینسلین کے استعمال سے میں نے بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اور تقریباً سو فی صدی مریض بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں، مثلاً ذیادری کوئی بچہ جس میں ردی علامت پیدا ہو چکی ہوں، مستغایاب نہ ہوا ہو۔

سینے کی کھڑکھڑاہٹ اور بلغم کی زیادتی کے اخراج کے لئے عصارہ ریلوند استعمال کرتا ہوں، اس سے نئے اور دست ہو کہ بلغم کا اخراج ہو جاتا ہے تقریباً قلب اور سانس کی درستگی کے لئے کورائین بندریہ انجکشن حسب عمر استعمال کرتا ہوں، بچوں کے مونیہ کے علاج میں ان ادویات کو نہیں بھوننا چاہئے

حب ڈبہ اطفال، پوسٹ ریجٹ ۵ تولہ، مضبر اوتہ، مغز جہا گلوٹ مدبر اوتہ، طریبا ۶ ماشہ، بارکس میں کر بقدر دانہ مونگ گولیاں تیار کریں، ایک ایک گولی ماں کے دودھ میں گھس کر تین تین گھنٹہ بعد دیتے رہیں، جسے کہ دست شروع ہو جائیں، بچوں کے مرض ڈبہ کے لئے تجرب ہے۔

ترباق ڈبہ اطفال ہر عصارہ ریوند اٹولہ کیسول اماشہ سوڈا بائیکا رب
 ہم تولہ ہر پلو ایک ۲ تولہ ہر سفوف پتار کریں
 مقدار خوراک ادنیٰ ایک سال کے بچے کے لئے اس کی ایک خوراک
 کے استعمال سے فائدہ دست ہو کر ملغم صاف ہو جاتا ہے سانس کی تنگی
 سینے کی کھڑکھڑاہٹ وغیرہ بالکل درست ہو جاتی ہے دن میں دو تین بار دیں
 ڈبہ اطفال کا ہومیو پیتھی علاج

بچوں کے نوینہ کے شروع میں اکونائٹ اور چوبیس گھنٹہ بعد برائی ادینا یا
 فاسفورس استعمال کریں یہ ڈبہ اطفال کا تجرب علاج ہے

مضمی بدہ DYSPEPSIA دس پیسیا

وجوہات تشخیص دس پیسیا بچوں کو عام سونے والی مرض ہے خرابی غذا
 اس کا خاص سبب ہے

علاج خراب غذا کو ترک کریں اور مندرجہ ذیل نسخہ جات کا استعمال کریں
 سفوف ترباق اطفال ارتزید سفید مقششر پوسٹ ہلیہ زرد کلاماں
 پودینہ بائی ہر سہ ہم وزن باریک پس کر محفوظ رکھیں
 مقدار خوراک ایک سال کے بچہ کو ایک ماشہ دو سال کے بچہ کو
 ۲ ماشہ گرم پانی میں حل کر کے پلا دیں ایک دو دست ہو کر طبیعت صاف ہو جائیگی
 بدہ مضمی کا نسخہ عرق یولف عرق پودینہ عرق اجوائن ہر ایک
 تولہ تولہ بچہ کو پلانے سے ہر قسم کی بد مضمی پیٹ درد اچھا درد
 ہو جاتا ہے

اکسیر اطفال : در جلابہ ہر پڑ ، ر بوند خطائی ، گیشیا کاردب ہر ایک تھ لہ تولہ
 سندھ ۶ ماشہ ، کھانڈ ۲ تولہ ، سب دواؤں کو کوٹ حجان کر رکھ لیں ،
 مقدار خوراک ۲ رتی دن میں تین بار دیں پانی کے ساتھ ، بد معنی ،
 قبض ، ابھارہ ، نفخ ، پیٹ درد ، بخار ، دودھ کا پھٹنا ، خرابی غذا کی
 وجہ سے انتہال کا آنا کے لئے بے حد مفید ہے ،
 دو اے کے بد معنی : در دربر ۴ گرین ، سوڈا بائیکارب ۲ گرین ،
 جھڑ پاؤ ڈر ۲ گرین ، ایسی ایک خوراک بوقت ضرورت دیں ، بد معنی ،
 پیٹ درد ، نفخ شکم اور قبض کے لئے مفید ہے ،

فے مثلی VOMITING دوائے ٹنگ

تشخیص : وجوہات و تشخیص : در عموماً زیادہ دودھ پینے یا غذا کی خرابی سے بچوں
 کو تے اور مثلی ہو جاتی ہے ،
 علاج : در اصل سبب کو رفع کریں ، اور مندرجہ ذیل نسخوں میں سے
 کوئی سا استعمال کریں ،

نسخہ : در الہی خورد ، سولف ، پودینہ ، سوئٹ ٹین تین ماشہ لے کر
 کوٹ لیں ، اور آدھ پاؤ پانی میں جو کش دیں ، جب نصف رہ جائے ،
 کھنڈا کوٹ کے پیٹھا ملا کر چم حصہ بلا دیں ، اٹلی ، تے وغیرہ فوراً بند ہو جائے گی ،
 گلوکوز ۲ چمچہ خورد ، سوڈا بائیکارب ایک چمچہ ، پانی ایک گلاس میں
 حل کر کے کئی بار بلا دیں ،

دو اے کے مجرب : ایکریل اگریں ، ایردیشک چاک پوڈر ۲ گرین ، ایسی
 ایک پڑ بہ دن میں تین مرتبہ کھلائیں ، تے اور دستوں کے لئے بے حد مفید ہے ،

فے اطفال اور سفوف مٹھی، طباشیر کشتہ منکم، سوڈا بائیکا رب
 دانہ الائی خورد ہر ایک مساوی الوزن لے کر سفوف تیار کریں، بقدر ۲ رقی ہمراہ
 مشربت انار یا شہد چٹانے سے سخت سے سخت فے رک جاتی ہے،
 امرت دھارا پلہ منم کھانڈ میں ملا کر کھانا بھی فے کو روکتا ہے۔

فے کا ہومیو پیتھی علاج

ایکاک ۳۰ بچے کو خواہ کسی وجہ سے اُلٹی آتی ہو، یہ دوائی دینے سے یقیناً
 آرام ہو جاتا ہے، بچوں کی فے مثلی کا تریاق ہے،
 آرسنک البم ۳۰ یہ بھی فے مثلی کے لئے مفید ہے۔
 ہر قسم کی فے، مثلی کے علاج میں میں نے ایکاک کو اکسیرترن
 پایا ہے، بچوں کو فے، مثلی خواہ کسی سبب سے ہو، اس کو ضرور استعمال
 کرنا چاہئے، ایک دو خوراکوں سے فے رفع ہو جاتی ہے۔

پیٹ درد GASTRALGIA گسٹریلجیا

وجوہات و تشخیص : یہ بچوں کی عام بیماری ہے، بچہ روتا ہے، پیٹ
 سخت اور نفخ ہو جاتا ہے، گھٹنے سکیر کر پیٹ کو دباتا ہے،
 علاج : گلیسرین کی پچکاری یا بتی سے قبض رفع کریں، بچہ کیلے
 ۱۲ انس گلیسرین اینا کے لئے کافی ہے۔

دوائے درد پیٹ : ریلور بہائی، گرین، سوڈا بائیکا رب
 گرین، پانی میں حل کر کے پلا دیں، پیٹ درد، قبض، اچھارہ وغیرہ
 کے لئے مفید ہے۔

دو اسکے اچھارہ برکیٹرائل بقدر ۳ ماشہ یا کم و بیش پلانے سے بچوں

کا اچھارہ دور ہو جاتا ہے۔

اکسیری نسخہ آر گل بنفشہ، گل سرخ، سنار کی، بادبان، اصل السوس
ہر ایک ایک ماشہ، نصف چھٹانک پانی میں جو کش دے کر چھان لیں، اس میں
۶ ماشہ برکیٹرائل ملا لیں اور ذرا سی کھانڈ ملا لیں، یہ ایک برس کے بچہ کے لئے
ایک خوراک سے، بچوں کے پیٹ درد کے لئے اکسیر ہے۔

دو اسکے مالش برکیٹرائل اولہ، روغن تارمین اولہ، باہم ملا لیں،

بچے کے پیٹ پر نرم نرم مالش کریں، پیٹ درد کے لئے مفید ہے۔

پیٹ درد کے لئے چاروں عرق بھی مفید ہیں، نیز ذرا سی ہینک دودھ

میں ملا کر پلانا بھی پیٹ درد کے لئے مفید ہے۔

مکسچر برائے درد پیٹ، آر کلورل ہائیڈراس پ گریں، سپرٹ ایبوشا
ایرومیتک ۲۰ منم، ٹیکچر کارڈیم ۵ منم، گلیسرین ۲ منم، عرق سولف یا سویا
اڈرام، ایک چمچہ بعد از غذا دیں، بچوں کے نفخ اور درد پیٹ کے لئے مفید ہے

پیٹ درد کا ہومیوپیتھی علاج

کیمومیل ۳۰، یہ دوا پیٹ درد، نفخ شکم، تو لیخ، سبز یا زرد رنگ کے دست
۳۰ نکلیں، اور دانست نکالنے کی تکانیف میں ہر تین گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں،
کاربوویج ۶۰، بچوں کے پیٹ درد کے لئے مفید ہے، ہر ۵۱ منٹ
بعد ایک خوراک دیں۔

چاکنا ۳۰، یہ بھی پیٹ درد کے لئے مفید ہے، اگر کیمومیل سے
فائدہ نہ ہو، تو یہ دیں۔

ڈاسریا

DIARRHOEA

اسہال

وجوہات و تشخیص : اس مرض میں کسی خواشدار مادہ سے انتڑیوں سے
خواشش ہو کر دست آتے ہیں۔

علاج : پہلے خواشدار مادہ کو رفع کریں، اگر زیادہ دست آ رہے
تو ان کو قابضات سے بند کر دیں، اس مطلب کے لئے کمپڑاکیل بہترین
دوا ہے، ایک سال کے بچہ کے لئے ایک چھوٹا چمچ دیں، بچوں کے دست
روکنے کے لئے مجرب نسخے بڑوں کی امراض میں ملاحظہ فرمائیں۔

حالیہ اسہال : اسعد کوئی، کندر، حب الہاس، تخم خشخاش
ہر ایک تولہ تولہ، کوٹ چھان کر رکھیں۔

خوراک : ۴ رتی ایک سال کے بچہ کے لئے، بڑے بچوں کو حسب عمر
دیں، بچوں کے دست روکنے کے لئے دانت نکالنے کے ایام میں بید مفید ہے،
سوفاقا بلض : ۲ ڈورس، بوڑھے گرین، گیٹک ایسٹ، اگرین
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ دیں، اسہال کے لئے مفید ہے۔

گر میو سکسی ڈین (شاد پ ڈوم) : یہ دوا جراثیمی بچش، اسہال گرمائی،
سمر ڈاسریا، مبعادی بخار کے دست آئوں کی متورم جلی کو تسکین دیتی ہے،
مفتدار خوراک : بڑے آدمیوں کے لئے ۲ میل سپون فل دن میں چار بار
بچوں کو ۲ چمچ خوراک دن میں چار بار دیں۔

اکسیر اطفال : زہر مہرہ خطائی، دانہ لاجی خورد، مغز کنول گڈ،
طبائشیر نقرئی، جھرا لیمود، زراوند مدحرج، نارجیل دریائی، ہر ایک ۶ مائشہ،
پوسٹ، بید زردہ، مائشہ، مردار بید، مائشہ ۴ رتی۔

تمام دواؤں کو علاحدہ علاحدہ چیں کر عرق سولف ملا کر بقدر مونگ گڑھا بنائیں

ترکیب استعمال ایک گولی شیر مار یا عرق سولف میں حل کر کے
 دیں، دن میں تین خوراک دیں، تھکے، اسہال، نفخ شکم، بد معنی، کمزوری
 اور سوکڑا، یعنی سوکھا مسان کے لئے اکسیری دوا ہے،
 میں بچوں کے دستوں کے علاج میں اکثر سمیٹھ کارب اور سلفنا گٹنا ڈین
 کو زیادہ استعمال کرتا ہوں، شدت حالات میں انیون کے مرکبات بھی استعمال
 کر لیتا ہوں، لیکن مثلاً ذرناور، جب بچہ کی صحت اچھی ہو اور دست زیادہ
 آتے ہوں، ورنہ مندرجہ بالا ادویات کافی ہوتی ہیں،

ہومیو پتھی علاج

اکونائٹ ۳۔ جبکہ بچہ بے چین ہو، اور بخار بھی ہمراہ ہو، سفید رنگ
 کے دست آتے ہوں، ہر گھنٹہ بعد ایک ایک خوراک دیں،
 کیمفر مدر ٹیچر، ہیفنہ کی صورت میں یہ دوائی اکسیری ہے، ہر تین گھنٹہ
 بعد ایک خوراک دیں،

پسٹا ۶۔ جب دست مختلف رنگوں کے آتے ہوں، تو یہ دوا
 بے حد مفید ثابت ہوتی ہے، دن میں ۴ خوراک دیں،

ڈسینٹری

DYSENTERY

ہیچس

تشخیص وجوہات و تشخيص : اس مرض میں بچہ کو پاخانہ کی بار بار حاجت ہوتی
 ہے، خون، آؤں اور ٹنم بھی خارج ہوتی ہے جس سے بچہ جلد کمزور ہو جاتا ہے
علاج : اگر سدا ہو، تو پہلے کیمپٹر ایل سبب ٹمر دے کر قبض رفع
 کریں، بعد ازاں قابضات کا استعمال کریں، بچوں کی ہیچس میں کیمپٹر ایل ایلیشن

مسیحائی اثر رکھتا ہے۔ پیچش کے بیان میں اس کا نسخہ درج ہے۔
 اکسیر پیچش : در دھینا ، آمیس ، کارڈ اسٹکی ، گج پیل ہر ایک بم وزن
 شہد بقدر ضرورت ، تمام ادویہ کو باریک میں کر سفوف تیار کریں ، اور محفوظ
 محفوظ اسٹند میں لٹا کر بچہ کو چٹائیں ، ۱۰ چوں کی سخت سے سخت پیچش بھی
 اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔

تریاق اطفال : گلوکوز ۲ گرین ، سوڈا بائی کارد ۳ گرین —
 کھورو ڈین ۴۵ مم ، سلفا گٹنا ڈین ۱۰ ٹیکہ ، گوند کبیر ۱۰ گرین ، عرق سونف
 ۴ ڈرام ، جلد ادویہ کو کھرنی میں ڈال کر اچھی طرح حل کریں ، یہ ایک سال کے
 بچہ کی ایک خوراک ہے ، دن میں ایسی چار خوراک دیں ، امراض معدہ و امعاء
 کے لئے اکسیر ہے ، اسہال ، سمروڈ اسٹریا ، اسہال گرمائی ، شدت پیاس ،
 پانی کا بار بار پینا ، پیچش وغیرہ کے لئے اکسیری نسخہ ہے۔

ہومیو پیتھی علاج

کھیریافاس ۶ x (۲ گرین) ، نیٹرم فاس ۶ x (۲ گرین) ، فیرم فاس ۶ x (۲ گرین)
 یہ چار سال کے بچہ کی ایک خوراک ہے ، ایسی ایک خوراک دن میں مرتین گھنٹہ
 بعد دیں ، دست ، پیچش ، خونی ، یعنی مروڑ ، کھانسی ، بخار ، بچہ کا کمزور ہونا
 دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفیں ، بڑیوں کا کمزور ہونا ، نزلہ زکام وغیرہ کے
 لئے اکسیر الٹرودا ہے ، اگر ساتھ ہی پیٹ میں درد ہو ، تو اس نسخہ میں
 گیشیا فاس ۶ x (۲ گرین) شامل کر لیں ،
 اگر پیچش کی تکلیف میں بیمار کو پیشاب بہت کم آئے ، یا بالکل ہی
 نہ آئے ، تو مرکبوری ایس کار ۶ منبہ ہوگا۔

پیش کش کے علاج میں سلفا گنٹ ڈین ، انٹر واپو ٹام ، کلورو ڈین ، کارلوسنتھ ۳۰
 ٹکس و امیکا ، سٹریپٹو مائی سین ، ایسٹین ، ڈورس پوڈر ، انیون ، کتیسٹرا ، سیل ایٹین
 اور ہومو پیپٹی ادویات اپیکاک ۲۰۰ ، مرکری سال ۳۰ ، مرکری کار ۳۰ ، مہری معمول
 و تجرب ادویات میں ، اور حسب علامات ان کے استعمال سے سو فی صدی
 کامیابی ہو جاتی ہے ، اور میری تمام یرکٹس میں پیش کش کا کوئی مریض خواہ بچہ ۱۰
 عورت یا مرد ہو ، ان کے علاج میں کبھی ناکافی نہیں ہوتی ، بچوں کو حسب عمر
 ادویات استعمال کر دانی چاہئیں ۔

تقبض CONSTIPATION کانسٹیپیشن

وجوہات و تشخص : بچوں کو یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے ، جب بچہ کو باقاعدہ
 باقاعدہ کھل کر پاخانہ نہ آئے ، تو بچہ کو قبض اور اس کے ساتھ دیگر امراض
 لاحق ہو جاتے ہیں ، اگر بچے کی والدہ کو بھی قبض ہو ، تو بچے کی والدہ کو قبض کشا
 طاقت بخش پیل اور سبزیائی زیادہ مقدار میں استعمال کرانی چاہئیں ، بچوں کی
 قبض کے لئے نہایت بے ضرر اور مفید دوا ہے ،

جسم گھٹ جھپٹ سے پیدا ہوتا ہے ، تو اسے سیاہ رنگ کا پاخانہ آیا
 کسی شکرنا ہے ، اگر کسی بچہ کو پاخانہ نہ اترے ، تو یہ گھٹ استعمال
 کرنی چاہئے ، اس کے استعمال سے پیٹ کے اندر جس قدر غلاظت ہوگی ، نکل
 جائے گی ، زمانہ قدم سے مستعمل ہے ،

نسخہ : برگ گارڈ زبان ، گل بنڈہ ، مٹھی ، منیٹھ ، عناب ، گل سرخ
 برگ سنہا کی ہر ایک ماشہ ماشہ ، پانی میں جو شش دے کر چھان لیں ، گرم گرم
 حالت میں گودا اٹھاس ۶ ماشہ ، ترنجبین ۶ ماشہ بھگو کر حل کر لیں ۔

صاف کر کے بچہ کو تجھ چھ ملائیں مفید نسخہ ہے جو بچوں کی ہر قسم کی
قبض کے لئے مفید ہے۔
کیسٹر اکل عمر کے مطابق عرق گلاب یا دودھ میں ملا کر دیں، یا خانہ کھل
کر آجائے گا۔

مشریت منہشہ عمر کے مطابق عرق گلاب میں ملا کر دینے سے بھی قبض رفع
ہو جاتا ہے۔

حب قبض کشا، راجو، اتور، مسطک، راجی، یا مسہر، ریوند، عصارہ اتور
کھول کر کے بانی کی مدد سے دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائی جائیں، ہر وقت ضرورت
ایک گولی ہمراہ میٹھا دار گھسیں کر دیں، قبض رفع کر دے گا، مفید ہے۔
بچوں کی قبض میں کیسٹر اکل بہترین دوا ہے، فوری ضرورت کے لئے
گلبسین کا اپنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔
مومیو پیچی علاج

بچوں کی قبض میں نکس و امیکا، برائی ادینا، اوبیم، لاسکو پوڈیم ادویات
بہترین قبض کشا ہیں۔

THARID WARMIS
(خمرید ورم)

کرم امعا

وجود است و تشخیص، اس مرض میں بچے کے پیٹ میں کرم پڑ جاتے ہیں،
ناک مسکتا ہے، منہ میں خارش اور درد ہوتا ہے، روتا ہے اور منہ سے
مال بہتی ہے، بیٹاب کی جاگ کو ہاتھ میں کھینچ کر مالتا ہے۔
علاج، دافع کرم ادویہ استعمال کر کے مسہل دیں۔

ہومیو پیتھی علاج

سیا x ۶ . یہ دوا بچوں کے بستر پر پیشاب کر دینے کو روکنے کے لئے مفید ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کے لئے۔ رات کو موٹے وقت ایک خوراک دیں،
نکس دامیکا، کلکیر یا کارب اور سلفر بھی مفید ادویات ہیں۔

بنیادیں

و جو ہات و لشکر میں رہا میں نے بھی کہ پیشاب سے رکھ جانا ہے۔
 علما جہانگیر، زکریا بانی قیام آبادی کرنا نہ پر غور کرنا کہ
 فسخہ نہ ہو جو کھار، نو تدار، زمان بقدر، ۱۲۰۰ فی ہزار ایک سو کھنڈے سے
 پیشاب فوراً کھل جاتا ہے، گرم پانی دھار منقہ منہ نہ ہو تو لینے سے
 پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔

مولیٰ کا نمک مفقود اگرین دانتیں چہار بار روئیں بندشیں بول سکے لئے
مضید ہے۔ اگر نمک نہ ملے، تو ویسے مولیٰ کا پانی نکال کر پانی بخور مضید ہے۔
لشعیرہ جو کھارے جو سرخ نشاور ہر ایک نیم وزن دروؤں کو بہ یک یسیا کر
بخوبی ملا لیں حسب عمر و مرضی سے ہر ایک کے استغناء کریں۔
اگر کسی وجہ سے بچے کا پیٹ باندھ کر گیا ہو تو اس کے استغناء سے
فورا کھل کر آ جانا ہے۔

اگر اردو پر سے پیشاب جاری نہ ہو تو بارگاہِ ربوبہ کے سینہ سے پیشاب بھاریج
کریں۔ مگر سلفا ڈرغس کے استعمال سے پیشاب بھاریج بند نہیں ہوگا۔ تو ان کو استعمال
بند کر دیں۔ اور باقی زیادہ مقدار میں پلا کیں۔

ملیریا بخار MALARIAL FEVER ملیریا فیور

وجہ است و تشخیص در سردی اور لرزے سے بخار ہوتا ہے، پیٹ کو ٹوٹنے سے فی اور جگر بھی بڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

علاج: در اول دفعہ بخار اور دردیں قبض کو رفع کریں، نوبت سے پیسے بخار کو روکنے والی ادویہ کا استعمال کریں۔

دوا کے بخار ہر یوکوین ۴ گرین، اور یہانی کو ۲ گرین، سوڈا بایکاربو ۴ گرین، اور یہانی یا دودھ و شیر کے ساتھ بخار سے پیسے دیں، دن میں ایسی تین خوراکیں دیں، بچوں کے ملیریا بخار کے لئے از حد مفید ہے۔

یوکوین ۴ گرین، ایسی ایک کبہ پڑیہ چار چار گھنٹہ بعد دیں، ملیریا بخار کے لئے اکسیر ہے۔

اکسیر بخار: در سہاگر سفید بریاں، رتی، سفوف طوطی، رتی، کشتہ ہڑتال، گودنی، رتی، یہ ایک خوراک ہے، ایسی دن میں تین خوراکیں دیں، بچوں کے بخار کے لئے اکسیر ہے۔

دو لے بخار اطفال: در تین اولہ، کھانڈ اولہ، باریک سفوف تیار کریں، خوراک رتی عرق گاندبان کے ساتھ دیں، دن میں تین دفعہ، حے اطفال بچوں کے ملیریا کے لئے از حد مفید ہے۔

کشتہ ہڑتال، گودنی، رتی، بھراہ آب یا شربت پلا دیں، بخار کو نہایت

مفید ہے۔ بچوں کے ملیریا بخار کے علاج میں یوکوین، کشتہ ہڑتال، گودنی، برگیم، کلوروا، لاکوین، بیکسٹن، ۵ گرین، اور ہومیو پیتھی دوا اپیکاک ۳۰ بہت مجرب ثابت ہوئی ہیں، ان کے استعمال سے سو فی صدی کامیابی ہوتی ہے۔

میعادی بخار، تپ تور کی

وجوہ است و تشخیص در یہ ایک میعادی بخار سے، جو دو ہفتہ اور کبھی تین چار ہفتہ تک چڑھتا رہتا ہے، دوسرے ہفتے مبار کی جس کو تور کی بھی کہتے ہیں، نکل آتی ہے۔

علاج در اس مرض کے علاج میں حرارت کو رفع کرنے والی اور تور کی کے دانوں کو رکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تدم علاج متروک ہو رہا ہے، اور جدید ادویات نے اس مرض کے علاج کی کاپا ہی پلٹ دی ہے، میعادی بخار کے دو کسری نسخہ جات درج کئے جاتے ہیں جن کے ہونے ہوئے کسی دوسری دوا کی حاجت نہیں رہتی۔

آریو مائی سین ایک کیپ شول ۲۵۰ ملی گرام، گلوکوز یا چینی سفید ایک ڈرام، کیپ شول توڑ کر کھانڈ میں ملا کر آٹھ خوراکیں بنالیں، یہ مقدار دو سال کے بچہ کے لئے ہے، دن میں چار خوراک دیں، میعادی بخار کے لئے اکسیر ہے، دو تین دن کے استعمال سے بخار رفع ہو جاتا ہے، ہمارے تجربہ میں بچوں کے میعادی بخار کے علاج میں آریو مائی سین سے بڑھ کر کوئی مفید وراثت نہیں ہوئی، خوشذائقہ بھی ہے جسے بچے خوشی سے کھا لیتے ہیں، دیگر میعادی بخار کے عوارضات مؤثرہ پیچش، اسہال، کھانسی سرساز وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتے۔

کلورومائی سٹین پامی ٹیٹ، یہ کلورومائی سٹین کا خوشذائقہ شربت ہے ایکٹ چھ خوراک سرساز لکھنے بعد ملاویں، یہ مقدار خوراک دو سال کے بچے کے لئے ہے، اس کے استعمال سے تین چار دن کے اندر بخار رفع ہو جاتا ہے، اور تور کی بھی نکل آتی ہے، مریض دیگر عوارضات سے بھی محفوظ رہتا ہے

دق البصیان سوکڑا اطفال

MARASMUS

تشخیص و وجوہات : اس مرض میں بچہ کو ہلکا بخار رہنے لگتا ہے، مضم خراب ہو جاتا ہے، چھش اور دستوں کی شکایت ہو جاتی ہے، خفیفتا بہ چھوٹے بچوں کی سیل سے کیونکہ بڑوں کو تب دق کا لغویہ پھپھڑوں میں ہوتا ہے، اور بچوں کی اکثر آنتیں مبتلائے مرض ہوتی ہیں چونکہ یہ متعدی مرض ہے، اکثر مریض بچہ سے تندرست بچوں کو اس کی چھوت لگ جاتی ہے، یا مسلول گائے کے دودھ پینے سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں بخار ۲۲ گھنٹے رہتا ہے، اور رات کو زیادہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد کی شکایت رہتی ہے، اس کے بعد درد مروڑ کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، دست بدبودار ہوتا ہے، سہری ہیل، کبھی آؤں، خون اور چربی بھی آتی ہے، بچے کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، کبھی کھاشی آتی ہے، کان کی لور بائٹل بے حس ہو جاتی ہے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔

علاج : حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کریں، غذا زود مضم دیں سفیدی ہیفہ مرغ، لائم و اٹھ چادلوں کی بیج وغیرہ کھلائیں، اکسیر سوکڑا، مردار بدنا سفہ امانشہ، ورق سونا امانشہ، دونوں کو روح بید مشک میں سات دن کھل کر کے خشک کریں،


مقدار خوراک : چاول تا ۲ چاول ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں، البصیان کے لئے مفید ہے۔


کیسی فرول ٹیبلٹ ۵ ہزار یونٹ

مقدار خوراک : ترکیب استعمال : ایک ایک ٹکیہ پانی کے ساتھ صبح و شام کھلائیں، بچوں کے غذا کے سلی ورم کے لئے مفید و مجرب ہے۔

کنز العلاج

عضلاتی انجکشن لگانے کے مقامات!





دو لے اسپہال :۔ طب شیر ، پوست سنگدانہ مرغ ، بیلگری ہر ایک ہم وزن
 ہر ایک پیس ہیں ، بعد ۲ تا ۳ رتی ایک سال کے بچہ کو دیں ، دستوں کیلئے
 فائدہ مند ہے ، جو ہر مہرہ بھی اس مرض کے لئے مفید ہے حسب عمر استعمال کریں ،
 ر فوٹ ، کمزور اور تپ دق کی استغداد رکھنے والے بچوں کو بی جی دیکسین
 یکہ لگو نے سے بھی دق الصبیان کا مرض ہو جاتا ہے ، اس لئے چھوٹے ۱۲ اور
 زرد بچوں کو بی جی کا ٹیکہ نہیں لگوانا چاہئے ، چنانچہ میری رٹ کی عزیزہ یکم عمر ۶ سال
 کو بی جی دیکسین کا ٹیکہ لگو اس نے کے بعد دق الصبیان کی علامات دو مہینہ کے
 بعد شروع ہو گئی تھیں ، حالانکہ ٹیکہ لگو اس نے سے پہلے بہت صحت مند اور
 تندرست تھی جس کی علامات معمولی بخار ، میٹ درد ، شدید پیش پیش میں
 دس اور چربی بھی خارج ہوتی تھی ، غذا سے انتہائی نفرت ، منہ کے اندر
 چھالے ، کھانسی وغیرہ تھی ، باوجود ہر طرح کے علاج کے جسم بالکل کمزور اور سوکھ
 ہوا تھا ، تین ماہ مرض میں مبتلا رہنے کے بعد ۵ ، متعین معظم ۲۷ کو وقت
 بچہ شام خون کی تے آنے کے بعد انتقال کر گئی ، انا للہ وانا علیہ راجعون
 جدید دوا :۔ بعض بچوں کی ہڈیاں بہت کمزور اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ، بچہ
 کبڑا ہو جاتا ہے ، اس حالت میں لاسکو ارد ٹامن ڈی کن سنڈریٹ ۳ قطرے
 روزانہ استعمال کریں ، اور ڈامن ڈی کے تجارتی مرکبات اڈکسولین ، اسٹیلین
 وغیرہ بھی بچوں کی عام کمزوری اور کساح ر ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا کیلئے مفید ہے ،

بچوں کی تپ دق میں ہمارا معمول علاج

تپ کسی بچے میں سوکڑا یعنی دق الاطفال کی تمام علامات پائی جائیں ، تو مندرجہ
 نسخہ جات کا استعمال کرنا ہر گز بہت مفید ثابت ہوا ہے ، اور چند دنوں کے
 استعمال سے تمام علامات رفع ہو جاتی ہیں ،

میزلس

خسره MEASLES

وجوہ است و تشخص : یہ ایک متعدی مرض ہے، یہ مرض اکثر بچوں کو ہوتا ہے جسم پر نکھائی سپر خ رنگ کے دانے نکلتے ہیں،

ابتدائی علامات : رنگ سے ہانی ہٹا ہے جھینکس آتی ہیں، کھانسی اور ساٹھی بخار بھی ہوتا ہے، اس کے دانے ۲۴ گھنٹہ سے لے کر ۶۷ گھنٹہ تک مڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ مرض اکثر موسم بہار میں ہوتا ہے، خفیف خسره کا انجام عموماً بخیر ہوتا ہے، لیکن شدید خسره بچوں کے لئے مہلک ہے، علاج : جب خسره کی علامات ظاہر ہوں، تو مرض کو سردی سے محفوظ رکھنا چاہئے، اور گرم رکھنا چاہئے تاکہ دانے بخوبی نکل آئیں، اور مندرجہ ذیل ادویہ استعمال کریں،

سبازول CIBAZOL یہ گولیاں بنی بنائی انگریزی دوا فرمٹوں سے مل جاتی ہیں، مقدار خوراک ۱۲ گولی یا کم و بیش حسب عمر ہمراہ آب نم گرم دن میں تین بار دیں، یہ دوائی خسره، پیچک، لاکڑا کا کڑا، دیگر خون کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض کے لئے بہترین مسکن دوائی ہے،

لکچر اور لاسکوار ایونٹاسیٹاس ڈائلیوٹ ۱۲ ڈرام، سپرٹ ایفٹر ٹائٹرسائیڈ مکمل، پوٹاسیم سائٹریٹ ۴ گرین، وائٹم ایسکک ۵ مکمل، ایسپرکٹ ۱۰ مکمل، ہائڈروکسیٹ ۱۵ مکمل،

یہ پانچ سال کے بچہ کی ایک خوراک ہے، ایسی ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد جاریہ روزانہ دیں، سبازول گولی اور لکچر باری باری دیں، یہ نسخہ بچوں کے لئے، زکام، کھانسی، بخار، خسره، لاکڑا کا کڑا، تپ لڑ کی وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے،

لنسخہ خسره : در عتاب ، انجیر تین تین دانہ ، مویر منقہ ۵ دانہ ، خاکشی
 (خوب کلاں) ۳ ماشہ ، پانی حسب ضرورت ڈال کر جوش دے کر ازلہ جینی سفید
 ملا کر عمر کے لحاظ سے پلائیں ، اس سے خسره کے تمام واسے باہر نکل کر بخار ، کھانسی
 اور خسره کی دوسری تکلیفیں رفع ہو جائیں گی ، یہ نسخہ تب مہار کی میں بھی مفید ہے ،
 اگر خسره میں سخت قبض ہو جائے ، تو صابن کی پتی یا گلیسرین سیاز پٹری
 استعمال کریں ، یا نم گرم پانی کا حقنہ کریں ، اگر منہ میں چھالے نکل آئیں ، تو اسٹرن
 گلیسرین وغیرہ لگائیں ، اگر خسره کی علامتیں شدید ہوں ، اور واسے اندری
 اندر میں ، جلد پر نمودار نہ ہوں ، تو زعفران ۱۰ رتی ، تولد بھر دودھ میں حل کر کے
 بچہ کو پلا دیں ، ہوڑی دیر بعد تمام واسے نکل آئیں گے ، یا مرلیش کو آب گرم
 میں بٹھا دیں ، اس سے تمام واسے بخوبی ظاہر ہو جاتے ہیں ،

بادداشت : مرض خسره میں مونہ اور دستانوں کا خاص خیال رکھنا
 چاہیے ، کیونکہ خسره میں ان دو مرضوں کا ہونا اکثر ملکہ ہوتا ہے ، اس لئے
 ابتدائے خسره میں بطور حفظ بالقدم : ایم بی ۶۹۳ ، سلفا پیراڈین ۱۰ گولی یا
 سیازول دن میں تین چار بار استعمال کریں ، اگر مونہ ہو جائے ، تو مقام ناف پر
 ای ٹو جیسٹین پلاسٹر لگائیں ، ایم بی ۶۹۳ ، سیازول کچھ پلائیں ، اگر دست
 زیادہ آ رہے ہوں ، اور پچش بھی ہو ، تو ایم بی ۶۹۳ ، کیسٹرائیل امیشن دن میں
 تین خوراک پلا دیں ، یا سمٹھ کارب ، سوڈا یا میکارب ۲ گرین دن میں چار بار کھلائیں
 غذا لطیف ، زود ہضم ، دودھ ، پختی ، دال ، چھائی وغیرہ دیں ،

اکثر اذات مرلیش کو خسره میں مونہ اور پچش کی مرض لاحق ہو جاتی ہے ، اس
 میں ہمارا معمول یہ ہے ، کہ اول مرلیش کو پینسین ۲ لاکھ یونٹ کا عضلی ٹیکہ کر دیا
 جاتا ہے ، اور پچش کے لئے سیازول ۱۰ ٹیکہ ، کیسٹرائیل امیشن ۴ ڈرام ،
 گلوکوز ڈرام ، اسی ایک خوراک دن میں چار دفعہ دی جاتی ہے ،

رو کہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔

علاج ۵۔ یہ مرض چونکہ چھوت دار ہے، اس سے تندرست آدمیوں کو یہ سبب نہ کرنا چاہئے۔ اور صفائی کا انتظام رکھنا چاہئے۔ بطور حفظ ماقدم چیچک کا مشہور و معروف ٹیکہ جو گورنمنٹ کی طرف سے لازمی طور پر مفت لگایا جاتا ہے بہترین اور کامیاب دوا ہے۔

مرض ہو جانے کے بعد کوئی علاج اس مرض کی مدت اور نتائج میں نمایاں طور پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کا کوئی شافی علاج ہے۔ صرف اس کے عوارضات مؤثرہ، بخار، کھالسی، قبض، اسہال، دست، درد وغیرہ کا علاج کریں۔ جیسا کہ مرض خسرو میں مذکور ہے۔ اہم، لی ۶۹۲، سلفا پیراڈین یا سبازول کے استعمال سے چیچک کے عوارضات زور نہیں پکڑتے، مریض کے آنکھ، منہ، ناک کو صاف رکھنا چاہئے۔ مٹھرت عذاب کا استعمال مرض چیچک خسرو لاکڑا کا کڑا، خرابی خون اور خون کا جوکشن مٹھانے کے لئے عجیب الٹا دوا ہے مقدار خوراک اتنا پچھ کو، ۳ تولہ نوجوان کو دینا مفید ہے۔

تندرست شخص خاص کو بطور حفظ ماقدم ویکسین لف کا ٹیکہ لگوانا چیچک سے محفوظ رکھتا ہے۔

نوٹ۔ مرض چیچک خسرو، لاکڑا کا کڑا تینوں کامادہ ایک ہی ہوتا ہے ان مرضوں کے ساتھ بخار لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ مرضیں عمر میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہیں، جس کو ایک دفعہ ہو جائیں، دوسری دفعہ نہیں ہوتیں۔

بچہ، تو ایک اور مرض ہوتی ہے جس کو چھوٹی چیچک، لاکڑا کا کڑا یا چھین پاکس وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ بھی خسرو اور چیچک کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی خسرو اور چیچک کی مانند کرنا چاہئے۔ مٹھرت عذاب کا استعمال سے حد مفید ہے۔ کلورڈائی سین کا استعمال اس مرض کا تجرب علاج ہے۔

چھچک اور خسرو کا بخار

یاد رکھیں کہ جب بخار دوسرے دن سے تھادز کر جائے اور چھچک ظاہر ہونے لگے، تو سرد چیزیں استعمال نہ کرائیں، کیونکہ اس وقت سردی پھٹنا بسا اوقات بہت بڑی غلطی کا سبب بن جاتا ہے، اس لئے کہ اس وقت تو اس امر کی ضرورت ہے ایسی چیزوں سے جو فضول کو باہر کی طرف متوجہ کریں، اور سردوں کو کھولیں، طبیعت کی اعانت کی جائے مثلاً بخار کا پانی اس حالت میں بہت سی سودمند دوا ہے، کیونکہ بخار مادہ کو مشرف کے ساتھ باہر کی طرف دفع کرتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ امر نادر کی مصرت سے چھٹکارے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔

چھچک کا ہومیو پیتھی علاج

اس مرض کے لئے شروع مرض میں اکونائٹ ہر دو گھنٹے بعد دینا چاہئے، دوسرے درجہ میں مرکبوس سال یا میسٹلا استعمال کریں، چوتھے درجہ میں جب آرام آرہا ہو، تو فاسفورس دن میں دو بار دیں، غیب کا فرض ہے، تو نئی کسی مقام پر چھچک کے مرض کا علم ہو، تو اسی علاقہ کے سینٹر، ڈسپنسریورٹ کرے، تاکہ مناسبت تمام چیز سے دبا کر رکھ لیا جائے، اطلاع نہ دینا برہم میں داخل ہے۔

بچوں کا درجہ حرارت کم و بیش ہو جانا

بچوں کا درجہ حرارت بڑھ جانا ایک عام علامت ہے، اور یہ کئی اسباب سے ہو سکتا ہے، چونکہ چھوٹے بچوں کا نظام حرارت بہت نازک ہوتا ہے، اس لئے معمولی اسباب سے بھی درجہ برہم ہو جاتا ہے۔

بچوں کے درجہ حرارت کے بڑھنے کا عام سبب کانوں کی خرابی، حلق کے غدر کا بڑھ جانا اور بعض اوقات ڈر سے یا پریشان ہونے سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ بلیریا اور میعادی بخار، منوہ سے بھی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔
علاج: بخار کے اصلی سبب کو معلوم کر کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہر ایک کا مکمل علاج اس کے بیان میں علیحدہ علیحدہ درج ہے۔
 اور سے حرارت دیکھنے کے لئے بڑے بچے تو فخرامیٹر منہ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کی بغل یا کچھ ران میں فخرامیٹر رکھ کر درجہ حرارت دیکھنا چاہئے۔

اسٹوپ چشم اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں کا علاج بڑے آدمیوں کی امراض چشم میں ملاحظہ فرمائیں۔
 آج کل بچوں کی آنکھوں کی بیماریوں میں پینی سلین ٹوشن، پینی سی لین آئی مریم، سلغا فٹایا زول، آریو مائی آکٹ مینٹ، کھورو مائی سٹین آکٹ مینٹ جدید ادویات بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔

رال ہٹا TAEA LESAM ٹایالزم

تحریر غیب: اس مرض میں بچوں کے منہ سے رال بہتی رہتی ہے۔
 وجوہات: ہار پیٹ کے کپڑے، خرابی ہاضمہ اور دانت نکلنے کے زمانہ میں یہ مرض عام بچوں میں پائی جاتی ہے۔
علاج: درجہ کا ہاضمہ درست کریں، اگر پیٹ میں کپڑے ہوں تو گرم کٹن ادویات کا استعمال کریں، مازر پیس کر گلیسرین میں ملا کر منہ میں لگائیں۔

اگر بچہ کمزور ہے، تو مغزی ادویات دیں، اگر دماغ کی کمی ہو، تو سیٹامین ۱۰۰
 یا نیکو و گرام کا ہر روز انجکشن کریں، دو تین انجکشن لگنے پر بچہ تندرست ہو جائے گا
 ہائیمہ کے لئے حق زہرہ میں سوڈا یا سیکارب قند سے ملا کر کھوڑا کھوڑا پلائیں،

قلاع الفم

تعریف: اس مرض میں بچہ کے منہ میں چھالے پیدا ہو جاتے ہیں۔
 وجوہات: اور خرابی ہائیمہ اس کا خاص سبب ہے بعض اوقات کمزوری
 اور دماغ کی کمی ہونے پر بھی منہ آ جاتا ہے، گرم چیز کے کھانے سے اور خرابی
 خون بھی اس کا باعث ہو سکتا ہے۔

تشخیص: اس مرض میں بچہ کو کھانے اور داندہ کا دودھ پینے سے سخت
 تکلیف ہوتی ہے، اور غذا نہ پہنچنے کے باعث بچہ کمزور
 ہو جاتا ہے۔

علاج: دہی کے کا ہائیمہ درست کریں، دماغ کی کمی ہے، تو دماغ
 کے انجکشن کریں، ہائیمہ میں ایکریٹین یا سیرین، اینڈوگن یا سیرین پھر ریبی سے لگا لیں،
 خرابی خون سے ہو، تو سلفا گریپ کا استعمال کریں۔

اکسیر قلاع الفم: ہر دو گھنٹہ ۴ لاکھ یونٹ کا انجکشن ہر ۲ گھنٹہ
 بعد کریں، ایک دو انجکشن کرنے سے منہ کے زخم وغیرہ رفع ہو جاتے ہیں۔
 شکر کے لحاظ سے دوا کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں، ایک سال کے
 بچے کے لئے ایک لاکھ یونٹ کا انجکشن کر دے۔

دیگر ادویات: بڑے آئرن کی امراض میں ماحفظ فرمائیں

نورائیدہ نیچے کا جریان خون

تشریف: در اس مرض میں پیدائش کے بعد تھوڑے عرصہ تک ناک
منہ یا مقعد کے راستے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی غتہ کرنے کے
بعد خون بند نہیں ہوتا۔
علاج: بڑے ڈامن کی ٹکیاں کھلانے یا انجکشن لگانے سے ہر قسم کا
جریان خون فوری بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس مرض کا دیرینہ علاج نہ کیا جائے
تو بچہ جلد ہی مر جاتا ہے۔

بلیوں کا بیڑھا ہو جانا

تشریف: در اس مرض میں نیچے کی بڑیاں ٹڑھی ہو جاتی ہیں۔
وجوہات: اور کیسیم اور ڈامن کی کمی کے باعث اور لٹا لٹا دور
وغیرہ میں۔

تشخیص: بچہ چل پھر نہیں سکتا۔ خاص کر ٹانگیں کمان کی طرح
ہو جاتی ہیں۔

علاج: بچہ کو ڈامن کا استعمال کرائیں، خاص کر ڈامن بی
اس کے لئے بہا بہت مفید ہے۔ کا ڈیور آبل یا اڈیکسولین کھانے کے لئے
دس جسم برائش کریں، دودھ کثرت سے دیں، ڈامن ڈی جس کا تجارتی نام
اڈیکسولین ہے، اس مرض کا شافی علاج ہے۔

بچے کا یرقان

تعریف اور یرقان کی دو قسمیں ہیں، ایک مہلک اور ایک معمولی۔
 وجوہات اور اس کا سبب آتشک، خرابی خون ہے، جدید ماسرین کا
 خیال ہے کہ اس مرض کا باعث شحم الدم ہے، کیونکہ بچے یرقان میں مبتلا
 ہوتے ہیں، ان کی والدہ کو زمانہ حمل میں اکثر قے آتی رہتی ہے۔
 معمولی یرقان تو جلد ہی ظاہر ہو جاتا ہے، آنکھوں پر زردی
 تشخیص اور جلد کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، شدید یرقان میں تاروں
 کی رنگت صفرا میں بدل جاتی ہے، اور بہت جلد شدت اختیار کر جاتا ہے۔
 یہ ایک چھوٹا بیماری ہے، اس لئے ایک بچے سے دوسرے بچے کو بھی یرقان ہو سکتا ہے
 علاج راج اور نوذابیدہ بچے کا یرقان عام طور پر تین قسم کا ہوتا ہے،
 پیدائش کے دو تین دن بعد ظاہر ہوتا ہے، جو خود بخود رفع ہو جاتا ہے،
 اس میں پہلے جلد کی رنگت زرد ہوتی ہے، پھر آنکھیں بھی زرد ہو جاتی ہیں
 ۱۱ اگر پیدائشی نقص ہو، تو شدید یرقان ہوتا ہے، جو مہلک
 ہوتا ہے۔

۱۲ ایک موردی یرقان ہوتا ہے، بچہ بالکل زرد پیدا ہوتا ہے
 اور چند دنوں میں ہی مر جاتا ہے۔
 علاج کے لئے والدہ کا علاج کرنا چاہئے، اس کے لئے لوراکسیٹرکٹ
 جو حقے جینیئے استعمال کرنا چاہئے، لوراکسیٹرکٹ دودھ، دھامن بی ۱۲ دوسری
 کے چھ بہات انجکشن لگانے سے یہ مرض موقوف ہو جاتا ہے، ہر تیسرے
 دن انجکشن کریں، دوران حمل میں فولاد کا استعمال بھی مفید ہے۔

باب ہفتم

زہریں اور ان کا علاج

دنیا میں زہر خورانی کے واقعات عہداً اور قصداً رونما ہونے رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہر ایک معالج کو واسطہ پڑتا ہے، اس لئے مختلف زہروں کی علامات اندان کا علاج تحریر کرنا ضروری ہے۔

تحریر زہر (POISON) وہ چیز ہے جو جسم انسانی میں داخل ہو کر مضر صحت اثر پیدا کر کے زندگی کو خطرے میں ڈال دے یا ہلاک کر دے زہر کے داخل ہونے کے راستے درمند، ناک، آنکھ، کان، جلد، تھری بول، رحم کے راستے جسم میں داخل ہو کر اپنا مضر اثر کرتی ہیں، زہر کے راستے جسم میں داخل کر کے کھلائی جاتی ہے، یا کبھی انسان غلطی سے بھی کھا جاتا ہے۔

زہریلی گیس ناک کے ذریعے اور بذریعہ انجکشن جلد کے راستے بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔

زہروں کی اقسام : زہریں تین قسم کی ہوتی ہیں،
 "معدنی زہریں" مثلاً سم الفار، سیکورہ، دارچینک

ہمارے دغیرہ۔

۱۲، بناتاتی زہریں مثلاً افیون، مٹھائیلیہ وغیرہ۔

۱۳، حیوانی زہریں مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ۔

تاثیر کے لحاظ سے تمام زہریں تقریباً تین اقسام میں،

۱، اکال قسم کے زہر، (جلانے والے زہر) مثلاً تیزابات، سودھے اور پوٹاشش، یہ جسم پر لگنے سے جلد کو جلا دیتے ہیں۔

۲، خراشش پیدا کرنے والے زہر، یہ زہر جسم پر لگنے سے سوزش اور خراشش پیدا کر دیتے ہیں، مثلاً سنکھیا، پارہ، جما لکڑی، فاسفورس، آمبوڈین اور سانپ وغیرہ۔

۳، پٹھوں پر اثر کرنے والے زہر، یہ زہر نظامِ عصبی پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً افیون، کچھ، مٹھائیلیہ، کلورو فارم، کوکین، کافور، دھتورہ وغیرہ۔

تاثیر اور فعل کے لحاظ سے زہروں کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کی مختصر سی خصوصیات ملاحظہ فرمائیے۔

اکال قسم کے یا جلانے والے زہر، اس قسم کے زہروں کے کھانے سے منہ، حلق اور خوراک کی نالی میں سخت جلن اور درد ہوتا ہے لگاتار قے اور متلی ہوتی ہے جس میں اکثر خون ملا ہوا ہوتا ہے، منہ اور حلق کی رنگت اندر سے سفید ہو جاتی ہے، مسموم کا پیٹ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور جسم کے اندر دنی تمام افعال سست ہو جاتے ہیں،

زہر کی یہ تاثیر براہ راست منہ کے ذریعہ یا مقامی طور پر استعمال کرنے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے جس سے جلد گل سڑ جاتی ہے، اور بیرونی استعمال سے جلد پر نشانات موجود ہوتے ہیں۔

خراشش یا سوزش پیدا کرنے والے زہر، یہ بھی براہ راست

یا مقامی طور پر استعمال کی جاتی ہیں، ان کے کھانے کے تھوڑی دیر بعد سوزش
کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، پیاس شدت کی لگتی ہے، پہلے مثالی پھر تے
آتی ہے، پھر اسہال شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد میں بخار کی علامات رونما
ہو جاتی ہیں، پھر نینس بند ہو کر جسم سرور پڑ جاتا ہے، اور اس کے اوپر لیسیدار
تھنڈی رطوبت پائی جاتی ہے، معدہ کے مقام کو اگر دبایا جائے، تو وہاں
دور ہوتا ہے

خواش پیدا کرنے والی زہریوں کی علامتیں مندرجہ ذیل بیماریوں سے
ملتی ہیں، ہیضہ، درد گردہ، آنٹوں کا سخت سڈھ، درم معدہ دامعہ،
معدہ دامعہ کا پھٹ جانا، درم صفائی وغیرہ۔

نظام اعصاب پر اثر کرنے والے زہر، بہ تین قسم کے ہوتے ہیں،
۱، دماغی (۲، نخاعی، (۳، قلبی، (۴، اختفائی۔

دماغی، یہ براہ راست دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور غشی پیدا کر کے
موت کا سبب بنتے ہیں۔

مخدر اور منوم یعنی خواب آور زہر، اس کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً
انیون اور اس کے مشتقات مارفیا وغیرہ۔

بے حسی پیدا کرنے والے، یہ نظام اعصاب کو بے حس کر دیتے
ہیں مثلاً کوکین اور کلوروفارم۔

سکر یعنی بیہوش اور سست کرنے والے زہر، ان کے استعمال سے انسان
سست اور بے خود ہو جاتا ہے مثلاً اکوکل، شراب برانڈی، کلورل ہائیڈریٹ
کلوروفارم، کافور، روغن تارپین، کاربالک الیڈ وغیرہ۔

ہذیان پیدا کرنے والے، ان کے استعمال سے دماغی توازن
درست نہیں رہتا مثلاً دھتورہ، بھنگ، اجوائن، خواسانی، لغاح وغیرہ۔

دماغی زہر کھانے والوں کی علامتیں مندرجہ ذیل بیماریوں سے ملتی ہیں،
سکتہ، زیادہ بے طبیعتی، مرگی، شمم بول، امراض قلب کے سبب اچانک مرست
واقع ہونا،

نخاعی زہر اس قسم کے زہر براہ راست جسم میں پڑا اثر انداز ہوتے
ہیں، اور تشنج اور اکڑاؤ پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کچھ اور اس کے مشابہات
سرخ گنبن وغیرہ،

نخاعی زہر کی علامتیں مندرجہ ذیل بیماریوں سے ملتی ہیں، مثلاً کزاز
تشنج، ورم دماغ، نخاع وغیرہ،

قلبی زہر اس قسم کے زہر براہ راست قلب پر اثر انداز ہو کر نظام عصبانی
اور دوران خون کو معطل کر کے موت کا باعث ہوتا ہے، مثلاً ڈیجیٹلس، بٹاکو
مٹھا تیل، کنیر سفید و سرخ، کڑھے باداموں کا تیزاب، ایسڈ ہائڈروسیانک
اخٹناقی، اور اس قسم کے زہر تنفس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر
پھیپھڑوں پر اثر انداز ہو کر دم گھٹا دیتے ہیں اور یہ عام طور پر گیسوں کی
تشکیل میں ہوتے ہیں، مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، کوئلہ
کی گیس، بدرو اور گندی موری کی گیس جو عام طور پر بند کھدوں میں
پیدا ہو جاتی ہے،

زہروں کا اصول علاج

مسموم یعنی زہر خورہ اگر جلد ہی علاج کے لئے لایا جائے، تو حسب ذیل طریقوں
سے علاج کرنا چاہئے،

۱) غذائی نالی یعنی معدہ میں داخل شدہ زہر کو باہر نکالنے کا طریقہ

اختیار کرنا چاہئے، اور اس کو بے اثر اور معتدل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔
 معدہ کو زہر سے صاف کر دینا نہایت عمدہ علاج ہے، ابواب معدی یعنی
 سٹانک یخوب سے باسانی کیا جاسکتا ہے، جب تک زہریلی چیز معدہ یا
 خوراک کی نالی میں پڑی ہو، تو سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ ابھی جسم سے باہر ہے،
 اور اس سے پیشتر کہ وہ خون میں جذب ہو کر جسم کے اندر رگ دریشہ میں اپنا
 اثر کر کے نکل جاتی ہے، لیکن اکال یعنی جلانے والی زہروں میں یہ طریقہ
 اختیار کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ مضر صحت ہے، کیونکہ حلق اور خوراک کی نالی
 اپنی طوالت میں جل چکی ہوتی ہے، معدہ کو دھوئے والے آلہ کے استعمال سے
 جھد جاتی ہے یا زخمی ہو جاتی ہے، اس صورت میں ایسی ادویات استعمال
 کرنی چاہئیں جو اسی زہر کے ساتھ مل کر بیماری طور پر کوئی بے ضرر مرکب کی
 صورت اختیار کر لیتی ہوں، کسی زہر کا جو حصہ جسم میں جذب ہو چکا ہو، اس کے
 اثر کو بھی اسی طریقہ سے زایل کرنا ہوگا۔

ہمارے لئے یہ جاننا ضروری نہیں ہے، کہ زہر کی مقدار کیا ہے، تاکہ
 اس کے ناد زہر کی مقدار کا صحیح استعمال کیا جائے، بلکہ زہر کو جسم سے باہر نکالنے
 اور بے اثر کرنے کی اہتمامی کوشش کرنی چاہئے، اور مریض کو اس وقت تک
 زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے، جب تک کہ زہر کا اثر جسم سے بالکل زایل
 نہ ہو جائے، اور زہر سے پیدا شدہ درد اور دیگر تکالیف کو سکون نہ مل جائے،
 بلکہ مریض کی حالت خواہ کس قدر خراب یا شدید علامات خواہ کتنی ہی خطرناک
 کیوں نہ ہوں، معالج کے لئے نا امید کی کوئی وجہ نہیں، ہر ممکن طریقہ سے
 علاج کرنا چاہئے، کیونکہ بعض اوقات ابتدائی کوئی افاقہ نظر نہیں آتا، اور
 معالج باوجود ہو جاتا ہے، لیکن یہ مناسبت نہیں ہے، کہ علاج ترک کر دیا
 جائے، کیونکہ علامات کے ردی ہونے کے باوجود بین چار گھنٹہ بعد مریض کی

حالت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی معساج ابتدائی حالت میں مریض کو دوائی دے کر بہتر پاتا ہے۔ اور علاج کے مزید تواتر کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن اس حالت میں بھی لازم ہے کہ آئندہ علامات کو پورے طور پر دیکھتا رہے کہ زہر کی جو مقدار جسم کے اندر موجود ہے، دوبارہ خون میں مل جائے اور مہلک اثر پیدا کر دے۔

چار چیزیں زہر کے اثر کو زایل کرنے کے لئے نہایت مفید و مجرب ہیں
(۱) معدہ دھونے کا آلہ (۲) فنی آدر مسہل ادویات (۳) تریاق زہر
(۴) محرک اور مقوی ادویات۔

معدہ دھونے کا آلہ، جسے انگریزی میں سٹامک ٹیوب یا انبوب معدی کہتے ہیں، عام طور پر مندرجہ ذیل حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مفید بھی ثابت ہوتا ہے جب مریض نے افیون، کلوروفارم، فاسفورس، کلورل ہائیڈریس، کچلہ وغیرہ کا استعمال کیا ہو۔

استعمال کا طریقہ: سٹامک ٹیوب کو کسی رغنی چیز مثلاً کیسٹرائیل یا بادام ردغن سے چکنا کر کے مری کے راستے معدہ میں پہنچا دیا جائے، ننگی کو داخل کرنے وقت زبان کو انگلی سے دبایا جائے، تاکہ ننگی آسانی سے گزاری جاسکے، ننگی کا جو سرا معدہ میں داخل کیا جائے، اس پر بیس انچ کے فاصلہ پر ایک نشان لگانا چاہئے، تاکہ اس نشان تک داخل ہونے میں تسلی ہو جائے کہ ننگی معدہ میں پہنچ چکی ہے۔ جب ننگی مریض کے معدہ میں پہنچ جائے، پھر ایک پائمنٹ یعنی چھٹانک گرم پانی شیشے کی قیف (جو ننگی کے اوپر کے سرے پر لگی ہوتی ہے) میں ڈال دیں جب تمام پانی معدہ میں چلا جائے، تو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے ننگی کو قیف کے نیچے سے دبا دیا جائے، اور اس قدر نیچے کر دیا جائے کہ مریض کے

معدہ کی سطح سے پانی چلی جائے۔ اس وقت انگلی اور انگوٹھے کے دباؤ سے
 انگلی سے پٹایا جائے۔ دباؤ ہٹتے ہی داخل شدہ پانی معدہ کو دھونے کے
 بعد انگلی کے راستے دوبارہ باہر نکل آئے گا۔ یہ طریقہ بار بار اس وقت تک
 کرنا چاہئے۔ جب تک کہ خارج شدہ پانی سے زہر کٹی ہو اور رنگ دُور نہ
 ہو جائے۔ اور پانی اصل صورت میں خارج نہ ہونے لگے۔

سٹاک بمب کے استعمال سے پہلے معدہ کو غذا سے قے آور دوا کے
 ذریعہ خالی کر لینا ضروری ہے۔ ورنہ غذا کے اجزاء اسے نالی بند ہو جائے گی۔
 اور داخل شدہ پانی باہر نہیں نکل سکے گا۔

اور اگر مریض نے کوئی اکال یعنی جلا دینے والا زہر کھا لیا ہو تو پھر بھی
 اس کا استعمال ممنوع ہے۔ ایسی صورت میں قے آور ادویہ کا استعمال کرنا چاہئے
 جب مسموم علاج کے لئے لایا گیا ہو۔ اور غذا معدہ یا غذا کی نالی میں ہو
 تو ایسی صورت میں قے کرانا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں
 ایزب معدہ نہ مل سکے۔ تو پھر بھی معدہ کو قے آور دواؤں کے استعمال سے
 صاف کرنا چاہئے۔

قے آور ادویات اور مسہلات

۱۔ سوڈیم کلورائیڈ رکھانے کا نمک ۳ تولہ، آدھ سیر گرم پانی میں گھول
 کر پلانے سے قے آجاتی ہے۔

۲۔ ایک بڑا چمچہ رالی آدھ سیر گرم پانی میں حل کر کے مریض کو پلائیں

۳۔ زنگ سفاس ۱۰ ڈرام (۲ ماشہ) ایک گلاس گرم پانی میں ملا کر

پلائیں۔ بوقت ضرورت دوسری تیسری خوراک بھی دے سکتے ہیں۔

۴۔ پلو اپیکاک ۲ ماشہ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ قے آور ہے۔

۵۔ ایو نیم کارب ۲ ماشہ آدھ سیر گرم پانی میں حل کر کے پلائیں۔

۶، ریٹھ یا راڑھ کے چھلکے کا سفوف ایک ماشہ ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ کھلانے سے فوری تے لاتا ہے۔
 ۷، وائیم اپیکاک ۴ ڈرام پلاسے سے تے آجاتی ہے: بچوں کے لئے بہترین تے آور ہے۔

۸، اپومارفین ہائیڈر کلورائیڈ ۱۰، ۱۰ گرین زیر جلد انجکشن کریں۔
 یہ بہترین تے آور دوا ہے، لیکن یہ دوا ایسی صورت میں استعمال کی جاتی ہے جب کہ مریض بے ہوش ہو۔ اور کوئی دوا کھانا نہ سکتا ہو۔ اور کسی چیز کے نگلنے کی طاقت اور ہوش نہ ہو۔ خاص کر ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بے ہوشی پیدا کرنے والے زہر کا استعمال کیا ہو۔
 یاد رہے اس کے استعمال سے کمزوری اور نقاہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہئے۔

۹، اگر مندرجہ بالا ادویات میں سے کوئی دوا بھی بروقت مسیر نہ آ سکے تو مریض کو گرم پانی کا بھرا ہوا گلاس پلا کر مرعی کا پر یا انگلی حلق میں ڈال کر پھرائیں۔ اس طرح حلق میں خراش ہو کر تے آجائے گی۔

۱۰، اکثر زہر خوردہ مریضوں کو خود بخود اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اسہال نہ آئیں تو زہر کو رفع کرنے کے لئے گرم پانی کا اپنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور انٹریڈوں اور معدہ کو صاف کرنے کے لئے جلاب دینا پڑتا ہے ہر ایک زہر کا مناسب جلاب اس کے بیان میں درج ہے۔

تذریاتی زہر یا فساد زہر

جو زہر استعمال کیا گیا ہو۔ اگر اس کا تریاق کھلا دیا جائے تو زہر کا اثر فوراً رفع ہو جاتا ہے۔ اگر فوراً رفع نہ بھی ہو تو اس کی شدید علامات میں فوری کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ قندت نے ہر ایک زہر کے لئے اس کا تریاق

تزیاق بھی پیدا کیا ہے، جو کیمیاوی طور پر زہر کو بے اثر کر دیتا ہے، ہر ایک زہر کے تزیاق کو اس کے بیان میں درج کیا جائے گا، لیکن عام ادویات کے فادہ درج ذیل ہیں،

۱، معدنی تیزابوں کے استعمال میں گنیشیا اور چاک پانی میں ملا کر پلانا کیمیاوی اثر کرتا ہے، اور ان کو بے اثر کر دیتا ہے،

۲، فاسفورس اور کنٹھریڈس کے اثر کو زایل کرنے کے لئے آٹا یا چاک گھول کر پلانا تزیاقی اثر رکھتا ہے،

۳، افیون یا مارفین کی زہریلی علامات کو اڑوپین کا استعمال تزیاق ہے،

۴، سکہ اور بیریم کی زہریلی علامات کے لئے الکلین سلفیٹ تزیاق ہے

محرك اور مقوی ادویات کا استعمال

جب مسموم پر زہر کی علامات پوری طرح نمودار ہو جاتی ہیں تو اس وقت جسم پر انتہائی ضعف طاری ہو جاتا ہے، زہر کو بے اثر کرنے اور خارج کرنے کے علاج کے ساتھ جسم کو گرم رکھنے، نبض اور تنفس کو جاری رکھنے کی بھی کوشش کرنی پڑتی ہے،

اگر مریض کی حرارت جسمانی کم ہو رہی ہو اور جلد سرد پڑ چکی ہو، تو حرارت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ گرم پانی بوتلوں میں ڈال کر مریض کے ارد گرد تلوں، بغلوں اور رانوں میں رکھیں، اور ایچ چیزیں استعمال کریں مثلاً ایتھر، مسٹرکین، کورامین جلدی یا عضلاتی ٹیکہ کے ذریعے استعمال کریں، اور گرم کپڑا مریض کو اڑھائے رکھیں، کیونکہ حرارت کا اخراج مسموم میں معمول سے زیادہ ہوا کرتا ہے،

گرم چائے اور تھوہ وغیرہ پلائیں، اگر مریض بے ہوش ہو،

تو غذائی حققتہ کرنا چاہئے۔

سخت نقاست اور ضعف کی صورت میں نارمل سیلان دوپاسٹ کا وریڈی انجکشن کرنا بہت فائدہ مند اور مقوی قلب و دماغ ہے، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ خون گھاڑھا ہو چکا ہو، تو اس کے خون میں مل جانے سے خون مثلاً ہو جاتا ہے، اور دوران خون اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے، تنفس رکھنے یا بند ہونے کی صورت میں مصنوعی تنفس جاری رکھیں،

اگر پیشاب دیر سے نہ آیا ہو، تو کینٹھڑ کے ذریعہ پیشاب نکال دیں، درد اور دیگر علامات جو ناقابل برداشت ہوں، ان کو موزوں اور مناسب ادویات سے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے،

اب ہم ہر ایک زمرہ کا علاحدہ علاحدہ بیان کھتے ہیں، تاکہ اچھی طرح وضاحت ہو جائے اور سمجھنے میں آسانی ہو، اور ہر ایک معالج بلوقت ضرورت علاج کر سکے،

سنگیبا یا معمم الفار ARGENIC آرسنک

یہ نہایت شدید اور خراش کرنے والا دوا ہے، اور اکثر ایک رتی کے وزن میں بھی زہریلی علامات پیدا کر دیتا ہے، عام طور پر قتل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، شیشہ کی طرح معبد، بے رنگ اور بے مزہ ہوتا ہے

علامات زہر آلودہ گھٹنے کے بعد علامات ظاہر ہوتے ہیں، سنگیبا کے مریض کی زہریلی علامات ہیضہ سے ملتی ہیں، مریض پریشانی کا طاری ہونا، جی مثلاً نا، تھے کا آنا، پیٹ میں مہلک پیاس، شدید بدستے میں خون آمیز مادہ بھی خارج ہوتا ہے، شدید حالت میں مریض کا چہرہ دھندلا، شک کی دیواریں کھچی ہوئی اور سوج، پیشاب کا بند ہونا، منہ میں کھارون

اور جسم کا سرد ہو کر مریض پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اسی حالت میں انتقال کر جاتا ہے۔

علاج اارتے آور ادویہ کا استعمال کریں، اگر خود بخود تے آ رہی ہو۔ اور شدت پیاس ہو، تو صرف ٹھنڈا پانی بکثرت پلائیں، اور برف چوسا کر شدت پیاس رفع کریں۔

دود کو دور کرنے کے لئے افیون یا مارفیا بقدر ضرورت لیں یا ۱۰

گرین بذریعہ انجکشن استعمال کریں، اگر مریض سرد ہو رہا ہو، تو گرم پانی کی بوتلیں اور پھیلیاں جسم کو گرم کرنے کے لئے رکھی جائیں۔

دودھ گھی کا استعمال بھی مفید ہے، چو نے کا پانی، میٹھا تیل بم وزن ملا کر دینا مفید ہے، ٹینکچر سیل اس کا فاد ز سر ہے، نسخہ ۱۰ ٹینکچر سیل ۱۰ ادس، سوڈا بایکارب ۱۰ ادس، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پانی میں ملائیں، پھر دونوں کو ملا کر مریض کو پلائیں حسب ضرورت دو تین بار ایسی ایک ایک خوراک پلائیں۔

نسخہ ۱۱ ٹینکچر سیل کے زیر کا تریاق ہے، نسخہ ۱۲ ٹینکچر فبرالی ۱۰ کلو رائیڈ ایک حصہ، پانی ۷ حصہ، باہم ملا لیں، دے ۱۲ کیسی نید گینٹیا ایک حصہ، پانی ۱۹ حصہ، باہم ملا لیں۔

بوقت ضرورت دونوں کو علیحدہ علیحدہ تیار کر کے باہم ملا کر بوتل کو اچھی طرح ملا لیں، مریض کو ہر ۱۵ منٹ بعد ایک بڑا چھپہ پلائے رہیں، حتیٰ کہ مریض کو سکون حاصل ہو جائے، اور تمام علامات میں کمی ہو جائے، یہ دوا سنگھیا کو فوری طور پر غیر نقصان دہ سلوشن میں تبدیل کر دیتی ہے، ہر ایک معالج کو یہ نسخہ یاد رکھنا چاہئے،

پارہ سیلاب MERCURY مرکری

پارہ اور اس کے مرکبات پر کورائیڈ آف مرکری ریسکیورہ دارچینا
 شکرٹ، کیڈیل زیادہ مقدار میں کھا لینے سے ذہن بلیا اثر کرتے ہیں،
 علامات : مریض کو کوئی چیز کھانے وقت منہ میں دھاتی ذائقہ
 محسوس ہوتا ہے، تالو کا پچھلا حصہ اور خوراک کی نالی اس قدر سکڑ جاتے
 ہیں کہ کسی دوا کا دینا مشکل ہو جاتا ہے، منہ اور حلق میں سفیدی سی سفیدی
 پائی جاتی ہے، گلا گھٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، معدہ میں درد، قے اور اسہال
 آتے ہیں جن میں خون اور طعم کی آمیزش ہوتی ہے، مریض کا چہرہ خون کے
 اجتماع سے بھرا بھرا سا معلوم ہوتا ہے، بعض حالتوں میں زرد اور متخیر ہوتا
 ہے، پارہ سرعت سے حل ہو کر تمام دوران خون میں مل جاتا ہے، اور گردہ میں
 پہنچ کر خاص عمل کرتا ہے جس سے پیٹاب بنتا بند ہو جاتا ہے، اگر پارہ
 کا مریض جانبر ہونے لگے، تو اس کے منہ سے ٹھوک بکثرت خارج
 ہونے لگتا ہے۔

علاج : اس کا علاج سم الفار سے مختلف ہے، اس کے ذریعے
 اثر کو دفع کرنے کے لئے بہترین فادزیرانڈ ہے، جسے بہت جلد سے
 دینا چاہیے، اس کے استعمال سے قبل تالے کی کوشش نہ کریں، پارہ کا
 فادزیرانڈ سے کی زردی اور سفیدی باہم ملانے سے بنتا ہے، اور کیمیادی
 طور پر پارہ کے ہر ایک مرکب کو کسی دوسرے مرکب میں تبدیل کر دیتا ہے،
 جو کہ متقابل ذہن بلیا کم ہوتا ہے، اور نہ ہی جلد حل ہو سکتا ہے، چنانچہ آٹھ
 دس انڈوں کی زردی اور سفیدی کو باہم خوب پھینٹ کر پلائیں، پھر غوطہ پی
 بعد قے آور ادویہ دے کر قے کروائیں، یا سٹاک ٹوب سے معدہ کو

دھوڑالیں، نادر سے قبل ہرگز تے نہ کرائیں،

پیٹ کے درد اور اسہال کو روکنے کے لئے ایک دتی تک افیون
پانی میں حل کر کے پلائیں، پھر لعاب دار اشیا، پلا تے رہیں، صنعت کی
حالت میں سپرٹ ایوینا ایرومیک ۱۰ سے ۲۰ قطرہ مادہ اور المسک،
خمیرہ گاؤ زبان عنبری ۳ ماشہ سے ۶ ماشہ کھلائیں، اگر کسی موفع پرانڈے
نہ مل سکیں، تو اس صورت میں گندم کے آٹا کی پٹی سی لی بنا کر پلا دینا
مفید ہے۔

پارہ کے زہر میں اگر کھوک کی گلیاں اپنے عمل میں تیز ہو جائیں، اور
کھوک بکثرت پیدا کریں، تو مریض یقیناً صحت یاب ہو جاتا ہے، مصنوعی
ذرائع سے کھوک پیدا کرنا نافع ثابت ہوگا۔

مسرحہ ANTI MANY انٹی منی

علامات، ارمنہ میں دھاتی ذائقہ ہوتا ہے، مسلسل تے اور مثلی
ہوتی ہے، بعد میں دست شروع ہو جاتے ہیں، پیاس شدید آواز بیٹھ
جاتی ہے، پیروں میں تشنج، نبض کمزور ہو جاتی ہے، نگلنے کی قوت کمزور
ہو جاتی ہے، آخو میں مریض بالکل سبے ہو جاتا ہے، اور حرکت
قلب بند ہونے سے مر جاتا ہے، مریض عام طور پر چند گھنٹہ سے چار دن
کے اندر ہی مر جاتا ہے۔

علاج، اگر مریض کو تے نہ آتی ہو، تو سادہ طریقہ پر تے کرائیں، چائے
پلائیں، محرک قلب و دوائیں استعمال کریں، درد رنج کرنے کے لئے مارینا
مسور لی مقدار میں دیں، ہارن کو گرم رکھیں
ایڈرینے لین کا تیکہ بھی اس کے لئے مفید ہوتا ہے۔

فوسفورس PHOS PHOROUS

علامات : اس کے فوراً نکلنے کے بعد مندرجہ ذیل علامات
ظاہر ہوتی شروع ہو جاتی ہیں، گلے، معدہ میں درد، تپتی آتی ہے، جس میں
لبیدار مادہ خارج ہوتا ہے، اندھیرے میں دیکھنے سے اس کے اندر روشنی
ہوتی ہے، مریض تاریک جگہ پر سانس لے، تو سانس میں بھی روشنی معلوم ہوتی
ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، درد شدید ہوتا ہے، مریض بے چین، ہنڈھال
پر لیٹاں اور کمزور ہو جاتا ہے، اخیر میں ہڈیاں اور تشج بھی ہو جاتا ہے، اکثر
تکسیر، حمض اور خونی پیشاب بھی جاری ہو جاتا ہے۔

فوسفورس اسے ہارن تک ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔

علاج : ہارنٹا سیم پر منگنیٹ کے محلول سے سٹامک ٹوب کے
ساتھ معدہ کی صفائی کریں، مگنیٹیا سلفاس مقدار ۴ ڈرام پانی میں حل کر کے
پلائیں، حتیٰ کہ انتڑیوں سے فوسفورس خارج ہو جائے، روغنی
جلاب سرگز نہ دیں، رفع درد کے لئے مارفیا استعمال کریں،
ٹرین ٹائن آیل اس کا تریاق ہے، ۱/۲ ڈرام سرد و گھنٹہ بعد پلائیں۔

لیڈ

پیسیہ

علامات : تپتی، شدت پیاس، دائمی قبض، پیٹ درد،
عروق کی سکڑاہٹ، سردی کا احساس، خون کی سرخی اور کمی، گلے کی خشکی،
سر جھکانا اور تشج اس کے زہر کا نتیجہ ہیں، ابتداً خارج مقامی ہوتا ہے، اور
بعد میں مریض لہجہ ہو جاتا ہے، اس کے زہر کی خاص علامت یہ ہے کہ
مسوڑھوں کے گرد سیاہی نایل، شیلگوں و حاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اور سوچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

علاج : ار قے آور ادویہ کا استعمال کریں۔

گندھک، سوڈیم، نیکیشیا سلفاس اور پوٹاسیم آیوڈائیڈ مفید ادویہ ہیں۔

ممانہ

COPPER

کاپر

تبدلہ ہو جھٹھ، زنگار وغیرہ سے زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

علامات : سردرد، سبز مادے کی قے، انٹریوں میں کانٹے

کی سی درد، ٹانگوں اور رانوں میں درد اور اکثر یہ قان ہو جاتا ہے۔

علاج : اس کا تریاق

اس کے استعمال سے یہ دھات نہ حمل ہونے والے مرکب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قے آور ادویہ دے کر معدہ کو صاف کر دیں، پھر لعابدار ادویہ آش جو وغیرہ دیں۔ پیٹ درد کی حالت میں افیون کا استعمال کریں۔

چاندی

SILVER

سلور

علامات : خواش پیدا کرنے والی زہروں جیسی علامات ہوتی

ہیں۔ گلے اور معدہ میں درد، سفیدی مایل جالیدار مادہ کی قے، روشنی لگنے پر سیاہ ہو جاتی ہے۔

علاج : سوڈیم کلورائیڈ رکھانے کا نمک، ۴ ماشہ پانی میں گھول

کر پلائیں۔ اور قے آور ادویات استعمال کریں، بعد میں سفیدی بیضہ کا محلول پلائیں۔

شدت درد میں مسکنات استعمال کریں۔

سلور نامکٹریٹ بھی چاندی کا مرکب ہے۔

جست ZINC زنک

علامات : شدید قے ہوتی ہے، معدہ، پیٹ میں درد، منہ کا مزا دھاتی اور کسبلا ہوتا ہے، بعد میں دست شروع ہو جاتے ہیں، ہتھالیں ضعف سے موت واقع ہو جاتی ہے،

علاج : گرم دودھ کافی مقدار میں پلائیں، سفیدی بیضہ کا محلول پلائیں، گرم چائے اور کافی پلائیں
رفع درد کے لئے مسکنات کا استعمال کریں، ضعف قلب کے لئے مقویات اور محرکات استعمال کریں،

نشیثہ پساہو

علامات : معدہ میں درد، دست، خون وغیرہ، نشیثہ کے ذرات کا خارج ہونا،

علاج : بیمار کو روٹی آلود وغیرہ بہت کھلائیں، تاکہ نشیثہ کے ٹکڑے غذا میں مل جائیں، پھر قے آور ادویہ کا استعمال کریں،

ایبودین IODINE

اس کے استعمال کے فوراً بعد منہ اور گلے میں سوزش کے ساتھ درد شروع ہو جاتا ہے، جو فوراً معدہ تک پھیل جاتا ہے، حلق، معدہ میں جلن، درد، دست، پیاس کی شدت، دوران سر، تشنج، ضعف قلب وغیرہ علامات شروع ہو جاتی ہیں،

علاج : در شاک بڑھ اور تھے اور ادویہ کا استعمال کریں۔ نشانات
یامیدہ پانی میں گھول کر پلائیں، رفع درد کے لئے افیون استعمال میں لائیں

اوپیم

OPIMUM

افیون

علامات : یہ ایک عام استعمال ہونے والی زہر ہے۔ اس کی علامات
تین درجوں پر منقسم ہیں۔

درجہ اول : مرتضیٰ کی دماغی حالت میں ہيجان ہوتا ہے، چہرہ
سرخ اور حرکت قلب تیز ہو جاتی ہے۔

درجہ دوم : سر میں گرانی اور بوجھ اور چکر، مریض سستی محسوس کرتا
ہے اور مریض سونے لگتا ہے۔ نبض سست، ٹیلیاں سکڑ جاتی ہیں، تھے
آتی ہے، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے اور تنفس گہرا ہوتا جاتا ہے۔ مریض پر ہوشی
کی کیفیت ظاہری ہو جاتی ہے۔

درجہ سوم : اس درجہ میں مریض پر کامل بے حسی ظاہری ہو جاتی ہے،
نبض بالکل سست اور ٹیلیاں ہو جاتی ہے، منہ سوکھ جاتا ہے، آنکھوں
کی ٹیلیاں بالکل سکڑ جاتی ہیں، سانس خراٹے سے آتا ہے، سرد پسینہ
آتا ہے، مریض پر گہری غنودگی ظاہری ہو جاتی ہے، اور بیدار نہیں کیا جاسکتا
اسی حالت میں تنفس رک جاتا ہے، اور حرکات قلب بند ہو کر موت
واقع ہو جاتی ہے۔

افیون خالص صورت میں اور اس کے جوہر اور ٹینکچر استعمال کئے
جاتے ہیں۔

افیون خالص ۲ رتی، مارفیا ۲ ۱/۲ گرین ہلک ثابت ہوتی ہے۔

چونکہ افیون ایک عام استعمال ہونے والی دوا ہے، اس لئے انارٹی اور نئے نا تجربہ کار اور نئے نارغ التحصیل حکیم، ڈاکٹر اس کے استعمال میں بہت دفعہ نقصان اٹھاتے ہیں۔

علاج: ہر گرم پانی سے معدہ کو دھوئیں، پھر پوٹاسیم پرمنگنیٹ اگرین ایک پائٹ پانی میں ملا کر سٹامک ٹوب سے معدہ کو دھوئیں جتنے کہ محلول کا رنگ عنابی ہو جائے۔
یاد رہے پوٹاسیم پرمنگنیٹ اگرین، افیون، اگرین کو بے اثر کرتی ہے، یہ بے نظیر تریاق افیون ہے۔

مریض کو آرام نہ کرنے دیں، یعنی سونے نہ دیں، بلکہ ادھر ادھر پھراتے رہیں، معزز بنولہ ایک چھٹانک ایک سیر پانی میں حل کر کے پلائیں تیز ہتھوڑے، چائے وغیرہ پلائیں، ارڈین سلفاس، سٹرکینیا سلفاس، کینین، سوڈیم سیلی سلیٹ کی جلدی پھکاری کریں، ہاکہ، پاؤں کو گرم رکھیں، آکسیجن سونگھائیں، کورامین ۲ سی سی کا انجکشن اس کا تریاق ہے

C O C I N

کوکین

علامات: اس کے زیادہ استعمال سے جسم میں بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج: معدہ کو صاف کریں، بے ہوشی کی حالت میں ایمرینا کارب یا ایمائیل نائٹریٹ سونگھائیں، منعقد قلب کی حالت میں کورامین پذیر یعنی انجکشن استعمال کریں

سائنس بند ہونے کی صورت میں مصنوعی تنفس جاری کریں۔

کلوروفارم

علامات : بے ہوشی، تنفس کی رکاوٹ، نبض کمزور، دل کی رفتار تیز، طاقت میں کمی، ہاتھ، پاؤں مارنا، پیاس کی شدت، معدہ کا ڈوبنا، ہوا احساس، عضلاتی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔

علاج : برساتک میپ اور نفے آور ادویہ کا استعمال کریں، کچھ یا سٹرکینیا اس کا نوازہ سر ہے، کھلی ہو اس رکھیں، گرم تھوہ، ایچفرو وغیرہ محرکات از حد مفید ہیں، مصنوعی تنفس کی ضرورت ہو تو جاری کریں،

انٹی پائرین ANTI PEARIN

انٹی پائرین، انٹی فیرین، اسپیرین، فنٹین وغیرہ ایسی ادویہ ہیں جو عموماً تیز بخاروں اور اعصابی درودوں میں استعمال کی جاتی ہیں، جب ان کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے، تو یہ زہریلا اثر پیدا کرتی ہیں،

علامات : ان کے استعمال سے پسینہ اس قدر زیادہ آتا ہے، کہ جسم تر ہو جاتا ہے، نبض کمزور اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے، مریض بے حد کمزور ہو جاتا ہے، نفے آتی ہے، چہرے کی رنگت نیلی ہو جاتی ہے، بعض اوقات خسرہ کی مانند سرخ دانے بھی نکل آتے ہیں،

علاج : مریض کو آرام سے لٹائیں اور محرکات کا استعمال کریں خصوصاً کورائین بذریعہ انجکشن یا منہ استعمال کریں، سپرٹ ایونیا ابرومیشک ۲۰ قطرے پلائیں، جو اہر مہرہ بھی مفید ہے،

ہاتھ پاؤں گرم رکھیں، تنفس رکھنے کی صورت میں مصنوعی تنفس جاری کریں۔

نوٹ: نا بخیرہ کار اور انارڈی عطالی حکیم کے ہاتھوں یہ ادویہ زیادہ مقدار میں استعمال ہو کر زہریلے اثرات پیدا کرتی ہیں۔

کافور

علامات: سر چکرانا، سر درد، ہڈیاں غشی، سانس کی رکاوٹ اس میں نہ قبض آتی ہیں، اور نہ ہی درد ہوتا ہے۔

علاج: تھوڑے تھوڑے ادویہ کا استعمال کریں، بعد میں بہت سا پانی پلا کر کوئی تیز جلاب دیں، ضعف دور کرنے کے لئے کھورل ایفیر یا سپرٹ ایوینا استعمال کریں، سر کو ٹھنڈا اور ہاتھ پاؤں کو گرم رکھیں۔

بھنگ

علامات: روح اس باختم ہو جاتے ہیں، مہنسی خوب آتی ہے، مریض خوشی کے لغزے بند کرتا ہے، آخر کار بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے۔

علاج: تھوڑے تھوڑے ادویہ سے معدہ صاف کریں، اور زرخ اشیا استعمال کریں، سرد پانی کے منہ پر چھینٹے ماریں۔

دھتورہ

علامات: حلق اور منہ خشک، سر چکرانا، روح اس باختم ہو جانا نظر میں نمودار آ جانا، دیوانگی کی علامات کا ظہور، بال نوجنا، مریض چھینٹ مارتا ہے، آخر کار غشی کی حالت میں ہمیشہ کیلئے آرام کی بند سو جاتا ہے۔

علاج : اسٹاک ٹیوب اور منفی ادویہ سے معدہ کو صاف کریں ، بعد
 میں کیسٹر ایل یا گنیشیا کا جلاب دیں جب تین چار پاخانے آجائیں ، تو
 سینٹر کارپین ٹاسٹرٹ ۱۲ گرین کی جلدی پھکاری کریں ، اور ہاتھ ، پاؤں کو
 گرم رکھیں ، محرک ادویہ کا استعمال کریں ، مصنوعی تنفس جاری کریں ،

TOBACC

تباکو

یہ ایک عام استعمال کی چیز ہے جو قریباً تمام دنیا میں استعمال کی جاتی ہے ،
 علامات : اس کے کھانے کے فوراً بعد گھبراہٹ ، سرچرانا ،
 تلخی ، جی منڈانے لگتا ہے ، نظر دھندلی ہو جاتی ہے ، ٹھنڈا پسینہ آنا
 نبض کا کمزور چلنا اور دم گھٹنا اور سادھ ہی جلد بھی سرد پڑ جاتی ہے ،
 بعض اوقات تشنج بھی ہو جاتا ہے ،

علاج : رتے اور ادویہ کا استعمال کریں ، اسٹاک ٹیوب سے معدہ کو
 دھوئیں ، چائے اور قہوہ پلائیں ، محرک ادویات کا استعمال کریں ،
 گرم دودھ پلانا بھی مفید ہے ، بادام روغن ناک میں ٹپکانا بھی
 مفید ہوتا ہے ،

نکسوامیکا

NUXVAMICA

چکلہ

یہ بھی ایک شدید زہر ہے جو دوا شدہ کی مقدار میں زہر قاتل ہے ، اور اس
 کا جوہر سٹرکنین ۱۲ گرین سے ۲ گرین تک مہلک ہے ،
 علامات : اس کے کھانے کے تھوڑے عرصہ بعد زہریلے اثرات

ظاہر ہو جاتے ہیں۔ منہ کا ذائقہ سخت کڑوا، دم گھٹتا ہے، بے چینی بھید
 بڑھ جاتی ہے، دماغی کمزوری، چہرہ سرخ اور تناوٹ ہوتی ہے، ذہن
 بصارت اور قوت سماعت تیز ہوتی ہے، آنکھیں روشن اور ٹمٹکی بندھ
 جاتی ہے، زہر خوردہ کو بے ہوشی لاحق نہیں ہوتی، عضلات تنفس مفلوج
 ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔

علاج: در تشنج واقع ہونے سے قبل تھے آور ادویہ دے کر فوراً
 معدہ کو صاف کریں، تشنج کی حالت میں کلورڈ نارم سوئگھانا مفید ہے،
 گرم دودھ زیادہ پلانا مفید ہے۔

تھے لانے کے لئے ٹیکچر آئیوڈین ۳۰ بوند پانی میں ملا کر پلائیں،
 یا ایپو مارفین ۱/۲ ڈروکلورائیڈ ۱/۲ گرین کی جلدی بھکاری کرنا نہایت مفید
 ہے۔ سٹاک بیٹوب سے معدہ کو دھوئیں، پوٹاشیم برومائڈ بقدر ۲ ڈرام
 پانی ملا کر پلانا بھی مفید ہے۔

مٹھا تیلہ ACO NIT اکو نائٹ

یہ کثرت فوائد کے لحاظ سے اکثر ادویات میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے
 بعض اوقات غلطی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے زیادہ مقدار کھا لینے سے
 فوراً اپنا زہریلا اثر دکھاتی ہے۔

علامات: رکھانے کے کھوڑا عرصہ بعد زبان اور منہ کا بے حس
 ہونا، بدن پر چیونٹیاں پھرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اس کا خاص اثر اعصاب
 پر ہو کر حسی اعصاب کے فعل کو معطل کر دیتا ہے، جی متلانا، تھے آنا
 نبض کی کمزوری اور بے قاعدگی، جلد نیلگروں اور نظر دھندلی ہونا اس
 کی عام علامات ہیں۔

علاج: ہر سٹاک ٹیوب اور تھے آور ادویہ سے معدہ کو صاف کریں۔ ڈیٹیس ۲۰ قطرات پلائیں۔ یا بیہ گریں کی جلدی چکاری کریں۔ دم گھٹنے کی صورت میں مصنوعی تنفس جاری کریں۔ محرکات کا استعمال مثلاً جوارکش مفرح، مفرح یا قوی یا سپرٹ ایبونیٹا ایرومینگ دیں۔ نارمل سیلان کو بذریعہ رکٹم یا ویدی ذریعہ سے اندہ داخل کریں۔ بیریڈنی طور پر مقام قلب پر رانی کا لیپ کرنا بے حد مفید ہے۔

جھالکوٹ CROTON SEED کروٹن سیڈ

عام طور پر اکثر حکیم جلاب وغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، غلطی سے زیادہ مقدار میں دئے جانے سے زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔
علامات: ہر معدہ میں سخت درد، تھے اور دست بہت زیادہ جسم زرد اور پھیکا، پسینہ آتا ہے، نبض کمزور ہو جاتی ہے، ہڈیاں ہوتا ہے۔

علاج: ہر سٹاک ٹیوب یا منقی ادویہ سے معدہ کو صاف کریں۔ انڈوں کی سفیدی پانی میں حل کر کے پلائیں۔ دودھ، گھی کا خوب استعمال کریں۔
ٹینکچر بیلا ڈونا سے ۵ قطرے کی مقدار میں دینا اس کا تریاق ہے۔

رفع درد کے لئے ایفون یا مارینن چم گریں کی زیر حید چکاری کریں۔

محرک ادویہ کا ہمراہ استعمال رکھیں۔

بھلا نوہ

علامات : ہر سردی طور پر جلد پر لگانے سے خراش اور سوزش پیدا کرتا ہے۔ اور جس جگہ اس کا تیشیر لگ جاتا ہے، اس جگہ آبلہ پڑ جاتا ہے زیادہ مقدار لگ جانے سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔
علاج : اخروٹ کا استعمال اس کا تریاق ہے۔
سردی طور پر دھن اخروٹ لگائیں، فوراً تمام علامات رفع ہو جاتی ہیں، اور خوردنی طور پر بھی اخروٹ کی گری کھلائیں۔

دیجیٹلس DIGITALIS

دل کو طاقت دینے کے لئے ایک عام استعمال کی دوا ہے، زیادہ مقدار بار بار دینے سے زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔
علامات : غشی، نبض بے قاعدہ، کمزور اور حسرت رتے متلی، سر درد اور اذ حد ضعف، رتے میں سبز مادے کا اخراج، پیشاب کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔

علاج : اسٹاکم ٹوب اور رتے آور ادویہ کا استعمال کریں۔ مریض کو آرام سے رکھیں، پے گرین سٹرکنیا کی جلدی پھکاری کریں، محرکات دیں، نیز قہوہ پلائیں، یونیورسل نسخہ استعمال کریں۔

تارپین TERPENTIAN

علامات : سانس سے تارپین کی بو، خراٹے سے سانس، مثانہ میں خراش، آخر میں کوما اور تشنج کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

علاج : ہر سٹاک ٹوب سے معدہ کو صاف کریں ، اور بعد میں گینیشیا
 اور ادس پانی میں حل کر کے پلائیں ، جلاب آنے کے بعد جو کاپانی پلائیں
 رفع درد کے لئے ایفون کا استعمال کریں ،

کھنکھ

یہ عام طور پر موسم برسات میں پیدا ہوتی ہے ، اور لوگ سالن پکا کر کھاتے ہیں ،
 علامات : اس کی علامات میضہ کے مشابہ ہوتی ہیں ، عموماً کھانا
 کھانے کے بعد تکلیف شروع ہو جاتی ہے ، پیٹ میں درد ، تھکے ، اہمال
 وغیرہ آتے ہیں ،

علاج : ہر تھکے اور ادس سے تھکے کر دہیں ، جلاب دیں ، یا
 حقنہ کریں ، رفع درد کے لئے شکم پر گرم ٹکڑ کر کے ، محرکات کا استعمال
 کریں ، قہوہ براندی پلائیں ،

مٹی کا تیل

مٹی کا تیل ، پیرولیم ، پیرامین ان میں سے کسی کو کھانے سے زہریلی علامات
 پیدا ہو جاتی ہیں ،

علامات : ہر منہ ، حلق ، معدہ میں سوزش اور درد ، تھکے آتی ہے
 جس میں تیل کی بو پائی جاتی ہے ، چہرہ زرد ، متفکر ، نبض کمزور اور بے قاعدہ
 تنفس گہرا ہوتا ہے ، بعض دفعہ بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے ،

علاج : ہر سٹاک ٹوب اور تھکے اور ادس سے معدہ خالی کریں ،
 اور پھر محرکات کا استعمال کریں ، سرٹکینیا پلگرین کی جلدی پھکاری کریں ،

جسم پر مالش کریں، کچھ مدد پر ۲ سے ارٹی تک دو تین بار دیں،

شراب ALCOHOL الکوحل

یہ ایک عام نشہ آور استعمال کی چیز ہے، جو جوانوں کے لئے اڑھائی سے لے کر پانچ اوئس تک مہلک ہوتی ہے،

علامات اور مریض کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، اور منہ سے شراب کی بو آتی ہے، خیالات پریشان، جوش اور ہڈیان کے ساتھ چال میں لڑکھڑاہٹ اور بے ہودہ گفتگو، متلی اور تھکے اس کی عام علامات ہیں، شدت حالات میں چہرہ زرد یا نیلا، جلد ٹھنڈی، عنودگی اور سانس گھٹنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اگر علامات بڑھتی جائیں، تو حرکت قلب تنفس کی بندش کی وجہ سے بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے،

علاج: رشتہ ایک بیٹوب یا تھے اور ادویہ سے فوراً معدہ کو دھوئیں گرم چائے اور کافی پلائیں، محرک قلب ڈیجیٹلین، سٹرکینین، کورامین میں سے کسی ایک کا انجکشن لگانا چاہئے، مصنوعی تنفس جاری کریں اگر سر کی سطح گرم ہو، تو ٹھنڈے پانی سے مریض کو بہلانا چاہئے،

تیزاب SULPHURIC ACID

تیزاب گندھک، شورہ، نمک یہ جلا دینے والے زہر ہیں، علامات اور خالص تیزاب گندھک کے استعمال کرنے کے بعد شدید درد اٹھتا ہے، شدت درد کے باعث تشنجی دورے شروع ہو جاتے ہیں

گیس کی ڈکاریں ، ابکیاں اور تھے شروع ہو جاتی ہے ، پیاس کی شدت اور نگلنا دشوار ہو جاتا ہے ، مریض نڈھال ، کمزور اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں ، عام طور پر تیزاب نگلنے کے چند گھنٹے بعد ہی موت واقع ہو جاتی ہے ، جوانوں میں ایک ڈرام کی مقدار مہلک ثابت ہوتی ہے ،
علاج : زہر تھے کرانا اور سٹانک یوٹ سے معدہ کو دھونا منع ہے کیونکہ اندرونی لعابدار تھلی پہلے حل چکی ہوتی ہے ، ان کے استعمال سے اور چھد جائے گی ، یہ نسخہ استعمال کریں ،

چونہ ایک تولہ ایک سیر پانی میں ملا کر پلائیں ، دیگر الکلیز ، سوڈا بائیکاربوہی ، دیسی صابن ، لکڑی کے کوئلے کی راکھ جو بھی میسر ہو ، دو تولہ کی مقدار اندرونی طور پر پانی میں ملا کر پلائیں ، اگر باہر کا حصہ حل گیا ہو ، تو ان ادویہ کا ضماو کریں ، اور ان کے بعد روغن بادام ، روغن تل وغیرہ روغنات ۲ چھٹانک ایک گلائش پانی میں ملا کر پلائیں ، رفع درد کے لئے افیون کا استعمال کریں ، طاقت کے لئے غذائی حقنہ کریں ،

ایسڈ کاربائلک

علامات : ارمہ حلق ، معدہ میں جلن ، جلد کی رنگت گہری نیلگوں ، پاخانہ کی رنگت سیاہی مائل ، پیشاب گہرا سیاہ ، حرارت بدن کم دل کا فعل اکثر معطل ہو جاتا ہے ، اگر باہر جلد پر لگ جائے ، تو اول جلد سفید ، پھر سرخ ہو کر زخم بن جاتا ہے ،

علاج : سوڈا بائیکاربوہ کو سیر دنی طور پر پانی میں حل کر کے لگانا از حد مفید ہے ، اگر کسی نے کھالیا ہو ، تو اول سٹانک یوٹ سے معدہ کو صاف کریں ، انڈے کی سفیدی اور دودھ کا استعمال کریں ،

معدہ کو صاف کرنے کے بعد مگنیشیا سلفاس ۲ ٹولہ پانی میں حل کر کے پلانا از حد مفید ہے۔

ایسڈ ہائیدروسیانک^ط

علامات : در حواس خمسہ کا زائل ہو جانا، تنفس سمست، نبض بالکل کمزور، پتلی، جلد سرد، اعضا ڈھیلے، سانس سے کڑوے باداموں کی بو، علاج : اسٹامک ٹیوب اور منقعی ادویہ کا استعمال کریں، سر اور رڑھ کی ہڈی پر دگرنے کے ناصدے سے سرد پانی ڈالیں، ڈاکٹری نادر ہر پلائیں محرکات کا استعمال کریں، ایبقر یا اٹروپین پہلے گرین کی جلدی پھکاری کریں،

ایگز بلک ایسڈ^ط

علامات : متواتر خراش، جلن، درد، تپ، نبض کمزور، جلد سرد، ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے بے حس، سخت پھپھنی اور تشنج ہوتا ہے، علاج : لائٹ وارڈ، چونے کا استعمال از حد مفید ہے، دیگر چودہ دس تیزابوں کے بیان میں ہے،

کاسٹک پوٹاش سوڈا^ط

علامات : در منہ، حلق، پیٹ میں شدید جلن کا احساس اور درد ہوتا ہے درد اور مردڑ سے دست آتے ہیں، مھوک میں خون اور جسم سرد ہوتا ہے، علاج : ترش استہار مثلاً لیموں کا رس، سرکہ، اٹلی کا گودا وغیرہ کا استعمال از حد مفید ہے، کیونکہ ایلیگز کا تریاق ایسڈ ہے، اور ایسڈ کا

تریاق ایلیکیز ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ کھاری چیزیں زرخشی میں مل کر
بے ضرر نمکوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، تو روغن بادام، روغن زیتون پلا دیں، اور
کمزوری کی حالت میں محرکات دیں، رفع درد کے لئے مسکنات دیں،

کاربن مانو اوکسائیڈ^ط کاربن ڈایا اوکسائیڈ^ط

کاربن مانو اوکسائیڈ خطرناک زہر ہے، کیونکہ خون کے آکسیجن
جذب کرنے والے سرخ دانوں کے ساتھ مل کر ایسا مرکب بناتی
ہے کہ وہ دوبارہ کیمیائی طور پر ٹوٹ نہیں سکتا،
اس لئے جب آکسیجن جذب ہو کر جسم میں نہیں جاتی، تو مریض
کام گھٹنے لگتا ہے،

کاربن ڈایا اوکسائیڈ جلنے کے عمل سے پیدا ہوتی ہے جو
دلی بھٹیوں اور بھٹیوں میں عام ہوتی ہے،

علاج

مریض کو کھلی ہوا میں رکھیں، مصنوعی تنفس جاری کریں، سینے اور
چہرہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں
آکسیجن سونگھا لیں، محرکات کا استعمال کریں، جسم کو گرم
کریں،

نارمل سیدائن سولیکیشن کی پچکاری بذریعہ دریدیا رکھیں،

سانپ کا ڈسنا

سانپ کی بے شمار قسمیں ہیں، اور اکثر مہلک ہوتے ہیں۔
علامات :- جہاں سانپ کاٹے، اس جگہ پہلے جلن ہوتی ہے۔
 پھوڑی دیر بعد نشتر چھینے جیسا درد ہوتا ہے، جلد متورم، بے حس اور
 نیلگوں ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سارا عضو بے حس ہو جاتا ہے۔ اور
 تمام جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، زہر چڑھ کر پہلے سر درد محسوس ہوتا
 ہے، بے حسی، گھبراہٹ، پھر بے ہوشی غالب ہو جاتی ہے، آنکھوں کی
 پتلیاں پھیل جاتی ہیں، مریض لڑکھڑاتا ہے، اگر سانپ سخت زہریلا
 ہو، تو کاٹے ہوئے مقام سے خون سیاہ رنگ کا رستا ہے، اور متواتر سخت
 درد ہوتا ہے، اکثر ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، جلد کے نیچے مختلف
 مقامات پر خون کے دھبے پڑ جاتے ہیں، کبھی خونی پیشاب اور خونی اسہال
 آنے لگتے ہیں، علامات کی تیزی اور شدت سانپ کی قسم پر منحصر ہے۔

علاج :- سب سے پہلے اگر ہو سکے، تو زخم سے ادریسے ۲ انچ
 کے فاصلہ پر رسی سے مضبوط بند لگا دیں، تاکہ مقامی طور پر دوران خون بند
 ہو کر زہر جسم میں نہ پھیل سکے، اور بعد میں کاٹے ہوئے مقام پر چاقو یا نشتر
 سے اس x نشان کے مطابق دو گہرے پٹے ایچ چیرے دے جائیں
 اگر میسر آ سکے، تو زخم پر سیکنی لگا دیں، اور جب تک زہریلی علامات میں
 کمی واقع نہ ہو، بند نہ کھولیں

۲۰، زخم کو خود مریض یا دوسرا آدمی چوس کر بخوکتا جاوے، بشرطیکہ
 چوسنے والے کے منہ میں زخم یا گوشت خوردگی مرض نہ ہو، اور

چوس چکنے کے بعد منہ کو صاف کرے۔

۱۳۔ اگر ایسی جگہ سانب کاٹ لے جہاں بند نہ لگ سکتا ہو، تو کاٹنے ہوئے مقام کو چیرہ X دے کر سلگتا ہوا کوئلہ یا سیخ بہت گرم رکھ کر زخم کو جلانا چاہئے۔ اگر فوراً یا آدھ گھنٹہ کے اندر اندر مریض علاج کے لئے پہنچ جائے، تو فستق سے کاٹ کر X زخم میں ۲ ماسٹہ پرمینگنیٹ آف پوٹاش ڈال دیں جو لوگ سانب والی جگہ یا جھکات میں رہتے ہوں، تو ان کو سینک بکٹ لین سیڈ جس میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ بھرا ہوتا ہے، یہ ایک چاقو سے پاس رکھنا چاہئے، یا کم از کم پوٹاش اور فستق ضرور اپنے پاس رکھنی چاہئے، کیونکہ یہ دوا سانب کے زہر کا تریاق ہے۔

۱۴۔ سانب کاٹے مریض کو تیز رفتی اور ادویات مثلاً ریچھہ اماشہ دو تین دفعہ پلا کرتے کہ ادیں بکیر لگتے تھے، دست اور پسینہ آنے سے سانب کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔

جب اچھی طرح تھے، دست، پسینہ سے مواد خارج ہو جائے تو تحریکات استعمال کرادیں، کاٹے ہوئے مقام پر کاربالک ایسڈ اچھی طرح لگانا بھی مفید ہے۔

تریاق زہر سانب: زہر مہرہ خطائی اتولہ، روح کیوڑو خالص ۵ تولہ، دونوں کو اچھی طرح گھول کر کے بالکل خشک سفوف بنا دیں، بوقت ضرورت ۴ رتی تا ایک ماسٹہ پانی سے مریض کو کھلا دیں، اگر مریض بے ہوش ہو گیا ہو، تو منہ کھول کر اس کے حلق میں ڈال دیں، یہ دوا سانب کے زہر کا تریاق ہے، اس کے استعمال سے سانب کا زہر بالکل اتر جاتا ہے۔

تریق فاروق بھی زیریے اثرات کو دور کرنے کے لئے بہترین مسئلہ دور
ہے۔ شراب برانڈی کا مریض سائب کو پلانا بھی از حد مفید ہے۔ آتا پلا دیں
جس سے نشہ ہو جائے۔ سائب کا مریض کو سوتے نہیں دینا چاہئے
اگر مریض بالکل بے ہوش ہو۔ تو نو مشاوریسی پس کر آنکھ میں ڈالیں۔ اگر
مریض ہوش میں نہ آئے۔ تو مردہ خیال کریں۔

سیٹن مدر ٹیکر زخم پر لگائیں۔ اور اندرونی طور پر بھی کھلا دیں معمولی
قسم کے سانپوں کے زہر دفع کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔
گولڈرینا مدر ٹیکر۔ جمینا مدر ٹیکر۔ گایاکو $\times 4$ تا $\times 20$ ۔ سسروچی ام
مدر ٹیکر۔ انڈیگو $\times 3$ تا $\times 30$ ۔ مومیو پیٹنگ ادویہ بھی سائب کے زہر کے اثر
کو دور کرنے میں مفید و موثر ہیں۔ تفصیل کے لئے اسرار مومیو پیٹھی طبع دوم
ملاحظہ فرمادیں۔

بچھو کا کاٹنا

علامات :- بچھو کے ڈنگ مارنے سے مقام نیش پر سخت
درد ہوتا ہے جس کا اثر تمام جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اثرات شدت
درد سے دل گھٹنے لگتا ہے۔
علاج :- مقام نیش کو دبا کر یا نشتر سے خون نکال دینا چاہئے۔ اس
سے زہر کم ہو جاتا ہے۔

امرت دھارا۔ مریم زنبک۔ یو کلیٹس آئل۔ کلوروفارم۔ آب پیاز۔
دھتورے کے ڈوڈے کا پانی۔ اینون کا محلول ان میں سے جو بھی میسر ہو مقام
نیش پر لگائیں۔ بدھ کین ۲ گرین نصف سی سی ڈسٹیلڈ واٹر میں حل کر کے مقام نیش
پر انجکشن کریں۔ درد کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔

لیگزین ساختہ مایہی جام رانڈیا، کاسونگھانا، مچھو کاٹے کا فوری اور
مغرب علاج ہے۔

بھڑپا شہد کی مکھی کا کاٹنا

ان جانوروں کے کاٹنے سے مقام نیش پر درد ہوتا ہے، اور سوجن ہو جاتی ہے
علاج اور مقام نیش کو دبا کر ڈنگ کو خارج کریں، اور دبا کر یا نشتر
سے قدرے خون خارج کریں، مچھو کاٹے کی تمام ادویات کا استعمال کرنا
بے حد مفید ہے۔

باب ہشتم امراض عامہ

اسکریوٹ SCURVY سکروی

وجوہات و تشخیص اس مرض میں مسوڑے سے پیپے اور نرم ہو جاتے
میں راہ جسم کے مختلف مقامات سے جریان خون ہونا شروع ہو جاتا ہے
اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ نفیس تغذیہ (دماغ کی کمی) سے ہوتا ہے۔

علاج: روٹامن سی کا استعمال کرنا اس مرض کا شافی علاج ہے
اس کا اصلی نام اسکوربک ایسڈ ہے، جو کئی دوا ساز کمپنیاں مختلف تجارتی
ناموں سے تیار کرتی ہیں، مثلاً

سپلین رگلکسوم، روٹاکسون (روڈیٹی) سیبی اون (ای مرک)
کنٹن (ریوٹیسٹ) بیٹا سیرین (ری) سوی من (سی ڈی سی)
سیوی بیٹ (بارم) الیکورول (روٹامنز لمیٹڈ)

افعال و خواص: روٹامن سی کی کمی سے پیدا شدہ تمام عوارض
مثلاً مسوڑھوں کی بیشتر امراض رزم اور پیلو ہونا، ماسحورہ، جریان خون
مکروہی دانت، قلت الدم کے لئے مفید و تجرب ہے۔
زکام، نمونہ، سکروہی اور جراثیمی امراض میں جسم کی قوت متقابلہ
بڑھانے کے لئے بہت استعمال ہوتی ہے، غذا کے استعمال میں مدد
دیتی ہے، جسم کے خلیات کو طاقت بخشتی ہے، صحت کو جلد از جلد
بحال کرنے میں مدد دیتی ہے، خون کے سرخ ذرات زیادہ مقدار میں
بناتی ہے، دوران حمل، دوران زچگی، شدید امراض کے بعد، پرانے
زخموں کو مندمل کرنے کے لئے اکسیر ہے، اور بڑی ٹوٹ جانے میں
بہت مفید ہے۔

بطور حفظ یا تقدم سنگرزے کا رس کھلانا چاہئے، تازے میوے
نارنگی، انار، سنگرزہ، مالٹا، انوپے، ٹارٹ خفوصیت سے
مفید ہیں۔

سبز ترکاریوں مثلاً گاجر، مولی، شلغم وغیرہ کھلانے چاہئیں
نمک شہد، گوشت، مچھلی، باسی یا خراب غذا سے
قطعاً بدبیز کرائیں۔

بیر کی بیماری BERI BERI

وجوہات و تشخیص : یہ مرض دھان بی الف کی کمی سے ہوتا ہے۔
درحقیقت نقص تغذیہ کی بیماری ہے۔ اس میں مچھلی اعصاب کا ورثہ ہو جاتا
ہے جس میں دل، پیچھے اور ٹانگوں کے اعصاب زیادہ مبتلا ہوتے ہیں
اور بعض مریضوں کو استسقا بھی ہو جاتا ہے۔

علاج : دھان بی الف اس مرض کا شانی علاج ہے۔ اور مناسب
غذا کا انتظام کرنا ضروری ہے۔

اسے ایبوزین یا کھیا مین کہتے ہیں۔ اسے کئی دوا ساز کمپنیاں مختلف
تجارتی ناموں سے تیار کرتی ہیں۔ مثلاً

نبروا (رودشی) بیرین (رگلیکسو) بیٹا من (رٹی) بی لکس (بارک)
ویکس (پارک ڈیوس) برتی من (سی ڈی سی) بی فورٹس (دھانز لمیٹڈ)
وڈنابی پز (وانڈرم) بیڈوم (شارپ اینڈ ڈوم)
افعال و خواص : یہ بدن میں نشاستہ کے استعمال میں مدد

دیتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی سے معدہ، دل اور اعصاب کی متعدد
امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بیری بیری، سورہنسی، بھوک کی کمی،
دامی قبض، پستی، دل کی دھڑکن، جہانی و اعصابی کمزوری، ہر قسم کی
دردیں، تشنج، تنگی تنفس، نالیج، قلت الدم و غیرہ۔ اور اس کے
استعمال سے مندرجہ بالا تمام امراض رفع ہو جاتی ہیں۔

نیز وضع حمل میں پیدا اسٹ کو نزدیک تر لانے اور درد زہ کو کم
کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۱۰۰ ملی گرام کا انجکشن کریں روزانہ ایک بار ،
بچوں کو حسب عمر کم مقدار میں کریں۔

نیز اس کی ۱۰ - ۲۵ - ۵۰ - اور ۱۰۰ ملی گرام کی خوراک لکھیاں
بھی ہوتی ہیں۔

مریض پیری پیری کو بالکل آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں ، اور
مریض کو ایسی غذا دیتی چاہئے جس میں وٹامن بی کثرت ہوں ، اور
صنعت قلب کی صورت میں معوی دھڑک قلب ادویات دیں۔

کمزور ریکٹس کا ٹیڑھا ہو جانا (RICKETS)

وجوہات و تشخیص اس مرض میں بڑیوں میں اجڑائے معدنی کم ہونے
سے وہ کمزور ہو کر ختم کھا جاتی ہیں ، یہ مرض وٹامن ڈی کی کمی اور
نا سغورس کی کمی کے باعث لاحق ہو جاتی ہے ، عموماً یہ بیماری شیرخوار
بچوں کو ہو جایا کرتی ہے ، بچے کو زلہ ، زکام ، کھانسی ، غلغلیہ بار بار
ہو جاتا ہے ، یہ مرض عموماً چار پانچ سال کی عمر تک رہتا ہے۔

علاج : بچے کی غذا کا انتظام کریں ، دالہ کے دودھ کے
ساتھ گائے کا تازہ دودھ دیں۔

وٹامن اے اور ڈی کا استعمال اس مرض کا شافی علاج ہے۔
ایڈکسولین ADEXOLIN (گلیسر)

پانچ پانچ قطرے صبح ، دوپہر ، شام پانی میں ملا کر دیں ،
لایکو اور وٹامن ڈی کن سنٹر میڈ

تین قطرے روزانہ استعمال کریں۔

کیسیم اور نا سفورس کے مرکبات استعمال کریں، گریٹ سیلٹ
 رچرڈل سیرپ، سٹنٹ ٹو جن اور کاڈ ٹور آکل کا استعمال اس مرض
 کے لئے مفید و محرب ہے۔

RHEUMATOID
 ARTHRITIS

جوروں کا پتھر اجانا

روئے نا پید آٹھرائی لٹس

تشخیص و وجوہات: یہ جوڑوں کی ایک بدانی مرض ہے جس میں
 جوڑوں کی کڑیاں اور ہڈیاں ناقص یا خالص ہو جاتی ہیں جوڑ سخت
 اور بد وضع ہو جاتے ہیں

یہ مرض عموماً سوزاک، نمونہ، مزمن وجع المفاصل، نفرس یا
 سیل وغیرہ سے ہوتا ہے، عموماً ہاتھوں، انگلیوں، کہنیوں اور گھٹنوں
 کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔

علاج: براہی سبب مرض کو دریافت کر کے رفع کریں،
 شدت مرض میں مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں، رفع درد
 کے لئے مسکنات استعمال کریں، اور ماؤف جوڑوں پر لٹی منٹ آئیوڈین
 کی انس کریں، اور جوڑوں کو بھارا دیں، یا ٹکڑ کریں،
 بعض اوقات ماؤف جوڑ کو بے حرکت کر دینے کے لئے
 سمپلٹ، بانڈج دیا جاتا ہے، تاکہ درد کو روکنے کے لئے زیادہ
 مسکن دوائیں نہ دی جائیں،

اگر سوزاک کا مریض ہو، تو سٹریپٹو پیٹریلین کا استعمال اس مرض
 کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔

چیمٹ ادویات

ہیوٹا زو ٹیڈین (ساختہ آرگیلی) یہ دوا وجع المفاصل، نفرس
تجر المفاصل اور دم کے لئے بہترین ہے۔ مقدار خوراک دو ٹمکیاں ہر دو
گھنٹہ بعد دیں۔

آکٹوفین (ساختہ شیرنگ) یہ دوا نینا کی سکونک ایسڈ سے
مرکب ہے۔ سوزش اور دم کو کم کرتی ہے، جب کہ جسم میں بورک ایسڈ
کی زیادتی ہو، خاص کر مفید ہے۔ نفرس اور وجع المفاصل میں بھید
مفید ہے۔ اس کے استعمال سے درد کم ہو جاتا ہے، اور بخار جلد اتر جاتا
ہے۔ جوڑوں، عضلات اور اعصاب کی دردوں میں بھید مفید ہے۔
مقدار خوراک ایک دو ٹمکیاں دن میں تین مرتبہ، ٹیکہ کی صورت
میں ۵ سی سی کا عضلاتی ٹیکہ کریں۔

ارگا پائسین (ساختہ گلی گلی) یہ دوا ایک مصنوعی مرکب ہے
اور دردوں کو کم کرنے کے لئے بہت مفید ہے، خاص کر جوڑوں
کے عوارضات میں بہت مفید ہے۔

ریو ماٹرم (ریاحی دردوں) گنٹیا، وجع المفاصل، عضلات
اور دیگر ساختوں کے ریاحی دردوں، آکھ اور قلب کے ریاحی عوارض
نیز اعصابی دردوں کے لئے بہت مفید ہے، لقوہ، شیلی کا، کلوتزہ
وغیرہ میں بھی دیا جاتا ہے، مرگی کے مریضوں میں اس کا استعمال نہ
کرنا چاہئے، نیز دل اور گردہ کی مزمین امراض میں بھی اس کا استعمال نقصان
دہ ثابت ہوتا ہے، انجانا کی علامات ظاہر ہونے پر فوراً موقوف کر دیں۔
مقدار خوراک ۵ سی سی کا گمراہ عضلاتی ٹیکہ روزانہ یا دوسرے دن کریں،
ٹمکیوں کی صورت میں ۲ ٹمکیہ دن میں تین بار دیں۔

موٹاپہ A DIPOSITI (رائڈمی پوسٹی ٹی)

وجوہات و تشخیص اس مرض میں جلد کے نیچے اور اندرونی اعضا پر چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے جسم موٹا ہوتا جاتا ہے۔ بعض خاندانوں میں یہ مرض موروثی ہوتا ہے زیادہ کھانے پینے خصوصاً چربی، مٹی اور نشاستہ دار غذا پس کھانا، ورزش اور ریاضت نہ کرنا اور خاص کر عورتوں کو حیض کے بند ہو جانے کے بعد یہ مرض ہو جاتی ہے۔ مرض ذیابیطس اور گردوں کی پرانی سوزش کی وجہ سے بھی بعض اوقات موٹاپہ ہو جاتا ہے۔

علاج در موٹاپے کی طرف میلان ہو تو غذا کو کم کر دینا چاہئے۔ مرض چربی اور شیریں غذاؤں سے پرہیز کر لیں، ہر روز پیدل سفر کرنا اور سخت ورزش کرنا اس مرض کے لئے مفید ہے، موٹے آدمی کو زیادہ سونا نہیں چاہئے۔

کروشن سالٹ KRUSCHEN SALT

یہ سوڈا سلفاس، مگنیشیا سلفاس اور پوٹاشیم آکسائیڈ وغیرہ نمکیات کا جو ش دار مرکب ہے۔

مقدار خوراک ہر ایک ڈرام صبح اٹھتے ہی ایک ادش پانی میں حل کر کے پلاویں

ایکسپرٹ کیٹ حقانی رائڈ اس مرض کے لئے بے حد مفید ہے لیکن اس دوا کو احتیاط سے دینا چاہئے، شروع میں ایک گزین

دن میں دو بار دیں، اور اس کو اس طرح بڑھاتے جائیں کہ اگر ہر
روزانہ کی مقدار تک پہنچ جائے۔

اگر دوران استعمال میں مریض کی نبض فی منٹ ۹۰ مرتبہ سے
زیادہ حرکت کرنے لگے، تو اس دوا کی مقدار خوراک کو کم کر دینا
چاہئے، اور دل دھڑکنے لگے، تو اس کا استعمال موقوف کر دیں۔
یہ دوا مندرجہ ذیل تجارتی ناموں سے ملتی ہے۔

یوپیرون (ایمن اینڈ، نمبری)

پیرا کھون مون (رٹی)

بائبروڈن (پارک ڈیوس)

ہلکاؤ RABI (رے پیر)

وجوہات تشخیص : یہ ایک شدید متعدی مرض ہے جو باؤلے
کٹے کے کاٹنے سے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اس مرض کا زہر
مریض کے لعاب دہن (رہال) میں ہوتا ہے، کٹے کے علاوہ پاگل
بھیر طیبے، گیدڑ، لومڑی، ہرن وغیرہ کے کاٹنے سے بھی یہ مرض
ہو جاتا ہے۔

باؤلے کٹے کے کاٹنے کے بعد مریض اس خوفناک مرض
سے پریشان رہتا ہے، مقام زخم پر سوزش اور درد محسوس کرتا
ہے، روشنی اور بلند آواز کو برداشت نہیں کرتا، پانی پیتے وقت

گلا گھٹتا سا معلوم ہوتا ہے۔ گلے اور نرخرے کے عضلات میں تشنج ہو کر گردن سخت ہو جاتی ہے۔ پانی سے بہت ڈرتا ہے اور پانی کے دیکھتے ہی یا پانی کا نام سنتے ہی گلے میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ مریض پانی نہیں پی سکتا۔ بلکہ اس کا نام بھی نہیں سن سکتا۔ منہ سے رال بہتی ہے۔ ۱۰۱ یا ۱۰۲ درجہ کا بخار ہو جاتا ہے۔ شدت مرض میں ہڈیاں ہو جاتا ہے۔ پھر تشنج یا ایمنٹن کا ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اور عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور مریض بے حس و حرکت۔ بے ہوش ہو کر دل کی حرکت بند ہونے یا دم کے بند ہونے سے مر جاتا ہے۔

علاج

اس مرض کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے۔ راہ خارجی اور ۱۲ داخلی۔ اگر باؤ لاکتا ہاتھ، پاؤں، پنڈلی یا کلائی پر کاٹے، تو زخم کے اوپر کی طرف ایک مضبوط پٹی باندھ دینی چاہئے۔ تاکہ زہر خون میں نہ مل جائے۔ پھر زخم کو پانی سے اچھی طرح دھو کر لوہے کی گرم سلاخ یا کوکے سے داغ دیں۔ داغ دینے سے زخم جل جاتا ہے۔ اور مرض پیدا ہونے نہیں پاتا۔ اگر کاٹنے کے گھٹنے آدھ گھٹنے بعد بھی زخم کو جلا دیا جائے۔ تو بھی مرض دیر کے بعد ہوتا ہے۔

آگ کے علاوہ کاربائلک ایسڈ، سلورنائٹرٹ یا خالص تیزاب سٹورہ سے بھی زخم جلا یا جاسکتا ہے۔ اور اس مرض کا ثانی علاج کرانے کے لئے کسی قریبی سرکاری ہسپتال میں مریض کو داخل کر دانا چاہئے۔

انٹی ریک ویکسین

اس کے انجکشن اس مرض کا ہنایت مجرب اور کامیاب علاج ہے۔ اور یہ میڈیکل اور نرسنگ کی نگرانی میں لگائے جاتے ہیں، اس لئے مریض کو ہسپتال میں داخل کرانا ضروری ہے۔

جب مرض کا غلبہ ہو جائے، تو پھر یہ مرض لا علاج ہے، اور غلبہ مرض میں پہلے علاج اس طرح ہوتا تھا، کہ مریض کا دھندلے خون اس قدر نکال دیا جاتا تھا، جس سے مریض بے ہوش ہو جاتا، لیکن یہ علاج مفید ثابت نہیں ہوا، شدت مرض کی صورت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

THY ROTOTOXICOSIS

گلہڑ

رختھالی روٹوٹوکسیکوسس

وجوہات و تشخیص: اس مرض میں اکثر گلے کے اوپر غیر طبعی گوشت بڑھ جاتا ہے، اور گلا پھول جاتا ہے، زیادہ تر عورتوں کو یہ مرض ہوتا ہے۔

غذہ ورقیہ کے افزائت کی زیادتی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی نفسیاتی سبب کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، علاج: اس مرض کا علاج در طرح ہوتا ہے۔

۱۔ اپریشن کرنے سے اور ۲۔ دوا کے ساتھ۔

جب گلہڑ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو، اور دوائی علاج موافق نہ
پڑا ہو، تو پھر آپریشن کرنا چاہئے۔ ورنہ عام حالتوں میں دوائی
علاج سے شفا یابی ہو جاتی ہے۔

دوائی علاج

ٹھائیرائیڈز گلینڈز کا استعمال اس کا مجرب علاج ہے۔
ہیپلٹ آف ٹھٹھوراسل

۳ گرین روزانہ کھلائیں، ایک ماہ کے بعد مقدار خوراک
گھٹا کر ۱/۲ گرین کر دیں، اور ۲ ماہ تک یہی خوراک جاری رکھیں،
آخر میں صرف ۱/۴ گرین روزانہ مزید تین ماہ کھلا کر یہ دوا
بند کر دیں۔

اگر دوران استعمال میں کسی علامات قے، بخار، درد گلو،
غدر مفادہ کا بڑھ جانا اور دورے پیدا ہو جائیں، تو دوائی کی
مقدار کو کم کر دینا چاہئے، یا بالکل بند ہی کر دینا چاہئے۔

نوٹ: اگر مرض خفیف ہو، تو ۳ گرین کی

بجائے ۱/۲ گرین شروع کرنی چاہئے

کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے

غذہ ورقیہ کے افرازات کم ہو جانے

کا احتمال ہے۔ جس سے نقصان پہنچ

سکتا ہے

معمولی حالتوں میں ٹھیکر آئیوڈین روزانہ تین بار لگانے سے بھی

گلہڑ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔

دوائے گھبر

ریڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری ۴ گرامین ، ویزلین ایک اونس ،
مرہم بنائیں ، اور تھوڑی سی مرہم لے کر گھبر کے اوپر لگا کر
نل دیا کریں ، دن میں دوبارہ اس کے استعمال سے ہی معمولی
گھبر رفع ہو جاتا ہے ،

دوائے گھبر

یہ دوا گھبر کے لئے نہایت مفید ہے ، قدرے دوا گھبر پر
مل دیں ، اور روزانہ استعمال کریں ، جس وقت باریک ثبور است
برآمد ہوئے لگیں ، تو دوا ترک کر دیں ، دو تین یوم جب وہ
سوزش اور ثورات مدہم ہو جائیں ، پھر شروع کر دیں ، اور
متواتر اس وقت تک استعمال جاری رکھیں ، جب تک گھبر جلد
کے برابر نہ ہو جائے ، یعنی جب تک بالکل نابود نہ ہو جائے ،
نیز رسولیوں کے لئے بھی اسی طرح مفید ہے ،

نسخہ : دارچینا ۵ تولہ ، پانی ایک سیر میں حل کریں ، اور پوٹاسیم
آئیوڈائیڈ ۵ تولہ کو ایک پائ پانی میں حل کر کے ہر دو کو ملا لیں ،
جب درود نشین ہو جائے ، اور پانی نفع آئے ، تو باقی ماندہ
حصہ کو خشک کر لیں ، اب اس دوائی کے ایک حصہ میں لکھن ۶ حصہ
شامل کر لیں ،

ترکیب استعمال

گھبر پر لگائیں ، گھبر کے علاوہ خنا زیر کے لئے بھی مفید ہے ،
اگر کوئی نفسیاتی سبب ہو ، تو اس کا تدارک کرنا چاہئے ،

گلہڑ کا با یو کیمک علاج

کلکیر یا فلوریکا

جبکہ گلہڑ پتھر کی مانند سخت ہو گیا ہو، یہ اس مرض کی عمدہ دوا ہے۔ نئی اور پرانی دونوں حالتوں میں مفید ہے۔
مقدار خوراک ۶ تا ۱۲ دن میں ۴ خوراک دیں،

کلکیر یا فاس

اس دوا کو کلکیر یا فلوریکا کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینا چاہئے دن میں ۴ خوراک ہمراہ آب دیں،
نیم گرم فاس : یہ دوا گلہڑ کے لئے بہت مفید ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ یہ دوا گلہڑ کو بہت جلد ختم کر دیتی ہے،

دن میں چار خوراک دیں،

سلیشیا

یہ دوا خنازیری مزاج والے مریضوں کے لئے بہت عمدہ ہے،

علاوہ ازیں خواب سے خواب زخم، مواد، پھوڑے، پھینسی،
نا سورا، بار بار نا سورا ہونا، چیچک، کھانسی، رقی، سرطان وغیرہ
کے لئے بھی مفید ہے۔

دن میں چار خوراک دیں،

باب نوزدہم

ڈاکٹری فارماکوپیا قدیم

(بہنجا ب)

ایکریٹ گلیسرہ ہائیزا لیکوڈ ڈرام ۱
ایکوا ادس ۱

ایسی ایک ایک خوداک دن میں
تین دفعہ پلائییں، پیریا بخار کے لئے
مفید و مجرب ہے۔

(نوٹ) یہ دوا غذا سے ۲ گھنٹہ
بعد پلائی چاہئے، ورنہ سہلے ہونے
کا خطرہ ہے۔

۳، کسچر تلی و پیریا

کوئین سلفاس ۵
آرن سلینٹ ۳
ایڈ سلفیرک ڈا بیلیوٹ ۱۰

(۱) کسچر پیریا
کوئین سلفاس ۱۰
ایڈ سٹاک ۳۰
گینشیا سلینٹ ۲۰
ایکوا کلوروفارم ادس ۱

ایسی ایک ایک خوداک ہر چوتھے
گھنٹہ بعد پلا دیں، پیریا بخار میں
مفید ہے۔

(۲) کسچر پیریا

سکونا فیری فیوج ۱۰
ایڈ سٹاک ۳۰
گینشیا سلینٹ ۲۰

کی دوا ہے: جسم کے نیگے حصوں پر
ملنا مچھروں سے محفوظ رکھتا ہے

(۱۶) مرہم تلی

ہیڈ آئیوڈائیڈ آف مرکری گرین ۲۰
وین لین اوش ۱

ملا کر مرہم بنالیں۔ مقام طحال پر
چھڑ کر ۱۰ منٹ تک مقام طحال کو
دھوپ میں رکھیں۔

تلی بڑھ جانا اور تلی کا سخت
ہو جانا وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

(۱۷) ڈایا فورٹیک مکسچر

سپرٹ ایفیر ٹائٹرو سائیڈ ۳۰
لایکوار ایوینا ایسی ٹاس ڈرام ۲
پوٹاسیم سائٹراس گرین ۲۰
ایکوا اوش ۱

ایسی ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد
پلائیں۔

ہر قسم کے بخار میں مفید ہے
چڑھے بخار کو دودھ کرتا ہے۔

ٹینیشیا سلفاس ڈرام ۱
ایکوا اوش ۱

ایسی ایک خوراک بعد از غذا دیں۔
تلی بڑھ جانا اور طیریا کے لئے
مفید ہے۔

(۱۸) مکسچر پرانا طیریا

کوئین بائی ہائیڈروکلورائیڈ گرین ۳
لایکوار آر سٹیک ہائیڈروکلور مسم ۵
ٹیکچر فرال پرکلور مسم ۱۰
ٹینیشیا سلفاس گرین ۳۰
ایکوا اوش ۱

ایسی ایک خوراک بعد از غذا دن
میں دو بار۔ پرانا طیریا اور کمزوری
بدن میں مفید ہے۔

ہیرائل اولیم سٹرونیلا اوش ۱/۲
کوڈونٹ آیل اوش ۲
ایسڈ کاربائلک پیور مسم ۲۱
کرو سین آیل اوش ۱

ملا کر محفوظ رکھیں۔ بیرونی استعمال

(۸) سفوف بخار

اسپرین ۵
فنیٹین ۵
ڈورس پوڈر ۵
گرن ۵
گرن ۵
گرن ۵
ایسی ایک پڑیہ کھلا کر ۵ امانٹ
بعد گرم دودھ یا چائے پلائیے
تاکہ پسینہ اچھی طرح آجائے بخت
بخاروں میں پسینہ لانے کے لئے مستقل
ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے وغیرہ کے
لئے بھی مفید ہے۔

(۹) مکسچر بخار

سوڈا سیلی سلاس ۱۰
گرن ۱۰
لائکوڈارامیوینا ایسی ٹاس ۲
ڈرام ۲
پوٹاشیم ایسی ٹاس ۲۰
گرن ۲۰
ایکوا ۱
ادش ۱
ایسی دن میں ددخو ک دیں
بخار کے ساتھ پھٹوں اور جوڑوں کے درد
کے لئے مفید ہے۔

(۱۰) میضہ کی گولیاں

پوٹاشیم پرملگنیٹ ۲۰
گرن ۲۰
کیورین اور ویزلین ملا کر بنا لیں
اور اس کے اد پر کیورین چڑھا لیں
مریض میضہ کو دودھ گولیاں ۱۵
منٹ کے بعد کھلائیے۔ دد کھنڈ بعد
دو گولیاں نصف گھنٹہ بعد دیں یہاں
تک کہ دستوں کا رنگ سبز ہو جائے
اور وہ تعداد میں کم ہو جائیں۔

(۱۱) میضہ کیلئے بولس ایلیا

پانی ابلا ہوا ۸
ادش ۸
لیولین پوڈر ۳
ادش ۳
ہر دوا جزا کو شیشی میں ملا کر خوب
ملا دیں۔ سچے کہ دودھ کی مانند ہو جائے
نصف ادش دوا ہر آدھ گھنٹہ بعد
پلا دیں۔ جب مریض میضہ کی فے اور
دست بند ہو جائیں۔ تو دوا کا دفعہ
بڑھا دیں۔ اور مقدار کم کر دیں۔
اگر مریض میضہ کو شدید تشنچ
ہو رہے ہوں۔ تو لائپرٹانک سیلین دو
یا تین پائنٹ کا دریدی ٹیکہ کریں۔ میضہ
کے لئے مفید ہے۔

۱۲۱، پیچہ کے لئے پانی

پاشیم پر مگنیٹ ۴ گرین
اوش ۲۰

علا کر رکھ لیں، پیاس کی حالت
میں مریض پیچہ کو یہ پانی پینے کو دیں

۱۲۲، مکسچر اسہال

سوڈا بائیکارب ۱۰ گرین
بسمتہ کارب ۲۰ گرین

ادیم ۵
مسچوراکریٹ ۱ اوش

ایسی ایک ایک خوراک دو تین
دفعہ دن میں ہمراہ آب دیں، دستوں
کو بند کرنا ہے۔

۱۲۳، سفوف اسہال

بسمتہ سیلی سلاس ۱۵ گرین
سوڈا بائی کارب ۵ گرین

ایسی ایک ایک پڑیہ دن میں دو
دفعہ کھلائیں، پیچش اور اسہال میں
مفید ہے۔

۱۵، مکسچر پیچش

گیشیا سلفاس ۱ اوش
ہیڈ سلفیورک ڈائیسیوٹ ۱۰
اکیا ۱ اوش

ایسی ایک خوراک صبح کو پلائیں، پھر
۲ ڈرام ہر دوسرے گھنٹہ بعد پلائے
دیں، یہاں تک کہ مریض کو کھل کر دو
چار اجابتیں ہو جائیں، شدید پیچش
میں مفید ہے۔

۱۶، کیسٹرائیل امیلتشن

کیسٹرائیل ۱ ڈرام
ٹنگکچر ادیم ۵
میو سلج ٹم ایشیا ۱ اوش

امیلتشن بنا دیں، ایسی ایک ایک
خوراک ہر تیسرے چوتھے گھنٹہ بعد
دیں، پیچش خونی و اسہال کے لئے
مفید ہے۔

۱۷، مکسچر اسہال پیچش

ادیم کیر وٹلائی ۵
مسم ۵

اوسیم جونی پر
اوسیم نیچو پٹ ایڈسٹیلورک

ایرومیٹک
سپرٹ ایٹر
ایکڑا

ایسی ایک ایک خوراک ہر شہرے
گھنٹہ بعد پلائیں، میضہ، اسہال شدید
میں مفید ہے۔

(۱۸) ککچر اسہال

ککچر اوسیم
ککچر ککچر
ایڈسٹیلورک ڈل

پیرمنٹ وارڈ
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین
دفعہ پلائیں، اسہال میں نہایت
مفید ہے۔

(۱۹) سفوف قبض

کالا دانہ دحب النیل
سفوف
سفوف سنڈھ

ایسی ایک پڑیہ سوتے وقت
کھلائیں، ازالہ قبض کرتا ہے۔

(۲۰) گولی قبض کشا

ایکڑیکٹ کالوسنٹھ کو
گرین ۲
بلیو پل
ایکڑیکٹ مایوسائس
گرین ۲
گرین ۱

سب اجزاء کی ایک گولی بناویں
سوتے وقت ہمراہ آب کھلائیں
قبض کشا اور مہل ہے۔

(۲۱) سفوف قبض کشا

بلیو جلیپ کمپونڈ
کیدیول
گرین ۳
گرین ۲

ایسی ایک پڑیہ سوتے وقت
کھلائیں، قبض کشا ہے۔

(۲۲) جرعی مسہل

مگنیشیا سلفاس
ایکڑا
ادس ۱
ادس ۲

علا کہ علی الصبح پلاویں بہترین
دست آور ہے۔

۲۳۳) حب قونج

اویم
ایک پونڈ کٹ بیل ڈونا
گرین ۴
گرین ۴
اگولی بنائیں ضرورت کے وقت
کھلائیں۔ قونج میں مفید ہے۔

۲۳۴) سفوف نفخ شکم و سوء

سوڈا بائیکا رب
پلور دیرب
پلو جگر
گرین ۱۰
گرین ۵
گرین ۱۰
ملا کر ایک پڑیہ بنائیں قبل از غذا
تیراہ آب کھلائیں۔ سوء منقسم معده
نفخ وغیرہ میں مفید ہے۔

۲۳۵) مکسچر مضم

سوڈا بائیکا رب
سیرٹ ایوینا ایوڈمیشک
سیرٹ کلورونام
طیکچر جگر
ایکوا منتخا پ
گرین ۲۰
منم ۲۰
منم ۱۵
منم ۱۰
ادش ۱
ایسی ایک خوراک قبل از غذا دیں۔

سوء منقسم اور نفخ وغیرہ میں مفید ہے

۲۳۶) مکسچر مقوی معدہ

ایکوا سٹرکنیا ہائڈروکلور
ایسڈ ہائڈرو نائٹریک
کلورک ڈل
ایکوا کلورونام
ایکوا
منم ۱۵
ڈرام ۴
ادش ۱
ایسی ایک خوراک بعد از غذا دیں
دافع سوء منقسم اور مقوی معدہ ہے۔

۲۳۷) مکسچر کمی خون

فیری ایٹ ایوینا سائٹرس
ایوینا کارب
ایکوا
گرین ۲۰
گرین ۲
ادش ۱
ایسی ایک خوراک بعد از غذا دیں
میں دوبارہ کمی خون میں مفید ہے۔

۲۳۸) سفوف بواسیر

کیم آف ٹارٹار
پلاسٹر
گرین ۲۰
گرین ۲۰

یام ملا لیں ، ایک پڑیہ رات
کو سوتے وقت کھلائیں ، بواسیر میں
مفید ہے۔

(۲۹) مریم بواسیر

گال اینڈ ادیم آئینٹ
بوقت ضرورت مسوں پر لگادیں
درد کو بند اور مسوں کو خشک کرتی ہے

(۳۰) مریم بواسیر مسکن

ایسڈ ٹینک ۳۰ گرین
مارفیا ہائیڈروکلور ۸ گرین
کوکین ہائیڈروکلور ۸ گرین
ویٹلین ۱ اونس
مریم بنا دیں ، بواسیری مسوں
پر لگادیں ، درد کو بند کرتی ہے۔

(۳۱) مکسیچر کھانسی

وائٹنم اسپیکاک ۲۰ منم
سپرٹ ایٹر نائٹرساٹ ۲۰ منم
ٹائیوڈا امیوٹا ایسی ٹاس ۲ ڈرام
ایکوا کمیفیر ۱ اونس

ایسی ایک خوراک ہر تیسرے
گھنٹہ بعد ، سوال ششی میں مفید ہے۔

(۳۲) حب سوال مزمن

پل اسپیکاک کم سلا
ایسی ایک گولی دن میں تین بار
پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

(۳۳) مکسیچر کھانسی پرانی

ایموٹا کارب ۵ گرین
ٹینکچر نکس دامیکا ۵ منم
ٹینکچر سلا ۱۵ منم
ٹینکچر کمیفیر کو ۱۵ منم
ایکوا کلوروفارم ۲ ڈرام
ایکوا ۲ اونس

مکسیچر بنا دیں ، ہر چھ گھنٹہ بعد
ایک اونس کی خوراک دیں ، پرانی کھانسی
میں مفید ہے۔

(۳۴) مکسیچر کھانسی سل ودق

ایسڈ ہائیڈروسیانک ڈل ۵ منم
ایسڈ نائٹریک ڈل ۱۵ منم

در کے لئے مفید و تجرب ہے۔

(۳۷) مکسچر نمونیا

ایمونیٹا کاردب ۳
دائیم ایسکاک ۴
ٹیکچر سٹینکا ۵
ٹیکچر سٹروٹینٹس ۶

۳۰
سیرٹ کلوروفارم ۱۰
ایکوا مشقناپ ۱۰

ایسی ایک خوراک ہر چوتھے گھنٹہ
بعد دیں، نمونہ میں مفید ہے۔

(۳۸) مکسچر نمونیا

پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۵
گرین ۵

کریازوٹ ۲
ممن ۲

ایکویٹیکٹ گلیسر ہائڈر ۱
ٹیکوئیڈ ۱

سیرٹ دائیم رکٹیفائیڈ ۱
ممن ۱

کلیسیرین ۱
ڈرام ۱

ایکوا اینٹی سائی ۱
ادش ۱

ایسی ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد

لائیگوار مدینا پائڈر دکلور ۵

کلیسیرین ۲

ایکوا ۲

ملا کر لقمہ ایک ادش ہر چھ گھنٹہ

بعد دیں، کھانسی سلی ودق میں مفید ہے۔

(۳۹) مکسچر ودق ریوی

کریازوٹ ۵
ممن ۵

میر سلیج ۲
ڈرام ۲

ایکوا ۱
ادش ۱

ایسی ایک خوراک بعد غذا دن میں

دو دفعہ دیں، ودق میں مفید ہے۔

(۴۰) مکسچر وٹم

پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۵
گرین ۵

ٹیکچر سٹروٹینٹ ۱۰
ممن ۱۰

سیرٹ ایمونیٹا ایرو میٹک ۲۰
ممن ۲۰

لائیگوار آرسینی کلس ۴
ممن ۴

ٹیکچر بیلا ڈونا ۵
ممن ۵

میر پ ڈو ۳۰
ممن ۳۰

ایکوا ۱
ادش ۱

ایسی ایک خوراک دن میں تین دفعہ

پلا دیں، مٹوئیہ میں مفید ہے۔

۱۳۹) مکسچر و جرح مفاصل شدید

سوڈا سیلی سلاس ۸ گرین
سوڈا بائیکا رب ۲۵ گرین
سیرپ اورنج ۲۵ منم
ایکوا ۲ ادنس

بقدر ایک ادنس ہر چوتھے گھنٹہ
بعد پلا دیں، گٹھیا کو دور کرتا ہے۔

۱۴۰) مکسچر پرانا گٹھیا

سوڈا سیلی سلاس ۱۵ گرین
پوٹاشیم آکسائیڈ ۵ گرین
سوڈا بائیکا رب ۱۵ گرین
سوڈا سلفاس ۳۰ گرین
سیرٹ کلوروفارم ۲۰ منم
ایکوا منتھاپ ۱ ادنس

ایسی ایک ایک خوراک دن میں
تین مرتبہ پلا دیں۔

۱۴۱) یعنی منٹ و جرح مفاصل

یعنی منٹ ایوینا کی مالش کریں۔

گٹھیا، نقرس کے لئے مفید ہے۔

۱۴۲) انفلو منٹرا مکسچر

سوڈا سیلی سلاس ۱۰ گرین
سوڈا بائیکا رب ۱۵ گرین
سیرپ ٹو ۱ ڈرام
ایکٹریکٹ گلیر ہائز الکیوٹڈ ۱ ڈرام
کمیفرداٹ ۱ ادنس

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین
دفعہ پلا دیں، زکام، نزلہ، انفلو منٹرا
کے لئے مفید ہے۔

۱۴۳) مکسچر عرق النساء

ایوینا کلورائیڈ ۲۰ گرین
پوٹاشیم آکسائیڈ ۴ گرین
سیرٹ کلوروفارم ۲۰ منم
ایکوا ۲ ادنس

بقدر ایک ادنس دن میں تین بار
پلا دیں، عرق النساء کو مفید ہے۔

۱۴۴) سفوف داد عصبی

اسپرین ۳۰ گرین

فستقین
کیفین ساٹراس
گرین ۳
گرین ۳
ایسی ایک پڑیہ عند الضرورت
کھادیں، سردرد، زلزلہ، زکام، شقیقہ
عصابہ، بخار کے لئے مفید و تجرب ہے

۱۲۵) مکسچر درد سر عصبی

سودیم لوجی نال
پوٹاشیم برومائیڈ
لائیوڈار آر سینٹی کیس
ٹنگکچر جیلی میم
ایکوا کلوروفارم
گرین ۳
گرین ۱۵
منم ۲
منم ۱۰
ادس ۱
ایسی ایک خوراک ہر چوتھے گھنٹے بعد
پلائیں، درد سر عصبی، صرع (مرگی)،
اختناق الرحم، ہسٹریا میں بھی مفید ہے

۱۲۶) لیپ درد اعصاب

کلورل ہائیڈریٹ
کمفر
ڈرام ۲
ڈرام ۲
ہر دو گھنٹے کے محفوظ رکھیں
مقام درد پر لگائیں، درد سر، شقیقہ، عصاب
زہریلے جانوروں کے کاٹے کیلئے مفید ہے

۱۲۷) گولی استسقاء

پوٹاشی ٹیس
پوٹاسلا
بلیو پل
گرین ۱
گرین ۲
گرین ۲

ایک گولی بنائیں، ایسی ایک
گولی ہر رات کھائیں، استسقاء کو نافع ہے

۱۲۸) مکسچر استسقاء

دبشارکت قلب
پوٹاشیم ایسی ٹاس
سیرٹ ایٹھرناٹروپائی
انفیوژن سکوپرائی
ادس ۱
گرین ۲۰
منم ۳۰
ایسی ایک خوراک دن میں دو دفعہ
پلائیں، استسقاء جو جوڑوں کی وجہ
سے ہو، کو مفید ہے

۱۲۹) جرعم استسقاء

گینشیا سلفیٹ
ایکوا
ڈرام ۶
ادس ۱
ایسی ایک خوراک علی الصبح پلائیں
اور دو گھنٹے تک مریض کو پانی نہ پینے
دیں، اس مکسچر کو جس وقت دینا ہو،

اس رات مرغن کو ۵ گرین پیو پل کھائیں

(۵۰) حب احتباس الطمث

و در حیض

فیرائی آرسی ٹیٹ ۴ گرین ۴

فیرائی سلفاس ۴ گرین ۴

ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ۴ گرین ۴

ایسی ایک ایک خوراک صبح و شام

بعد از غذا کھلائیں ، بے قاعدگی حیض

بندش حیض کو مفید ہے ، حیض جاری

کرتی ہے ،

(۵۱) مکسچر درد خصیۃ الرحم و

کثرت حیض

پوٹاسیم برومائیڈ ۸ گرین ۸

ایکسٹریکٹ ہائیڈراکس

لیکوریٹس

مکسچر ہائیڈروکس

ایکوا

ایسی ایک خوراک دن میں دو دفعہ

پلائیں ، کثرت حیض ، درد رحم ، مثانہ

وغیرہ کو مفید ہے ،

(۵۲) مکسچر سوزاک شدید

پوٹاسیم ہائیڈروکس ۳۰ گرین ۳۰

پوٹاسیم برومائیڈ ۱۰ گرین ۱۰

مکسچر ہائیڈروکس ۳۰ مسم ۳۰

انفیوژن بوکو ۱ اونس ۱

ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو

یا تین دفعہ پلائیں ، سوزاک کے لئے

مفید ہے ،

(۵۳) مکسچر سوزاک

باسم کو بی با

میو سیلج گم ایشیا ۱ ڈرام ۱

دار ۱ اونس ۱

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین

دفعہ پلائیں ، سوزاک کے لئے

فائدہ مند ہے ،

(۵۴) پچکاری سوزاک

پوٹاسیم پرمنگنیٹ ۴ گرین ۴

دار ۱ اونس ۱

احیل میں پچکاری کریں ،

۵۵، چکاری سوزاک مزمن

ذہک ششہاس

گرین ۲

ادش ۱

ایکوا

حل کر کے اجیل میں چکاری کریں

۵۶، مکسچر ورم شانہ

گرین ۱۰

منم ۲۰

ادش ۱

گرین ۳۰

ادش ۱

ترکیب استعمال در علی الصبح

خالی معدہ شمشیر ۲۲ پلا میں ۱۰ اور اس

کے دو گھنٹہ بعد مکسچر ۱۱ پلا میں خاص

کے دو گھنٹہ بعد مریض کو کھانا دیں

۵۷، مکسچر تشک

لاسیوار ہائیڈرو جوالی

پر کلورائیڈ

ایسڈ ہائیڈرو کلورک

ڈائیسیوٹ

ایکوا

منم ۲۰

منم ۱۰

ادش ۱

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین دفعہ پلا میں

۵۸، سفوف تشک

گرین ۱

گرین ۳

گرے پوڈر

چاک پوڈر

ایسی ایک ایک پوڈر دن میں

چار دفعہ ہمراہ آب کھلائیں

۵۹، مکسچر تشک (درجہ سوم)

گرین ۱۰

منم ۲۰

منم ۱۰

ادش ۱

ایکوا

ایسی ایک ایک خوراک دن میں

دو دفعہ پلائیں

دب، آتشک کے زخموں پر بلیک

دش سے لٹ زکر کے رکھیں

ج، زرد کنڈیو میٹا کیلوریل گرین ۱۰

لنک اوکسائیڈ

حسب ضرورت معقد کے تشکی زخموں پر برکیں

۶۰۰ تشک کے پیچھے

۱۰، نیو سلور سان عکرم ۳۵

اس کا وزیدی ٹیکہ پر ہفتے کیا
جاتا ہے اور مقدار دوا کو تدریج

بڑھایا جاتا ہے۔

(ب) انجمن مسیحی ریلوے

ایک سی سی کی مقدار میں عسلی
سیکھ رہے تھے وہاں جاتا ہے

رج، انجمن ہائیدہ اجرائی دینی، دینی،

ایک ہی سیکنڈ کی مقدار میں غصہ

اسکی ہر صفحے پر جاننا ہے، تشکک کا

مفید و محرب علاج ہے۔

۶۱، لوشن اوزونا

طریق طمان

175

کلردونام

123

اکو

ادبشن

ملا کر ناک کے اندر چھپا دی گرس

بدبو ناک ، ناک کے گھڑنے وغیرہ تو

دور کرنے میں مفید ہے۔

(۶۲) کسپرا مرض جدید

لائیگوارد آر شک ہائڈروکلور ممز ۵

طیغور سنگونا کی پونڈ

ایک پادشاہ اور اس کی

ایسی ایک ایک خواجہ بعد از غذا

دیں، اعلیٰ درجہ کی مصطفیٰ خون ہے۔

(۶۳) مرحوم اگزیپا

کیسے مینا ڈرم ۲

زنگ ادکسا سٹڈ

دینہ لین اونس

مرسم بنائیں اور لٹکائیں، اگرچہ پتا

اور جلد وار پھنسیوں، زخموں کے لئے

مفتی ہے۔

(۶۴) نوشتن اکزیمیا

کھلے سن

پیدا می شست

زنگ بوکتا سید درام ۲

الحکم داریت ادنیس ۶

۲۰ دانش

مکان خوب پائیں۔ اگرچہ بار بار لکھا میں

چند دنوں میں آرام ہوگا۔

۶۵، زور اگزیا (تر)

زنک اڈکسائیڈ ڈرام ۲

بیدایسی ٹیٹ ڈرام ۱

سٹارج وٹاشا سٹم ڈرام ۵

ملا کر زور بنائیں، اور زور اگزیا پر رکھیں۔

۶۶، لوشن اگزیا (تر)

لایکیو اڈکسائیڈ ڈرام ۲

ایکوا اڈس ۲۴

لوشن بنا دیں، اور اس میں لٹ کر کے مقام ماؤف پر رکھیں، اور لٹ کو بار بار تر کرتے رہیں۔

۶۷، سر کے اگزیا کی مرہم

سٹرین آکٹنٹ گریں ۱۵

وین لین اڈس ۱

ملا کر مرہم بنائیں، اور سر پر لگائیں سر کے اگزیا کے لئے مفید ہے۔

۶۸، مرہم اگزیا مزمن

زنک اڈکسائیڈ ڈرام ۲

سٹارج وٹاشا سٹم ڈرام ۲

وین لین اڈس ۱

مرہم بنا دیں، پرانے اگزیا کے لئے مفید ہے۔

۶۹، مرہم داد و حدری

ایسڈ کرائل سو فینک گریں ۲۰

وین لین اڈس ۱

مرہم بنا کر صبح و شام جائے ماؤف پر لگادیں، داد و حدری کے لئے مفید ہے۔

۷۰، مرہم خارش

سلفر سبلی میٹ ڈرام ۲

پوٹاسیم بائیکارب ڈرام ۱

سپیل آکٹنٹ اڈس ۱

مرہم بنا دیں، مقام ماؤف پر مالش کریں، خارش ہر قسم کے لئے مفید ہے۔

۷۱، مرہم زخم

زنک اڈکسائیڈ گریں ۸۰

دیزلین ۱
مرہم بنا کر زخموں پر لگا دیں،
مفید ہے۔

۷۲، بورک انٹمنٹ

بورک ایسڈ ۱
دیزلین ۱
مرہم بنا کر زخموں پر لگا دیں،

۷۳، لوشن زخم

زنک سلفاس ۴
اکیوا ۱
لوشن بنا دیں، پر اسے زخم، ناسور
وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

۷۴، قطور رد چشم

زنک سلفاس ۱
ایسڈ بورک ۲
اکیوا ۱
لوشن بنا دیں، ڈراپر سے
آنکھ میں قطرہ قطرہ ڈالیں، رد چشم اور
آشوب، آنکھ آنا وغیرہ کیلئے مفید ہے۔

۷۵، قطور چشم

سلور نائٹریٹ ۲
اکیوا ڈسٹ ۱
لوشن بنا دیں، بچوں کی آشوب
چشم میں مفید ہے، ڈراپر سے قطرہ
قطرہ ڈالیں،

۷۶، کاسٹک لوشن

سلور نائٹریٹ ۱۰
اکیوا ڈسٹ ۱
لوشن بنا دیں، اور بلیک الٹ کر
سگودوں پر پچ کر پیس، سگودوں کے لئے
مفید ہے۔

۷۷، مرہم زخم قرنیہ

میو اڈکس ایڈ آف مرکری ۴
دیزلین ۱
ملا کر مرہم بنا دیں، شبیہ کی سلامتی
سے آنکھ میں لگائیں، زخم آنکھ،
سفیدی چشم وغیرہ کے لئے مفید
ہے۔

۸۷ قطور آذن

زنک سلفاس ۲
ایسڈ بورک ۸
سپرٹ رکٹیفائیڈ ۲
ایجو ۱
گرین ۲
گرین ۸
ڈرام ۲
ادس ۱

روشن بنائیں، کان کو صاف کر
کے چند قطرے کان میں ڈالیں، ریم
گوشش، کان بہنا وغیرہ کے لئے معینہ ہے

بچوں کے نسخے

۸۹، سفوف پیش شدہ

پلو اسپیکاک کمیونڈ ۲
پلو اسپیکاک ۱
ایرڈ بیٹک چاک پوڈر ۳
گرین ۲
گرین ۱
گرین ۳

ایسی ایک ایک پڑیہ دن میں
تین دفعہ ہمراہ آب کھلائیں بچوں
کے دست ہچیش وغیرہ میں معینہ ہے

۸۰، مکسچر ہچیش

کبیراکیل ۵
قطرے ۵

ٹکنیجر اوم ۱۰
میو سیج آکٹیشیا ۱۵
سپرٹ کلورونام ۲
ڈال وارڈ ۱
قطرے ۱۰
قطرے ۱۵
قطرے ۲
ڈرام ۱

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین
دفعہ پلائیں ہچیش، آدن آنا خون
وغیرہ کے لئے معینہ ہے

۸۱، سفوف قے و دست

کبیراکیل ۱۰
ایرڈ بیٹک چاک پوڈر ۳
ایسی ایک ایک خوراک ہر گھنٹہ
بعد پلاؤں، بچوں کی قے و دست
وغیرہ میں مستعمل ہے

۸۲، سفوف اہمال

پلو اسپیکاک کمیونڈ ۲
ایسڈ گلیک ۳
ایسی ایک ایک خوراک دن میں
تین دفعہ کھلائیں، بچوں کے اہمال
میں معینہ ہے

۸۳، سفوف اسہال

گینشیا کاب ۱
گین ۱
بسنفہ کاب ۱
گین ۱
ایسی ایک ایک خوراک دن میں
تین دفعہ ہمراہ آب کھلائیں، دستور
کے لئے مفید ہے

۸۴، سفوف قبض کشا

رورب ۲
سوڈا بایکارب ۳
پلو جگر ۱
گین ۲
گین ۳
گین ۱
ایسی ایک ایک خوراک صبح و
شام دیں

۸۵، مکسچر قبض کشا

کبیرا ۱۰
میسج ایکشیا ۱۵
سپرٹ کلوروفارم ۲
ڈل وارڈ ۱
منم ۱۰
منم ۱۵
منم ۲
ڈرام ۱

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین دفعہ

۸۶، قبض کشا نسخہ

کبیرا ۱
پیر جیب کبیرا ۱
خون ایک خوراک کھلائیں قبض کشا ہے
۸۷، مکسچر کھانسی

دائیم اسپیک ۳
ایوینا کاب ۱
میو سلج ۱
اکیرا ۱
ایسی ایک خوراک دن میں تین دفعہ پلاکیں

۸۸، سفوف آتش کش

ہائیڈرو جرائن کم کر تیا ۱
پلو اسپیک ۱
پلو سنس من ۱
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین
دفعہ دیں

۸۹، سفوف کرم امار

بسنفہ ۱
رورب ۱
ایسی ایک خوراک سوتے وقت

بمراہ آب کھلائیں، پیٹ کے کپڑوں
کے لئے مفید ہے۔

(۹۰) مکسچر کرم امعاء

سنوین
کسیٹر آئیل

گوین ۲
ڈرام ۳

موسلج ایشیا ڈرام ۳

سیرپ سمل ڈرام ۱

دار ۲

ہم ملا کر علی الصبح خالی معدہ
بچہ کو پلائیں، دو سال کے بچہ کے لئے
موزوں ہے، کرم امعاء کو درکار نہیں ہے

ڈاکٹری فارما کوپیا جدید

(پنجاب)

اب ہم پنجاب کے سرکاری شفا خانوں میں مروج و معمول بننے والے
کرتے ہیں، یہ نسخے میڈیکل فیکلٹی کی طرف سے مقرر شدہ ڈاکٹروں کا
بورڈ تجویز کرتا ہے، غرض یہ ہے کہ ہسپتالوں کی سیانیت قائم ہے
اور ڈاکٹر صرف نسخہ کا نمبر لکھ کر بخورے سے وقت میں زیادہ سے
زیادہ مریضوں کے لئے نسخہ تجویز کر سکے۔

کسیٹر آئیل امیلسن

کسیٹر آئیل

آکل آف سنے من

سفوف ایشیا

ڈرام ۴

منم ۳

ڈرام ۱

ایک خوراک فوراً اور پھر نصف

خوراک ۲ یا ۴ گھنٹہ بعد، پینچش اور

خراش دار اسہال کے لئے بچوں کو

عمر اور ضرورت کے مطابق اس میں

سے ایک یا دو ڈرام دن میں ۳ یا ۴

بار دے سکتے ہیں۔

۲، کا ڈیور آیل امیشن

کا ڈیور آیل
آئل آف سنے من
سفوف ایشیا
پانی
ڈرام ۱
منم ۳
گرین ۱۵
اوش ۱

ایک خوراک دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ
کھانے کے بعد، عام جسمانی کمزوری کے
لئے، بالخصوص وقت میں مچھلی کا تیل دینے
کا عمدہ طریقہ ہے۔

۳، کاربن ٹر اکلورائیڈ جینو
بلو ڈیم آیل امیشن

کاربن ٹر اکلورائیڈ
آیل آف جینو پوڈیم
سفوف ایشیا
پانی
منم ۳۰
منم ۱۵
گرین ۲۰
اوش ۱

ایک خوراک پلاؤ، اور ساتھ ہی
گنیشیا سلفاس کا جلاب دے دو۔
یہ بک دم رکھاڑی نما کر موم کا خاص
علاج ہے، علاج شروع کرنے سے
پیشتر ایک دو بوم ایک اوش گلوکوز

دورانہ پکنا چاہئے، تاکہ اس دوا سے
حکمر کو ضرر نہ پہنچے، اس کے ساتھ
کمپیرایل کا جلاب دینا منع ہے نیز
یہ ضروری ہے کہ علاج سے قبل اور
بعد مریض شراب استعمال نہ کرے۔

۴، نی لکس مال امیشن

ایسٹریکٹ آف سیل فرن
سفوف ایشیا
کلوروفارم دوا
منم ۱۰
گرین ۳۰
اوش ۱

صرف ایک خوراک صبح خالی پیٹ
پلاؤ، اور ۳ گھنٹہ بعد تیز نمکین مشہل
یا کمپونڈ سکچر آف سنا ایک یا دو اوش
دور کمپیرایل کا جلاب ہوگز نہ دینا چاہئے
کیونکہ اس سے یہ زہریلی دوا کے خون
میں جذب ہونے میں مدد دیتی ہے
دوا دوبارہ دینے کی ضرورت ہو
تو تین چار دن کا وقفہ دیا جائے۔

۵، گلیسیرین آف بورک ایسڈ

بورک ایسڈ
گلیسیرین
گرام ۱۵۰
گرام ۸۵۰

مرض یا ز اور با مخصوص آتشک کیلئے

۱۹، انجکشن آف مریسیل

ایک سی سی کا دریدی یا عضلاتی ٹیکہ
مرض استسقا قلبی وغیرہ میں درم کو تحلیل
کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، خصوصاً
جب کہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے
پھیپھڑوں میں اجتماع الدم ہو جائے،
یہ ٹیکہ کوٹنے سے پیشتر ایک دو روز
ایونیم کورائیڈ کا مکسچر ۳۴ دیا
جائے، اس سے اور خوب کھل کر
ہوتا ہے، اور درم اُتر جاتا ہے۔

۲۰، امونی ایسڈ لنی منٹ آف کیمفر

کیمفر ۱۲۵ گرام
آیل آف لونڈر علی لیٹر ۵
سٹرائک سولوشن آف ایونیا علی لیٹر ۲۵
الکوحل ۹۰ فیصدی ۱۰۰۰ علی لیٹر
مختلف اقسام کے دردوں پر مقامی

۲۱، لنی منٹ آف کیمفر

سافٹ سوپ ۷۵ گرام

بلو پینٹ دم لوزتین اور حلق
رفیرنکس، پر رولی کی پھر پری سے لگاؤ
منہ اور زبان کے چھالوں کے لئے بھی
مفید ہے، اس میں سے تیس قطرے
ایک ادش پانی میں ملا کر غرغرے بھی
کرائے جا سکتے ہیں۔

۲۲، نیوار سفینا مین

نیوار سفینا مین ۵۰۳ گرام
پہلی مرتبہ اس مقدار کا دریدی ٹیکہ
کرو۔ اور ہر مقررہ رفتہ رفتہ مقدار
بڑھا سکتے ہیں۔ ۵۰۶ گرام تک
پہنچا دو۔ یہ مرض آتشک کا خاص
علاج ہے۔

۲۳، انجکشن آف لیسمنٹ

ایک سی سی کا عضلاتی ٹیکہ سرین کے
بیرونی اور بالائی حصہ میں ہر مقررہ دیا
جاتا ہے، انجکشن سے دو گھنٹہ قبل
کوئی غذا نہ کھلائی جائے، سوئی دین
ایچ ملی نہایت تیز، باریک اور بغیر زنگ
کے ہو۔

کمیفیر ۵۰ گرام
 آبل آف ٹرین ٹائن ۶۵۰ ملی لیٹر
 ڈسٹیلڈ واٹر ۱۰۰۰ ملی لیٹر
 کھانسی، غزوئہ، درد پل میں سینہ
 پر مالش کرتے ہیں، عضلات اور جوڑوں
 کے دردوں کے لئے بھی مفید ہے،
 شیر خوار بچوں کو مساجی الون آلو آبل
 ملا کر مالش کرنی چاہیے۔

۱۱۲ کیلامن لوشن

کیلامن پوڈر ۲ ڈرام
 لیڈ ایسی بیٹ ۱ ڈرام
 زنک اڈکسائڈ ۲ ڈرام
 ہلم واٹر ۶ اونس
 ڈسٹیلڈ واٹر ۲۰ اونس

جلدی امراض بالخصوص اکزیما میں
 جبکہ خوبست رستی ہو، غور سے غور سے
 دفعہ کے بعد لگاؤ، مقامی مسکن ہے
 جب چینل رسورائی سس، پیل ری
 ہو، تو یہ دوا تسکین دیتی ہے۔

۱۱۳ میٹر لوشن

سیلی سلک ایسڈ ۱۰ گرین
 کمیفیر آبل ۳۰ منہ
 مرکبیرک کھور ایسڈ ۱۰ گرین
 عیقہ ایسڈ سپرٹ ۱ اونس
 سر میں بخاریا کھرنڈوں کے
 سبب بال کرتے ہوں، تو بھور
 سیر لوشن مالوں کی جڑوں میں تڑا
 لگاؤ، اس کو استعمال کرنے کے بعد
 آگ کے قریب نہ بیٹھنا چاہیے، اور
 سگریٹ نہ پینا چاہیے۔

۱۱۴ زنک انیڈ بورک آلی ڈراپ

زنک سلفیٹ ۱ گرین
 بورک ایسڈ ۲ گرین
 ڈسٹیلڈ واٹر ۱ اونس

دن میں دو تین مرتبہ ایک ایک قطرہ
 آنکھوں میں ڈالیں، آتش بچیم اور پانی
 بہتے ہیں مفید ہے۔

۱۱۵ سلور نامسٹریٹ ڈراپ

سلور نامسٹریٹ ۲ گرین
 ڈسٹیلڈ واٹر ۱ اونس

صبح دشام آنکھوں میں ایک ایک
قطرہ ڈالو۔ آستوب چشم اور نگروں
کے لئے مفید ہے۔

۱۶، سسٹرانک سلورنا سسٹریٹ ڈراپ
سلورنا سسٹریٹ -
گرین ۱۰
ڈسٹکٹ وارٹ
ادش ۱

پوٹوں کو الٹ کر روئی کی پھریری
سے لگاؤ اور پھر نمکین محلول و پانی
ادش ۱ نمک گرین ۱۲ سے وضو ڈالو۔

نگروں کے لئے مفید ہے۔ یہ تیز روشن
آنکھوں میں ڈراپ سے ہرگز نہ ڈالیں۔

۱۷، زنک اینڈ بورک ایسڈ ڈراپ

زنک سلفیٹ
بورک ایسڈ
ریٹی فائیڈ سپرٹ
ڈسٹکٹ وارٹ
گرین ۲
گرین ۸
ڈرام ۲
ادش ۱

روئی سے کان صاف کر کے اس
کے ایک دو قطرے ٹپکاؤ۔
کان کی ریم اور زخم کے لئے

مفید ہے۔

۱۸، کاربالک گلیسرین ایسڈ ڈراپ
گلیسرین آف کاربالک ایسڈ
گلیسرین
ادش ۱

خدا گرم کر کے چار پانچ قطرے
کان میں ڈالو۔ کان کے درد کے لئے
مستعمل ہے۔

۱۹، کونین مکسچر

کونین سلفیٹ
ڈائیپلوٹ سلفیورک ایسڈ
گرین ۱۰
منم ۱۰
گینشیا سلفاس
گرین ۳۰
کلوروفام وارٹ
ادش ۱

ایسی ایک ایک خوراک دن میں
تین مرتبہ، پیر یا بخار کے لئے۔ اگر
مریض کو دست آ رہے ہوں تو گینشیا
نکال دیں۔

۲۰، سکونا فیری فیوج مکسچر

سکونا فیری فیوج پوڈر
ڈائیپلوٹ سلفیورک ایسڈ
گینشیا سلفاس
گرین ۱۰
منم ۱۰
گرین ۳۰
ادش ۱
پانی

دن میں تین مرتبہ پیر یا بخار کیلئے
کھانے کے فوراً بعد دی جائے، تو
قے آنے کا احتمال ہے۔

۲۱) آسرن اینڈ کونین مکسچر

کونین سلفیٹ گرین ۵
فیرس سلفیٹ گرین ۵
ڈائکلیوٹ سلفیورک ایسڈ منم ۵
پانی تا ادس ۱

دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد
پیر یا بخار اور بڑھی ہوئی تلی
کے لئے۔

۲۲) آسرن مکسچر

آسرن اینڈ امونیم سٹریٹ گرین ۳۰
پیپرمنٹ وارٹ تا ادس ۱

دن میں تین مرتبہ کھانے کے
بعد رکھی خون کے لئے۔

۲۳) آرسنک مکسچر

ٹائیگوار آرسینی کیس منم ۳
پیپرمنٹ وارٹ تا ادس ۱

دن میں دو تین مرتبہ کھانے
کے بعد رکھی خون کے لئے۔

۲۴) ڈایا فورٹیک مکسچر

پوٹاشیم سٹریٹ گرین ۲۰
سویٹ سپرٹ آف نائٹر منم ۲۰
ڈائکلیوٹ سولوشن ڈرام ۱
آف امونیم ایسیٹ تا ادس ۱
پانی تا ادس ۱

دن میں تین مرتبہ ہر قسم کے
بخار میں حرارت کم کرنے اور پسینہ
لانے کے لئے۔

۲۵) سوڈیم سیلی سلفیٹ مکسچر

سوڈیم سیلی سلفیٹ گرین ۲۰
سوڈیم ہائیپو سولفایٹ گرین ۳۰
لیکویڈ ایکسٹریکٹ منم ۱۵
آف لیکو رس تا ادس ۱
پانی تا ادس ۱

دن میں تین مرتبہ یا حسب ضرورت
جوڑوں اور عضلات کے دردوں
کے لئے۔

۲۶، بسمتھ انڈیڈ چاک مکسچر

بسمتھ کاربونیٹ ۲۰ گرین
 کسٹیم کاربونیٹ ۲۰ گرین
 ڈیگاکٹھ ۲ گرین
 کلوروفارم وارڈ ۱ اونس
 دن میں تین یا چار مرتبہ اسہال
 عفی بد معنی کے لئے مفید ہے بشرط
 ضرورت اس میں مکسچر اوپیم ۵ منم یا
 مکسچر کپڑ کپڑ ۳۰ منم فی خوراک اعانہ
 کر سکتے ہیں

۲۷، سیڈل اسٹن مکسچر

گنیٹیم سلفیٹ ۲۲۰ گرین
 کلوروفارم وارڈ ۱ اونس
 ایک دم ساری خوراک بلا دینیں
 گھنٹہ بعد پھر حسب ضرورت، نمکین
 سہل ہے، پیچھے میں ایک خوراک
 ایک دم پھر نصف خوراک ہر دو گھنٹہ
 بعد

بہاں تک کہ خون بند ہو جائے

اور درد رفع ہو جائے

۲۸، ایلکلائن کارمی نے ٹو

مکسچر

سوڈیم بائی کارب ۱۰ گرین
 ایرومیشک سپرٹ ۱۵ منم
 آف ایوینا
 کپڑ ند مکسچر
 آف کارڈیم ۳۰ منم
 کلوروفارم وارڈ ۱ اونس
 دن میں دو مرتبہ کھانے سے
 قبل، نفخ، بد معنی اور کھٹے
 ڈکاروں کے لئے

۲۹، ایڈ مکسچر

ڈائلیوٹ ہائیڈروم ۳۰ منم
 کلورک ایڈ ۱ اونس
 کلوروفارم وارڈ ۱ اونس
 دن میں دو مرتبہ کھانے
 کے بعد

بد معنی کے لئے، جب

معدے میں ترشتی کم ہو۔

۱۳، سیلائن اکیسکوٹرنٹ

سوڈیم بائی کاربونیٹ گرین ۵

امونیم کلورائیڈ گرین ۵

سوڈیم کلورائیڈ گرین ۵

ٹینکچر اسپیک منم ۱۰

لیکوڈ ایکسٹریکٹ

آف کورس منم ۲۰

کلوروفارم وارڈ ادش ۱

دن میں تین مرتبہ یعنی کھانسی

میں ملغم کو پستلا کر کے اور خارج

کرنے کے لئے

۱۳، سیدے ٹو اکیسکوٹرنٹ

ٹینکچر اسپیک

منم ۱۰

منم ۲۰

ٹورم ۱

ادش ۱

دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ خشک

کھانسی کے لئے

۱۳، اینٹی بیکٹریک اکیسکوٹرنٹ

ٹینکچر اسپیک

پوٹاسیم آئیوڈائیڈ گرین ۵

ٹینکچر اسپیک آف پوپلیا منم ۱۰

ٹینکچر آف سڑے مونیم منم ۱۰

سیرپ ڈو منم ۲۰

پانی ۳

ادش ۱

دن میں تین مرتبہ رومہ اور

تشی کھانسی کے لئے

۱۳، کاسکارا ٹینکچر

لیکوڈ ایکسٹریکٹ آف

کاسکارا ٹینکچر

ٹینکچر آف بیلا ڈونا

پانی

ادش ۱

ایسی ایک خوراک رات کو

سوئے وقت روزانہ دائمی قبض

کے لئے

۱۳، امونیم کلورائیڈ ٹینکچر

امونیم کلورائیڈ گرین ۲۰

لیکوڈ ایکسٹریکٹ

آف کورس منم ۲۰

سیرٹ کلوروفارم منم ۱۰

پانی

ادش ۱

۹ کے ساتھ اس کے اثر
کو تیز کرنے کے لئے دن میں ۳ مرتبہ

۳۵ برومائیڈ اینڈ کلورل مکسچر

پوٹاشیم برومائیڈ

کلورل ہائیڈریٹ

سیرپ

کلوروفارم واٹر

ایک خوراک رات کو سوتے وقت

یا حسب ضرورت، نیند آور ہے۔

ہذیان اور تشنج زچہ کے لئے بھی معید

ہے۔ بچوں کو تشنج میں بمقدار مناسب

دے سکتے ہیں۔

۳۶ برومائیڈ اینڈ لومی نال مکسچر

پوٹاشیم برومائیڈ

سولیو پل فینو باربیٹون

پانی

دن میں دو تین مرتبہ کھانے کے

بعد نیند آور اور مسکن ہے۔ بے خواہی

مرگی اور سرچکرانے کے لئے۔

۳۷ پیرلڈی ہائیڈ مکسچر

پیرلڈی ہائیڈ

سیرپ آف اورنج

پانی

رات کو سوتے وقت ایک

خوراک دی جائے۔ رید ذائقہ ہے

لیکن بے ضرر نیند آور ہے۔

۳۸ ایلکلائن ڈائیورٹک مکسچر

پوٹاشیم سٹریٹ

ٹینکچر ہائیڈروکسائیڈ

پانی

دن میں ۳ مرتبہ، مدد بول ہے

پیشاب کی ترششی کم کرنے کے

لئے دیتے ہیں۔

۳۹ ایوڈائیڈ اینڈ مرکری مکسچر

پوٹاشیم آیوڈائیڈ

سولوشن آف مرکیورک

کلورائیڈ

پانی

دن میں ۳ مرتبہ کھانے کے بعد

آتشک کا خوردنی علاج ہے۔

(۴۰) ایونیم کلورائیڈ
ہیکسے مین

ایونیم کلورائیڈ ۳۰ گرین
ہیکسے مین ۱۵ گرین
پانی ۱ تا ۱ ادش

دن میں ۳ مرتبہ پینتاب کے
تھن کو کم کرنے اور اس کو ترش
کرنے کے لئے۔

(۴۱) اسکنٹ آف بورک الیڈ

(دلی پی)
بورک الیڈ (باریک چھنا ہوا) ۱۰۰ گرام
پیرافین اسکنٹ ڈاٹ ۹۰۰ گرام
معمولی زخموں اور جراحتوں کے لئے

(۴۲) اسکنٹ آف کرائی

ساروین (دلی پی)
کرائی ساروین
باریک چھنا ہوا
ہیکسے مین
۴۰ گرام
۹۶۰ گرام

دن میں ۲ مرتبہ مادہ مقامات
پر گرگڑو۔ یہ مرسم داد اور بالخصوص
خشب کے لئے ہے۔ یہ بہت عطرش
ہے۔ اس لئے سر، آنکھ اور چہرہ
پر اسے برگڑ نہ لگاؤ۔

(۴۳) اسکنٹ آف ایونی

ایڈ مرکری (دلی پی)

ایونی ایڈ مرکری
دوب باریک میں کر ۵۰ گرام
ہیکسے مین ۹۵۰ گرام

جلدی امراض بالخصوص دلی
۳ بلوں اور سرکی جوئیں مارنے
کے لئے۔

(۴۴) ڈاٹ ایونیم

آف مرکورک نائٹریٹ

سٹرائنگ اسکنٹ آف
مرکورک نائٹریٹ ۲۰۰ گرام

سافٹ پیرافین سیلو ۸۰۰ گرام

بطور خورک ہر قسم کے زخموں اور مرض
سلاق دینیہ ٹار سالی میں استعمال

کیا جاتا ہے۔

(۲۵) سیلو اوکسائیڈ آف
مرکری آکسائیڈ

سیلو اوکسائیڈ آف مرکری
[گرین ۲
دوب بار یک پس کرا
دینے لین

سدائی سے آنکھ میں لگائیں،
یا سوئے کے کنارے پر لگائیں
زخم، سرخی چشم، پرانے گزروں بلاق
رٹیناٹار سائی، اور آنکھ کے چوڑے
کے لئے مفید ہے۔

(۲۶) آکسائیڈ آف سلفر

رہی رہی

سیناٹ سلفر ۱۰۰ گرام
سپیل آکسائیڈ ۹۰۰ گرام
[ہارڈ اور سافٹ وائٹ پیرامین

سے بنی ہوئی، ہماسوں اور بالخصوص
دبائی خارش دسکے پیر، کے لئے صبح و
شام مادف مقامات کو دھو کر چھلکے
اتار کر اچھی طرح رگڑو۔

(۲۷) آکسائیڈ آف

زنک اوکسائیڈ (بی بی)

زنک اوکسائیڈ (باریک چھان کر) گرم ۱۵۰
سپیل آکسائیڈ گرم ۸۵۰

جھے ہوئے مقام، معمولی زخموں
اور اگر بیا کے لئے ہے، شیر خوار
بچوں کی جلد بھٹ جائے، نوذریے
کسیٹرائل ملا کر لگائیں۔

(۲۸) ویت فیڈ آکسائیڈ

نیزونک ایڈ ۱۰ گرام
سپیل سٹک ایڈ ۱۰ گرام
وائٹ سافٹ پیرامین ادس ۱
داد (زنک ورم) اگر بیا اور

دھوبی کی کھجلی وغیرہ کے لئے،
مادف مقامات پر اچھی طرح رگڑو۔

(۲۹) لیزارس پیسٹ

زنک اوکسائیڈ
[دوبار یک چھنا ہوا
ادس ۶
سٹارج ۶
ادس ۶

سیلی سلک ایڈ اوٹس ۱۲
 ڈائٹ سافٹ پیرامین اوٹس ۱۲
 پرانے زخموں خشک پرانے
 اگزیا اور خارش اندام نہانی کے لئے

۵۰، مینڈلز پیٹ

آپو ڈین ۵
 پوٹاسیم آپو ڈائیڈ ۱۵
 آیل آف پیپرمنٹ ۵
 گلیسرین ۱
 روڑ تین میں روٹی کی چھری
 سے حلق میں لگانے کے لئے

۵۱، پل آف کالوسنتھ

ایڈ ہائیڈروکس (بی پی)
 کالوسنتھ (باریک پوڈر) ۱۲۰
 ایلوز ۲۵
 سکیوئی ریزن ۲۵
 کرڈ سوپ ۵
 آیل آف کادز ۲
 ڈرائی آپوٹیکٹ ۱۲۰
 آف ہائیڈروکس ۱۲۰

سیرپ آف لیکوڈ ۱۲
 گلوکوس ۱۲
 ۲ گولیاں رات کو سوتے
 وقت قبض کشا ہے، اسہال
 پیش اور بواسیر کے مریضوں کے
 لئے مفید ہے۔

۵۲، پل آف آسرن

کاربونٹ (بی پی)
 ایکسی کبیٹ فرائی سنٹیٹ ۳۲
 ایکسی سوڈیم کاربونٹ ۱۱۹
 ٹراکانتھ (باریک پوڈر) ۲
 اکیٹیا ۸۱۲
 لیکوڈ گلوکوز ۳۲
 ڈسٹلڈ واٹر ۳
 گولی دن میں دو تین مرتبہ
 کھانے کے بعد خون کی کمی کو دور
 کرنے کے لئے
 نیز حیض کی رکاوٹ بخوابی
 اور عصبی درد وغیرہ میں جو کمی
 خون کے سبب ہو۔ تازہ تیار شدہ
 ہونی چاہئے۔

۵۳، پل آف ٹائیم پر منگنیٹ

ہوٹا کیم پر منگنیٹ گرین ۲
کے اولین [مساوی حصہ نقد ضرورت

دیر سے لین کی تہ چڑھا کر گویاں بناؤ
سیٹھے ہیں ایک گولی ہر نصف گھنٹہ کے
بعد دو، اگر تھے آجائے تو دوبارہ
کھلاؤ یہاں تک کہ دستوں کا رنگ
سبز اور تعداد کم ہو جائے۔

۵۴، اسپرین فنا سے لین

اسپرین
فنا سے لین [گرین ۵

ایسی ایک پڑیہ گرم دودھ یا چائے
کے ساتھ، درد سر، درد دانت، عرق المنا
اور ہر قسم کے درد عصبی کے لئے،
خلوئے معدہ میں کھلاتے ہیں۔

۵۵، اسپرین فنا سے لین
ڈورس پودر

اسپرین
فنا سے لین [گرین ۵

ڈورس پودر گرین ۵

ایسی ایک پڑیہ زکام، بخار، درد
اعضا کے لئے دن میں دو تین بار۔

۵۶، پوجی ٹیس پودر

پودر پوجی ٹیس (بی پی) گرین ۱

مقبوض قلب اور بول ہے،
اختلاج قلب، دل کے غلاف کی سوزش
ربری کارڈائیٹس، دل کی مائٹل بیماریوں
اور دل کی غیر منتظم حرکت (آری کیو آر فریڈ
شن) میں حسب ضرورت دن میں ۳-۴ دفعہ

۵۷، گرے پودر

مرکزی درد چاک گرین ۳

ایسی ایک پڑیہ حسب ضرورت
قبض کشا ہے، چونکہ بچوں کو سبز یا
مٹیائے یا پھلکی دار اسپہال کی شکایت
عام طور پر کسی عجز شش مارے کے سبب
ہوا کرتی ہے، اس لئے یہ دوا
اسے خارج کر کے اسپہال روکنے
کے لئے پگ گرین سے پگ گرین کی مقدار
میں دن میں ۲-۳ بار دی جاسکتی ہے۔

۵۸، کمپونڈ لکٹوریس پوڈر (بی، بی، پی)

کمپونڈ پوڈر آف لکٹوریس گرین ۹۰
ایسی ایک پڑیہ رات کو سوتے
وقت پرانی قبض اور ایام حمل کی قبض
کے لئے جریبان اور احتلام کے مریضوں
کو بھی کھلاتے ہیں تاکہ اجابت
رہے۔

۵۹، کمپونڈ جلیب پوڈر (بی، بی، پی)

کمپونڈ پوڈر آف جلیب گرین ۶۰
ایسی ایک پڑیہ رات کو سوتے
وقت، دائمی قبض، استسقاء، زرق
استسقاء، لمبی، برائش، ڈیزینڈ (دوم گرم) گردہ
اور سمیت بول ریوریمیا میں عمدہ
مہل ہے۔

۶۰، سنٹو نین پوڈر

سنٹو نین ۲
سکرود رنگر مصفی ۵
ایسی ایک پڑیہ رات کو خلوئے عمدہ
پر کھلاتے ہیں اور پھر اگلی فجر تک نیشیا
سلفاس کا حباب دیتے ہیں۔

یکھوؤں (راڈنڈوم) کو مارنے اور خارج
کرنے کے لئے اس کو ایک دن کا ناظر کر کے
یعنی ہر دوسرے روز صرف ۲-۳ بار کھلایا
جاتا ہے چار سال کے بچے کو چوٹائی پڑیہ
اور ۸ سالہ بچے کو نصف پڑیہ دے سکتے ہیں
اس سے زائد مقدار ہرگز نہ دیں۔

۶۱، کیلومل زنک پوڈر

کیلومل
زنک اوکسائیڈ ۱
بھد مسادی

اسے بطور ڈسٹنک پوڈر بعض جلدی
امراض اگر کیا، آتشکی زخموں اور کانڈی
لو مار آتشکی چوٹوں پر جو معتد کے گرد
گرد ہوتے ہیں، پھر دکتے ہیں۔

۶۲، ڈسٹنک پوڈر

بورک ایسڈ
زنک اوکسائیڈ

سٹارج
بھد مسادی

زخموں، گرمی دانوں، گویا
اور اری خفا انڈر ٹرائی گو یعنی
چھوٹے بچوں میں پیشاب لگنے

ہسے سے رازوں کی اندرونی سطح
کی سوزش پر چھڑکتے ہیں۔
گرمی کے رازوں کے لئے اس
میں ذرا سا کافور ملا سکتے ہیں۔

۶۳، ایلکلائن پوڈر

گینیشیم اوکسائیڈ ۲۰ گرین
کیسیم کاربونیٹ ۲۰ گرین
اسی ایک پوڈر ۲ دن میں
مرتبہ کھانے کے بعد، سو رہنم
اور معدے کی جلن میں معدہ کی
ترشی کو کم کرنے کے لئے،

۶۴، ایسٹر سیرپ

(دلی پانی)

آرون ۸۱۶ گرام
فاسفورک ایسڈ ۴ ملی لیٹر
سرٹکینا ہائیڈروکلور ۳۰ گرام
کریٹین سلفائیٹ ۱۲۱ گرام
سیرپ ۵۶ ملی لیٹر
گلیسرین ۱۲۰ ملی لیٹر

ڈسٹلڈ واٹر ۳۰ ملی لیٹر
ایک چمچہ خورد قد سے پانی
ملا کر کھانے کے بعد۔

عام مقوی و جنرل ٹانک ۱۰
محرك نواح ہے، تو اے غلیظ اور
حواس خمسہ کو طانت دیتا ہے۔
کثرت متبا کو نوشی سے

بصارت و صندلی ہو جائے، یا
دھیمی روشنی میں پڑھانا نہ جائے
تو یہ ایک کارآمد ٹانک ہے۔
اس سے قوت سماعت و
بصارت تدریجاً تیز ہو جاتی ہے۔

۶۵، ہپازمپیری آف

گلیسرین

جیے پین ڈکڑا کر کے ۱۲ گرام
گلیسرین ۵۰ گرام

ڈسٹلڈ واٹر بقدر ضرورت

سایچے میں شیاٹ بنائیں
یہ شیاٹ خصوصاً بچوں کا رنج
قبض کے لئے معتد کے اندر رکھ
دیتے ہیں۔

ادارہ رہنمائے زندگی کی مقبول عام طبی واکٹری مطبوعہ

مصنف ممتاز اطباء حکیم ڈاکٹر محمد رفیع تھانی۔ ایچ۔ ایچ۔ پی پنجاب یونیورسٹی آر۔ پی۔ ایچ۔ مالک و مدیر ماسٹر مہارہما کے زندگی و مصنف متعدد طبی کتب

طبی دنیا کی معرکہ الہا کتاب کنز العمال

طبی دنیا میں یہ اپنی طرز کی پہلی کتاب ہے۔ معالجات اور تجربات کے موضوع پر اس وقت کی کتب شائع ہو چکی ہیں لیکن اس کے مقابلہ کی آج تک کوئی کتاب معرینہ تحریر میں نہیں آئی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا دوسرا ایڈیشن جو ڈیڑھ ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا تھا ایک سال کی قلیل مدت میں ختم ہو گیا۔ اب اس کا تیسرا ایڈیشن منع اضافات شائع کیا جا رہا ہے۔ جس میں ہر مرض کا طبی و ڈاکٹری نام، تعریف، اسباب، علامات اور تشخیص کو مناسب وضاحت سے درج کیا گیا ہے اور ہر مرض کا یونانی، ڈاکٹری، ہومیوپیتک اور دیگر کمال شافی علاج درج کیا گیا ہے اور ہر ایک طریق علاج پر کئی عجیب و غریب، امراری اور ہمدی نسخہ جات درج اور آرٹ پیپر پر چھاپا گیا ہے۔ شخصی اقتصاد پر بھی دی گئی ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا طرز بیان اس قدر آسان اور دلچسپ ہے کہ معمولی اور دغواں اصحاب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

سائنس طبع سے لے کر آج تک علم طب نے جس قدر منازل ترقی طے کئے ہیں۔
ہر ایک طریق علاج و بیدک یونانی، ایوپٹھک، ہرمیو پٹھک وغیرہ نے بیماریوں کے علاج کے
لئے جو ادویات استعمال کئے ہیں، اور لاکھوں مرتبہ تجربہ کی کسوٹی پر پرکھے جاسکے ہیں،
اور تاثر میں آئے ہیں، اور جہاں تک مصنف کے دماغ اور تجربے نے رسائی کی ہے
ان کی لغو اور غیر مستند نہیں، بلکہ تمام نسخہ جات لاکھوں مرتبہ سائنسگاہ طریق پر تجربہ شدہ
ہیں۔ خصوصاً کئی کئی کی جدید ادویات، سلفا ڈرگس، انٹی بائیوٹکس، پینسلین، سٹریپٹو مائی سین
کھور، ٹی سٹین، کریونائی سین، ڈی اے ڈی، ہارمونز، غدوی ادویات اور دیگر ادویات کے
دانی تجربہ سائنس بھی دیتے ہیں، اور مریض کے علاج میں نہایت مفید، مجرب و نشانی انگیز
اور سینٹ ادویات بھی نکلی گئی ہیں۔

خصوصاً نمونہ: اور سی، کھانسی، ہر قسم، تب و دق، سہل، بواسیر، آتشک، سوزاک،
جریان، اہدم، ناعردی، مکی خون، ضعف جگر، سنگرمی، اسہال، ہیچش، درد گردہ، زویا، مہلیس
تپ، طبع، چربی، چونا بخار، وجع مفاصل، گنہی، بندش حیض، عقر، لکیر یا مدق، افسیان
سکھ، ناسور، بکند، پرانے زخم اور دوسری بیماریوں کے سوئی صدی تجربہ نسخے بلا بخل
نہیں کر دیئے گئے ہیں، اہل آخر میں قدیم و جدید ڈاکٹری، یونانی، فارماکوپیا، سینٹ ادویات
کے نسخے انڈیا کی ایک ادویات بھی نکلی گئی ہیں۔

بہ کتاب حکیموں، ویدوں، ڈاکٹروں، کمپونڈروں، عطاردوں، اور ساندوں، طالبان
طب ادویہ ایک اور دان کے لئے مفید ہے، شائقین تجربات کے لئے خزانہ جو اہرات
ہے، مناسب میں اس کا ہونا یرکٹس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ہر ایک گھر میں اس کی
موجودگی حکیم و ڈاکٹر کا کام آتی ہے۔

قیمت فی جلد - ۱۰ روپے، مجلد ۲ - ۱۰ روپے، علاوہ محمولہ ڈاک

مینجر کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

زمانہ حاضر میں انجکشن کے موضوع پر بے مثل کتاب جدید انجکشن کا ایب (بالقصور)

وجودہ وقت کی طبی دنیا میں معالجات میں انجکشن یعنی سوئی کے ذریعہ دوائی کا استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے کہ سوئی چھو نے پر ہی شفا یابی کا دار و مدار سمجھا گیا ہے اور شاید ہی کوئی ایسی مرض ہو جس کے علاج میں انجکشن یعنی انجکشن کا دخل نہ ہو اور ہر ایک معالج کو روزانہ کئی بار اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ عنوانات حسب ذیل ہیں۔

باب اول انجکشن کی تعریف۔ اغراض و مقاصد انجکشن لگانے کا ساز و سامان۔ بھکاری سرخ و سوائی رینڈاں، اور دیگر ضروری سامان اور ان کی نقاد ویر، انجکشن کا دستور العمل مثلاً تطہیر عامل معمولی آلات انجکشن، تطہیر ڈسٹریکٹور، انجکشن لگانے کا طریقہ، انجکشن لگانا سیکھنا، انجکشن لگانے کیلئے مقام کا انتخاب، انجکشن کے خطرات، انجکشن کی قسمیں مثلاً جلدی، عضلاتی، دریدی، نخاعی، استانی، اعصابی، مقامی، عمل انتقال خون، عمل اشتعال، الصدر اور دیگر مقامی تخذیر یعنی بھسی پیدا کریمے، انجکشن اور جسم کی مخصوص ساختوں کے انجکشنوں کو بالوضاحت لکھا گیا ہے، اور جانچا عکس نقاد ویر کے ذریعہ انجکشن کے سامان اور انجکشن کے مقامات کو ظاہر کیا گیا ہے۔

باب دوم میں انجکشن کے ذریعہ استعمال ہونے والی ایوی پیٹھک کی قدیم و جدید، مؤثر و بیٹھک، ویکٹوریاتی انجکشن کی ادویات، ان کے افعال، خواص و فوائد، مقدار، استعمال، اور وضاحت سے لکھا گیا ہے۔ زمانہ حاضر کی جدید ادویات مثلاً ڈرگ، ہارمون، آئی بائیٹک وغیرہ کو بھی تفصیل سے درج کیا گیا ہے۔

باب سوم میں انسانی جسم کی ایسی بیماریاں جن کا انجکشن کے ذریعہ ستانی اور چرب علاج ہو سکتا ہے ان کا عمل اور ستانی علاج لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں بعض ایسی باتیں بھی لکھی گئی ہیں جو اس سے

یہ کتاب میں شامل نہیں کی گئی۔ صفحات ۲۲۶، ٹائٹل رنگین، قیمت ۲۱ روپے

منجھ کتب خانہ زمزمہ سے زبانی لکھی گئی ٹیپنگ سب منجھ (پاکستان)

جنسی تعلقات اور جنسی معالجات کی بے نظیر کتاب

اسٹیم شاپ رطب دوم

دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جسے جنسی تعلقات سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ قانون قدرت کے تحت برتنہ رست انسان کو اس تعلق کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بھل مغربی تہذیب کے زیر اثر تو یہ موضوع ایسا عام ہو چکا ہے کہ اس کی سابقہ رازداریاں اور پوشیدگیاں اس قدر عریاں اور شگی ہو چکی ہیں کہ موجودہ وقت کے نوجوانوں کو جوانی سے پہلے ہی دعوتِ نظارہ ملے رہی ہیں، عنوانات حسب ذیل ہیں:

حصہ اول جنسیات: موجودہ وقت کی جنسیات پر ایک مفصل مقدمہ جس میں نوجوانوں سے خطاب کیا گیا ہے، اعضا و نسل کی تشریح، افعال و منافع، شہوت کی تعریف اور مابینیت، منی کی حقیقت اور اجزائے منویہ کا بیان ہے، شبابِ جوانی کیا ہے، جنسی خواہش کی پیدائش، جذبہ جنس کا فطرتی استعمال اور انسان کیلئے ازدواجی زندگی کی ضرورت کو دلائل اور واقعات سے ثابت کیا گیا ہے، شادی کیا ہے، رفیقہ حیات کا انتخاب اور دیگر ضروری امور جو اس کے انتخاب میں پیش آتے ہیں، بوری کے نیک و بد و پہلو جو نہایت دلچسپ و نظم میں لکھے گئے ہیں، رفیقہ زوجیت، آداب محبت، جماع کرنے کا فطرتی اور فطرتی طریقہ، نمیند اور جماع، تناسل بینی یا عیش و عشرت کے نقصانات، حمل اور حاملہ کے لئے ندیں، ہدایات اور اصول صحت درج ہیں،

حصہ دوم معالجات: جوانی اور قوتِ مردی کے ضائع کرنے کے اسباب مثلاً جلق، غلام، ناجائز تعلقات، کثرتِ جماع پر موجودہ دور کی مغربی تہذیب اور واقعات کی روشنی میں نہایت شرح و بسط سے لکھا گیا ہے، جربان، احتدام، سرعتِ انزال، نامردی، سوزاک، آتشک اور دوسری جنسی بیماریوں کا مفصل ذکر ہے، قوتِ باہ اور نامردی کا علاج اور اس کے تین اصول تسکین، تقویت اور تحریک، ان کا دستورِ علاج درج ہے، مغزوہ مرکب، یونانی، ہرمیو پیٹھک، ویدک، مجرا، محرب، قدیم و جدید نسخجات و ریح میں، آلات اور بجلی کے ذریعہ بھی نامردی کا علاج لکھا گیا ہے، قیمت ۳/۰ روپے

یہ مگر کتب خانہ رہنما کے لئے زندگی کو بہ نیک سنگھ دھرمی پاکستان

ڈاکٹری مجربات کی لاثانی کتاب جدید ڈاکٹری فارماکوپیا اردو

اس وقت طبی دنیا میں ایلوپیتھک ڈاکٹری کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، کہ اس وقت تمام دنیا کے ممالک میں یہ طریقہ رائج ہے، اور یہی ایک طریقہ علاج بن لائوئی طور پر مستعمل ہے، اور دنیا کے تمام ممالک کی حکومتوں نے سرکاری طور پر بھی اسی علاج کو عوام کی جسمانی بیماریوں کے علاج کا واحد حل قرار دیا ہے، اور یہی ایک طریقہ علاج ہے جس کے معالجین کو ہر ملک میں باقاعدہ طور پر حقوق حاصل ہیں، اور ان ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے آپس میں یگانگت رکھ کر کیا نیت پیدا کرنے کیلئے اپنے اپنے ملک میں فارماکوپیا یعنی مجرب ادویات کی ایک کتاب تیار کی ہوئی ہے جس پر تمام معالجین کے علاج کا انحصار ہوتا ہے، اور وہاں کی حکومتوں نے بھی سرکاری طور پر ان کے تجویز کردہ اور ترتیب دادہ فارماکوپیا کو مستمالوں میں رائج کیا ہوا ہے۔

اس کتاب میں پاکستان کے سابق صوبہ پنجاب کا جدید فارماکوپیا مجموعہ سرحدہ آرم ہنگال اور ہندوستان کے تمام صوبوں کے فارماکوپیا، انگلینڈ امریکہ کے فارماکوپیا بھی دست میں ہیں نیز انگلینڈ کے مشہور معروف ایم، ڈی، ایچ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے خصوصی مجربات دست میں، اور جو وہ وقت میں جن بیماریوں کی شانی علاج معلوم ہو چکا ہے، ان کی شانی ادویات بھی لکھی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان کے مشہور معروف ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے مجربات کو بھی لکھا گیا ہے ڈاکٹری مجربات کا ایسا مخزن ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی ڈاکٹری مجربات کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، ڈاکٹری کی بڑی سے بڑی کتاب بھی اس قدر کامیاب اور مجرب نسخہ جات کا مجموعہ پیش نہیں کر سکتی۔

حکیم ڈاکٹر وید، کمپونڈر، کیمسٹ، مڈ دالٹ اور نرس سب کے لئے بہانیت مفید اور کارآمد کتاب ہے، صفحات ۲۰۰، ٹائٹل رنگین قیمت ۳/۳ روپے
یہ مجرب کتب خانہ رہنما کے زندگانی کو بہ نیک سنگھ مغربی پاکستان

ڈاکٹری معالجات کی بے نظیر کتاب ایلویتھک میڈیکل پریکٹس

یہ کتاب جدید معالجات پر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، مضامین کی ایک جھلک
۱۔ ایلویتھک طریق علاج میں بیماری پیدا کرنے کے اسباب اور جدید معلومات مثلاً
جراثیموں کا مفصل بیان درج کیا گیا ہے۔

۲۔ تشخیص علاج کے لئے جو ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً تھرماسٹر، ایسٹسکوپ
ایئر سکوپ وغیرہ کا مفصل بیان ہے۔

۳۔ دستورالعلاج رک کہ کس طرح امراض کا شافی علاج کیا جاتا ہے
۴۔ جسم انسانی میں ادویہ داخل کرنے کے مختلف طریق خصوصاً انجکشن لگانے کا طریقہ
ہدایت آسان پیرایہ میں لکھا گیا ہے۔

۵۔ نسخہ نویسی و دوا سازی، ڈاکٹری اوزان و پیمانے و دیگر پریکٹس میں کام آتی والی
مفید معلومات درج ہیں۔

۶۔ ہر مرض کا یونانی، ڈاکٹری نام اور موجودہ دور میں بیماریوں کے علاج میں شافی
اثرات رکھنے والی ادویات کا مفصل بیان ہے۔

۷۔ عام مشہور مرکبات کے اجزاء کے نسخہ مثلاً سی پی سی پوڈورین منٹ پی سی
وغیرہ جو مختلف ناموں سے لکھے جاتے ہیں، ان کے مکمل اجزاء تحریر ہیں۔

۸۔ برٹش فارماکوپیا کی تمام معرود ڈاکٹری ادویات کے نام و مقدار خوراک درج ہے۔

۹۔ زمانہ حاضرہ کی جدید ادویات سلفا ڈرگ، بٹر ٹریپائی سین، مینی سلین اور دیگر ادویات درج ہیں۔

۱۰۔ میڈیکل پریکٹسزوں کی ترقی کیلئے عام ہدایات اور دوا ساز فزموں کی جدید طریقہ پر مبنی کیلئے

تھے اور ان کے پاکستانی ناچیسٹوں کے مکمل ایڈریس بھی درج ہیں۔ قیمت: ۳/۸ رقم ۲۶۸ صفحات

مینجر کتب خانہ دہلوانے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ ریسرچ پاکستان

خصوصی ادویہ اور ان کے معالجات (دوم)

پاکستان کے عرض وجود میں آنے کے بعد ہیٹھ ادویہ کے موضوع پر یہ سب سے پہلی کتاب ہے، مصنف نے اس کتاب کے تحریر کر کے زبردستی کمی کو دور اسی نہیں کیا، بلکہ ایک اہم ضرورت کو بھی ہوا کر رہا ہے۔

اردو زبان میں مفرد اور مرکب ادویات پر شمار کتاب میں موجود ہیں لیکن ہیٹھ ادویات پر آج تک کوئی مکمل اور جامع کتاب نہیں لکھی گئی جو تمام اردو دان حکیموں، ڈاکٹروں، کمیونسٹروں، دہلوی کمیونسٹوں، عطاروں، و طلبان علم طب اور ادویات کے دھیمی رکھنے والوں کیلئے مفید کارآمد اور مفید معجزہ مجموعہ ہوتی چنانچہ اس اہم ضرورت کے پیش نظر یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔

چنانچہ بہت قلیل مدت میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے، اور شاہین کے مسلسل زور و مطالبہ کی وجہ سے اب اس کے دوسرے ایڈیشن کے شائع کرنے کا اہتمام کر لیا گیا جو ضروری ترمیم و اضافہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جسم انسانی کی تمام بیماریوں کی تقریباً دو ہزار اور بیشتر یونانی، دیدک، ہومو پیتھی، ہیٹھ ادویات جو کہ مختلف ممالک، پاکستان، بھارت، انگلینڈ، امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، چین، جاپان، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں تیار ہوتی ہیں، خصوصاً ایسی ادویات جو بیماریوں کے علاج اور صحت قائم رکھنے کیلئے عامگیر شہر حاصل کر چکی ہیں، ان ادویہ کے اجزاء ترکیبی، افعال و خواص، غذا و خوراک، ترکیب استعمال، تیار کرنے والی دھم اور ملک کا نام لکھا گیا ہے۔ اور تمام ادویات کو جملہ نظام ہائے بدن مثلاً دماغ و عصاب کی خرابیاں، نظام تنفس، امراض خون، دوران خون، نظام انہضام کی بیماریاں، عصبی و ناسل مریضوں، دماغی امراض، جلد، میٹابولیزم، معاصر، ہڈیاں، قوت تغیر بدن، امراض مخصوصہ زنانہ و بچکان کے باعث لکھا گیا ہے۔

نیز معریات عامہ، معوی و غذیہ، ٹوٹھ پیٹ، طبی صابون، میسر، دیکسین، فلیکونین، ہلغا و گیس انٹی بائیوٹک، جیاتین، ہارمون، الیو جک، انٹی سٹامین، ڈرگز کا مفصل بیان ہے۔ یہی اور ان کا بیان فائدہ کے طبعی اور کیمیائی امتحان کا طریقہ، ڈرگ ایکٹ، ڈرگ کنٹرول آرڈر، ہیٹھ جیسٹیشن ایکٹ، مارکیٹ جیسٹیشن، ادویات متعلقہ اجراء و سلب بھی درج ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ کتاب

یہ مختصر کتاب خانہ پرستی سے لے کر لکھی گئی ہے۔

عاطلین طبیب کی صحیح رہنما قانون علاج

یہ ایک نادر و نادر تصنیف ہے۔ اس میں انسان کو بیماریوں کے پنجہ سے نجات دلانے کے قوانین بتائے گئے ہیں۔ اس کے چار حصے ہیں۔

۱۔ کلیات : اس میں علم طب، صحت، مرض، موت کی کیفیت، پیدا ہونے والی بیماریوں کے اسباب اور ان کی اقسام، علم الجراثیم کا مفصل بیان ہے۔ وقت مدبرہ بدن و دستور العلاج، علاج کی قسمیں، جسم میں ادویہ داخل کرنے کے مختلف طریق، انجکشن وغیرہ کو مفصل طور پر درج کیا گیا ہے۔

۲۔ علم الادویہ : ادویات کے اثر کی حقیقت و نام و نوعیت، استعمال، ہونیوالی ادویات اور جدید فارمین، سٹرکچرل، آرگنک، کورمیں، کوہین، سپاہ اور جدید ادویہ، سائیکو پک، پشلیں، سٹرکچرل، پی سے اس، ہائڈرازائٹ، آریڈائی سین، کامیکوہین، جیاتیں، رٹامنز، ہارمونز وغیرہ کے افعال و خواص، مقدار، خوراک وغیرہ درج ہیں۔

۳۔ دستور العلاج : اس میں جملہ نظام ہا و بدن کا دستور، اعضا، سپہ، مثلاً نظام اعصاب اور ن کے افعال، منافع، اعصاب کی تقسیم، حرکت، ان اعضا، جس کا بیان، درد کی مامیت، سوزش، اعصاب کی افراط و تفریط، غلغلہ، نالیج اور دیگر امراض اعصاب کا بیان اور علاج میں استعمال ہونیوالی ادویات اور مکمل دستور، علاج ہے۔ نظام، انتظام، منہ، معدہ، بکری، اعصابی کے افعال و منافع اور اس نظام میں پیدا ہونیوالی خرابیاں، بد نشینی، قبض، اسہال اور دیگر جگہ میں پیدا ہونیوالی امراض، نظام تنفس، نظام دوران خون، نظام تناسل مردان و زنان، نظام حرارت، میٹابولیزم، مفصل، جلد، سماعت، بصارت، جراثیم اور امراض چھانک، کھل، دستور، علاج، علاج، بالمار، سرد و گرم حمام اور کوئی امراض کا علاج مفصل سے کیا جاتا ہے۔

۴۔ ختم و ریات : علاج : اس میں طریقہ تشخیص، اعتبار، نظام بدن، پریکٹیشنروں کیلئے مفید اشارات، ہونے والی ضروریات، طب بنایت و صحت کے درج میں، آخر میں مجرب و ناکویا درج ہے۔ قیمت ۵/۵ جلد ۱/۶
یہ کتب خانہ ہر نما سے زندگی کو بہتر بنانے کے لئے لکھی گئی ہے۔ (پاکستان)

یونانی مجربات کی بے مثل کتاب یونانی میڈیکل پبلیکیشنز

یہ کتاب طبی دنیا میں ایک نئی پیشکش ہے جو اپنی بے مثل خوبیوں کی باعث ایک لاجواب مخزن ہے۔ اور اطباء کی اہم ضرورت کو پورا کیا گیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے یونانی تجربہ نسخہ جات کی کسی اور کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس میں انفرادی طور پر کسی ایک طبیب اپنے صدوری تجربہ نسخہ جات بلا بخل پیش کئے ہیں۔ پاکستان کی تمام طبی محاسنوں کے فارماکوپیا اور دیگر مشہور و معروف طبیب کے مجربات کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ عنوان سے حسب ذیل میں رہا، اور ہمارے زندگانی کا ترتیب دیا ہوا تجربہ فارماکوپیا۔

۱. تبیم یونانی تجربہ طبی فارماکوپیا یعنی قرابادین یونانی، ۲. پنجاب پراڈنشل یونانی طبی کالفرنس لاہور کا طبی دستور، ۳. اور فارماکوپیا، ۴. آل پاکستان یونانی طبی کالفرنس لاہور کا طبی دستور العمل اور فارماکوپیا، ۵. مخزن طب کے پاکستان کا طبی دستور العمل اور طبی فارماکوپیا، ۶. مخزن خادم الحکمت شاہدہ لاہور کا مصدقہ و تجربہ طبی فارماکوپیا، طب جدید مشرقی اور تہن فارماکوپیا کمیٹی آل پاکستان طبی مجلس لاہور۔ ۷. جدید طبی فارماکوپیا مجوزہ لفٹنٹ کرنل ای۔ جی۔ اومیر صاحب پی۔ و۔ ایچ۔ ڈی انگلینڈ۔

در سینکڑوں تجربہ و مفید نسخہ جات مثلاً مشمت دھات، اکسیر اطفال، اکسیر بچش، اکسیر کالی کھانی، سفوف قوت باہ، جام عیش یوسفی، اکسیر سنگہ منی، اکسیر سزاک، اکسیر معوی، اکسیر خارش، بال تہربت، اکسیر نالچ و لغوہ، اکسیر نایاب، اکسیر خاص، اکسیر سیل، اکسیر جگر، اکسیر ویدان الامعاء، اکسیر بواسیر، اکسیر پاد، اکسیر عرق النساء وغیرہ میں اس میں دئے گئے ہیں۔

اطباء کو ام اور طب سے دلچسپی رکھنے والے اور خصوصاً صدوری مجربات کے متلاشیوں اور جمع المجربات کے مرغیوں کے لئے ایک نادر و نایاب تحفہ اور طبی مجربات کا لاجواب خزانہ ہے۔

قیمت تین روپے صرف
مخبر کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

اردو لٹریچر میں طلب قانونی کا مفید مجموعہ پاکستان کا طبی قانون (مجموع دوم)

پاکستان کی قومی زبان اردو تسلیم کی گئی ہے، اور ہر ایک شعبہ میں اردو کو رائج کیا جا رہا ہے میڈیکل لائن میں اکثر کتابیں اردو زبان میں شائع ہو چکی ہیں لیکن میڈیکل ایکٹ طبی قانون میں اردو زبان میں ابھی تک کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی، اکثر حکیم، ڈاکٹر، کمپسٹ، ڈرگسٹ، عطار، دوا فروش، کمپونڈ وغیرہ جو انگریزی زبان کو نہیں سمجھ سکتے، اکثر قانونی گرفت میں آئے جیتے ہیں، اس ہم ضرورت کے لئے یہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اس کے دو حصے ہیں حصہ اول ڈرگ ایکٹ یعنی قانون ادویہ، اس میں دوائی کی تعریف، دوا سازی، آفیشل، نان آفیشل، برٹش فارماری کی متعلق مرکبات تیار کرنے کی اجازت کا حاصل کرنا، پیٹنٹ یعنی خاص ادویہ کی تیاری، گورنمنٹ سے منظور کرانا، قانون رجسٹریشن جس کے جاننے سے فرم، دوا خانہ، پیٹنٹ ادویہ، رجسٹرڈ کوآپریٹو میں، کامیاب و ناکام خلاف قانون دوا سازی کی تعزیرات وغیرہ بھی درج ہیں، دوا فروش، ایجوٹیک، پیٹنٹ ادویہ، ایکس، یا انجکشن، انسٹرومنٹ یعنی ڈاکٹری آلات کی فروخت کیلئے لائسنس کا لینا، ایجوٹیک ادویہ کی تقسیم، ہارور، ویکل، اینٹی بائیوٹکس، اینٹی سیرس، سیمیا، تیزاب، ایسڈس، کھن، سپرٹ، بشیڈول ایچ ای ایل ادویہ کی تقسیم، جلد سمیا کی فروخت کے لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ، فارم ۱۱، ۲۰، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱

امراض اطفال کی بے نظیر کتاب بیماریاں اطفال (بالصویر)

بچے ہی ہر ملک کی صحیح اور معینہ دولت ہیں۔ اور ہر ایک ملک کی مستقبل کی ترقی اور کامرانی کا انحصار اس ملک کے بچوں پر ہے۔ بچوں کی تندرستی، صحت اور نشوونما کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی صحت کا غماض صرف طبیب ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بچہ اپنی نکالیف کو زبان سے نہیں بتا سکتا۔ طبیب اپنے تجربات اور مہارت علامات سے ہی بچوں کے امراض کی تشخیص کر کے علاج کرتا ہے۔

اس کتاب میں بچوں کی تمام عمومی مثلاً سر و اعصاب، آنکھوں، ناک، کان، جسنہ، جلق، سینہ، پیٹ، معدہ اور انتڑیوں کی بیماریوں کا ذکر نہایت تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اور ہر ایک مرض کی تشخیص اور مکمل شافی علاج درج ہے۔ اور تمام طریقہ علاج مثلاً یونانی، دیدک، ایوپیٹک اور ہومیو پیتھک کے مجرب نسخے دیے گئے ہیں۔ اور ہر بچے بڑی خصوصیت سے کہ مصنف کا بچوں کے علاج میں اپنا تجربہ بہت وسیع ہے، ہزاروں بچے ان کے علاج سے مختلف امراض کے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بچوں کی مشہور بیماری سوکڑا کا (یعنی) اور... افسیدہ مجرب اور شافی نسخہ درج ہے جس کے استعمال سے سینکڑوں بچے تندرست ہو چکے ہیں۔ اور دیگر امراض مثلاً بچوں کی تپ دق، دق الاطفال، مونیر، ڈبہ اطفال، تپ، اسہال، تپ چش، بلیریا، حرقہ، کالی کھانسی کے سونی صدی مجرب نسخے بلا تخیل درج کئے گئے ہیں۔

کئی ایک اطباء اور ڈاکٹروں کے مفید اور دلچسپ مضامین اور بچوں کی بیماریوں کے متعلق ان کے ذاتی تجربات کو جامع و کامل دست تحریر کیا گیا ہے۔ امراض اطفال کے موضوع پر اس کے مقابلہ کی آج تک کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ جا بجا اقتادیر سے مزین ہے۔ بچوں کے اسے ہر گھر میں اس کا ہونا اشد ضروری ہے۔ قیمت تین روپے صرف علاوہ محصول ڈاک

یہ بک کتب خانہ رہنمائی زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

اطباء کے پاکستان کا تعارف نامہ

آل پاکستان طبی ڈائریکٹری (بالصویر)

اس کتاب میں پاکستان کے ہزاروں حکیموں کے صحیح کوالف مثلاً نام، ولدیت، عمر، عام تعلیم، طبی تعلیم، مدت مطب، تصنیف یا ایجاد اور مکمل پتے درج ہیں۔ غیر ملکی دو اساز کمپنیاں جو سیٹنٹ ادویات اور انجکشن یعنی ٹیکے وغیرہ تیار کرتی ہیں ان کے پتے اور پاکستان میں ان کے تمام رجسٹروں کے صحیح پتے بھی درج ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان میں طبی، ڈاکٹری کتابوں کے چھاپنے والے اور بیچنے والوں کے بھی نام تحریر ہیں۔ پاکستان کی طبی ڈاکٹری مجالس، ایسوسی ایشن وغیرہ ان کے نام اور ان کے مکمل پتے تحریر ہیں۔

پاکستان میں یونانی، ویدک، ایو پیٹھک، ہومیو پیٹھک درس گاہیں یعنی کالجوں کے نام اور ان کے مکمل ایڈریس بھی لکھے گئے ہیں۔ اور پاکستان و بھارت کے اردو، انگریزی رسالوں کے نام، مقام اشاعت اور ایڈیٹرز کے نام بھی درج ہیں۔ ڈاکٹری آلات تیار کرنے والی فرموں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اکثر اطباء کی نقادیر کے علاوہ ان کے صدری مجربات جو ان کے مخفی خزانے تھے، بلا کم و کاست درج ہیں۔ اور ہر ایک نسخہ سینکڑوں مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔

مجربات کے متلاشی حضرات کے لئے بھی لاجواب کتاب ہے، ہر ایک طبیب اور عامل طب کو اس کی ایک جلد اپنے پاس رکھنی ضروری ہے کیونکہ یہی ایک کتاب ہے جس میں ہر ایک میڈیکل پریکٹیشنر کی ضروریات کو حاصل کرنے کے مکمل کوالف درج ہیں، تاکہ موجودہ وقت کے تمام اطباء اپنے معاصروں سے مکمل واقفیت حاصل کر سکیں۔

غرضیکہ یہ کتاب اپنی نوعیت کی بے مثل کتاب ہے جس پر ملک کے موقر اخبارات، رسالے اور مقتدر طبی شخصیتیں اس کے مفید ہونے پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، کتابت، طباعت، ریدہ زیب، ٹائٹل عمدہ رنگین کاغذ سفید کرنا فنی، قیمت ۳/- روپے مجلد ۳/۱۲ روپے

مینجر کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

بایو کیمک طریق علاج کی بے مثل کتاب

ایکینہ بایو کیمسٹری

بایو کیمک طریقہ علاج ہے جس میں تمام بیماریوں کا علاج صرف بارہ ادویات سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس علاج کے موجد ڈاکٹر سنٹر نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ جسم انسانی بارہ نمکیات پر مرکب ہے اور کسی ایک نمک کے کم ہونے سے جسم میں مختلف قسم کی تکلیف وہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ علامت اس نمک کی کمی کو پورا کرنے ہی سے رفع ہو سکتی ہے اور لاکھوں مریضوں پر استعمال کرنے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نظریہ حقائق پر مبنی ہے چنانچہ اس طریقہ علاج پر یہ کتاب اپنی نوعیت کی بہترین کتاب ہے اس کتاب کے چار حصے ہیں حصہ اول میں بایو کیمک علاج کا فلسفہ، دوا سازی اور دوائی کا استعمال مقدار خوراک، ضروری ہدایات اور ڈاکٹری اوزان درج ہیں۔ حصہ دوم میں بارہ ادویات کے افعال و خواص مقدار خوراک وغیرہ مفصل درج ہے جس کے متعلق دعویٰ سے کہا جاسکتا ہے کہ اس قدر تفصیل دار بیان کسی کتاب میں نہیں ہو گا، بایو کیمک اور ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے مجربات کا ضمیمہ ذکر کیا گیا ہے۔ حصہ سوم میں علاج الامراض ہے جس میں سر بیماری کا بایو کیمک طریق علاج پر مجرب علاج درج ہے جس کو ایک پڑھا لکھا معمولی آدمی بھی باسانی پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

حصہ چہارم میں بایو کیمک مجربات ہیں، اس میں بایو کیمک مجرب نسخہ جات جو بیماریوں کے علاج میں کثیر اثر ثابت ہو چکے ہیں اور لطف یہ کہ بالکل بغیر رسم سے اور مفید ہیں بایو کیمک طریق علاج پر یہ ایک بہترین کتاب ہے جس کے مقابلہ کی دوسری کتاب کا ملنا مشکل ہے قیمت ۱۰/۳ روپے حجم ۲۶۰ صفحات

اکسیری مجربات یا معمولات حجازی

اس کتاب میں تقریباً ایک سو اسی نسخے درج ہیں جن کے استعمال سے مرض سے مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ یہ نسخے ہیں جو حجازی صاحب کے اپنے معمول مجرب ہیں موجودہ وقت میں اس کے ہم پایہ مجرب

کی کوئی کتاب نہیں ہے نیز کتاب ہے قیمت چار روپے صرف
 میمن بک خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

ڈسپنسر کورس

ڈسپنسر کلاس پاس کرنے کے لئے اس کورس کو ذہن نشین کر لینے والے ہر امیدوار کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ کمیونیکیشن کورس پریکٹیکل مائن پریسلیس کے ماتحت مرتب کیا گیا ہے۔ راور ایڈیٹنگ کے سرخوشی کے لئے تمام ضروری معلومات درج ہیں۔

مضامین مندرجہ ذیل میں حصہ اول تحریری

طریقہ، اوزان و پیمانے، فی صد محلول تیار کرنے کا طریقہ، دوا دینے کے اوقات، فارمی یا دوا سازی نسخہ سازی مثلاً خشک نسخے تیار کرنا، سیال مسحور وغیرہ بنانا، امیلسن تیار کرنا، گولیاں اور ٹمکیاں تیار کرنا، انجکشن لگانا، سکینا اور اس کا بیان، تغذیہ یا عمل ان کم پیٹی بلٹی، طبی یا سیٹری لائسنس اور اس کا طریقہ، دواؤں کا سٹور رکھنا، زہری اور ان کا علاج، ایڈیٹنگ ڈاکٹری ادویات کے افعال و خواص، مقدار، خوراک اور ترکیب استعمال کو وضاحت سے لکھا گیا ہے، ڈاکٹری کے جنرل ناچ معنی معلومات کو بھی درج کیا گیا ہے۔

حصہ دوم عملی یا پریکٹیکل درجہ عام سوالات، دوا سازی، امیلسن، مرہم، پوسٹ، گولی، ٹمکیہ بنانا، دوا شناسی اور اس کا طریقہ، اوزان و پیمانے، معلومات عامہ، امراض و علاج، ڈسپنسر کا تعلق، ڈسپنسر کے فرائض وغیرہ کو وضاحت سے لکھا گیا ہے، سابقہ امتحانات کے سوالات مع جوابات تحریر میں قیمت رعایتی فی جلد ۲/- روپے

کنزالجواہرات

یہ وہ کتاب ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے کامیاب حکیموں اور ڈاکٹروں کے روزمرہ کے سینکڑوں معمرات و مع میں سریت لے کر پاؤں تک تمام بیماریوں کے تیر بہدف اکسیری مجربات درج ہیں، ملک کے مشاہیر طبیب اور ڈاکٹر اس کے مفید ہونے کے متعلق اظہار رائے فرما چکے ہیں، کتاب کیا ہے گنجینہ جواہرات ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مجربات کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، قیمت ۲/- روپے

ڈاکٹری فارماکوپیہ چارٹ راور، انگریزی، انجکشن

پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے فارماکوپیہ کا اردو ترجمہ ہے، جو ایک چارٹ کی شکل میں تیار اعلیٰ کاغذ پر خوشخط چھپوایا گیا ہے، ہر ایک میڈیکل ہال میں اس کا ہونا ضروری ہے۔

قیمت فی چارٹ اردو، انگریزی، انجکشن

مینجر کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

تشخیص امراض پر وسیع معلومات کا خزانہ

(زیر طبع)

کتاب تشخیص (بالصویر)

مصنفہ ڈاکٹر محمد رفیق مجازی

انسانی بیماریوں کے علاج میں کامیابی کا انحصار صحیح تشخیص پر مبنی ہے۔ کیونکہ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو، دروائی خواہ کتنی قیمتی اور زود اثر ہو، ہرگز ناکام نہ ہو سکتی، اگر مرض کی تشخیص صحیح ہو، تو اس مرض کا علاج کرنا آسان ہی نہیں، بلکہ علاج میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، اور کوئی دشواری نہیں رہتی چنانچہ اکثر اطباء کے بڑے مطالبہ کے پیش نظر یہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اس کتاب میں تشخیص امراض کے علمی اور عملی پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، اس کے تین حصے ہیں،

حصہ اول تشخیص ظاہری : اس حصہ میں ایسی معلومات ہیں جن سے معالج اپنی فراست اور تجربہ سے مریض کو صرف ایک نگاہ دیکھ لینے سے ہی کئی امراض کو معلوم کر لیتا ہے، مثلاً دیکھنے، سننے یا ٹوچنے یا لہے سے مس کرنے یا نبض وغیرہ کے دیکھنے سے پیشتر امراض کا پتہ حل سکتا ہے، اس حصہ میں مصنف نے اپنی ذاتی تحقیق اور تجربہ کو زیادہ وضاحت سے پیش کیا ہے، اور متعدد میں پیش کیے، شیخ رئیس بوعلی سینا، ابو سہل مسیحی، جالینوس، علامہ بقرقندی، علامہ محمد اکبر ازہانی، شیخ الملک حکیم حافظ اجل خاں صاحب، حکیم عبدالوہاب بنیاد اور دیگر اطباء اور ڈاکٹروں کے علمی تحقیق اور عملی تجربہ کو بھی پیش کیا ہے، حصہ دوم میں آلات تشخیص کرنے کا طریقہ بتایا گیا، مثلاً تھرمیٹر، اسٹتھسکوپ، ایرسکوپ، ایکسیرے وغیرہ حصہ سوم میں مریض کا معائنہ، نظام انہضام، تنفس، دوران خون، بول، عصاب، امراض مخصوصہ مردان و زنان، جلد، بخار اور بخور کی بیماریوں کی تشخیص کرنے کا مفصل بیان، غرضیکہ یہ کتاب ہر میڈیکل پریکٹیشنر کی عام تشخیصی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، اس کے مطالعہ کے بعد معمولی تباہیت میں بھی جبروت انگیز طور پر تبدیلی واقع ہو جائے گی، اور ہر ایک مریض کی تشخیص کرنا آسان ہو جاتی ہے، جابجا کسی تصاویر نے اس کتاب کی انادیت کو دوبالا کر دیا ہے،

طرز بیان نہایت سادہ اور سلیس، اور زبان میں ہے جس سے ایک معمولی اور دوران طبیب بھی پڑھ کر

مستفید ہو سکتا ہے، لکھائی چھپائی اعلیٰ کاغذ سفید صفحات ۲۵۶، قیمت فی جلد ۵ روپے

منیجر کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹوبہ ٹیک سنگھ (مغربی پاکستان)

فہرست مضامین کنز العلاج طبع سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۴	شیخ	۳	پیش لفظ
۶۷	فالج		مسرد اعصاب کی بیماریاں
۷۶	حذہ	۵	درد سر
۷۸	رعشہ	۶	درد سر نرالی
۸۰	تمد و کزاز	۲۲	بجربات درد سر
۸۱	اختلاج	۲۳	درد سر کا ہومیو پیتھک علاج
۸۲	بذیان	۲۶	درد تشنیتہ
۸۳	لوہ لکنا	۳۰	درد عصابہ
۸۸	سر میں پانی بھر جانا	۳۲	کابوس
۸۹	مرگی	۳۴	ضعف دماغ
۹۷	سکتہ	۴۰	نزہ و زکام
۱۰۲	اختناق الرم	۴۸	سر سام
۱۰۲	عطاش	۵۵	بے خوابی
۱۰۲	ام الصبیان	۵۷	شیان
۱۰۲	مالجوریا	۵۹	نیند کی زیادتی
۱۰۵	جنون	۶۰	دندان سر
۱۰۷	گردن میں بل پڑ جانا	۶۲	عصبی کمزوری

۱۴۳	نظر کی کمزوری	۱۰۸	مراق
۱۴۴	ناخونہ	۱۰۹	ہزال نخاع
۱۴۵	روزگوری	۱۱۱	دماغ کا نرم پڑ جانا
۱۴۵	نا سور چشم		آنکھوں کی بیماریاں
۱۴۷	جربات امراض چشم		آنکھ دکھنا
	کانوں کی بیماریاں	۱۱۲	سفیدی چشم
		۱۲۱	لکڑے
۱۵۱	کان کا درد	۱۲۳	موتیا بند
۱۵۶	کان بہنا	۱۲۷	آنکھ میں کچھ پڑ جانا
۱۶۰	کان میں میل پڑ جانا	۱۳۱	آنکھ پر چوٹ لگنا
۱۶۰	کان بچنا	۱۳۳	بہنی
۱۶۳	بہرا پن	۱۳۴	نی
۱۶۶	کان کی پھنسیاں	۱۳۵	پڑ بال
۱۶۷	کان کے کیرٹے	۱۳۷	بھینٹا پن
	ناک کی بیماریاں	۱۳۸	نظر کی خرابی
		۱۳۸	قریب نظری
۱۷۰	نکسیر	۱۳۹	بعید نظری
۱۷۶	نزلہ زکام	۱۳۹	اندھا پن
۱۷۶	ناک کی بواسیر	۱۴۰	اندھرا نا
۱۷۷	ناک کے کیرٹے	۱۴۱	ڑھنک
۱۷۸	ناک کی جربو	۱۴۳	

۲۱۱	لکنت	۱۷۹	ناک میں کچھ پھنس جانا
۲۱۲	گلے پڑنا	۱۸۰	نوبنی سیدان الائف
۲۱۶	کوا گرنا		منہ، زبان، حلق کی بیماریاں
۲۱۷	درد گلو	۱۸۲	منہ کے چھالے
۲۱۹	پیرانا درد گلو	۱۸۵	منہ آنا
۲۲۱	حلق کی پھنسیاں	۱۸۹	منہ سے بدبو آنا
۲۲۲	آواز کا پیٹھ جانا	۱۸۹	سرطان لب
۲۲۳	مشکل سے نکلنا	۱۹۰	ہونٹ کا پھٹنا
۲۲۴	خناق	۱۹۱	ہونٹوں کے چھالے
۲۲۸	کن پڑے		دانتوں کی بیماریاں
	بیسنے کی بیماریاں		
۲۳۱	کھانسی	۱۹۳	درد دانت
۲۴۰	دمہ	۱۹۸	دانتوں پر میل جمع ہو جانا
۲۴۹	ذات الریہ	۱۹۹	مسوڑھوں کی سوجن
۲۵۸	ذات الجنب	۲۰۰	ما سخورہ
۲۶۳	سینہ کا عضلاتی درد	۲۰۶	زبان کا سوج جانا
۲۶۴	نفث الدم	۲۰۷	تندرا
۲۶۸	سل	۲۰۸	شکاف زبان
	دل کی بیماریاں	۲۰۹	سرطان زبان
۲۷۲	خفقان	۲۱۰	زبان کا بڑا ہو جانا
		۲۱۰	مقوک کا زیادہ آنا

۳۲۳	تہجشت	۲۷۶	درد دل
۳۲۸	بواسیر	۲۷۸	غشی
۳۲۵	خروج مقعد	۲۸۰	دمہ قلبی
۳۲۷	جگندر	۲۸۱	دل کی سوچن
	جگر، تلی اور پتہ کی بیماریاں	۲۸۱	دل کی اندرونی سوچن
		۲۸۲	دل کے غلاف کی سوچن
۳۲۹	ضعف جگر	۲۸۲	دل ڈر بنا
۳۵۵	درد جگر	۲۸۵	دل کی پھر کن
۳۵۶	ورم جگر		معدہ اور انٹریوں کی بیماریاں
۳۵۷	یرقان		
۳۶۱	تاب تلی	۲۸۹	درد معدہ
۳۶۲	استسقا	۲۹۵	بد معنی
	گردہ، مثانہ، قعیب	۲۹۷	قے رستی
	کی بیماریاں	۲۹۹	بھکی
۳۶۹	درد گردہ	۳۰۶	سینہ
۳۷۲	گردہ کی پھری	۳۰۹	قویخ
۳۷۲	ورم گردہ	۳۱۳	قبض
۳۷۷	ضعف گردہ	۳۱۶	دیوان الامعاء
۳۷۹	خونی پیٹاب آنا	۳۱۷	آست میں تلے جانا
۳۸۰	پیٹاب بند ہو جانا	۳۱۹	ورم زائدہ عور
			اسہال

۴۳۸	کثرت حیض	۳۸۲	پیشاب پیدا نہ ہونا
۴۴۱	عقتر	۳۸۵	سوزاک
۴۴۳	درم رحم	۳۹۲	آتشک
۴۴۵	شرنگاہ کی خارش		مردوں کی بیماریاں
۴۴۶	سیلان الرحم		جریان
۴۵۰	خود ج اندام بنانی	۳۹۶	کثرت احتلام
۴۵۱	درد زہ	۴۰۱	سرعت انزال
۴۵۳	اختناق رحم	۴۰۵	جلق یا مشت زنی
۴۵۶	پرسوتی بخار	۴۰۹	نامردی
۴۵۷	استقاط حمل	۴۱۲	انزوا
۴۶۰	درد بعد وضع حمل	۴۲۹	تیز حشفہ
۴۶۱	زچہ کی ٹانگ کا سفید درم	۴۲۹	درم فدرہ مذی
۴۶۲	سن یا سن	۴۳۰	قبیلہ مایہ
۴۶۲	رحم کا ٹک جانا	۴۳۰	درد خصیہ
۴۶۵	سپرہ	۴۳۱	فطوں کی خارش
۴۶۷	دودھ کی زیادتی	۴۳۱	درم مثانہ
۴۶۷	دودھ کی کمی	۴۳۲	سلسل البول
۴۶۸	پستانوں میں دودھ جم جانا	۴۳۳	عودتوں کی بیماریاں
۴۶۹	پستانوں کا درم		احتباس الطمث
۴۷۰	پستانوں کا بڑا ہو جانا		
۴۷۱	پستانوں کا ڈھیلا ہو جانا	۴۳۴	

پستانوں کا چھڑا ہوجانا

بخاروں کا بیان

شب لرزہ یا ملیریا بخار

میعادی بخار

دق دسل

اعصاب و مفاصل کی بیماریاں

گنٹیا

نقرس

جلد کی بیماریاں

زخم

چوڑے پھینسی

خارش

داد

چنبل

آبے

چھپا کی

سرخابادہ

ہگیا گرم پانی سے جل جانا

۴۷۲

شب چراغ

گھنچ

۴۷۳

جو میں پڑنا

۴۸۲

بغا بھوسی

۴۹۹

ضربہ و سقطہ

چھا جن

جاور سیا

چلبیری

لاہور سور

۵۱۲

۵۱۹

بچوں کی بیماریاں

۵۲۶

ام البیان

۵۲۹

تشخ

۵۳۳

دانت نکالنا

۵۳۶

سیفہ اطفال

۵۳۸

کھانسی

۵۴۱

کالی کھانسی

۵۴۴

دمہ اطفال

۵۴۵

ڈبہ اطفال

۵۵۰

بد معنی

۵۵۲

۵۵۶

۵۵۷

۵۵۸

۵۵۹

۵۶۰

۵۶۱

۵۶۲

۵۶۳

۵۷۲

۵۷۳

۵۷۴

۵۷۶

۵۷۸

۵۸۰

۵۸۳

۵۸۴

۵۸۷

۶۲۳	پارہ	۵۸۸	تھے، متلی
۶۲۴	سرمہ	۵۸۹	پیٹ درد
۶۲۵	ناسفوس	۵۹۱	اسہال
۶۲۵	سیبہ	۵۹۲	پیش
۶۲۶	تانبہ	۵۹۲	قبض
۶۲۶	چاندی	۵۹۵	کرم امعا
۶۲۷	جست	۵۹۶	بستر پر پیشاب کرنا
۶۲۷	نیشہ پسا ہوا	۵۹۷	بندش بول
۶۲۷	آبکودین	۵۹۸	طیریا بخار
۶۲۸	افیون	۵۹۹	میعادی بخار
۶۲۹	کوکین	۶۰۰	سوکڑا اطفال
۶۳۰	کلورونارم	۶۰۳	خسرہ
۶۳۰	انٹی پارکیرین	۶۰۵	چیمپک
۶۳۱	کافور	۶۰۷	بچوں کا درجہ حرارت کم رہیں ہو جانا
۶۳۱	بھنگ	۶۰۸	رال بہنا
۶۳۱	دھتورہ	۶۰۹	تلاخ الغم
۶۳۲	متباکو	۶۱۰	جریان خون
۶۳۲	کچھ	۶۱۰	بڈیوں کا طیرسنا ہونا
۶۳۳	مٹھا تلیہ	۶۱۱	بچے کا یرقان
۶۳۴	جھاگلوٹ		زہریلے اوران کا علاج
۶۳۵	کھلا نرہ	۶۲۱	سنگیا

۶۴۴	بھڑکا کاٹنا	۶۳۵	ڈیجتال
۶۴۴	شہد کی مکھی کا کاٹنا	۶۳۵	تار پین
		۶۳۶	کھنٹ
	امراض عامہ	۶۳۶	مٹی کا تیل
۶۴۴	اسکرپٹ	۶۳۷	شراب
۶۴۶	بیری بیری	۶۳۷	تیزاب
۶۴۷	کساح	۶۳۸	ایسڈ کاربائک
۶۴۸	جوڑوں کا پھتر اجانا	۶۳۹	ایسڈ ہائیڈروسیانک
۶۵۰	موٹا پہ	۶۳۹	الگزیلک ایسڈ
۶۵۱	ہلکا د	۶۳۹	کاشک پوٹاش
۶۵۲	گلہڑ	۶۴۰	کاربن مانو آکسائیڈ
۶۵۶	ڈاکٹری فارماکوپیا	۶۴۰	کاربن ڈایا آکسائیڈ
		۶۴۱	سانپ کا ڈسٹ
۶۷۲	ڈاکٹری فارماکوپیا جدید	۶۴۲	بچھو کا کاٹنا

طبی دنیا کی معرکہ الادا کتاب

کنزالتشخیص بالتصویر

اس کا مطالعہ ہر ایک طبیب کے لئے ضروری ہے

قیمت چھ روپے

ملنے کا پتہ :- کتب خانہ رہنمائے زندگی ٹویٹیک سنگھ



KANZ -UL- ILAJ

THIRD EDITION

طیب ★

BY

Dr. MOHAMMAD RAFIQ HIJAZI

Editor:

RAHNOMA -E- ZINDGI



RS. 10/-



RAHNOMA-E-ZINDGI BOOK DEPOT

TOBA TEK SINGH